



Duke University Medical Center Library
Trent Collection



Hans von Gersdorff—1551—Contemporary Color

Josiah Charles Trent, M.D.



Digitized by the Internet Archive
in 2016

<https://archive.org/details/dehumanicorporis01spie>

DILIGENTIA.

ANATOMIA.

INGENIUM.

ADRIANI SPIGELII

BRUXELLÆNSIS

Equitis D. Marci

olim

In Patavino Gymnasio Anatomicæ & Chirurgiæ Profess. Primarij,
DE HUMANI CORPORIS FABRICA
LIBRI DECEM,
Tabulis XCIIIX. ari incisiss elegantissimis, nec
ante hac visis exornati.

Serenissimo

IOANNI CORNELIO VENETIARUM Duci dicati.

OPUS POSTHUMVM.


DANIEL BVCRETIVS VRATISLAVIENSIS Philof. & Medic. D.

FRANCOFVRTI

Impensis & Cælo MATTHÆI MERIANI
Bibliopolæ & Chalcographi,

ANNO M.DC.XXXII.

INSTRVMENTA ANATOMICA.



I.
Spigelius



SERENISSIMO

IOANNI CORNELIO
VENETIARVM DVCI

LIBERALIS CREMA Philof. & Medic.D.

Perpetuam Felicitatem.

INTER cætera ingenii monumenta, Serenissime Princeps, quæ Adrianus Spigelius, fatis concedēs, mihi reliquit, Historiam humani corporis, pluribus à se locupletatam inuentis, Danieli Buretio, & probatæ sibi fidei ac eruditionis Anatomico, vt sparsam in ordinem redigeret, commisit. Id opus cum à Clarissimis huius Collegii Medicis, quibus legendum exhibueram, probatum esset, tum vt Soceri, de me optime meriti votis, tum plurimorum, qui enixe id desiderabant, precibus satisfacerem, in publicam lucem protraxi. Cæterum vt fœlicioribus auspiciis, splendidiusve in hominum manus veniret, Tibi Serenissime Princeps, dedicare visum est. Quid enim plus lucis exspectem aliunde, quam ab eo, à quo ipsa Respublica toto terrarum orbe splendidissima, quæ Te Illu-

striffimi Senatus Principem omniū applausu creavit, non mediocrem lucem mutuatur? Si enim familiam spectemus, ab antiquissimis Romanorum Corneliis, quorum res gestę ac nobilitas omnium historias adornat, deducitur? si Fortunę bona intueamur, cum summum Imperium teneas, Filios Patri quam simillimos cernis, qui cum & ipsi maximis honoribus fungantur, ambiguum tamen faciunt, à tali dignitate plus accipiant decoris, quam eidem conferāt. In Federico certè Vaticana purpura nitidius splēdet: in Marco Antonio Primicerialis mitra eminet: à Francisco & Aloysio Senatoria toga gloriam: à Georgio literę & Philosophia ornamentum capiunt. Te verò ipsum si cernamus, nō tam Fortunam hanc tuam, quàm Te in hac ipsa admirari fas est. Raram in Deum pietatem, acerrimum iudicium, suspiciendam doctrinam, incredibilem prudentiam, erga subditos clementiam, in patriam amorem. Quę certè omnia talia sunt, vt cum in Te summo Principe sint conspicua, summis quoque tantum Heroibus propria fuerint, Deum Opt. Max. venerari æquum est, vt Clementissimum Optimumque Principem terris haud inuideat, sed diutissimè incolumem, saluumque præstet, quo præclariorem certè,

*Non alium videre Patres, aliumve Nepotes
Aspiciunt.*

Venetiis. Anno M. DC. XXVII.



AD

CELEBERRIMVM AMPLISSI-
MVMQVE VENETORVM MEDICO-
RVM COLLEGIVM.




ADRIANI Spigelij, Clarissimi Viri Anatomen, Serenissimo IOANNI CORNELIO, Venetiarum Duci dicatum opus, Vobis, Excellentissimi VIRI, offero. Sub auspiciis enim summi Principis natum, nec tutius muniri, splendidius ornari, quam eiusdem patrocinio, potuit. At cum obscurum minime sit, quam Dissectionum studium plærisq; omnibus, ijs etiam, qui Dogmaticam sectantur Medicinam, sordeat, summorum in Arte Virorum autoritate, gratiam huic operi colligendam, necessarium videbatur. Quos sane si alibi, atq; Venetijs, quæram, quid aliud fecisse iure videar, quam in Meridie Solem apud Antipodas quæsisse? Quæ enim gens, aut ita barbara est, vel longe dissita, cuius fines Veneti Collegij gloria non sit peruagata? quæ sic elata, aut inuida, quin vltro fasces deferat, seq; victam fateatur? Certe in summa omnium rerum ignorantia versari necesse est, quem lateat, Hippocratis & Galeni Artem, quæ sola inconcussis nititur fundamentis, barbarie superiorum seculorum sepultam, à Veneto ordine vitam lucemq; recepisse. Omitto hic referre summorum Virorum nomina, quod ob excellentiam omnium, nec principium facile statuere: nec ob multitudinem finem fortasse inuenire queam. Quod si de Anatomicis quoq; dicendum est, Nicolaum Massam, præstantissimū Philosophum ac Medicum, primum omnium, maiorum tempestate, Refectiones Orbi restituisse, omnium consensu clarum est. Quæ certe res tantum vniuersorum applausum meruit, vt & summi Pontifices, & inuicissimi Imperatores, tam celebrem ordinem, tam præclarum collegium maximis rarissq; priuilegijs, velut certatim condecorarint. A quibus ergo, si splendorem quæramus, quam à Clarissimis Viris? si autoritatē, à summis in Arte? si defensionem, quam ijs, qui in maximo apud omnes sunt nu-

mero, petere licebit? Sed & ut sperare liceat, tum vestra erga omnes beneuolentia iubet, tum imprimis quadriga Excellentissimorum Virorum, cuius iudicium de hoc opere perquam honorificum sane fuit. Tanto vero & ipsa quoque nobis spes accenditur magis, quanto & hos maiores esse, & insigniore apud Vos pollere autoritate certum est. Quis enim Sanct. Sanctorum non nouit, nostri seculi Æsculapium, cuius in medendo dexteritatem, tum in docendo ingenium admirata Serenissima Respublica, in celeberrimo totius Orbis Patauino Gymnasio supremæ Cathedræ præfecit? Quam sanè prouinciam, & maxima omnium expectatione primum suscepit: sic admiratione tenuit, desiderio incredibili reliquit. Iam vero Albertus Columbus, & Anatomicus ac Chirurgus celeberrimus, cum maximi ab omnibus æstimeretur, tum vero & Serenissimi Principis nostri iudicio, cuius valetudo ipsi commissa est, Medicorum familiam ducit. Quid dicam autem de Hieronymo Theobaldo, & Mich. Angelo Rota, quos, ut laudare, omni laude maiores, hoc humili dicendi genere non audeo, sic neque opus apud vos, VIRI Excellentissimi, quibus eorum Virtus sic perspecta est, tantique habita, ut in Collegij vestri amplissimi difficilioribus temporibus, Defensorum titulo, non summo tantum nomine, sed & auctoritate eos declaraueritis. Nec est ut exterorum aut posteritatis gratia præconium hic mediter, quorum res gestæ toti Orbi notissimæ in omnem æternitatem transcribentur. Theobaldi certe fama (ut omittam quam Anatomia ipsi peperit) quanta sit, ex innumeris clarissime monstrabit, quod à Diuo FERDINANDO II. Imperatore ex Italia in Germaniam accitus, Filij curæ adhibitus fuerit, maximisque præmiis affectus, iterum dimissus. Mich. Angelus autem, ut ipse Medicorum vnus est è Principibus: sic fere Principum tantum præfectus sanitati, nomen celeberrimum immortalitati sacrat. Hos summos Viros, cum & ante operis editionem Lectores, & approbatores inuenerim, non dubito, quin & beneuolentia vestra, quæ fuit erga Authorem semper, & autoritate horum Virorum, (quorum consilio VOBIS offero,) mori, vestrum ipsis calculum addatis, ut jam non tantum tutius in publico contra maleuolorum morsus appareat; sed & vestro ornatum nomine omnium gratiam fauoremque mereatur. Valete.

Vester LIBERALIS CREMA vobis singulis deuotissimus.

DANIEL



DANIEL BVCRETIVS VRATISLAVIENSIS

Philos. & Medic. D.

BENEVOLO LECTORI S.



*OFFERO Tibi, Benigne Lector, Adriani
Spigellii, Clarissimi Viri, decem de Humani
Corporis Fabrica Libros, quos mihi vita
discessurus ut in ordinem redigerem, com-
misit. Opus est, cum infinitis obseruationi-
bus, tum methodo succincta, praeclaris par-
tium vñibus, & dissectorum historijs mirifice exornatum.
Adhuc, cum rari admodum sint, quibus resectionum studiũ
placeat, nisi Medicina, cuius fundamentum est, gratia: to-
tum opus sic institutum est, ut perpetuo ad Artis vñum re-
feratur. Hinc tot praecepta Chirurgis in suis operationibus
notanda; tot difficilium Hippocratis locorum explicationes;
viarum, per quas morborum transmutationes fiunt, tum
consensus partium, demonstrationes. Accedunt plurima ab
aliis aut non attacta, aut perperam descripta: sed imprimis
nova Cerebrum dissecandi ratio, ad inuestigandos Capitis
affectus maxime necessaria. Nec enim certe locum hic ha-
bet illud tritum Comici, Nullum est iam dictum, quod non
dictum*

dictum sit prius. Latuere multa maiores nostros, quæ superior atas edocuit, multaq, nunc quoque abstrusa oculos fugiunt, quæ tempus in apricum producet. Quanta vulgo in musculorum doctrina confusio; circa venarum, arteriarumque usum obscuritas; circa viscerum actiones difficultas? Hic tamen nullus dubito, quin elegantem ordinem, clarâ lucem, miram facilitatē inuenias. Ne quid tamen desiderari posset, quod ad operis perfectionem faciat, ex Musæo eiusdem, Iul. Casserii Placentini, celeberrimi Dissectoris Tabulas Anatomicas, omnes novas, nec antehac visas, addidimus. Quæ sane quanti præsent aliorum adhuc editis, ad nullo negotio edocebit, quod quæ in aliis singula ferè tantum sunt commendatione digna, in his uniuersa reperiantur. Elegantia ad viuum accedens: multitudo necessaria; perfectio absoluta; magnitudo perspicua: artificium admirabile. Scio plurimis, nec iis indoctis, diuerticula has videri ab ipsis sectionibus: at rectè rem æstimantibus videre licet, & iis, quibus nunquam Anatomias cernere contigit, in Authorum obscura alias lectione, facem esse: iis vero, quibus tam felicibus esse datum fuit, ut nonnunquam intuerentur, in tanta rerum varietate influxæ memoriæ subsidium cedere. Tuum est, benigne Lector, beneuolo hac suscipere animo, primisque nostris conatibus, vel Atheniensium monitu, quibus lege cautum erat, ne primi ingenii fœtus exploderentur, fauere.

Venetis. Anno M.DC.XXVII.

IN ANA-



IN ANATOMEN
D.D. ADRIANI SPIGELII

Anatomici Patauini,

à

DANIELE BVCRETIO VRATISLAVIENSI

in lucem editam.

SPIGELIO in magno quicquid Rex *Adria* fleuit,
Atq; *Antenorei* Nympha superba Padi,
Qua sapè obstupuit *Natura* arcana docentem,
Et si qua antiquus nesciit *Hippocrates*,
Nunc redit à tumulto, & totum se spargit in orbem,
Qua res vnius hactenus urbis erat.
Quas Tibi soluemus gens *Phæbo* dedita grates?
Qua *Tibinam* reddet præmia *Posteritas*,
BVCRETI? Si Regis opus donare salutem,
Exstinctis vitam reddere, pæne Dei est.

Daniel Sennertus D. Facult. Medic. in Acad. *Leucorea*
Profess. & Senior.

FELIX sorte tua, & tot claris diues alumnis
PATAVIVM, *Euganeis* præstructum collibus olim,
Qua *Brenta* *Hadriaco* properat se iungere ponto?
Quid memorem *THEMIDOS* præfulgida lumina prisca?

)(

Quid

*Quid SOPHIES studium? quid totum deniq; dicam
 Disciplina orbem, diductum ambagibus amplis?
 Si MEDICOS libeat narrare, & Apollinis artes,
 Ilias immenso sese inferet altera textu.
 Te cano, SPIGELL, Germano sanguine cretum,
 Quem tanta ornavit cura, tantog; labore,
 FABRICIO: ut possit, quo sese AQUA-PENDULA iaciat,
 Eripere è manibus parti ornamenta decoris.
 Mira loquor forsàn, sed non ea dissona vero.
 Nam quæ FABRICIVS vulgavit voce, styloque,
 Lustris bis senis operi intentissimus uni,
 Herculeog; instans pernox & perdius ausu:
 Illa dedit nobis, vno comprehensa pugillo,
 SPIGELIVS, pulcro confusus acumine mentis,
 Iudicioq; acri, & longa experientia in arte.
 At tibi, BVCRETI, qui dispensante JEHOVA,
 Ante annos, animumq; geris, dextramq; virilem,
 Quid mercedis erit? Ut post tua funera, dignus
 FABRICIO, viuas aeternum, SPIGELIO Q;*

Casp. Hofman. D. & Prof. Publ.

BVCRETI, Iuvenum doctissime, gloria gentis
 Nostra inter ipsos Italos, ubi te tenent
 Euganei montes, atq; vrbs Antenoris ingens:
 Sed non capit laudes nisi Cælum tuas.
 Quid dicam, quid non de Te præfiscine dicam?
 Vrget simul lentaq; rerum copia.
 Nunc mihi Pythagoras cunctanti vellicat aurem,
 Suamq; tantum non probat sententiam.
 En tibi, ait, monstrum vitio sine, quale renasci,
 Corpore alieno animaq; desultoria.
 Omne genus, memini quondam docuisse, animantum:
 Auctoritatem namq; nullus defugio.
 Quod si HOMINEM esse parum est quem BVCRETIVM esse fateris,
 Agnosce saltem spiritum SPIGELII,

Atq;

*Atq; animi mentem iuuenili in pectore canam,
 Agnosce BVCRETIVM alterum Spigelium.
 Nec refert, paulo ante simul si vixit uterque:
 Namque anima non ibi est, ubi animat, sed ubi amat.
 Atque ita Bucretium, sese, dilexit, ut ipsum,
 Spigelius, animaeque compotem sua.
 Quo post defuncto, SPIGELIO-VIRBIVS ille est,
 Quem nunc Spigell animat simul anima atque amat.
 Hac Samius, quæ si malè me recitasse putabunt,
 Nil deprecor, mea esse dicant Posterì.*

Georgius Næslerus D. & P. P. Ill. Principis Palatini & Reipub.
 Norimberg. Medicus.

DOTE licet propria, Speculum splendescere constet,
 Gemmarum rutilo sed magis orbe placet;
 Sic licet ingenii Speculo SPIGELIVS oras
 Irradians, proprio luminis ore iuuet:
 Huic consertatamen BVCARDIA GEMMA, decorem
 BVCRETI socia commodat arte magis.
 Mome quid expositum tibi claustrum pectoris optas?
 Hoc speculo specimen viscera cuncta dabunt.
 Quin parili geminata patet sub munere virtus,
 Et Speculo humano fulget imago Dei.

Ad Clarissimum Dominum Bucretium.

MORTIS agone Tibi sua scripta SPIGELIVS offert,
 BVCRETI, meritis credita vita tuis.
 Solue vices fati, clausum nam corde reliquit
 Ceu speculo, speculum pectoris ille sui.

Ludouicus Iungerman Med. D. & Professor Botanicus in Vni-
 uersitate Altorphina. P.

SPIGELIVS nusquam est! Imò est, victurus ubique:
Vixque capax tanti nominis Orbis erit.
Fletibus innumeris quid eum defletis amici?
Dissecuit, docuit, scripsit, & interiit.
Vixit enim celebris, mutato nomine de se
SPIGELIVS, docti nomine BVCRETIL.

Sebastianus Chaignæus Picto-Gallus Collongienfis Ph.
& Med.D.



INDEX



I N D E X

LIBRORVM ET CAPITVM

In toto hoc Opere contentorum.

LIBER PRIMVS.

EXternarum partium Appellationes, Figuram, Magnitudinem, & mutuam inter se Proportionem exponit.

- I. Externarum Capitis partium appellationes succincte explicat. 1
- II. De appellationibus externarum Thoracis partium. 9
- III. De appellationibus partium externarum infimi Ventris. 10
- IV. De appellationibus partium externarum, quæ generationi sunt dicata. 12
- V. De appellationibus Manus, & partium in ea contentarum. 13
- VI. De appellationibus Pedis, & partium in eo contentarum. 15
- VII. De humani corporis figura, & magnitudine: tum quo pacto hæc secundum ætatem, sexum, regiones, & morbos differat. 17
- VIII. De Figura, & Magnitudine Capitis, partiumq; in eo contentarum. 21
- IX. De Figura, & Magnitudine Thoracis, ac Mammillarum. 22
- X. De proportionibus infimi Ventris, & Pudendorum viriūq; sexus. 24
- XI. De mutua Artuum inter se proportionem. 26

LIBER SECVNDVS.

Qui ossium historiam proponit.

- I. Ossis naturam, vsus, & differentias explicat. 27
- II. De partibus ossium, ubi nomina, quorum frequens in ossium historia mentio fit, simul explicantur. 32
- III. De ossiū inter se structura, ac cōnexu. 34
- IV. De nutrimento, quo ossa aluntur, & per quas vias ad ipsa deducatur. 38
- V. An ossiū aliquod sit principiū, quæ admodū Venarū, Arteriarum, & Neruorū, tum quale illud sit, inuestigatur. 40
- VI. Brevis omnium totius corporis ossium diuisio, & enumeratio instituitur. 41
- VII. Agit de Cranio in vniuersum, suturasq; Capitis proponit. 42
- VIII. De ossibus Capitis: siue Caluaria propriis agit. 45
- IX. Describit tria ossicula auditui inseruentia. 48
- X. De osse Cuneiformi, & Spongioso. 49
- XI. Agit de osse Iugali. 51
- XII. Ossium Faciei, siue Maxilla superioris, & inferioris, descriptionem tradit. ib.
- XIII. Dentium numerū historiāq; proponit. 55
- XIV. Ossis hyoidis historiam tradit. 58
- XV. Describit Clauiculas. 59
- XVI. Sterni, siue ossis pectoris historiam proponit. ibid.

XVII.	Scapularum historiam explicat.	61	carum, labiorum, maxilla inferioris, &
XVIII.	Quæ de spina in vniuersum dici possunt, persequitur.	63	aurium musculos proponit.
XIX.	De Vertebra Cervicis.	64	VI. Persequitur historiam musculorum lingua, ossis hyoidis, faucium, & laryngis.
XX.	De Thoracis, ac Lumborum Vertebra.	65	VII. De musculis Caput, & Cervicem mouentibus.
XXI.	De osse sacro.	67	VIII. De musculis Thoracis.
XXII.	De osse coccygis.	68	IX. De musculo Subclauio.
XXIII.	De Cestis.	69	X. De infimi Ventris, & primum, de musculis abdominis appellatis.
XXIV.	De osse Innominato.	70	XI. De musculis Lumborum.
XXV.	De osse Humeri.	73	XII. De musculis Testium, Vesicae, Ani, & Penis.
XXVI.	De Vlna, & Radio.	75	148
XXVII.	De ossibus extremae Manus, & Sesamoides appellatis.	77	XIII. De musculis Scapula.
XXVIII.	De osse Femoris, & Patella.	79	XIV. De musculis ossis Humeri.
XXIX.	De Tibia utroque osse.	80	XV. De musculis ossis Cubiti.
XXX.	De ossibus Pedis extremi.	82	XVI. De musculis Radii.
XXXI.	De Vnguibus.	86	XVII. De musculis Carpi, vel potius totius manus dicatis.

LIBER TERTIVS.

Qui de Cartilaginibus, & Ligamentis agit.

I.	Cartilaginis naturam, vsus, & differentias proponit.	88	XVIII. De musculo, cuius latus tendo media vole subnascitur, quem Palmarem vocant.
II.	De Cartilaginibus supremi ventris, siue Capitis.	91	XIX. De musculis manus digitos flectentibus.
III.	De Cartilaginibus medii, infimique Ventris.	92	XX. De musculis manus digitos extendentibus.
IV.	De Ligamentis agit, quorum naturam, vsus, & differentias breuiter persequitur.	94	XXI. De musculis manus digitos oblique ad latera trahentibus.
V.	De Ligamentis, quæ in capite, thorace, ac in omni ventre occurrunt.	96	XXII. De musculis Femoris.
VI.	De Ligamentis Artuum, ac primo Manus.	97	XXIII. De musculis Tibia.
VII.	De Ligamentis Cruris vniuersi.	98	XXIV. De musculis Tarsi siue Pedis.

LIBER QVARTVS.

Qui Musculorum historiam persequitur.

I.	Quid sit Musculus, & quæ eius actio.	100	XXV. De musculo, cuius latus tendo, media plantæ subnascitur, & Plantaris propterea vocatur.
II.	Quæ sit musculi constructio, & quibus ex partibus constet.	104	XXVI. De musculis pedis digitos flectentibus.
III.	Enumerantur omnes musculorum differentiae, quæ alicuius sunt momenti.	110	XXVII. De musculis pedis digitos extendentibus.
IV.	Quæ difficultates sese in musculorum historia offerant, & quibus modis tollantur.	113	XXVIII. De musculis pedis digitos ad latera oblique mouentibus.
V.	Frontis, Palpebrarum, oculorum, nasi, buccarum, labiorum, maxilla inferioris, & aurium musculos proponit.	114	XXIX. Brevis omnium totius corporis musculorum enumeratio, memoria gratia, instituitur.

LIBER QVINTVS.

Quo Venarum natura, earumque per vniuersum corpus series describitur.

- I. Venarum naturam, actionem, & vsus explicat. 177
- II. Differentias Venarum breuiter enumerat. 181
- III. Disceptationem Medicorum, & Philosophorum de principio Venarum continet: tum Authoris sententiam in medium adducit, & probat. 182
- IV. Cur dua vena, Porta nempe dicta, & Cava facta sit, tum qua ipsarum inter se differentia sit, & connexio. 188
- V. Ramos, siue propagines Venae portae recitat, & Hippocratis aphorismum huc maxime facientem explicat. 190
- VI. Superiorem, siue Ascendentem Venae cauae truncum, tum ramos per caput dispersos, recitat. 196
- VII. Axillaris Vena per brachium distributa seriem proponit. 202
- VIII. Inferiorem, siue descendentem venae Cavae truncum explicat. 204
- IX. Iliaci rami exterioris per crus disseminati propagines, & ramos, enumerat. 208
- X. Sanguinis definitio proponitur, & declaratur. 210
- XI. Animalium quadam sanguinea, quadam ex sanguine esse, & quamobrem. 213
- XII. Sanguinem heterogeneum esse probatur, inde quibus ex partibus constet, & quae harum cause sint, inuestigatur. 214
- XIII. Differentias sanguinis persequitur. 216

LIBER SEXTVS.

Qui Arteriarum naturam, earumque per vniuersum corpus distributione persequitur.

- I. Arteriarum naturam, actionem, & vsus cum differentiis explicat. 219
- II. Superiorem, siue Ascendentem Arteriae magne truncum, & propagines per caput distributas, proponit. 223

III. Axillaris Arteria per brachium digesta seriem enarrat. 226

IV. Inferiorem, siue descendentem Arteria magna truncum, eiusque per medium ac infimum ventrem propagationem proponit. 227

V. Iliaci rami per crus propagati soboles. 235

VI. Vena arterialis, & Arteria venalis historiam complectitur. 236

LIBER SEPTIMVS.

Qui vniuersam Neruorum historiam complectitur.

I. Neruorum naturam, actionem, & differentias explicat. 238

II. De Neruis Cerebri. 243

III. De neruis spinalis medulla proprie sic dicta, & primo quidem vertebrarum Cervicis. 249

IV. De neruis medulla vertebrarum Thoracis. 252

V. De neruis medulla vertebrarum Lumborum. 254

VI. De neruis medulla ossis Sacri. 255

VII. De neruis per Brachia distributis. ibid.

VIII. De neruis per Crura digestis. 258

LIBER OCTAVVS.

Qui historiam infimi ventris continet.

I. De Cute. 260

II. De Pinguedine. 271

III. De membrana carnosae. 274

IV. De Peritoneo. 275

V. De situ, tam naturali, quam eo qui prater naturam est, omnium quae in imo ventre continentur, viscerum. 278

VI. De Omento. 282

VII. De Gula. 288

VIII. De Ventriculo. 289

IX. De intestinis. 292

X. De Mesenterio. 299

XI. De Pancreate. 301

XII. De Hepate. 302

- | | |
|---|--|
| <p>XIII. De Vesicula biliaria. 306</p> <p>XIV. De Liene. 309</p> <p>XV. De Renibus, & his succenturiatis glandulis, itemq; canalibus vrinae transitum concedentibus. 313</p> <p>XV. De Vesica Vrinaria. 316</p> <p>XVI. De partibus genitalibus in mare, & primum quidem de iis, quae seminis generationi inferuunt. 318</p> <p>XVII. De iis partibus, quae virilis seminis excretioni sunt dicata. 321</p> <p>XVIII. De partibus genitalibus in foeminis, & primo quidem de Pudendo muliebri. 328</p> <p>XIX. De Vtero. 331</p> <p>XX. De testibus, ipsiq; annexis vasibus preparantibus, deferentibus, & cecis. 335</p> <p>XXI. Traditur actio & vsus singularum partium, quae ad genitalia mulierum referuntur. 337</p> <p>XXII. Exponit differentias, quae in partibus genitalibus grauida, & eius quae vtero non gerit, obseruantur. 339</p> | <p>VIII. De actione, & vsu Cordis, partiumque ipsius. 354</p> <p>IX. De vnione vasorum cordis in fatu, quae in nato perit, vbi modus simul aperitur, quo non ipsa solum perditur, sed & vasa vmbilicalia in editis cavitatem suam amittunt. 359</p> <p>X. De Pulmonibus, & eorum aspera Arteria. 362</p> |
|---|--|

LIBER DECIMVS.

Qui supremi ventris historiam continet.

- | | |
|--|---|
| <p>I. De capillis, & quatuor communibus summi ventris integumentis. 367</p> <p>II. De Pericranio. 370</p> <p>III. De duabus cerebrum obcingentibus membranis. 371</p> <p>IV. Cerebri, quatenus id in Veteri sectione se offert, historiam nectit. 373</p> <p>V. Cerebelli, eiusque partium iuxta Veterum dissectionem, enarratio. 377</p> <p>VI. Spinalis medullae, secundum Veterum placita, descriptio. ead.</p> <p>VII. Cerebri eam dissecandi rationem, quam Recentiores inuenerunt, primum proponit, mox partium eius beneficio inuentarum, aut aliter comparentium, historiam nectit. 378</p> <p>VIII. De Actione & vsu Cerebri. 381</p> <p>IX. De oculo interno siue visus instrumento. 385</p> <p>X. De Aure interna, siue organo Auditus. 388</p> <p>XI. De naso interno, siue olfactus instrumento. 390</p> <p>XII. De gustu, tactusque instrumentis. ead.</p> | <p>Qui mediiventris historiam complectitur.</p> <p>I. De quatuor communibus medii ventris integumentis. 341</p> <p>II. De mammis vtriusque sexus. 342</p> <p>III. De Pleura, siue costas succingente membrana. 345</p> <p>IV. De Mediastino, siue membranis cavitatem thoracis intersepientibus. 347</p> <p>V. De Pericardio, & humore in ipso contento. 348</p> <p>VI. De Corde, eiusque partibus externis. 349</p> <p>VII. De Cordis partibus internis, Ventriculis inquam, & Valvulis. 352</p> |
|--|---|



ADRIANI SPIGELII

BRUXELLENSIS,

DE HUMANI CORPORIS FABRICA,

Liber Primus.

Externarum partium Appellationes, Figuram, Magnitudinem,
& mutuam inter se Proportionem exponens.

CAPVT PRIMVM.

Externarum Capitis partium appellationes succincte explicat.

Ex his numeris, quos margini ascripsimus, pro demonstratione eorum quæ in historia traditur, primus Liberum designat, secundus Tabulâ, tertius Figuram.



M V M A N I Corporis fabricam tradituri, initium ab externarum partium historiâ desumendum duximus, sapientissimi Platonis præceptum sequentes, qui omnem, quæ à rectâ ratione de aliquâ re suscipitur, tractationem, ab iis exordium petere iussit, quæ rûm oculis, rûm animo manifestiora essent. At hæ partes ex cæteris nec ita abstrusæ latent, vt quisquam sit cuius oculos subterfugiant: nec ita difficiles explicatu, quin vel rudis quisque animo suo comprehendere valeat. Accedit, quod hæc præuia tractatio, ad reliquorum, quæ nobis postmodum dicenda sunt, & maioris momenti erunt, & mentem requirent solertiolem, perfectam absolutamque cognitionem immensum quantum utilitatis afferat. Quemadmodum enim, qui vastam orbis terrarum descriptionem tradituri sunt, vt regionum, vrbiumque immensam multitudinem promptius edoceant, rudia primùm lineamenta ducunt, quibus amplum quendam situm crassâ mineruâ repræsentant, vt montes postea, oppida, fluminaque tradentes, quod sese referant, citra negotium inueniant. Sic in tam difficili corporis nostri fabricâ, in quâ tanta partium varietas, tantaque multitudo sese offert,

Ratio ordinis.

vt vix hominis vnus ætas ad ediscendum sufficiens esse videatur, si primùm rudem quandam veluti tabulam menti adumbratam in externis partibus exhibuerimus, ad quas interiorum postea situm referamus, plurimum operæ pretium fecisse meritò videbimur. Est igitur externarum partium tractatio, non vtilis tantum cuiuis, qui operam suam locare dissectionum studio voluerit; sed prorsus etiam necessaria, nisi animo semper anceps dubiusq; hæere cupiat, eius instar, qui in vastâ montium congerie, aut sylvarum inuiis viis errabundus, quò pedem figat, hinc inde ambiguus cursiter. Tractatio autem hæc, etsi primâ fronte levis admodum esse videatur, non tamen levis in eâ sese offert difficultas, quòd nomina illa, quibus externæ partes veniunt, infinita pæne sint, tum quòd partes ipsæ plurimæ existunt, tum quia authores varietate vorum supra modum delectati fuisse videntur. Vt tamen huic medeamur malo, & aliquod memoriæ subsidium conferamus in medium, methodo vtemur, quæ obscura omnia dilucidet, ignota cuncta aperiat, difficilia quæq; planissima reddat. Exordiemur autem à generali torius corporis diuisione, quæ etsi diuersa à scriptoribus vulgò tradatur, vnâ tamen illam seruandam censuimus, quam Galenus ubiq; locorum secutus est, sed imprimis 7. de vs. part. 21. vniuersum corpus, in ventres & artus, siue extrema, dirimendo. Vocatur VENTER insignis aliqua corporis cauitas, in quâ viscus aliquod primarium reconditum est: ART vs verò, extremæ partes, trunco corporis ramorum instar adnatæ, cuiusmodi sunt Manus ac Pedes. Hos Græci *καλα*, illos *κοιλίας* appellant, non tamen sine insigni vocis ambiguitate. Vsurpatur enim *κοιλία* nonnunquam strictiore significato pro abdomine, siue infimo ventre, quomodo Hippocrates summisit videtur, cum 2. aphor. 53. *ὁκόσοι*, inquit, *τὰς κοιλίας ὑγρὰς ἔχουσιν*, *νέοι μὲν ὄντες, βέλπον ἀπειλᾶσσαν τῶν τὰς ξηρὰς ἔχόντων*. quibus aliud est humida, dum quidem iuuenes sunt, melius degunt, quàm hi, qui siccas habent. Interdum adhuc strictius sumitur, & Venter significat, vnde *τὸ σῶμα τῆς κοιλίας* dicitur, quod apud Latīnos orificium Ventriculi appellatur. Sic & Pollux accepisse videtur, dum *ἐνθα*, inquit, *τῇ κοιλίᾳ συνάπτει τὸ σῶμα χος*, hoc est, ventriculo gula adaptatur. Strictissimè tandem, authore Philotheo, ad lib. 1. aphor. 15. pro quavis cauitate paruâ, quæ in profundo sita est, sumitur, siue cibum suscipiat, siue non, quæ admodum *κοιλία πῦ ἐγκεφάλου, καὶ τῆς καρδίας*, cerebri cordisq; ventriculi dicuntur. Hinc apud Aristotelem 1. hist. animal. 17. *ἡ δὲ καρδία ἔχει μὲν τρεῖς κοιλίας*, cor quidem tres ventriculos habet. Nos hoc loco *κοιλίας* vocabulo cum Galeno insignem aliquam cauitatem intelligimus, quæ viscus aliquod principale complectitur, eumque tria sint, totidem quoque Ventes constituimus, ex quibus *primus* & superior est Caput; *medius*, Thorax; *infimus*, Abdomen, improprie sic dictum. CAPUT ergò primus venter est, quâ voce ampliore propriaq; significatione, totum id appello, quod primæ colli vertebræ imponitur. Pressâ enim significatione Medici nonnunquam capite pro cerebro vtuntur, dum hoc læso, caput affectum esse dicunt. Interdum etiam angustiore adhuc, pro capillata tantum parte, quâ ratione sumpsit Hippocrates dum *αὐτὸ τῶν ἐν κεφαλῇ τραυμάτων*, de vulneribus capitis, librum inscripsit. intelligit enim tantum ea vulnera, quæ caluariæ infliguntur, quo pacto & nostræ ætatis Chirurghi hanc vocem accipiunt, faciei vulnera, à capitis vulneribus distinguentes. Dicitur autem Caput, vel, quia sensus ab eo initium capiant, quæ notatio Varroni ad Ciceronem placet: vel, quia cerebrum caput,

partium

Difficultas huius tractationis.

Generalius torius corporis diuissio.

κοιλίας vox ambigua est.

1.

2.

3.

4.

Capitis ambiguitas.

Capitis etymologia.

partium omnium nobilissimam. Græcis κεφαλή, quasi dicas, κέρυλ & , aut κέ-
 λυφος quod putamen, vel testam significat. *Diuidi* solet in duas partes, in capillatam, & *Diuisio*
 glabram. *Capillata*, τελεχών, Aristoteli, 1. histor. animal. 7. & κρανίον, Latinis ^a *Caluaria*, & *capitis.*
Cranium, vocatur, quod iterum in quatuor minores dirimitur, in anticam scilicet, po- *Partes*
 sticam, & laterales partes, quas inter Vertex, tanquam centrum in medio, constitutus *caluaria*
 est, huius diuisionis author. Pars enim quæ à vertice ad anteriora & frontem tendit, *quatuor.*
 Synciput: quæ huic contraria est, à vertice ad posteriora & ceruicem excurrans, Occi-
 put dicitur: hinc ab eodè vertice ad latera vtrinque & aures, Tempora, siue, vt quibus-
 dā placet, Tempora, pertingunt. ^b *Synciput* ergò, quasi summū caput vocatū, Aristoteli *Synci-*
 βρέγμα dicitur, Homero βρεχμῆς, & τὸ βρέχειν. quod irrigare significat, eò quòd humi- *put.*
 dissima capitis pars & mollissima in infantibus videatur, cum neque ossa sit, sed mem-
 branosa: neque corroborari queat, sed tenera maneat, donec, Plinio tradente, primus
 sermo eruperit. ^c *Occiput*, ἰνίον, διὰ τὸ ἰνῶδες εἶναι, quòd fibrosa ea pars sit, & nervosa, *Occiput.*
^d *Tempora*, quòd ætatis tempus indicant, in Viris *Tempo-*
 quidem canitie, in Fæminis caluitie: Græcis κροταφοί, & τὸ κροτεῖν περὶ τὴν ἀφῶν, quòd eo *ra.*
 loci ad tactum pulsus sit euident. Duo sunt, vtrinque ad latera syncipitis, inter oculos
 & aures, vbi caput paulè compressius est, posita. Media hinc inter has partes ^d *Vertex* *Vertex.*
 est, veluti centrum caluariæ, circa quem pili quasi in gyrum vertuntur, à quo & nomen
 accepit teste Quintiliano, lib. 8. institut. Aristoteli, & Introductori κορυφή dicitur, & τὸ
 κρύπτειν. quasi dicas κρυφή, quòd ea pars capitis crinibus maximè tegatur. Sunt nonnul-
 li, quibus geminus est, non ossè tamen, sed capillorum tantum æquamento, & hi δικόρυ-
 φοί, biuertices dicuntur. Cæterum pili, qui caluariam contegunt, speciali voce Latinis
^e *Capilli*, ad aliorum discrimen appellantur, quasi dicas, capitis pili, sed Pollux κόρσας, διὰ *Capilli.*
 τὸ κείρεσθαι, quòd tonderi consueuerint. Inter hos linea quæ ad frontem à vertice ex-
 currit, in dextram sinistramque partem capillitium dirimens, potissimum verò in mu-
 lieribus, Aristoteli λύστωμα, καὶ λύστωσις τῶν τελεχών dicitur. Doctissimus Gaza, *Discrimen*, & æ-
 quamentum capillorum vertit. In his notanda est crispitudo, & rectitudo, itemque color,
 ex quibus de temperamento hominis iudicium fiat.

Altera pars capitis glabra, & capillis priuata, caluæ subiecta est, & in faciem atque
 aures diuiditur. ^f *Facies*, Græcis πρῶσσωπον, διὰ τὸ πρῶσθαι ὅπ τε αὐτῶν καὶ φωνὴν εἰς τὸ πρῶστω *Facies.*
 διαπύμπειν, quòd solus homo inter cætera animantia erectus sit, vocemq. anteuersus e-
 mittat, vt docet Aristoteles, 3. de part. anim. 1. Propterea & πρῶσσωπον ἐπὶ μόνῃ τῶν ἄλλων ζώων
 ἀνδρώπῃ ὀνομάζεται. eodem teste, 1. histor. anim. 8. cum vni homini facies concessa sit, re-
 liquis animantibus cunctis, Rostrum. Vocatur autem *Facies* totum id, quod à capillo-
 rum terminis in syncipite exordians, ad mentum vsque excurrit. In hac præclarum
 quoddam diuinæ sapientiæ elucescit specimen, venerandaq. maiestas, quæ vel crude-
 les quosque animos ad mansuetudinem, vel indomitos ad amorem ducat. Quin imò
 in eo faciei decòr speciesq. olim honore fuit, vt primæuâ ætate honores & opes, pro fa-
 ciei cuiusque dignitate distributas fuisse prodiderit Lucretius, lib. 5.

Et pecudes, & agros, diuisere atque dedere,

Pro facie cuiusque, & viribus, ingenioque.

Nam facies multum valuit.---

Partes
faciei.

Est enim speculum animi, morum index, & sedes mentis, vnde & Vultus dicitur, quòd voluntatem detegat. Partes habet plures, frõtem, nasum, oculos, genas, labia, os, & mentum, de quibus singulis nunc ordine dicendum.

Frons.

FRONS ergò, Latinis à ferèdo dicta est, quòd animi mores præ se ferre soleat, Græci à situ μέτωπον vocant, quasi dicas, partem post oculos sitam, μετὰ τὰς ὀφθαλμούς. Superius, syn-
cipite; inferiùs, superciliis & glabellâ; ad latera, temporibus vtrinque coercetur. Huius cutis, quæ sola in homine mobilis est, προμετωπίς vocatur, at latino nomine caret. In hac lineæ apparent, ex quibus contractâ fronte ^h Rugæ generantur, ρυτίδες, & ἀμαρυγᾶς nun-
cupatæ. Has Physiognomi obseruant, qui & propterea Metoscopi appellati, cum natura, fortunæq. hominis signa, & indicia esse profiteantur. Sunt autem hæ lineæ du-
plices; aliæ enim in longum, aliæ verò in latum extenduntur, & illarum iterum septem sunt, singulæ singulis Planetis dedicatae. Nec tamen omnes in omnibus conspicuæ sunt, sed quædam interdum absunt. Vt plurimùm comparent, quas Mercurio, Veneri, & Ioui tribuunt, suntque omnes euidentiores si supercilium tollatur, quod paulò altiùs cogitantibus euenire solet, & tunc ἐπισκῆνιον vocatur, ac si diceres, supertentorium, quemadmodum si quis rectas cum transuersis ruget, quod irascentibus accidit, νεφέλη & νεφέλη, hoc est, nubes appellatur. ad hoc allusit Poeta, dum canit,

Deme supercilio nubem.----

Superci-
lia.

Ex inferiore parte frontem excipiunt ⁱ SUPERCILIA, quæ & propterea eleganter ^{i, d.} hirsutas frontis extremitates cognominat Ruffus. Pili sunt oblongâ serie, in frontis & oculorum confinio extensi, vt sudores ab illâ defluentes excipiant, ab his depellant. Græcis ὀφρύες dicuntur non notâ etymologiâ; Latinis à situ supercilia, quòd supra palpebras locata, quæ antiquitus Cilia, ab officio oculos celandi, vocabantur. Pars ergò ipsorum, quæ nasum respicit, ὀφρύων κεφαλὴ, Superciliorum caput: quæ ad tempora, ὀφρύων ὕπερ, Superciliorum Cauda vocatur. Vt autem palpebræ duæ sunt, ita & supercilia duo, quorum interstitium μεσὸφρυον, quasi medium supercilium à Græcis; à Latinis, quòd pilorum expers sit, ^k Glabella dicitur, quamuis nonnunquam hirsutum quoque reperiatur, ^{k, c} protensis ad nasum, & coeuntibus inuicem superciliis, quod signum Aristoteles i. hist. animal. 9. στυφνὴ, austeri & acerbi hominis esse tradit, & tunc στυφνὴ vocatur.

Glabella.

Nasus.

Nasi di-
uisio.Spina
nasi.

¹ NASVS postea sub glabellâ succedit inspiciendus, quem ab officio Græci ῥίνα, ^{l, 1. 1. 4.} ὡς τὸ ῥέειν, & μωκτῆρα, ac μωξωτῆρα, à muco, cerebri excremento, quod per ipsum fluit, appellant. Diuiditur in partem superiorem, quæ ossea est, ac immobilis: & in inferiorem, quæ cartilaginea, mobilisque. Vtraque iterum in duo latera dispecitur, & inter ipsa in partem mediam, quæ acuminata est, & ῥαχίς, ^m spina, ac dorsum dicitur, cuius summitas, ^{m, a.} ἡ μῦδος, ⁿ Colatorium, ab vsu suo vocatur, quia mucus per ipsam tanquam per cribrum colatur, quamuis, vt ostendemus inferiùs, id non nisi præter naturam fiat. Os enim ἡ μοειδὲς, siue spongiosum, odoribus potius, quàm excrementorum purgationi dicatum est à Naturâ. Foramina duo, quæ inferiùs patent, ῥύνια Aristoteli, ῥάωνες Dioscoridi, Latinis ^o Nares, à gnauitate, vt inquit Donatus, quia odoratu nos edocent adesse præ-
stò, quæ oculi nondum cernunt. Has, medij instar parietis, distinguit cartilago, ῥίον, seu P Columna appellata, cui superiore parte ^{p, d.} interseptum osseum, διὰ φραγμα Aristoteli cognominatum, iungitur. Partes verò mobiles, quæ inferiùs sunt, ἰσθμὶαι, Polluci, Latini-
nis

g, b.

h, c, c.

i, d.

k, c

l, 1. 1. 4.

m, a.

n, b.

o, e. c.

p, d.

- nis ^{q. e.} *Ala*, & *narium pinna* vocantur. Extrema autem nasi rotunditas protuberans, ^{r. f.} *Ala*.
^{s. g.} *ελον*, ^{t.} *nasi orbiculus*, & *globulus*: at pili in narium antro crescentes, ^{t.} *Vibrissi*, & *Vibrissa*, quod ^{u. d.d.} *Nasi globulus*.
^{t. i. i. 2.} *OCULVS EXTERNVS*, sic dictus ad differentiam interni, qui ad aliam tractationem pertinet, sub superciliis, & à latere radice narium collocatus est, duabus partibus constans; vnâ, quæ pro integumento interni oculi seruit; alterâ verò, quæ ad ipsum quidem oculum internum pertinet, at quatenus nobis sine dissectione in conspectum se profert, suo quasi iure ad externum referri videtur. Prior illa ^{u. d.d.} *PALPEBRÆ* vocatur, à palpitando, quod inter loquendum frequenter palpitent, & à nobis moueantur, Græcis *βλέφαραι*, *τὸ βλέπεν*, à videndo, quod iis apertis homovideat: vel certè, quia sunt *βλέποντες* *φάρεα*, hoc est, *Visus tunica*, & *opercula*, vnde nec malè, & eleganter profectò à Poëtâ, *ὀμματα φύλλα*, *Oculi folia*, dicuntur. Sunt autem palpebræ in vtroque oculo binæ, quarum quæ superior est, oculum à superiore parte operiens, *κρίλις*; altera, quæ inferior, & ab infimâ parte contegens, *κρίλον*, *καὶ ἀνὰ κρίλον* Polluci vocatur. Hæ cum ad oculi tutelam, maximè dormientibus, claudantur, si in somno conniueant, ut albi aliquid cernatur, indicia Medicis præbere solent exitialium febrium, indubitataque mortis. sic enim hoc signum Hippocrates i. prognostic. interpretatur, nisi fortè à superpurgatione, aut magno alui profluuiio, vel etiam aliâ externâ causâ contigerit, tùm enim minus malum portendit: aliàs summam omnium naturalium, vitaliumq; facultatum imbecillitatem significat. In quibusdam tamen naturale esse, apertis dormire oculis, obseruauimus. Quare cauendum est, ne præcipiti nimium iudicio hic fortè labamur; sed qualis valenti conditio fuerit, priùs inuestigemus. Cæterùm pili qui vtriusque palpebræ extremitates cingunt, *ἀπὸ τῶν βλέφαρων*, ^{x. e.} *βλεφαρίδες* dicuntur: Latinis quibusdam, inter quos est & doctissimus Theodorus Gaza, *Cilia*, sed malè vocantur, id quod rectè summus vir Scaliger iam antè obseruauit, & monuit: Plinius, & Lucretius *Palpebras* vocant. Cartilagine autem semilunares, quæ palpebrarum extremitates firmant, & inuersis ipsis visui se offerunt; clausis, inuicem iunguntur, *ἄρσιν palpebrarum crepidines*, & Antiquis *Cilia* quoque dicebantur. Harum fines sese inuicem secentes, vtrinque oculorum angulos constituunt, *τῶν ὀφθαλμῶν κανθούς*, quorum qui ^{y. f.} *Oculorū anguli*.
^{z. g.} ad nasum est, ^{y.} *Maior angulus*; qui ad tempora, ^{z.} *Minor*, & est, & nuncupatur, Græci tamen maiorem peculiari voce, & propriè *ἐγκανθὺν* appellant, quam vocem postea Vesalius ad carunculam eo loci positam traduxit. Hesychio pulchrè *πρὶν* dicitur, *fontis*, quod lachrymæ inde quasi scaturire videantur. Est enim illic ^{a.} *Foramen in inferioris palpebrae tarso*, ^{a. h.} *Punctum siue foramen lacrymale*.
^{b. i.} *lacrymale*, Græci *αἰζύλωπα* vocant. Si quis exactius foramen id videre desideret, bovis modo mactati oculum intueatur, in eo enim insigne admodum esse consuevit. Est etiam in fæminis maius, quàm in maribus, & in iis, qui lachrymis delectantur, quàm qui ab ipsis abstinant. Tandem inter ossa, & vtramque palpebram, exiguæ quædam ^{d. i.} *Cauit* ^{e. k.} *cauitates* reperiuntur, semicirculares, quarum superior, ^{b.} *Cauitas oculi*, *κρίλον*; inferior, ^{c.} *subcauitas*, *ἐπὶ κρίλον* dicitur. Vtraque cauitas, sed præcipuè inferior, in cachexiâ, & hydropo

- dropae intumescere consuevit, maximè verò, si à longo mensium, aut hæmorrhoidum profluuiò nascantur. Idem in longis vigiliis, & incipientibus ophthalmiis contingit. Menstruo autem fluxu laborantibus, tumor fit liuidus: at lue venerea pressis, pallidus, cum insigni splendore, qui mihi semper Gallici morbi certissimum signum dedit.
- Oculus.** Palpebris sic visis, visorium deinde organum inspicendum est, quod *Oculus* appellatur, ab occultando. Græci à munere suo ὀφθαλμὸν, quasi ὀπίος θάλαμον, *visus cubiculum*: & ὄμμα, ὡδὲ τὸ ὀπτεῖσθαι, à videndo vocant. In huius medio niger circulus, lucidusq; admodum est, speculi instar, speculi etiam officio fungens, quod imagines representet oppositas, ^d*Pupilla* dictus, Aristoteli κόρη, Ruffo γλῆνη. Hūc ambit alius, magnitudine quidem priorem superans, sed claritate victus, quem Græci ἰριδα vocant, à similitudine, quā caelestem arcum, varietate, & pulchritudine colorum refert, vnde & Romani quoque hanc vocem retinentes, ^e*Iridem* appellarunt. *Colores Iridi Aristoteles* e, m. i. histor. animal. 10. quatuor tribuit, atrum, cæsum, fuluum, & caprinum: *Galenus*, art. medic. 26. tres tantum constituit, glaucum, nigrum, & medium inter hos duos. Generantur autem hi, aut multitudine, aut paucitate, aut situ quodam certi humoris. Solutamen ferè Homo inter cætera animantia, diuersi coloris oculos obtinet, nec ratione tantum indiuiduorum, sed & integrarum nationum. Niger enim ferè est Æthiopibus color: *caesus* Belgis, & Septentrionalibus: *fuluus*, Italis, vicinisque gentibus. Fuerunt autem ex antiquioribus Græcis, qui τεφάνην vocauerunt; posteriores tamen extremitatem tantum ipsius, quæ inter *Iridem* propriè dictum, & album est, hac voce dignantur. Est autem ^f*Album oculi*, τὸ λεκάν, totum id, quod ^g n. extra dictas partes albi coloris existit, & à corneâ tunicâ constituitur. Ossa verò, vel impendentia, vel subiecta oculis, ὑπόπια, καὶ ὑπὸ φθαλμα vocantur. Latine si velis reddere, non malè *Subocularia* dixeris.
- Sequuntur nunc duæ aliæ partes, quas Arist. i. hist. animal. 11. σιγόνους vocat, ὅπσιον τε πελαγόμεναι, quod motæ concutiantur, facitq; vnam earum anteriorem, quā γένον vocat: alteram posteriorem, quam γένω. Partes sunt, quæ vtrinq; auribus, naso, oculisq; sub sunt, & ad mentum vsque protenduntur. Latinis, vt puto, rectè GENÆ dicuntur, ὡδὲ τὸ γίγνεσθαι, quod hæ partes barbam in viris producant, vnde, nec ineptè fortassis, *Barbitium* in his appellarentur, si cui nomina fingere placuerit. Est autem duplex Gena, superior & inferior, ἡ ἄνω καὶ κάτω γένους Aristoteli, dict. loc. *Superiorem* (quæ ^g, i. l. i. h. & MAXILLA SUPERIOR) constituunt sub oculis, inter nasum & aures, duæ illæ rotundæ faciei eminentiæ, soli homini concessæ, quæ pudoris sedes esse consueuerunt. rubescunt enim primum omnium pudore affectis. latine dicuntur *Mala* à similitudine (vt quibusdam placet) quā malum, siue pomum, non rotunditate solum suâ, sed & colore subrubro referunt, quam obrem & Græcis μήλα vocantur. Cicero tamen, in Orat. malam à maxillâ dictam fuisse ostendit, abiectis mediis literis, quomodo voces sæpè contrahuntur, non vsus causâ; sed auium. Sic ex axillâ, ala: ex taxillo, talus factus est. Polluce teste, γνάθοι etiam dicuntur, vnde mutuauit nomen Parasitus ille apud Terentium. Hippocrates, lib. de morb. mulier. eleganter κύκλους & περιώπας, circulos faciei nominat. Solet autè hæc pars in Peripneumoniacis inflammari, aut maximè rubere, quod fit, quia sanguinis copia affluens, propter tenuitatem ipsius cutis, quæ hoc in lo-

in loco summa est, imprimis transparet, cum etiam, quia vasa ibi maiora sunt paulum, & pinguedo nulla subiecta, quod fit, ut humoris abundantis, vel concurrentis eò, color facillimè transpareat.^h Inferior autem pars, quæ laxior est, & aëre inflata tumet, propriè *ῥαθός* dicitur, *Βύσσα* Latinis. In hac in nonnullis ridentibus rima, in aliis ruga, in quibusdam fouea comparet, quam Martialis *Galefinum*, *ῥαθὸν* & *ῥαθὸν* appellat.

Βύσσα.
Gela-
finum.
Labia.

i, x. Sub Naso, & genis continenturⁱ LABIA, quæ & LABRA Ciceroni, Aristoteli *χέ-
λεα*, *ῥαθὸν* & *ῥαθὸν* λείπον, quòd vocem fundant. Opercula sunt oris, dentium deformita-
tem tegentia, numeroq; duo. *Superius*, *ἀνώγειλον* dicitur; *inferius*, *κατώγειλον*. Extremi-
tates ipsorum rubæ, *περὶ γέρον*: sin committantur inuicem, *περὶ σμίον* dicuntur. Ipsum
autem foramen, quod apertura sua producant, τὸ *σμίον*, os cognominatur.

k, 2.3.1. Aperto ore, aut sublati labiis occurrunt in maxillæ vtriusque circuitu^k DEN-
TES, Græcis *ὀδόντες*; quasi *ἔδοντες*, ab *ἔδω*, quod est, comedo, dicti. Latinis etiam *Den-*
tes, q. e. dentes. Horum numerus diuersus est, non quidem ratione sexûs, ut malè cen-
suit Aristoteles, (cùm viderim fæminarum dentes superasse numerum dentium mari-
um) sed ratione ipsorum indiuiduorum, cùm in aliis plures, in aliis sint pauciores: ma-
gna tamen pars triginta duos obtinet, ut vtriq; maxillæ sedecim competant. Ex qui-
bus quatuor sunt Incisores, qui medium locum occupant, duo Canini, vtrinque; v-
nus, ad incisorem latus, & quinque Molares. *Incisores*, *τομείς*, *ῥαθὸν* τὸ *τέμνειν*, dicti sunt,
ab officio, quia cibum acie suâ tenui, (à quâ & *ὀξείς*, acuti appellantur) secant:
à loco vocantur *πρώτοι*, *primores*, ab Hippocrate, *Canini*, *κυνόδοντες*, quia reliquis
sunt longiores, & respondent dentibus duobus acutis admodumq; exsertis can-
num. *Molares*, *μύλαι*, quia incisum cibum, veluti molæ, conterunt, & in minutissimas
partes redigunt. Sed cùm hi postremi non semper, aut omnibus omnes crescant, aut
non omni tempore: sed sæpè in matura ætate exserantur primùm & nascantur,
quemadmodum vltimi molarium, qui propterea quoq; *σωφρονιστῆρες* ab Hippocrate
sunt appellati, quòd plerunq; oriantur, vbi Homo iam sapientiæ annos attigit, fit, ut
maxima sit de numero dentium apud auctores discrepantia. Cæterùm *margines* illi
maxillarum, in quibus seriâtim continentur, Græcis *φάτνια* dicuntur: at *alveoli*, quos
singulos singuli habent *βύτεια*. Interualla autem, quæ dentes à se discernunt inuicem,
ἀρμυῶ vocantur. Caro dentium, quæ circa *φάτνια* est, dura atq; immobilis, dentes
ceu vallum cingens, *Gingiu*a Latinis, *οὐλον* Græcis, *ῥαθὸν* ἔλαιν, ab inuoluendo, quasi
inuolucrum dentium. Hinc *ἐπὶ οὐλῆς* medicis, tumor in gingiuis natus vocatur. In-
ter superius labrum & nasum pars quædam occurrit, in quâ primùm barba erumpe-
re solet, quæⁱ *μύτις* dicitur, *ῥαθὸν* & *μυκτῆρου* à muco, qui ex naribus eò destillat. à situ a-
liis *ὑπὲρ ῥῖνον*, quasi sub naribus collocatum diceret. Cavitatis quæ in hoc sub ipsâ nasi
columna insculpta est, & in duas partes mystacem dirimit^m *φίλτρον* dicitur, quòd a-
moris illecebra in eò contineatur. Barba hîc primùm prodiens, si pili adhuc sint mol-
liores, *περὶ τὴν γωνίαν*, hoc est, anterior barba, quia ante inferiorem exeat: adauctis ve-
rò, rigidioribusq; factis, *μύτακις*, Latinis quoq; *Mystaces* græcam vocem retinenti-
bus, dicitur.

Incisores.

Canini.

Molares.

*Gingiu*a.

l, 1.1.1.

m, m.

n, n.

Sub labro humilioreⁿ Maxilla INFERIOR est, *ῥαθὸν*, & *Mentum*, ab eminendo
dictum. Eminet enim à gulâ, & parse est faciei infima, in orbicularem acutiem defi-
niens.

Maxilla
inferior.

nens. Circa hoc pili nascuntur, qui primū erumpentes *χνῆς*, *Lanugo*: adulti, *Ὠνήη*, *Ἐπώγων*, *Barba*, dicuntur. Pili verò à lateribus, sub temporibus & genis prodeuntes, *Ἰουλα* vocantur, quod instar vermis Iuli appellati se inuoluant, primamque lanuginem constituent.

Aures. Temporibus ° *Avres* adstant, sic dicta, quòd sonos vocesq; accipiant, & quasi haurire videantur, cum sint instrumentum auditus. Propriè tamen auris totum organum significat, internā externāq; aure constans. Græcis *ὠς* vocatur: at *ὠπον*, extremam tantum auris partem, quæ in capitis lateribus prominet, & de quâ hîc agendum est. Latini Græcos imitati *Auriculam* dixerunt, quamvis hanc vocem malè nonnulli pro parvâ aure acceperint. Huius *superior* pars, cartilaginosa, nomine caret græco, teste Aristotele, 1. hist. animal. 11. Gaza tamen interpres, latine *Pinnam* vocavit. *Inferior*, quæ carnea est, *λόφος* eidem, *ὠρυξ* τὸ λοῦν quod abscindere significat, & deturpare. Solet enim hæc pars turpiter flagitiosis abscindi ad manifestanda scelera. Gaza *Fibram* reddidit. Cæterum extremus pinnæ ambitus & circumferentia, à tortuositate suâ *ἑλιξ*, *Helix*, vocatur: interior & priori respondens, *ἀνθέλιξ*. Cavitas autem ipsa, quam circa consistit, *κόγχη*, *Concha*, à similitudine, quòd conchiliorum in morem anfractuosa sit, & tortuose caua iuxta hanc eminentia quædam est versus tempora, quam *τεχρον* vocant, siue *Hircum*. Est enim pars hæc pilis hirsuta, & in plærisq; densam hirci barbulam imitatur. Huic opposita pars *ἀντίτεχρος* dicitur: Foramen autem inter hæc, *Μεatus auditorius*, *πόρος ἀκουστικός*, in quo sordes colliguntur, Hippocrati *ῥύποι ἐν ποτὶς ὥσι* cognominati. Latini veteres *Cerumina* vocarunt, fortè à colore, & substantiæ consistentia, qua vtraque ceram flauam refert.

Collum. Sub capite tandem occurrit pars quædam oblonga & rotunda, figuræ cylindraceæ, ad humeros vsque protensa, quæ etsi inter medium & supremum ventrem sit media, ad caput tamen rectius, quàm thoracem referri posse videtur. Dicitur autem Collum, quod præcipuè torquibus coli ornariq; consuevit. quibusdam etiam *Cervix* vocatur, quamquam non desint alii, qui cervicem posteriorem tantum colli partem nominare velint. Græci *τερχήλον* vocant. Galenus tamen, lib. de ossibus, *ἄυχενά* quoque appellat, & cum *τερχήλω* confundit. Musæus similiter promiscuè uti videtur, cum *παρθενικῆς*, inquit, *ἔυδομον*, *ἔυχρον* τ' *ἄυχενά* καὶ *σιν*, virginis benevolentem collum & coloratum exosculatus. Sic Aristoteles quoq; 1. histor. animal. 11. cum *ἄυχενά* definit esse, τὸ μετὰ τὸ πρὸς ὤφθαλμον, quod inter faciem, & thoracem est. Diuiditur in partem anteriorem, & posteriorem. *Anterior*, *ἀντερεὼν* dicitur, *ἀπὸ τῆς θελίης ἀνθεν*, quòd pili ibi efflorescant, Aristoteli *λάρυγξ*. In hac cernitur caput asperæ arteriæ scuto suo prominens, vulgò, *Pomum Adami* dictum; aliis *Nodus gutturis*; Aristoteli, loco citat. *ἀρτηρία*. At in infimâ, & vicina thoraci parte cavitas est, acuro angulo pectori incumbens, *ἰγυλίον*, *λαυηνία*, *Iugulum*. *Posterior colli pars*, ab occipitio ad scapulas vsque excurrens, *ἀυχὴν* propriè, Aristoteli *ἐπωμὶς*, quòd supra humeros sit sita. Sunt autem *ὠμοί*, seu *Humeri*, partes illæ ad latera colli positæ, quæ initium præbent toti manui, & constituuntur ab eminentia, quam caput

caput brachii efficit, dum lato scapularum ossi coniungitur. His pars est contraria sub brachii articulo caua, *μασχάλη*, & *μασχάλις* dicta, Latinis *Axilla*, & per synopen, *Ala*.

CAPUT II.

De appellatione externarum Thoracis partium.

MEDIVS venter, qui cordis partiumq; vitali facultati destinatarum domicilium est, collum excipit. Hic Latinis Medicis, Thorax vulgò, græca voce appellari consuevit, quantumvis *θώραξ* apud Græcos non parua ambiguitate laboret. Aristoteles enim pro toto corporis trunco, medio infimoq; ventre constante accipit, cum 1. histor. anim. 7. corpus in summas partes dirimit, & τὸ ἀπὸ ἀνχένος, inquit, *μεχρὶ αἰδοίων κύτος*, *θώραξ καλεῖται*, quod à collo ad pudenda vsque pertendit, Thorax vocatur. Eadem significatione Aristotele antiquior Hippocrates, libro de arte, & doctissimus Plato in Timæo, sumpsere. Non mirum ergò si Iecur in thorace situm nonnunquam apud hos Authores legamus, quos nonnulli præcipiti nimis iudicio ignorantiae in rebus Anatomicis accularunt. Galenus tamen propriâ semper acceptione vsus est, quem meritiò Recentiores sequuntur, qui Thoracem eam tantum partem vocant, quæ collo subiecta, vtrinque costis clauditur. Sic Aristoteles & ipse nonnunquam accepisse videtur, vt 1. hist. animal. 13. vbi, *μετὰ*, inquit, τὸν θώρακα ἐν τοῖς περὶ τοῖς ῥασηρ, καὶ ταύτης ῥίζα ὀμφαλός. Venter infra Thoracem parte priore situs est, cuius radix vmbilicus. Dicitur autem *θώραξ*, ἀπὸ ὄρεϊν, quòd cor continet, viscus perpetim saliens.

Etymologia thoracis.
Diuisio thoracis.
Pectus.
Sternū.

Constat tribus partibus; anteriore, laterali, & posteriore. ^d *Anterior*, à colli cavitare propè clauiculas incipiens, ad molles vsque partes extenditur, & *σῆθος*, *Pectus* dicitur, ^e *Medium* pectoris, quod à iugulo in cartilaginem mucronatam desinit, *στένον* communiter, quasi *στερὸν* quòd ibi pectus solidum sit, osseumque, dicitur. Latini *Sternum* vocant, quando quidem in medio costarum sternitur. Ad huius latera, rotunda duo corpora carnosaq; eminent, vtrique quidem sexui communes, sequiori tamen & fæminino maiores. Græci ^f *τίττες* vocant generali nomine, & *μαστὺς* specialiore, fæminarum mammas, quasi *μαστὺς*, manfos, siquidem alimentum infantibus suppeditât. Latini, in Viris, *Mammillas*; in Mulieribus, *Māmas*; in cæteris Animalibus, *Vbera* appellant. Harum moles dum præsertim lacte turget, *ἄσκημα*, *Vter* dicitur: at pars, quæ in centro eminet veluti apex, *θηλή*, ^h *Papilla*: circuitus verò obfusus hanc ambiens, *Φῶς*, ⁱ *Areola*, à similitudine.

Māma.
Papilla.
Areola.

Posterior pars pectori opposita, quæ à ceruice ad costarum finem, & lumborum vsque principium porrigitur, *νῶτον*, ^k *Dorsum*, & *Tergum* dicitur, *μετὰ φρενον* etiam, quòd post *φρένες*, hoc est, diaphragma posita. Huius partes sunt *Scapula*, ὠμοπλάται, & *Spina*, ῥάχις. ^l *Scapula* vocantur eminentiæ illæ duæ superiores à lato scapularum osse prognatæ: at ^m *Spina*, acuta illa protuberantia, quæ per totam dorfi longitudinem excurrans, ⁿ *tergum* in dextram sinistramq; partem discescit.

Dorsum.
Scapula.
Spina.

Laterales tandem partes inter anteriorem posterioremq; continentur, & *πλευραὶ*, *Laterata* vocantur. Initium suum ducunt sub alâ, & cum costis terminantur. Late-

rum ergò vnum quidem dextrum est, alterum sinistrum; sed cum ex costis consent, carne alternatim constipatis, spatia illa intermedia quæ carnea sunt, *Intercostalia* dici meruerunt.

C A P V T III.

De appellatione partium externarum infimi Ventris.

INFIMUS VENTER, qui naturales partes, nutritioni generationiq; dicatas complectitur, suo honore infimo loco situs est, substantia carnea & mollis. Circumscribitur cartilagine mucronatâ, lateribus duobus, lumbis, & ossibus pubis. Aristoteles 1. hist. animal. 13. vocat propriè *ματέρι*, alii impropiè, *ἐπιγάστρον*. Latini *Ventrem* appellant, abutentes vocabulo in pressiore significato, quod euitare volens Celsus, rectius *inum Ventrem* dixit, ad discrimen capitis & thoracis, ventrium superiorum.

Abdomē. Sunt qui *Abdomen* cognominant, sed præterquam quod admodum impropiè, elegantioribus quoq; aduersantur, qui hanc vocem porcis potius, quam hominibus tribuendam censent. Diuiditur in partem anteriorem, & posteriorem; illa, à cartilagine ensiformi incipiens, ad ossa pubis vsque extenditur, Galeno *ἐπιγάστρον* dicta: hæc, ab extremis costis ad ossis sacri extrema pertingit, & quibusdam *Διζωμῶ* appellatur. ° *An-* o. i. i. r.

Diuisio infimi ventris. *terior* rursus in tres regiones, *superiorem, mediam, & infimam* secatur, quas Galenus, 2. aphorism. 35. ex Hippocrate, & Aristotele *ὑποχόνδριον* vocat, τὰ πρὸ τὸν ὀμφαλον, & τὸ ἥτερον.

Anterior pars. *P Superior* ergò pars à mucronata cartilagine ac costarum finibus, ad vmbilicum ferè terminatur. *Media*, supra infraque vmbilicum, trium circiter aut quatuor digitorum spatium complectitur, & quia hunc in media veluti centrum coercet, Vmbilicalis dicitur. *Infima*, ab hac inchoans, ad pubis ossa terminatur. Singula harum partium ab Anatomicis iterum in alios subdividuntur, in duas, inquam, laterales & mediâ, quarum appellationes nunc breuiter persequemur.

Suprema ergò regionis latera, propriè *ὑποχόνδρια* dicuntur, quasi *subcartilaginea*, si quidem *πρὸ τῶν χονδρῶν*, sub cartilaginibus costarum spuriarū sunt sita. Celsus, lib. 4. cap. 8. Latinis propriè *Præcordia* dici scribit, quamvis Plinius li. 11. nat. hist. cap. 37. hac voce diaphragma intellexerit. Inter hæc pars media, *ἐπιγάστρον*, quasi *Superuentrale* vocatur, in qua occurrit cauitas quædâ, Polluci *σφαγή* dicta, antiquis, *καρδία* Cor, vnde dolores circa illam partem fientes, *καρδιαλγίαι*, καὶ *καρδιωγμίαι*, cordis dolores appellantur, alii *πρεκαρδίων* dixerunt: quasi dicas, *Præcordium*, aut *Anticordium*, alii *σῶμα τῆς καρδίας*, os ventriculi nuncupant, quia sub eo ventriculi os superius lateat, & hæc est regio, cui solemus remedia adhibere pro stomachi malis.

Regio vmbilicalis. Porro *regio vmbilicalis* (in qua vmbilicus situs, & corporis totius, & abdominis centrum,) Græcis appellatur, τὰ πρὸ τὸν ὀμφαλον, quæ circa vmbilicum consistunt, ὀμφαλῶν autem, *πρὸ τὸ ἐμπνεῖν*, à respirando dictus est. Respirare enim per eum animal, dum vtero concluditur adhuc, Antiqui credebant. Media eius pars *μεσομφάλιον*, καὶ *ἀκρομφάλιον* dicitur: cauum autem *γαγγαμῶν* appellatur. Cutis rugosa, quæ circa vmbilicum est, *γεγέρδς*, *Vetula*, quòd in modum frontis vetulæ rugosa sit in homine. In ca-

nē enim, & aliis animalibus nullæ comparent rugæ, sed durus tantum & glaber nodus. Tota hæc regio umbilicalis, in nobis sanis, nonnihil monticuli instar, in medio ventris protuberat, & in non admodum pinguibus cadaueribus maximè conspicua est. Lateralibus partibus caret, etsi Laurentius, li. 6. histor. anatom. cap. 2. ipsi assignarit, & nominibus quoq; insignirit.

Infima regio, quæ Hippocrati ἡτρεον, aliis ἑσπέρως εἶλον, in tres partes dispescitur. *Mediam* *Infima* Aristoteles lib. 1. hist. anim. 3. ἡτρεον vocat, quod Gaza vertit *sumen*, & *abdomen*: *2 Late- regio.* *rales* partes vsque ad hypochondria sese extendentes, λαγῶνες, quod libidinis, quam λαγχνείαν vocant, ibi sit sedes. Hippocrates κενεῶνες appellat, quod inter coxendicis ossa & costas consistentes, molles sint, & vacuæ esse videantur. Latini *Ilia* dicunt eo *Ilia.* quod ilium intestinū sub ipsis lateat. Alii χολάς vocant, ὡς τὸ δέχεσθαι τὰς χολάδας, hoc est, τὰ ἐν περσ. Intestinorum enim, præcipuè tenuiorum maximam in se partem continent. Sub ἡτρεω continetur *a Pubes*, quam ἐπίσειον dicunt, ὡς τὸ τὸ σείειν, quod in libi- *Pubes.* dine hæ partes concutiantur. Alii ἤβην, Latini Pubem, quæ tamē voces, & pilos qui pudentis exerescunt, & locum in quo crescunt, & ætatem deniq; quā crescere incipiunt, videlicet decimum quartum in maribus, & duodecimum in fœminis, significāt. Quāprimum enim semini & mensibus via patet; pili quoq; in pube puerorum & virginum erumpunt, rariore redditā cute ab aucto calore. Hanc ad dextram sinistramq; partem circumstant *b βεβδῶνες*, *Inguina* appellati.

Cæterum hæ partes, & earum appellationes, tanto diligentius obseruandæ sunt, quanto frequentior earum apud Medicos mentio occurrit, tum in applicandis ventri remediis, tum in inuestigandis locis affectis. In *dextro* enim *hypochondrio* Iecur ferè totum situm est, cum parte quadam ventriculi. In *sinistro* lien totus: In *medio loco* ventriculi magna portio, cuius tamen plurima quoq; pars in sinistro continetur hypochondrio. *Sub umbilicali regione* intestinum ieiunum totum collocatum est: *sub iliis*, vtrinque, intestinum ilium, & in *dextro* quidem, coli, ilei, & cæci portiones, quæ sibi inuicem annectuntur, in *sinistro* vero, portio magna coli, & recti intestini. Sub ἡτρεω continetur Vesica, rectumq; intestinum; in fæminis quoq; vterus.

Posterior infimi ventris pars, *c Lumbos* continet, siue ὀσφύες, qui initium ducunt à *Lumbi.* flexu dorso, & ad vsq; nates pertingunt. Horum pars vtrinque carnea ψόα, ὡς τὸ ψάυσαι, à palpando dicitur, Latinis eadem de causa *Pulpa*. Ad horum dextrū latus Ren dexter; ad læuum, sinister situs est. Est & altera pars sub lumbis, carnosā, vtrinq; coxendicum innominatis ossibus appositā, quam γλατὲς Græci appellant, & γλόυτια *d Clunes*, ac *Nates* Latini, ab innitendo, opinor, quod sedentes ipsis innitamur. Sic Aristoteles quoq; 4. histor. animal. 10. ἰσχία apud Græcos, ὡς τὸ ἰσχεῖν τὰς καθήμενας eadem etymologia dicta esse, & propterea etiam solum hominem ἰσχία habere, existimat. Quāuis enim & alia quædam animalia sedere nobis videantur, vt propterea doctissimus Homerus ἰσχία tribuat Apro, Iliad. θ. dum canit.

Et Leoni, Iliad. 5. ἀπ' ἡτρεω κατ' ὀπίθε' ἰσχία πε γλατὲς πε.
ἐρῇ δ' ὡς πλάσσει πε καὶ ἰσχία ἀμφοτέρωθεν
μαστῖνι.

Solustamen Homo ex omnibus commodè sedet, cui carnosì & magni sontigère, & pro substernaculo puluinariq; tomento repleto, inferuiunt, vt citra molestiam sedendo, cogitationibus rerum diuinarum animum rectius applicare posset. hinc Philosophus 4. de part. 10. Simiam ἰσχυρία habere, & οὐρανὸν pernegat: rationem addens, ὡς μὲν ἔνδιπρος ὢν, οὐρανὸν ἔκχει, ὡς ᾧ περὶ πτερυγίας, ἰσχυρία. hoc est, simia quòd formâ ambigua sit, vt & in neutro, & vtroq; genere sit constituenda, idèd nec caudam habet, nec nates. Vt bipes enim, caudâ vacat: vt quadrupes, natibus. *Fissura*, quæ nates dirimit, *διχάλα* Herophilo dicitur, *e. z. z.* in quâ foramen aduertitur, vbi est exitus intestini recti, & excrementorum duriorum, *f. a.* quod *Podicem*, & *Anum* à rugis anilibus, quas habet, appellant.

Podex.

CAPVT IV.

De appellationibus partium externarum, quæ generationi sunt dicata.

GENITALES PARTES, μόρια γυνικὰ, & αἰδοῖα appellatæ, quod iis importuno tempore & loco detectis, pudore afficiamur, Latinis *Pudenda* eadem ratione, & *Naturalia* vocantur. Variant hæ partes pro sexus diuersitate, & aliæ maribus datæ sunt, aliæ fæminis. De vtrîsq; hîc agemus, initio ab illis accepto. *Genitalia* ergò *marium* commodè in duas diuiduntur partes, in eam quæ vterum ingreditur, & illam quæ extra, sacci instar propendens, remanet. Hanc & *Scrotum*, & *Scortum* vocant, quòd coriacei sacculi similitudinem referat. *Scortea* enim Veteribus dicebantur, quæcunque ex alutâ, aut pelle fiebant. *Vulgus marsupium*, & *bursam virilem* vocat: Græcis ὄρχεον, & ὄρχεον, Aristoteli etiam ὄρχεα dicitur. In hoc continentur partes, quæ semini genitali conficiendo destinatæ dicuntur, ὄρχεις, quos à numero quidam διδύμους, quasi gemellos, & à figurâ κυάμους, *Fabas* appellant. Latini *Testes*, quòd testimonium præbeant virilitatis. Altera pars longa & carnosâ, *Penis* dicitur, à pendendo: Græcis τὺλθ, à figura, quasi clauus: καύλος, *caulis*: σιγυγγῶδες νεφρός, *Neruus fistularis*: στήμγ, à stando: & πέος, *penis*. Vulgò etiam *Mentula*, quòd rigida hæc pars, viro mentem eripiat, vel à feriis ad iocosa & Venerea auertat. Pars verò, quæ inter anum & penis initium interiacet, in sexu masculino ἐπὶ στήμα, quòd sub pene sit sita; in vtroque sexu, latiore significato, πείνας, *Perinaum* dicitur, quo loci incisio fieri consuevit à Lithotomis. Cæterum penis rursus duas habet partes, vnâ, quæ semper cute tecta est, & dura ac veluti neruosa, totiusq; nomine gaudet: alteram, quæ carnosâ est, sphaerica, & in complexu Venereo à cute denudatur, *Glans*. *Præputium*. Glans, aliàs cute tecta, βάλανος dicitur, siue *Glans* à similitudine. Nonnulli *Cerasum* eâdem de causa vocant. Cutis autem illa πύλη Galeno, & ἀκροποδιά quibusdam, *Præputium* Latinis dicitur, estque illa, quæ Iudæis absconditur, vnde Recutiti vocantur, olim sanctissimi fæderis, nunc impiæ incredulitatis signum est. Ligamentum quod præputium, ex infernâ parte glandi alligat, κωδῶσμιον, *Vinculum caninum*, & κύων, *Canis*, dicitur. *Vulgus χαλινόν*, *frenum* appellat. Circulus qui glandis extrema cingit, στεφάνη, *Corona*: foramen autem in medio glandis, vrinæ & seminis exitui destinatum, οὐρήθρα, *Meatus vrinarius* vocatur.

FEMINARVM GENITALIA pluribus adhuc partibus constant, quàm marium. Vocantur

g. i. i. γ.

h. d.

i. 7. 16.

i. H.

k. x.

h. 7. 16.

4. 1.

m. 7.17. *i.* C.C. *a.* D.D. *o.* B. *p.* F. *q.* E.

cantur Galeno αἰδοῖον γυναικαῖον, Pudendum muliebre. A Poëtis Latinis *Cunius*; communiter *Vulua*, quod propter longam fissuram, qua labia genitalium disparantur, valuas æmuletur. Occurrunt in his primum, *m.* *Labia vuluæ, κρήμνα* Hippocrati dicta, quæ *Labia vuluæ.* sunt duo oblonga & mollia corpora, substantiæ carnosæ, & spongiosæ. In horum medio rima est magna, quam *σχίσμα*, seu *Fissuram magnam* appellant, quia reuera longe maior est alterâ rimâ, quæ vteri exterius osculum constituit. Diductis sic labiis, in *Rima magna.* conspectum veniunt duo alia corpora *n.* *Nympha* dicta, *νύμφα*, vel quia primæ sponsum admittant; vel, quia nympharum officio fungantur. vt enim illæ riuus, & scaturientibus præfunt aquis: sic hæ vrinæ riuulo præfectæ videntur. Ab aliis *πεύγα*, & *περυγώματα*, siue *Ala* dicuntur. Sunt autē duæ productiones, fungosæ carne constantes, vtrinq; vna, in principio ferè inter se iunctæ, & sub utroq; vuluæ labio latentes, vbique fere contiguæ, ad finem commissuræ ossium pubis ascendunt, vbi iunctæ, Clitoridem veluti præputium quoddam integunt. In harum apice *o.* *Clitoris* est, *κλειτορίς* *Clitoris.* dicta, ab obscæno verbo *κλειπέειν*, quod, his partibus lasciuie contrectatis, semen effundere significat. Nonnullis Recentioribus *Penis*, aut *Mentula muliebris* dicitur. Est enim processus exiguus, in anteriore & elatâ pubis parte, vbi nymphæ conueniunt, respondens in pluribus peni virili, puta in situ, substantiâ, spirituum repletionem, & erectionem. Diductis postea nonnihil nymphis, alia rima conspicitur, quæ *p.* *externum cernicis vteri osculum* constituit, supra quam aliud *q.* foramen cernitur, quod ex implâtatione colli vesicæ vrinariæ prodit. In illâ autem maiore rimâ, conspiciendæ veniunt quatuor *Caruncula*, quas *myrtiformes* appellant, quod myrti baccas referant. Harum anterior, vrinarii meatus foramen, quod in hanc vteri partem desinit, obteggit: altera huic opposita posterior est, duæ reliquæ sunt laterales. Seruantur hæ carunculæ vsque ad interitum, nec minus in vetulis, quàm iuuenibus cernuntur: in iis tamen, quæ vtero non gestarunt, integriores sunt. Has carunculas coniungit membrana quædam, in medio perforata, *ὕμην*, siue *Hymen* dicta, apud omnes scriptores decantatissima, quæ virginittis signum vulgò habetur, & reuera quando adest, certissimum esse solet, de qua tamen re inferius, vbi historiam vteri aggrediemur, pluribus acturi sumus. *Hymen.*

CAPVT V.

De appellatione Manus, & partium in ea contentarum.

r. 1.1.1. *A.* 7.

EXPRIMITIS hætenus appellationibus earum partium, quæ in tribus ventribus citra dissectionem conspectui se offerunt, reliquum est, vt ad Artus nunc accedamus. Appellamus *ARTVS*, siue *κῶλα*, partes nostri corporis, ex trunco ramorum instar exstantes, suntq; manus, & pedes, *χεῖρες, καὶ πόδες*. *ἡ χεῖρ*, siue *MANVS* vocatur, quicquid inter summum humerum, & extremos digitorum apices continetur. Hac enim significatione olim sumebatur, qua vsus est doctissimus iuxta atque antiquissimus scriptor Homerus, & post eum Hippocrates, qui propterea discriminis gratiâ, non *χῆρα* simpliciter, sed *χῆρα ἀκραν* vocauit, quam Latini, & nos hodie *Manum* dicimus. Hanc Galenus lib. de inæquali intemp. cap. 2. in tres præcipuas partes diuidit, in *βραχίονα*, in *πῆχυον*, & *τὸ ἀκρόχειρον*, id est, in brachium, cubitum, & extremam manum. Contracta enim & composita voce *ἀκρόχειρον* vocat, quam ab Hippocrate *ἀκραν*

χειρ^ε appellari diximus. Has partes Poëta non ineleganter versu complexus est, dum sic canit,

----- laudat digitosque manusq³,

Brachiaque, & nudos media post parte lacertos.

Aristoteles verò 1. hist. animal. 15. Manum, siue τὴν χειρ^ε appellat βραχίονα, quē Latini secuti sunt, vocantes *Brachium*, quicquid ab humero dependet. Huius partes constituit ὤμων, ἄγκων, ὠλέκρανον, πῆχυς, & χειρ^ε.^f ὤμ^o, siue *Humerus*, pars illa est, quæ à summo humero ad proximum vsq; articulum cubitiue flexuræ pertingit. ἄγκων flexura est cubiti, seu incuruatio brachii: huius contrarium est ὠλέκρανον, nempe exterior cubiti protuberantia, siue gibbositas. πῆχυς, Latinis *Vlna* & *Cubitus* dicitur, estq; pars, quæ à brachio, siue humero, vsq; ad manum extremam, seu summam, se extendit. χειρ^ε, & *Manus* quoq; Latinis dicta, à cubito, siue vlnâ extremâ incipit, & in acie digitorum terminatur. Porro manus interior pars, quæ caua est, dicitur² θέναρ Græcis, *Vola* Latinis, παρὰ τὸ βάλειν, à proiiciendo. Pars huic contraria, quæ prona est² ἀνθέναρ, & *Dorsum manus*. At *Palma* fit ex manu expansa, vt *Pugnis*, ex contracta. In vola notandæ sunt *Lineæ*, & *Monticuli* à Chiromantis sic appellati. Linearum principalis est, quam *Vitæ* appellant, propterea, quod ex eius longitudine aut breuitate, longam aut breuem vitam conicere liceat. Huius meminit Aristoteles, 10. Problem. 48. vbi τομὴν, *cæsura* vocat. Querens enim, cur illi qui per totam manum cæsura habent, longioris vitæ sint; respondet, quia articulis carentia breuioris sunt vitæ, vt pisces. Ergo quæ articulata sunt, longiori vitæ vsurâ fruuntur. At 1. de histor. animal. cap. 15. ἄρθρα, articulos vocat, quorum vnum aut duos per totam volam currentes, longævis assignat: breuioribus verò vitæ hominibus, duos quidem; at non per totam longitudinem protensos. Si tamen numerum linearum quæsieris, non duas, sed tres vt plurimum inuenies; vnam, quæ fit à flexu pollicis, & *linea vitæ* dicitur: alteram, quæ à quatuor digitorum flexu conficitur, & vocatur^c *Cerebri linea*: tertiam, quæ à trium tantum digitorum flexu constituitur, & appellatur^d *Mensalis*, quod cum dicta figuram trapeziam, siue mensalem referat. *Monticuli* sunt eminentiæ quædam in volâ manûs, quorum septem Chiromantæ faciunt, singulos singulis planetis dedicantes. Sic igitur^e *Pollicis* tuberculum, *Veneri* dedicare solent: *indici*, *Ioui*; *medii*, *Saturno*; *annularis*, *Soli*; *minimi*, *Mercurio*: *Triangulum* in vola manus, *Marti*: *Hypothenar* tandem, *Lunæ*.

Cæterum ἀκρόχειρον, siue *Manus extrema* in tres partes subdiuiditur, in καρπὸν, μετὰ-^f *Carpus*. καρπὸν, & δακτύλος.^f *Carpus*, Latini *Brachiale* vocant, quâdoq; *Carpum* Græca voce, est: que ea manus pars, quæ cubiti flexuræ proxima est, siue quæ palmam cubito iungit. μετὰ-^g *Metacarpus*. μετὰ-^g *Metacarpus*, postbrachiale, elegantioribus Latinis *Palma*, ea pars est, quæ inter brachiale, & digitorum principium consistit. δακτύλοι sunt ipsi *Digiti*, qui numero sunt quinque. Ex his duo, qui extremi sunt, nomen à magnitudine acceperunt, cæteri à situ, vel officio. Primus ergo, ^h *Magnus* vocatur, quod omnium sit maximus crassissimusque, cuius cum robur respondeat magnitudini, *Pollex* dicitur, quod cæteris quatuor æquipolleat. Græci eleganter, vt pleraq; omnia, ἀντίχειρ^ε vocarunt, quasi *promanum*, vt qui totius manus munere fungi queat, & sit instar omnium reliquorum digitorum. Non desunt tamen, qui ἀντίχειρ^ε dictum velint, quod cæteris oppositus sit, & ex aduerso situs. Alter

ter extremus, dicitur ⁱMinimus, & Auricularis, opinor, quia ad aures expurgandas eo communiter utimur. Pollici proximus, ὁ δεικνὺς δάκτυλος, ^kDemonstratorius Isidoro, ab vfu, à quo apud Græcos, omnes in vniuersum digiti nomen suum sortiti, vt dicatur δάκτυλοι, ὡς τὸ δεικνὺς, ab indicando. Hoc enim digito ferè præ aliis utimur in demonstrando. Vnde Poëta,

-----pulchrum est digito monstrari, & dicier, Hic est.

Latinis Index dicitur. Alius huius vsus est, sed minus conueniens honesto viro, à quo Introductorio λειχανός dicitur, ὡς τὸ λείχεν, quod lambere significat, quia quidam inciuiliter comedentes sine cochleari, pultem hoc digito lābunt, & nutrices infantib. hoc digito pultem præbent. ^lMedium appellant, qui hunc sequitur, à loco. Græci similiter μέσον. nonnulli, vt Poëta, impudicum vocant, & obscenum. Cynædis enim olim monstrabatur à prædiconibus, quo sæpe allusit Martialis in suis carminibus. Huic adstat quartus, proptereaque Græcis ὡς μέσος dictus, Latinis ^mAnnularis, quia in eo annulos, vt plurimum gestamus. Dicitur etiam ιατρικός, medicus, quod Medici Ægyptii, qui primum Anatomiam docere aggressi sunt, summo hunc honore prosequendum, & annulo dignandum censuerint, vt quem ipsa Natura principali membro iungere voluerit, quod ait Appion apud Gellium, lib. 10. Noct. Atticar. cap. 10. Erat enim inter ipsos fabula, neruum quendam à corde ad hunc immediatè transmitti.

Digitorum porro singulæ partes, quæ inter articulos sunt, ab Aristotele, ⁿΦάλαγγες dicuntur; Gaza reddidit Internodia. Protuberantiæ autem manus in pugnum contractæ, & articuli ipsi, κόνδυλοι, Nodi Gazæ. Pollicem vno condylo flecti, cæteros binis, tradit Philosophus. Reperio tamen κόνδυλος fuisse triplici nomine donatos, & κόνδυλος, & κόνδυλος ac μετακόνδυλος dici. ^oΚόνδυλος vocatur medius nodus digitorum in pugnum contractorum. ^pμετακόνδυλος, ille qui vngui est vicinior. ^qμετὰ κόνδυλος, qui metacarpio. Latini quibus exprimant, non habent peculiare voces, promiscue tamen omnes nodos, internodia, vel articulos vocant.

Tandem extremitates digitorum vnguibus munitæ sunt, quos Græci ὄνυχες vocant. Horum initia ab antiquis ῥιζώνυχες, vnguium radices dicuntur. ab aliis sic vocantur margines, ex quibus erumpunt. Circa has semilunula quædam candicans est, ἀνατολή, exortus appellata, quod circa vnguis exortum, & principium consistat. Reliqua pars ἄρχεμος dicitur, ab albore. Cæterum puncta illa alba, quæ nonnunquam in superficie videre est, νεφέλαι nubecula, à similitudine vocantur. at vnguium in summo extremitates, ἀκροανυχία.

CAPVT VI.

De appellatione Pedis, & partium in eo contentarum.

PEs tandem restat, Græcis ποδός dictus, Aristoteli i. hist. animal. 15. πέλους, Gazæ Crus. ^{Crus.} Latinis recentioribus, qui nomine proprio carent, ad discrimen minoris, Magnuspes. Est autem totum id, quod à clunibus originem ducens, sese vsque ad di-

- Diuisio cruris.* ad digitorum extremos vngues extendit. Diuiditur ab Aristotele citato loco, & à Galeno, lib. de inæqual. intemp. 2. in tres partes, in *μηρὸν femur, κνήμην, tibiam*, & *πόδα, paruum pedem*. Prima pars ^r *FEMUR, μηρὸς, ὁπὸ ἧς μερίζεται*, à diuidendo, quia truncum bifariam diuidere videtur, Hesiodo *μηρίον* dicitur. Celsus *Coxam* appellasse videtur, quæ & alii recentiores Aristotelis Interpretes sequuti sunt. Hoc vel idèò diligentius obseruandum est, ne perperam eos intelligamus, dum vocibus coxæ ac femoris promiscue vtuntur, & nunc os femoris Coxam, nunc è contrario os coxæ, Femur appellant.
- Femen.* Pars interna femoris, *ἡ ὀστέα μέρη* dicitur, ^r *Femen*: at protuberantia exterior circa articulum, ^r *ἰσχίον, Coxendix*: spatiū autem inter duo femora ad nates interiaccens ^r, *πλευράς*. Sic enim Galenus, comm. 4. de fract. interpretatur, scribens, apud Hippocratem *πλευρά* significare, *ἅπαν τὸ μετὰ τῶν βουβώνων ἐκ γαστέρου σκέλεος*, totum id quod inter vtriusque cruris inguina est; & subiungens docet, *τὸ μέσον ἐν τῇ πλευρᾷ*, medium quod est in hoc spatio, *περίναμον, Perinaum* vocari. Pollux in plurali *πλευράς* vocat, Latini *interfemina*.
- Tibia.* Altera pars ^x *TIBIA* est, *κνήμη* dicta, quæ vox ambigua significatione, modò totam illam partem denotat, quæ inter femur, & paruum pedem sita est, ossibus geminis suffulta, & de qua nunc sermo habetur: modò peculiariter illud os, quod ex his maximū est. Eodem pacto & Tibia Latinis promiscuè accipitur, quemadmodum & *πῆχυς*, iam vtrumque oscubiti, iam eorum longissimum significat. Celsus, *Crus*, à currendo vocat. Huius ^y *pars anterior* Aristoteli 1. hist. anim. 15 *ἂν πνήμιον* est, Latinis absq; nomine manfit, vt nonnulli græcam vocem vertentes, *Antetibiale*, vel *Protibiale* vocarint. Gaza tamen ^z *Cream* antiquissimo nomine appellat. *Posterior* ^z *ἡ γαστροκνήμιον* quasi tibiæ venter, Latinis *Sura* dicitur, vnde Plinius, *Sura*, inquit, soli homini data est, quippe carnosâ tibiæ pars. Et hæc illa est, propter quam Momus Iouem repræhendit, quòd tibiā in parte posteriore offendiculis minus obnoxiam, carnosio munimento ornasset. Notare tamen debebat Momus, oculos duos parte priore sitos esse, quibus quæ ante nos sita sunt prospicimus, in posteriore nullos esse. ^a *Exterior, ἡ ὀστέα κνήμιον*, ^b *interior, ἡ γαστροκνήμιον* appellatur. In superiore parte tibiæ flexura est; & articulus quo femori iungitur, & *γόνυ* vocatur, *Genu*, Huius pars anterior, quā extenditur, siue potius os ipsum quo genu inregitur, Hippocrati ^c *ἡ πμυλὶς*, Aristoteli *μύλη Mola*. Celsō *Patella*, *Mola genu*, & *Rotula*. ^c, ^d *At posterior pars, qua flectitur, & curuatur, ἡ ἰγνὺς*, Latinis *Poples*. Hinc Vena poplitea celebris, quæ sub hac parte ad pedem per tibiā excurrit. In *inferiore* tandem parte, qua tibia cum pede coniungitur, duæ sunt eminentiæ laterales, duræ ac osseæ, quarum altera interior vocatur, altera exterior, suntque processus ossium tibiæ, & fibulæ. Aristoteles ^e *σφυρα* vocat, alii *σφυρία*, quos sequuti Latini *Malleolos* dixerunt, quia malleum instrumentum fabrilè referunt, cum ab vtroq; latere capitula in hoc loco protuberent. Medici vulgò *Talos* vocant, vt cum in suppressis mensibus venas tali aperire iubent: sed errant, vt iam olim quoque Galenus monuit, ante cuius tempora hic error exortus ad nostra vsque dimanauit. Nec enim hi processus talum constituunt, sed sub his talus, siue astragalus latet, tactui, & oculis, ob ligamenta & tendines nequaquam se offerens. De his tradunt Physiognomi, inuidos eos esse, quibus multum extant: segnes autem & pigros, quibus subsident, atq; hoc verissimum esse signum ac infallibile produnt.

¶ Tertia pars sequitur, ^f *Paruus pes*, qui à tibiâ incipiens, in extremis digitorum apicibus definit & terminatur. Vocatur Aristoteli *ποδς*, vt Latinis quoque *Pes*. Platoni *ποδς* *pes*. *ἄκρ* & *Pes extimus* dicitur, quemadmodum Hippocrati modò *ἄκρ* & *χαίρ* dicebatur, cui respondet similisq; est in pluribus pes paruus. Diuiditur enim similiter in tres partes, *Διῖσι* in *πιδίον*, *μετὰ πιδίον*, & *δακτύλ* & *μετὰ δακτύλ*, quemadmodum manus in *καρπὸν*, *μετὰ καρπὸν*, & *δακτύλ* & *μετὰ δακτύλ*, quæ partes singulæ singulis respondent.

g *h* *i* *k* *l* *1* *2* *3* *4* *5* *6* *7* *8* *9* *10* *11* *12* *13* *14* *15* *16* *17* *18* *19* *20* *21* *22* *23* *24* *25* *26* *27* *28* *29* *30* *31* *32* *33* *34* *35* *36* *37* *38* *39* *40* *41* *42* *43* *44* *45* *46* *47* *48* *49* *50* *51* *52* *53* *54* *55* *56* *57* *58* *59* *60* *61* *62* *63* *64* *65* *66* *67* *68* *69* *70* *71* *72* *73* *74* *75* *76* *77* *78* *79* *80* *81* *82* *83* *84* *85* *86* *87* *88* *89* *90* *91* *92* *93* *94* *95* *96* *97* *98* *99* *100* *101* *102* *103* *104* *105* *106* *107* *108* *109* *110* *111* *112* *113* *114* *115* *116* *117* *118* *119* *120* *121* *122* *123* *124* *125* *126* *127* *128* *129* *130* *131* *132* *133* *134* *135* *136* *137* *138* *139* *140* *141* *142* *143* *144* *145* *146* *147* *148* *149* *150* *151* *152* *153* *154* *155* *156* *157* *158* *159* *160* *161* *162* *163* *164* *165* *166* *167* *168* *169* *170* *171* *172* *173* *174* *175* *176* *177* *178* *179* *180* *181* *182* *183* *184* *185* *186* *187* *188* *189* *190* *191* *192* *193* *194* *195* *196* *197* *198* *199* *200* *201* *202* *203* *204* *205* *206* *207* *208* *209* *210* *211* *212* *213* *214* *215* *216* *217* *218* *219* *220* *221* *222* *223* *224* *225* *226* *227* *228* *229* *230* *231* *232* *233* *234* *235* *236* *237* *238* *239* *240* *241* *242* *243* *244* *245* *246* *247* *248* *249* *250* *251* *252* *253* *254* *255* *256* *257* *258* *259* *260* *261* *262* *263* *264* *265* *266* *267* *268* *269* *270* *271* *272* *273* *274* *275* *276* *277* *278* *279* *280* *281* *282* *283* *284* *285* *286* *287* *288* *289* *290* *291* *292* *293* *294* *295* *296* *297* *298* *299* *300* *301* *302* *303* *304* *305* *306* *307* *308* *309* *310* *311* *312* *313* *314* *315* *316* *317* *318* *319* *320* *321* *322* *323* *324* *325* *326* *327* *328* *329* *330* *331* *332* *333* *334* *335* *336* *337* *338* *339* *340* *341* *342* *343* *344* *345* *346* *347* *348* *349* *350* *351* *352* *353* *354* *355* *356* *357* *358* *359* *360* *361* *362* *363* *364* *365* *366* *367* *368* *369* *370* *371* *372* *373* *374* *375* *376* *377* *378* *379* *380* *381* *382* *383* *384* *385* *386* *387* *388* *389* *390* *391* *392* *393* *394* *395* *396* *397* *398* *399* *400* *401* *402* *403* *404* *405* *406* *407* *408* *409* *410* *411* *412* *413* *414* *415* *416* *417* *418* *419* *420* *421* *422* *423* *424* *425* *426* *427* *428* *429* *430* *431* *432* *433* *434* *435* *436* *437* *438* *439* *440* *441* *442* *443* *444* *445* *446* *447* *448* *449* *450* *451* *452* *453* *454* *455* *456* *457* *458* *459* *460* *461* *462* *463* *464* *465* *466* *467* *468* *469* *470* *471* *472* *473* *474* *475* *476* *477* *478* *479* *480* *481* *482* *483* *484* *485* *486* *487* *488* *489* *490* *491* *492* *493* *494* *495* *496* *497* *498* *499* *500* *501* *502* *503* *504* *505* *506* *507* *508* *509* *510* *511* *512* *513* *514* *515* *516* *517* *518* *519* *520* *521* *522* *523* *524* *525* *526* *527* *528* *529* *530* *531* *532* *533* *534* *535* *536* *537* *538* *539* *540* *541* *542* *543* *544* *545* *546* *547* *548* *549* *550* *551* *552* *553* *554* *555* *556* *557* *558* *559* *560* *561* *562* *563* *564* *565* *566* *567* *568* *569* *570* *571* *572* *573* *574* *575* *576* *577* *578* *579* *580* *581* *582* *583* *584* *585* *586* *587* *588* *589* *590* *591* *592* *593* *594* *595* *596* *597* *598* *599* *600* *601* *602* *603* *604* *605* *606* *607* *608* *609* *610* *611* *612* *613* *614* *615* *616* *617* *618* *619* *620* *621* *622* *623* *624* *625* *626* *627* *628* *629* *630* *631* *632* *633* *634* *635* *636* *637* *638* *639* *640* *641* *642* *643* *644* *645* *646* *647* *648* *649* *650* *651* *652* *653* *654* *655* *656* *657* *658* *659* *660* *661* *662* *663* *664* *665* *666* *667* *668* *669* *670* *671* *672* *673* *674* *675* *676* *677* *678* *679* *680* *681* *682* *683* *684* *685* *686* *687* *688* *689* *690* *691* *692* *693* *694* *695* *696* *697* *698* *699* *700* *701* *702* *703* *704* *705* *706* *707* *708* *709* *710* *711* *712* *713* *714* *715* *716* *717* *718* *719* *720* *721* *722* *723* *724* *725* *726* *727* *728* *729* *730* *731* *732* *733* *734* *735* *736* *737* *738* *739* *740* *741* *742* *743* *744* *745* *746* *747* *748* *749* *750* *751* *752* *753* *754* *755* *756* *757* *758* *759* *760* *761* *762* *763* *764* *765* *766* *767* *768* *769* *770* *771* *772* *773* *774* *775* *776* *777* *778* *779* *780* *781* *782* *783* *784* *785* *786* *787* *788* *789* *790* *791* *792* *793* *794* *795* *796* *797* *798* *799* *800* *801* *802* *803* *804* *805* *806* *807* *808* *809* *810* *811* *812* *813* *814* *815* *816* *817* *818* *819* *820* *821* *822* *823* *824* *825* *826* *827* *828* *829* *830* *831* *832* *833* *834* *835* *836* *837* *838* *839* *840* *841* *842* *843* *844* *845* *846* *847* *848* *849* *850* *851* *852* *853* *854* *855* *856* *857* *858* *859* *860* *861* *862* *863* *864* *865* *866* *867* *868* *869* *870* *871* *872* *873* *874* *875* *876* *877* *878* *879* *880* *881* *882* *883* *884* *885* *886* *887* *888* *889* *890* *891* *892* *893* *894* *895* *896* *897* *898* *899* *900* *901* *902* *903* *904* *905* *906* *907* *908* *909* *910* *911* *912* *913* *914* *915* *916* *917* *918* *919* *920* *921* *922* *923* *924* *925* *926* *927* *928* *929* *930* *931* *932* *933* *934* *935* *936* *937* *938* *939* *940* *941* *942* *943* *944* *945* *946* *947* *948* *949* *950* *951* *952* *953* *954* *955* *956* *957* *958* *959* *960* *961* *962* *963* *964* *965* *966* *967* *968* *969* *970* *971* *972* *973* *974* *975* *976* *977* *978* *979* *980* *981* *982* *983* *984* *985* *986* *987* *988* *989* *990* *991* *992* *993* *994* *995* *996* *997* *998* *999* *1000*

CAPVT VII.

De humani corporis figura, & magnitudine: tum quo pacto hæc secundum ætatem, sexum, regiones, & morbos differat.

VIDIMVS hætenus ea, quæ ad partium externarum appellationes spectare videbantur, à quibus antequam discedamus, quæ tum totius corporis figura sit, ac magnitudo, tum singularum etiam partium inuicem proportio: & quâ ratione iuxta ætates, sexum, regiones, ac morbos differat, intueamur. Multæ enim sunt, & extra, & intra corpus figurarum species, si Hippocrati, lib. de veteri Medicina, credimus, quæ inter sese quod ad affectiones pertinet, tum ægroto, tum sano, maximopere differunt, quæ omnia (eodem præcipiente) nosse oportet quomodo discrepent, quo causas singulorum cognitas probe obserues.

Quenam autè sit *Figura* totius corporis, quadratane, an circularis, aut neutra, merito dubitari potest. Nam qui hominem *ἑυσακρον*, & ad naturæ leges conformatum *πετέγιωνον* appellant, siue quadratum, illi quadratam iam figuram humano corpori assignare videntur. Qui verò, quod vmbilicum videant medium esse corporis, ac veluti centrum, à quo ad extremitates sursum deorsumq; æquales ducuntur lineæ, circularem figuram tribuunt, sub rotundâ comprehendere videntur. At enim, cum illi truncum tantum corporis intelligant, hi verò malè conclusionem inducant: relinquatur, neutri opinioni subscribendum esse. Nec enim certè simplex figura est, sed ex variis

variis externarum partium figuris composita : neque nomen vllius figuræ est , quod huic commodè tribuas, nisi fortè humanam figuram dicere volueris, quin imo hæc ipsa quoq; determinari neutiquam potest, cum ad arbitrium voluntatemq; cuiuslibet, singulis quasi temporum momentis mirificè varietur, eiusmodi mutationes σχηματισμοι appellauere, & eos qui se in varias hoc pacto figuras commutant, σχηματίζοντες Veteres dixerunt, Rectè ergo concluditur, certam figuram humano corpori tribui nō posse, sed veluti Promethea in omnes esse omnibus momentis variabilem. Cæterum

Figurarū corporis mutationes quādiū scire referat. has figuras, cum in aliis plurimis artibus, tum vero in medicā ad vnguem nosse ita refert, vt planè necessarium sit, non tantum ad perfecte cognoscendos morbos, sed & eorundem euentus prudenter prædicendos, & feliciter curandos. *Ad cognoscendos* quidem morbos, quod luxata ossa fractave non aliter ferè pateant, quàm quia figurari illa membra, ad quæ pertinent, vt decet, non possint. *Ad prædicendum* verò quantum valeat, expressit satis Hippocrates in Prognosticis, vbi figuram hominis sani decumbentis describit, & ex ægrorum decubitu quid sperandum metuendumve sit docet. *In curatione* autem luxationum, & fracturarum, qui medias figuras ignorauerit partium omnium, omnium doctissimorum consensu frustra laborat. Atq; hæc de figurā.

Magnitudo humani corporis. *Magnitudinem* quod spectat, ea triplex est, pro triplici genere dimensionum, longitudine nempe, latitudine, & profunditate. Hæc autem, vel in debite proportionati mediocritate consistunt, vel ab ipsa declinant in excessum aut defectum, qui rursus vel maior, vel minor esse potest. Sed vt animo perfecte comprehendantur, ante omnia explicare oportet, quæ magnitudo homini esse soleat, si omnibus numeris Naturæ legibus sit satisfactum, vt corpus habeamus, ad quod veluti ad Polycleti quandam statuam cætera omnia expendantur. Sic enim nullo negotio intellexerimus, qui longus aut brevis, qui crassus aut gracilis, qui latus aut angustus sit vocandus. Tale autem hîc in *Europa nostra* æstimabitur, quod in *longitudine* quidem sex pedes Geometricos conficit, in *latitudine* autem & *crassitie*, vnum tantum cum tertia parte : ab hac proportionem qui iam declinant, Improportionati dicentur. Quamquam non ita strictis terminis hic ipse excessus defectusve debeat definiri, quin illi, qui parum duntaxat ab illâ exactâ regulâ discedant, adhuc proportionatorum in album referantur. *Longus* ergo hac ratione erit, qui septē, aut paulò minus, pedes constituat in longitudine : cæterum latitudine & crassitie conformis optimè proportionato corpori fuerit. *Paruus* contra, qui à sex pedibus deficiat in longitudine, in cæteris dimensionibus corpori proportionato respondeat. *Crassi* similiter sunt, quibus cum longitudo debita sit, vt sex quidem pedes comprehendat; tamen diameter latitudinis plus, quàm vnum conficiat: aut ambitus etiam, seu circumferentia thoracis, vel infimi ventris, plures quàm tres pedes contineat, cum in proportionato corpore tres exacte æquet, adeoq; æqualis sit dimidiæ longitudini totius corporis. E diuerso si hos nondum attingant, *Graciles* dicentur, cuiusmodi Hippocrates in Epidemicis φθινώδεις appellat, & tabi admodum obnoxios statuit. Cæterum magnitudo hæc, etsi à nobis sic definita sit, quod vt plurimum talis esse soleat: vsque adeò tamen inæqualis est, vt penes ætatem, sexum, regiones, & morbos, maximè differat.

Differē- Iuxta ætatem sanè, cum alia sit magnitudo infanti, alia puero, alia adolefcenti, alia iuueni,

iuueni, atque homini iam consistentis ætatis, alia denique senescenti, & decrepito. *Infans* enim paruus est, & breuis, maior puer, adhuc maior *adolescens*: *iuuenis* verò, aut *qui consistentem iam ætatem attigit*, non modò longior, sed & corpulentior est, quibus non secus atque arborum quamplurimis accidit, quæ dum tenellæ adhuc sunt, in altum assurgunt graciles, mox ubi lógitudinem debitam nactæ fuerint, in truncum abeunt crassio rem. De *decrepitis* restat dubitatio, verumnè sit, quod à quibusdam statutum esse video, eorum corpora decrescere, cum ad senilem ætatem prouehantur eosque breuiore s seipsis fieri. At ego breuiore s fieri pernego, graciliores fieri lubens largior. Ossâ erim, secundum quæ longitudo corporis exporrigitur, cum partes sint duræ ac solidæ, nec ætatis diuturnitate, nec morbi vllius sæuitiâ vnquam immi nuuntur. At caro, vt ab aliis pluribus causis, sic ab ætate facillè depascitur consumitur que. Quòd si breuiore s esse videantur seipsis iuuenibus, seniore s facti, id ideo acci dere credendum est, quòd articuli omnes, tum à musculis à calor is inopiâ tensis, tum à ligamentis siccatis & occallescentibus incuruantur. Atq; hæc causa est, quam propter diuinus olim Hippocrates, 2. aphor. 52. Iuuentutem in corporis longitudo ne degere, liberale & non indecorum pronunciarit: at senectutem, inutile, & deterius. Cum enim proceri antea essent, in se curuantur, faciliusq; sic flexura turpis aduertitur, diffi ciliusq; toleratur.

Sed & varietas magnitudinis secundum *sexum* aduertitur. In humano enim gene re, fæmina ferè masculo minor est, cum in cæteris animalibus sit maior. Hoc in o mnibus insectis videre est, vt in pulice, musca: sed & in sanguineis plerisque, vt in vi pera & serpentibus. Causa est, quòd fæminæ in brutis, vel fætus, vel oua, in ventre ge stare debeant vno tempore complura, vnde corpus maiusculum requirebatur: fæmi na autem in humano genere cum singulos gerat fætus, nec perpetuò ventrem ple num habeat, minorem quàm mas staturam nacta est. Quin & cum mulier ad parien dos, & educandos tantum liberos nata sit, ad quæ officia magnitudo corporis nulla requirebatur, Vir expressam DE I conditoris imaginem referens, ad orbis imperium, cæterorumq; animalium dominium conditus est, quare magnitudine tum animi, tum corporis meritò præcellere debuit. Illud etiam pratereundum non est, inter fæmi nas Virgines graciliores ferè esse, quia post congressum crassiores euadunt, venis vni uersi corporis in complexu venereo à calore exagitato dilatatis, id quod spatio vel v nius diei post coitum statim aduertere licet.

Quanta verò magnitudinis varietas sit penes *Regiones*, perquam bene nos docuit Hippocrates, in libr. de aëre, aquis, & locis. Summatim enim colligens, quæ mul tis dixerat longè, subiicit, pulchriora, & maiora omnia in Asiâ, quàm Europâ na scuntur, idque ob temporum anni temperiem fieri credendum est. *Asia* enim in me dio Solis exortu ad auroram sita, à frigiditate, & caliditate omni excedente remotior est. *Europæi* formâ, & magnitudine corporis perquam inter se differunt, idq; propter temporum maximas, & frequentissimas mutationes. Sic *Dani*, *Batavi*, & *Germani*, vtplu rimû magni sunt, ac pulchri: *Angli* itè & *Scoti*, *Galli* & *Hispani* cõtra, magna ex parte bre ues; at *Itali* & *Græci* mediocris staturæ. *Veneti* etiam proceri, & eleganti staturæ di gnitate eminent, id quod *Patritii* Nobilesque docent, qui aborigines sunt, reliquum

tia ma gnitudi nis cor poris se cūdem

1. *Ætate. Quæstio.*

2. *Sexus.*

3. *Regiones.*

Pygmai. vulgus, quod ex omnibus orbis partibus confluit, promiscuum est. Hoc loco de *Pygmais* dicendum erat, qui *πύγματος* dicti, à statura, qua vnam non excedunt. Verum ego Poëtarum fabulas esse crediderim, pro quibus tamen Aristoteles minimè haberi vult, sed veram esse historiam 8. hist. animal. 12. asseuerat. Ego quo minus hoc statuam, tum auctoritate primùm doctissimi Strabonis 1. Geograph. coactus sum, tum potissimum nunc moueor, quòd nostro tempore, quo nulla mundi pars est, quam nautarum industria non perlustrarit, nihil tamen vnquam simile aut visum est, aut auditum. Accedit quòd Franciscus Aluares Lusitanus, qui ea ipsa loca peragrauit, circa quæ Aristoteles *Pygmæos* esse scribit, nempe per quæ Nilus in Ægyptum fluit, nullibi tamen tam paruam gentem à se conspectam tradidit, sed populum esse mediocris staturæ, & Æthiopes tradit.

4. Tandem & *Morbi* corporis magnitudinem variant, cum visi sint, quos febris quartana in gigantæam molem crexit: nec credo quisquam est, qui ignoret historiam Antonii Antverpiensis, qui nostra adhuc ætate vixit, & cum pusillus admodumque debilis in lucem prodiiisset, illico puer ex morbo in maximum gigantem euasit. Huiusmodi tales à Græcis *ἐκτεταπλοι* vocantur, in quibus later vitium, quod prodigiosum augmentum, cum immatura morte accersit. Fuit enim Salamine Euthemini filius, qui in tres cubitos intra triennium adoleuit. Sed homo incessu tardus, sensu hebes; puber postea factus, subita membrorum contractione absumptus est, vt narrat Plinius. Eodem modo, nec adhuc pubertatem attingens Cornelii Taciti, nobilis historici, Equitisque Romani filius, diem suum misere obiit. E diuerso & *Nanos* fieri nonnunquam ex morbis compertum est, quoties superiores partes ad iustum augmentum perueniunt: brachia verò, & crura, tenera & parua manent, quemadmodum in luxationibus non restitutis solet accidere.

An nostra ætatis homines præcis minoribus sint. Ab his antequam discedamus, operæpretium est inquirere, verumne sit, quod à nonnullis creditur, Veterum corpora nostris multò maiora fuisse, sensumq; homines decrescere. Habemus enim Homeri locum, aliorumq; Vatum, qui de breuiori hac statura conqueruntur, ad quem allusit Iuuenalis Poëta, Satyrâ 15 cum inquit,

Nam genus hoc viuo iam decrescebat Homero,

Terra malos homines nunc educat, atq; pusillos.

Et profectò, si qua fides historiis est, corpus *Orestis*, quod oraculi iussu ex terra effossum, septem cubitorum fuisse creditur, qui apud Romanos pedes conficiunt, teste A. Gelio duodecim, cum quadrante. Quin imò in *Creta* quoque, Plinio scribente, terræ motu rupto monte inuentum est corpus quadraginta septem cubitorum, id quod alii *Otionis*, alii *Oeti* fuisse existimarunt. In hac re, vt antea statui, sic puto nunc credendum esse, determinatam humano generi magnitudinem exacte non esse, sed ipsam pro ætate, morbo, sexu, & imprimis regione plurimum differre. Quamobrem crediderim Græcos olim maiores fuisse, sed colonis in Græciam ductis, cum aliis commixtos esse, & sic minores sibi ipsis postea visos fuisse. Nam ego memini, in Batauia longiores multò fuisse homines, ac procerioris staturæ, quam nunc sunt, quod ob continua hæc bella, quæ Bataui gerunt, plurimæ quasi colonix ductæ, maximeq; gens illa cum exteris commixta fuerit. Cæterum, quæ de *Orestis* corpore referuntur, & præfer-
tim

*Observa-
tio,*

tim de illo in Cretâ reperto, aut fabulosa illa sunt, aut si quid veritatis in se continent, monstrosa giganteaque, nec non rara admodum fuere. Quod si quis Plinium etiam obiiciat, qui experienciâ edoctus, filios parentibus breuiores semper esse inuenit, illi contra nostram opponimus, quæ nos docuit, contrarium sæpè verum esse, adeoque atauorum auorumque longitudinem in nepotes migrare; filios etiam sæpè parentibus proceriores esse.

Obiectio.

CAPVT VIII.

De Figura, & Magnitudine Capitis, partiumq; in eo contentarum.

SED accedamus nunc ad singularum partium figuram, & magnitudinem: deinde quam inuicem proportionem habeant intueamur. Capiemus autem merito à Capite initium, quod in summo loco positum, & nobilissimum est, & maximè oculis nostris obuium.

CAPVT ergò cùm naturalem figuram obtinet, Galeno teste, Sphæram refert, sed oblongam, depresso vtrinque modicè iuxta tempora lateribus. Cùm autem magnitudinem legitimam obseruat, sextam totius corporis partem longitudine suâ, quæ ab extremo mento, ad summum vsq; verticem est, conficit. Vt verò & partes ipsius inter se consentiant, quatuor æquales lineas requirit. Prima est, quam faciei lineam vocabimus, & ab imo mento ad supremam frontem pertingit. Altera est, quam occipitis dicemus, & à vertice, vsque ad colli primam vertebra m ducitur. Tertia est frontis, ab vno temporum ad alterum excurrens. Quarta denique, ab imâ aure, (quo loco processus sunt mamillares,) ad syncipitis elatiorem partem perducta. Hæ quatuor lineæ si æquales inuicem sint, Caput proportionatum vocetur; sin ad inæqualitatem quandam declinauerint, tantùm à iusta & naturali constitutione ab esse, quantum ad hanc accesserint propius, dicantur. Si enim ex his lineis, ea quæ faciei est, longior fuerit, Caput Longum dicitur: sin breuior, breuius. Si frontis linea longior cæteris, caput Latum erit: si occipitii, caput Acuminatum. Si omnes æquales, Rotundum, & Naturale; si omnes inæquales erunt, aut quædam, & plures, orietur illa capitis forma, quam Φοξύον vocant Hippocrates, & Galenus. Sunt igitur capita quædam longa, quædam lata, alia acuminata, alia rotunda, alia Φοξύα. Talia autem fiunt, vel ratione regionum, vel victus, aut aliorum accidentium. Et ratione quidem regionum, olim longa capita habebant Macrocephali propterea dicti, qui teste Hippocrate, lib. de aëre, aquis, & locis, fasciis infantum capita nimium stringebant. Lata hodiè, vt audio, habent Moscovitæ, quod infantibus arte faciem explanent, ad omnia flecti in tenerâ ætate aptissimam. Rotundam habent Antverpienses: magnâ ex parte Bruxellenses etiam puellæ, nisi quod acuminatius his sit mentum. Alta capita, & acuminata habent Genuenses ferè, & Belgæ, à fasciis similiter, quibus infantes nimium stringunt. Germani ferè breue caput obtinent, quod dorso semper in cunis incumbant. Ratione Victus, olim meminit Hippocrates quoq; capitum oblongorum, quæ dicit talia fieri τὸ πρὸ τῶν ἀγειτέων, à ratione victus, qua utebantur admodum tenui, vnde temporalibus musculis exsiccat, caua fiebant tempora, sicq; longiora videbantur, proportionata capitis latitudine decedente.

Figura, & magnitudo capitis.

Caput longum. Breue. Latum. Acuminatum. Rotundum.

Capitis proportio variat, penes 1. Regionē.

2. Vicium.

Collifi-
gura.
Longitu-
do.

Latitu-
do.

Periphe-
ria.

Collum
tenue &
crassum.

COLLVM, si quis naturalem eius *figuram* desideret, teres est: sed *magnitudinem* non vbique obseruat æqualem. Nam quod ad *Longitudinem*, anterior eius pars, quæ à mento ad iugulum pertingit, quatuor Geometricas vncias continet: posterior, à fine occipitii, ad primam vsque thoracis vertebram, tres: at *laterales partes*, ab aure infimâ, ad summum vsque humerum, ferè septem vncias conficiunt. *Latitudo* colli, siue *Diameter*, quatuor vnciarum est: at *Peripheria*, siue circumferentia, pedis vnus. Ex his facile intelligitur, quod collum *tenue aut crassum* dicatur apud Hippocratem, in quo elegans locus est 6. epid. sect. i. vbi de iis, qui $\phi\sigma\zeta\delta\iota$ sunt, siue caput habent acutum, differens: siquidem, inquit, validam obtineant ceruicem, robusti erunt, cum aliàs, tum præcipuè in ossibus. Prudentissimè verò diuinus Vir, vt cætera, id addidit, cum quales sunt colli vertebræ, tales & thoracis, & lumborum, & ossis sacri, meritò esse consueuerint. Quibus igitur colli vertebræ crassæ, iis quoque & lumborum, & thoracis crassæ esse debent, reliquaue ossa omnia, nisi natura monstrosi aliquid parere cupierit. Rursum cum cæteræ partes omnes ossium magnitudini respondeant, ita vt musculi magni sint, quo magnis ossibus mouendo esse possint: & venæ magnæ, atque arteriæ, & nerui denique vt magnis musculis alimentum sufficiens, calorem debitum, & animale spiritum abundantem transportent: profecto recte concluditur, eos qui validam ceruicem obtinent, robustos esse, quia musculos magnos validosque acceperunt. Meminit autem Hippocrates potius colli, quàm alterius partis, ex qua robur colligatur, quòd collum ex iis sit, quæ maximè visui se offerunt; signa autem semper manifestissima esse debeant. Hinc patet clara expositio alterius loci, qui apud eundem Hippocratem habetur, sexta epidem. sect. sexto, vbi Ossium, inquit, naturam ex capite colligere oportet, deinde neruorum, & venarum, & carniū, & aliorum humorum, & supernorum, & infernorum. Oportet enim hanc sententiam de proportionatis intelligere, & in quibus omnia sibi respondent. Magnum enim caput, magnam ceruicem requirit, vt tuto sustentetur. Ceruix magna, magnum thoracem, & hic reliquas partes maiores desiderat: ita vt capitis magnitudinem, aut paruitatem, cæteræ partes omnes sequantur, siquidem natura proportionis leges obseruet.

C A P V T IX.

De Figura, & Magnitudine Thoracis, ac Mamillarum.

Thora-
cis figu-
ra.
Magni-
tudo.

THORAX, siue Medius venter, *figuram* oualem obtinet. Parte enim superiore, qua ceruicem tangit, angustior est: inferiore, qua infimum ventrem, latior: antè verò in pectore, & posterius circa dorsum, depressior. *Magnitudinis* autem ipsius hæc est ratio, si naturalis sit. *Pectus*, quod à iugulo incipit, & in mucronata cartilagine terminatur, octo vncias Geometricas conficit. *Dorsum*, à pri-

à prima thoracis vertebra, ad duodecimæ finem, siue ad primæ lumborum initium pertinens, pedem Geometricum, vnciamque vnam obtinet: ita vt pectus dorso quinque vnciis sit breuius. *Latera*, à clauiculis ad extremum thoracis excurrunt, vbi mendosæ costæ finiunt, vnciasque nouem cum dimidia habent. *Peripheria* autem thoracis, duorum pedum Geometricorum est, duarumque vnciarum. *Si spiritum reddas, vna vncia angustatur: si accipias, duabus dilatur.* Hæc proportio naturalis est: mutari tamen sæpè solet, tum à natura ipsa, tum à causis internis; quandoque etiam ab arte, & extrinsecus incidentibus. A natura quidem, cum mala conformatio sit in vtero; à causis internis, cum à destillatione sit gibbositas: ab arte denique, cum infantibus pectus nimium fasciis constringitur. Sunt enim cum alia recens natorum ossa, tum imprimis costæ thoracis, admodum teneræ & flexibiles, vt ipsis quamcunq; velis figuram facillimè largiaris. Quanto autem sanitatis ac vitæ dispendio pleræq; matres infantum suorum pectora angustent, imprimis Anglia edocebit, regio, quæ peruersam hanc fasciandi rationem vt plurimum sequitur, quo fit vt maxima hominum pars, tabe & destillationibus ibi conficiatur. Ineptum etiam est, & vltra fidem perniciosum illud studium, quod ferè Virgines adhibent, vt iunceæ videantur, loris, & mortifero artificio pectus in angustias cogentes, ignaræ, se angustando thoracem, ianuam tabi, marcorique aperire. Quibus enim strictior est thorax, ii sanguinis sputo, & destillationibus, partiumq; in thorace contentarum inflammationibus necessario redduntur opportuni, cum pulmones talibus maximè incalescant. Nam cum reliquum corpus proportionem suam, debitamq; magnitudinem retineat; thorax autem angustior fiat, plus sanguinis circa pectus colligitur, quàm aut idem digerere, aut à sese possit propellere, vnde in cauitatibus illis stabulans (præsertim verò Venæ arteriosæ, & Arteriæ venosæ) in multorum morborum causam degenerat. Accedit, thoracem ipsum compressum multo imbecillior fieri, vnde sanguis calidior eo affluens, vel ibi hærens, acrior redditus, facillimè vasa erodit, neque se defendere natura iam amplius potest. Hinc non immerito tales falsè ridentur à Terentio in Eunuchis, dum sic inquit:

Haud similis virgo est virginum nostrarum: quas matres student

Demissis humeris esse, vincto pectore, vt graciles fient.

Si qua est habitior paulò, pugilem esse aiunt; deducunt cibum,

Tametsi bona est natura, reddunt curuatura iunceas.

Mihi ergo earum gentium consuetudo cum primis arridet, (quæ & Venetiis obseruari cernimus) quæ latum potius, quàm angustum pectus; crassum, quàm tenue exoptat, & propterea infantum thoracem, leui fasciâ inuoluit magis, quam stringit.

In pectore sitæ sunt *Mammae*, quæ ratione sexus, & ætatis, maximè differunt, item ratione morborum, aliorumque accidentium corporis. In *Viris* enim non attolluntur, quod glandulas vix habeant: in *Mulieribus* globi instar decenter prominent. *Virginibus* etiam, antequam ad pubertatem accedant, vix præter papillas aliquid comparet; at vero cum aptæ conceptui fiunt, sensim excrescunt. *Vetulis* & *extenuatis*, oblongæ fiunt, turpiterque dependent, absumptis cum pinguedine glandulis, sola que cute restante: *pinguib;* contra turgent, & quandoque in insignem molem ascendunt.

Mulier-

*A quibus
causis
mutetur
proportio
Thoracis.*

*Quam
pernicio-
sum sit
nimis
stringere
infantū
Thoracē.*

*Mamma
rum ma-
gnitudo.*

Mulieribus etiam ventre gerentibus, incrementa sumente fœtu, & cum hoc vtero, sensim augentur, vt partus tempore instante satistumidæ videantur. Quamobrem qui mammarum decentem magnitudinem scire voluerit, Virgines aspiciat adultæ ætatis, & quæ corpus habeant staturæ decentis. his enim attolli in eam solent magnitudinem, vt manu suâ commodè vndiq; tegantur. Ab hac quæ discedunt, maiores, vel minores dicentur, prout ad excessum, vel defectum declinant. Atque hæc Medico prudenti diligenter consideranda sunt, vel ided, vt iudicium accuratum de nutrice bonâ ferat, cum monente Moschione, mediocres mammæ in bona nutrice semper eligendæ sint. Grandes enim, lac copiosum non generant, eodem auctore: parvæ autem frigiditatem denotant, & steriles fæminas, vt vitari debeant tales ab iis, qui coniugium liberorum procreandorum gratia suscipiunt.

Quæ nutritrix eligenda.

Papillarum magnitudo.

Papilla, ipsum quasi centrum mammarum constituunt, admodumque & ipsæ variant. Virginibus enim leuiter prominent, & fragæ instar rubent: lactantibus, ob suctionem infantis exseruntur, & liuent: effatis, oblongæ fiunt, nigricantque. Has iubet inspicere Hippocrates, 6. epidem. sect. 5. si de vteri affectibus iudicare velimus. Si enim papillæ, & quod in iis rubet, palle scat, morbosum est, inquit, ἀγγειον, siue conpectaculum, & vterus.

C A P V T X.

De proportionē Infimi ventris, & Pudendorum utriusq; sexus.

Vmbilicus centrum imi ventris. Magnitudo imi ventris.

INFINIVS VENTER, qui naturalem debitamque seruat proportionem, Vmbilicum habet in ipso medio veluti centrum, æqualiter ab omnibus extremis distantem. Eadem enim longitudo est, & quidem sex vnciarum, ab ipso ad vsque mucronatam cartilaginem sursum; ad pubis ossa deorsum; ad lumborum, atque ossium ilium extrema, versus latera. Peripheria autem, seu totus ambitus, duos Geometricos pedes cum duabus vnciis, adeoque vncias viginti sex efficit: at diameter, quæ ab vmbilico ad dorsum ducitur, præter præter nouem, vel decem. Cæterum hæc proportio magnitudinis diuersimodè variatur à causis, tum naturaliter, tum præter naturam incidentibus. Secundum naturam quidem, vt à cibo, & potu, à fœtu in vtero contento, à nimia pinguedine. A causis præter naturam institutum accidentibus, vt flatibus, in tympanitide; aquâ, in ascite: tumore, in lienis affectibus. Contra quandoque venter attenuatur in inediam, in alui fluxibus diuturnis, aut vehementibus, in quibus ita decrescit sæpe numero, vt tumorem illum circa vmbilicum, de quo diximus, Venter deperdat, & ad dorsum veluti retractus videatur, id quod sæpissimè consuevit fieri à superpurgationibus, longis item diarrhæis, & dytenteriâ. Atque in talibus caute omnino agendum est cum purgantibus, quandoquidem facillime lædantur, & exsolvantur. Liberius validissima quæque offeruntur, si vel morbus, aut natura ægri requirat, iis, qui ventrem mediocriter protuberantem habent. Et huc respexisse puto admirabilem Hippocratem, cum lib. de veteri Medic. circa finem, Medico prudenti cognoscendas, & considerandas esse inquit, νηλίας μακράς, καὶ στεργύλλας, ventres longos, & teretes. Ex figurarum enim inspectione cognoscimus prompte, qui apti sint ad helleborum, & alia

A quibus causis proportio variatur. Nota.

alia generosiora purgantia assumenda. Quibus enim partes in abdomine contentæ fortes sunt, beneq; constitutæ, tuto purgari possunt; quibus contra tenues, periculose medicamenta accipiunt. Et hoc illud quoque est, quod aphorismo trigésimo quinto secundæ sectionis legimus, melius esse in omni morbo, partes circa umbilicum & pectinem crassitudinem habere: at vehementem tenuitatem & eliquationem prauam esse. Periculosam enim vel ad infirmas purgationes existeret. *Mulieres* quæ amplo valdè sunt ventre, admodumque protuberante, ut venter ad coxas dilabatur, ineptæ sunt ad conceptionem. His enim vteri os à pinguedine omenti, ex 5. aphor. 46. comprimitur, & steriles fiunt, nec priusquam attenuentur, concipiunt. *Paruus venter* ab Aristotele in physiogn. inter primaria loca, ex quibus sapientiæ decor in homine apparet, refertur. Apud alios *venter canis*, & *exsuctus*, inuidum denotat, & sordidum: *rotundus*, siue potius teres, sobrium: *longus*, segnem & voracem: *prominens*, somniculosum, pigrum, & stupidum: quibus autem *umbilicus* admodum *protuberat*, inter salacissimos referuntur.

PUDENDORVM quoq; in utroq; sexu proportio tenenda est, ut de sterilitate, vel fecunditate iudicium sit clarum. Atque ut à *Virili* initium ducam, ubi id erectum est, in homine ætatis adultæ, sex uncias obtinet in *longitudine*, quatuor in *ambitu*, seu peripheriâ. *Maior mentula*, vuluam potius replet magnitudine, quàm vterum facundo semine. Est etiam ineptior ad Venerem, quam neq; animose aggreditur, nec diu sustinet, victis pondere musculis, qui rigidam hastam tenent. *Parua* contra, & salacior est, & fecundior, quia titillando ceruicem vteri, magis prolestat fæminarum semen, & diutissimè pugnam perfert. Est & aliud incommodum, quod longa mentula secū trahit, cum fæminas vterinæ suffocationi obnoxias reddat, quod ligamenta vteri, ceruicem nimium in coitu elongando, admodum laxet.

PVDENDI MULIEBRIS proportionem, plerumque ab ore licet desumere. Quibus enim os, & oculi magni sunt, iis quoque amplum est pudendum: obseruatumque est à me multiplici experientia; omnibus crassis, & pinguibus, mammaeque, & ventrem amplum habentibus, amplas quoque esse vuluas. Contra, quibus mammae depressæ, aut paruæ, os quoque paruum, mentumque acutum, & labia parua sunt, strictam esse, & angustiore vuluam. Quibus stricta ergò sunt genitalia, viros quidem delectant magis; at pariunt facilius quibus sunt ampla. Cæterum narrat Consaluus Ouedus in historia Indica, Vrabenles fæminas vuluam habere angustissimam, ut ægerime viros admittant, quod ipsis tamen, puto, arte potius, quam naturæ beneficio contingit, cum sciam duabus maximè rebus incumbere, paruis puta mammis, nec pendentibus, & angusto pudendo. Nec mirum id cuiquam videatur, cum in hisce quoque regionibus familiare id admodum sit scortis nostris, ut arte pessariisque adstringentibus, ceruicem vterinam sibi reddant angustiore. Has matronæ nonnunquam etiam honestæ imitantur, cum mariti ex lupanari redeuntes, de coniugum laxis genitalibus conqueruntur, quas strictas alibi inuenerint, ignaræ in quæ pericula se coniciant, cum menstruo sanguini primum viam, deinde fatui ianuam claudant, & se ipsas demum in mortem præcipitent, quod sæpe cum mortuo, ob angustiam exitus, fatu, simul ipsæ miserè animam expirare cogantur. Et hæc pericula maximè euenisse iis vidimus, quæ cum alias strictam haberent vuluam, in gratiam mariti angustiore

Pudendo
rum viri-
lium pro-
portio.
Magna
mentula.
Parua
mentula.

Obser-
uatio.

Puden-
dorum
mulie-
brum
propor-
tio.
Obser-
uatio.

In Italia.

stio rem arte reddiderunt : sed miseræ, inepti & temerarii consilii infelices pœnas capite tandem luerunt , & voluptatem mariti improbam, tristi amaritudine condierunt.

C A P V T X I.

De mutua Artuum inter se proportionē.

Proportionis artuum.

RESTANT ARTVS, siue Manus, & Pedes, quæ hanc inter se *proportionem* habent, vt quibus longi sunt pedes, iis quoq; brachia, siue manus sint longiores. Dextræ tamen partis artus, siue manus sunt, siue pedes, sinistris semper robustiores sunt , & crassiores, quod solet contingere ob exercitia, & motum corporis , quæ magis dextra, quàm sinistra parte perficiuntur. Hinc contra fit, vt iis sinistra partes crassiores sint, qui læua vtuntur, & ambidextri sunt. *Præter naturam* tamen hæ partes quoque crassiores fieri possunt, vt in tumoribus: vel tenuiores , si impediatur alimenti sufficiens affluxus, vt in luxatis non restitutis sæpe contingit , maximè si ipsis adhuc pueris aut adolescentibus hoc malum eueniat. Pedes ergo & brachia in corpore proportionato æqualia sunt: hoc est, tanta est longitudo ab osse pubis, ad calcanei vsque extremum, quanta ab alâ, vsque ad medii digiti extremum apicem. At quanta pedum longitudo est, tanta quoque trunci esse solet, siue superiorum partium, vt Aristoteles loquitur, hoc est, distantia inter ossa pubis, & capitis supremum verticem. Quamobrem *crus proportionati corporis* , tres continebit pedes, cum totum corpus sex conficiat, vt superius dictum est. Si consueta mensura efferre libeat, triginta sex vncias Geometricas dicemus. Ab hac mensura qui deficient, aut excedent , breuiores, aut longiores crura habebunt. *Notandum* autem corollarii loco hic est, obseruatum à me multiplici esse experientia, eos qui longos habent pedes, vt plurimum alio esse fluentiores.

Observatio.

Obseruandumque propterea id diligentius est, vt cautiores simus in præscribendis purgantibus, nec validiora talibus offeramus, quos facile in pericula conicere possumus.

FINIS LIBRI PRIMI.

ADRIA-



ADRIANI SPIGELII

BRUXELLENSIS,

DE HUMANI CORPORIS FABRICA,

Liber Secundus.

Qui ossium historiam proponit.

CAPVT PRIMVM.

Ossis naturam, vsus, & differentias explicat.



ACTENVS externas humani corporis partes persequuti sumus, earumq; appellationes, figuram, ac magnitudinem exposuimus, vt confusa primum ac communi quadam omniũ partium habita cognitione, distinctiorem postea, ac definitã animo facilius comprehendamus. Cum ergo iam de iis partibus nobis agendum sit, quæ citra dissectionem in conspectum non veniunt, vt methodo progrediamur, initium ab ossibus sumendum duximus. Quemadmodum enim totius corporis, omniumque partium basis ipsa sunt, ita quoque solidæ in anatomicis eruditionis primum ac maximè præcipuum fundamentum merito ab omnibus sapientibus habentur. Quodd si pro aliis scientiis facilius capessendis, locorum atq; imaginum beneficio, subsidium fluxæ memoriæ quarimus; mihi certe in hoc dissectionum studio maximè nitendum videtur, vt in tanta partium varietate, aliquod auxilium eidem inueniamus. Nec vero melius meo inuenietur iudicio Ossibus, quæ pro locis artificiosis quàm aptissimè nobis seruire queunt, cum plærâsque dissecandas partes, aut annexas sibi habeant, aut certe intra sese coerceant, vt nihil promptius sit addiscere, vnde incipiant, quo tendant, vbi desinant, qua figura, ac magnitudine singulæ partes sint præditæ, quàm illi, qui perfectam ossium cognitionem fideliter animo suo comple-

Ordinis ratio.

Ossium cognitio maxime utilis, & necessaria est.

xus fuerit. Nam quod in tentoriis præstant pali, in ædibus parietes, id nimirum in animalibus ossium substantia est. Ad horum enim imitationem, Galeno docente, 1. de Anat. admin. 2. cætera quæque in animante effingi mutarique solent, vt scilicet caluaria quidem rotunda sit, cerebrum quoque necessario tale fiat; & si oblonga, talem quoque figuram huic ipsi animali cerebrum induat. Iam verò si maxillæ paruæ, faciesque tota existat rotundior, necessariò quoque ipsorum musculi protinus parui erunt: aut si longæ, longa statim eiusmodi animali tota erit facies, eiusque musculi tales comparebunt. Quamobrem profecto non solum ad apprehendendam cæterarum partium naturam, sed etiam ad retinendam felicius, absolutam ossium doctrinam cæteris omnibus præmittere, necessarium videtur. Antequam tamen ad singulorum historiam accingamur, nonnulla in genere de ossibus considerabimus, imprimis quid

Os.

ipsum Os sit, quos vsus præstet, & quas habeat differentias. Os ergò, Græcis ὀστέον, & contracte ὀστῆν dicitur, vnde & Latini suam fortasse mutuarunt vocem. Dicitur autem ὀστέον, quasi στέρεον, ab adiuncto proprio, quod firmissima sunt ac durissima in nostro corpore substantia: vel ὀστέον τὸ ἰσχυρόν, ab officio opinor, quia (vt eleganter Hippocrates noster) τῷ σώματι στέον, καὶ ὀρθότητι, καὶ εἶδος παρέχοντι, toti corpori stabilitatem, rectitudinem, & formam exhibent. Est autem ^a Os, si definitionem eius quæras, pars

Ossis definitio.

nostri corporis simplex, omnium durissima ac siccissima, ad stabilimentum cæterarum partium creata.

Partes corporis duplices.

Dico os esse partem simplicem, intelligendo in compositam, & similem, siue, vt Aristoteles 1. histor. anim. 1. loquitur, ἁπλύνθετον, καὶ ὁμοιομερῆ. Corpus enim nostrum ex partibus constat duplicibus, quarum aliæ sunt similes ac simplices, aliæ dissimiles & compositæ. Simples vocamus, os, neruum, venam, arteriam, cartilaginem, membranam, & denique cutim, non quidem quod reuera tales sint (constant enim ex materia & forma, tum ex quatuor elementis, imò vero ex fibris & propria substantia inuicem intertextis) sed quia simplices ad sensum apparent, neque in alias ita facile diuidi possunt, quemadmodum quæ dissimiles vocantur. Quamcunque enim in simplicibus partem diuellas, eandem semper inuenies cum reliquis, vt quæcunque frustula ossis, & sint, & dici ossa possint, omnes item nerui cuiusvis particulæ, nerui merito cognominentur. Hæc causa est, cur ab Anatomicis similes partes appellatæ fuerint, quamquam mea opinione, rectius fortassis consimiles dicerentur, si Græcæ vocis ὁμοιομερῆς proprietatem tueri velis, quæ partem sibi similem significat. Nam si accuratius rem omnem iustremus, simile profecto à simili plurimum differt, tantum puta, quantum denominatiuum quodcunque à re vnde denominationem hausit. Sic differt angulus ab angulari, annulus ab annulari. Dicitur etiam Os simplex à nobis, ne erremus ob æquiocationem vocis ossis, intelligentes simul ea, quæ ossibus iungi solent, vt cartilaginee sunt, & ligamenta, ac periostium, quo pacto Medici communiter sumunt, cum inquirunt, ossa ex suo loco excidisse. Os ergo à nobis definitur, quod simplex est substantia, & ab aliis omnibus libera, ac nuda. hanc dicimus esse durissimam ac siccissimam, ad differentiam earum partium simplicium, quæ in nostro corpore reperiuntur, & duræ sunt ac siccæ, sed non æquè duræ ac ossa, quæ omnium sunt durissima. Cæterum cum cartilaginee quoque nonnunquam duræ admodum fiant, imo temporis progressu etiam in ossa degenerent, propterea in definitione, vsum finemque ossium

a, Huc pertinent omnes figura secundo libro dicta.

Similes partes re-
ctius consimiles
dicerentur.

addi-

addidimus, quæ ipsa à cæteris similaribus partibus quàm maximè separantur, dicentes, *ossa stabilimentum, ac fundamentum omnibus partibus largiri*. Hic enim ossium vsus *primarius* Vtus ossium.
 est, maximeq; generalis, quæ & ppter ea Galenus sæpe inculcat, sed imprimis i. de anat. *Primarius, & maximè generalis.*
 Admin. i. quæ locum modo in mediũ adduximus. Non tamè hic vsus ita vniuersalis est, atque communis omnibus, quin multa in corpore reperiuntur ossa, quibus hæc sustinendi corpus prouincia minimè competere videatur, cum nec dentes, nec iugale os quicquam sustineant, sed illi potius cibis incidendis, hoc temporali musculo muniendo sit præfectum. Quamobrem præter generalem hunc vsũ, alii quoq; erunt, iique *particulares*, quorum & mentionem diuersis in locis idem Galenus iniicit. Ac *primus Particularis.*
 quidem est, vt sint firmamenti loco ac tutelæ subiectis partibus, quo pacto cranium cerebro inferuit, os iugale temporali musculo; costæ, partibus vitali facultati destinatis, vertebræ, spinali medullæ. *Alter* vsus est, adiuuare melioremve reddere actionem 1.
 alicuius organi. sic patella in genu ambulationem, ossa sesamoidea in digitis manuum apprehensionem perficiunt, dum scilicet hos articulos firmant, ne in motu extra suam sedem labantur. *Tertius* est apprehensio, quem vsũ præstant dentes, tum qui cibum 2.
 incidunt, vt incisorii; tum qui frangunt, velut canini; aut comminuunt, tanquam molares. Est autem maxima ossium differentia inter se, quas vt omnes inuestigamus, ea Differētia ossiũ.
 quæ singulis partibus compositionem quandam habentibus accidere solent, ordine *A temperamento.*
 intueamur. Primoque *Temperamentum* ipsum, quod etsi omnibus ossibus citrà discrimen frigidum, & siccum contigit, vnde omnia quoque dura sunt, ac firma: alia tamen aliis multo sunt sicciora durioraque, nec tantum ratione ætatis, sed & sexus, & morborum, & ossium denique inter se in homine adulto. Ratione enim *ætatis*, puerorum ossa mollia admodum & humida sunt, si conferas cū ossibus senioris: quin imò plaræq; cartilagine potius, aut membranæ, quàm ossa vera videri queunt, donec progressu tandem ætatis solidiora & sicciora, ab interno calore indurata, fiant. Signo esse possunt primũ in lucem editi infantes, qui hac de causa pedibus insistere nequeunt, sed vacillant. Hoc monstrabit idem lallans, nequiensq; proferre articulata verba eorundem lingua, donec hyoidis os, quod basis instat, linguæ & musculis eius substernitur, siccatur firmiusq; redditum fuerit. Siccissima è diuerso sunt ossa decrepitorum, in quibus cartilagine quoq; in ossium naturam perquam multæ sæpe degenerant. *Virorum* quoq; ossa duriora esse fæminarum ossibus summus naturæ genius Aristoteles, 2. de part. anim. 9. prodidit. In *calidis* autem morbis, ardentibusq; febribus, sic exsiccari vt ferè lapidescant, experientia demonstrat. Sed enim, & in homine adulto si inuicem conferantur, durissima quædam inuenientur esse; vt ossa temporum petrosa, quæ à nimia duritie petris simili cognomentum acceperunt; & tria auditus ossicula, os item femoris, tibiæ, humeri, cubiti & radii: quædam contra molliora, vt ossa digitorum: quædam respectiue molliissima, cuiusmodi sunt vertebræ, ossa carpi, tarsi, & denique omnes epiphyse. Nonnulla extrinsecus obducuntur durissima crusta, intus verò mollem laxamq; substantiam coercēt, quemadmodum cranium duplici lamina inuestitum: plurima contra simplicem tantum habent substantiam, vt os femoris, aliaque duriora. Ratione *figura*, magna est differentia ossium. Alia enim triangulum referunt, vt scapulæ ossa: alia quadrangulum, vt duo ossa syncipitis: nonnulla pentagonum, A figura.

num, vt os occipitis. Cubi formam refert, os cyboides: nauiculæ, os nauiculare dictum: clauis antiquæ, ossa clauicularum. Stapedis, mallei, & incudis, tria auditui inferuentia ossicula, quibus & propterea hæc nomina imposita. Sunt & alia, quæ quoddam sesami semen referant, sesamoidea sunt appellata. Fibula quoque denominationem accepit ab acu fibulæ rectæ antiquorum, quam repræsentat tibiæ iuncta. Reperiuntur etiam ossa quæ curua sunt, vt costarum ossa: item quæ v Græcorum referunt, vt os illud quod linguæ radici præfigitur, proptereaquæ ὡψιλοειδὲς dictum. Nonnulla multarum figurarum sunt, vt os quod communiter cuneiforme, à situ inter alia ossa, sed πολύμορφον multiforme, à figurarum multitudine, quas habet, nuncupatur. Multa quoque sunt ossa, quæ figura carent, qualem quidem recensere liceat inter Geometricas, aut aliarum rerum formas: figuram tamen habent propriam, vt os femoris, humeri, cubiti, quia habent figuram quæ soli femori, humero, aut cubito competit, non alteri ossi. Nec tamen figura in toto osse semper spectatur, sed etiam in partibus, vnde factum est, vt sæpe à partis figura totum os nomen mutuarit, quemadmodum secunda vertebra ab Hippocrate *dens* dicta, quia processum habet, qui denti quoquo pacto assimilari queat. Sic processus, sinus, & ceruices quædam sua nomina habent. Processus enim qui stylum refert, *στυλοειδής*, qui acui similis, *βελυνοειδής*, dicitur. Illi qui sub auditorio meatu sunt, à similitudine quam habent cum mammillis *μαστοειδείς*, mammillares dicuntur. Processus ossis cuneiformis, quoddam vesperilionum alis assimilentur, *πτερυγοειδείς*, aliformes nominantur. Ratione *meatum* etiam ossium multiplex differentia nascitur. Quædam enim insignem cauitatem habent medulla plenam, vt os femoris, tibiæ, humeri: quædam verò sinustantum quosdam, cauernulasque obtinent, spongix aut pumicis instar, cuiusmodi sunt in maiorum quidem numero, os sacrum, corpora vertebrarum, sternum, talus, os calcis, & denique ossa verticis, quæ inter duas laminas substantiam spongiformem continent; inter minores verò, ossa carpi, & tarfi. Nullum enim os, quod paruum est, inquit Galenus 11. de vs. part. 18. medulla præditum est, nec ullam habet effatu dignam cauitatem, sed quasdam tantum cauernulas exiles, & angustas, idque in eum finem sic institutum est, ne si parua ossa ampliter caua forent, debilitate animali noceant; si magna, solida grauitate sua incommodent. Nonnulla habent foramina quædam, eaque vel magna, vt os occipitis, vbi spinalis transit medulla, & vertebræ, item ossa pubis, quæ insignia foramina habent: vel parua, vti capitis pleraque ossa, inprimis quod cribiforme dictum, ob copiam foraminum quibus cribrum exprimit: alia contra foraminibus carent. Si *superficiem* consideremus, alia ossa læuia sunt, vt os frontis, & duo verticis; alia aspera, vt femoris, humeri, os occipitii, quæ asperitates à Natura sunt conditæ, vel ob muscutorum firmiorem exortum & insertionem, vel eorundem tutiorem progressum. In *magnitudine* quoque notatu dignum reperitur discrimen. Sunt enim quædam ossa maxima, vt os femoris, quod omnium in corpore maximum est, deinde tibiæ os, & humeri: quædam sunt mediocria, vt ossa radii, & cubiti: quædam parua, vt digitorum, carpi, tarfi que ossa: nonnulla minima, vt quæ sesamoidea appellantur, & tria ossicula auditus. Sunt quoque alia longa admodum, at gracilia, cuiusmodi est fibula, & costæ: quædam contra lata atque ampla, vt ossa innominata dicta, & sacrum, scapularum quoque

A meatibus.

A superficie.

A magnitudine.

quoque ossa triangula, frontis, sincipitis, & occipitii: quædam verò sunt crassa, vt astragalus, & calcis. Ratione *numeri*, tot sunt ossa, quot commodè partium munibus satisfaciendo erant, adeoque nec plura, nec pauciora. Quamvis profectò Natura benignissima vnicum potius os, quàm plura exstruxisset, quòd vnitas continuitasque plurimum ad partium robur momenti adferat, sed motus corporis impediit, qui multitudinem exposcit. Quo nomine ipsa quoque cum plura pro vno in aliqua parte constituit, summa semper prouidentia cauit, ne temerè quicquam crearet, sed vel ad motum illius partis commodum, vel ad tutum vasorum transitum respiceret. Huc pertinere videtur, quòd quarundam partium ossa in prima generatione plura sunt, quæ postea in vnum os ætate crescente coalescunt. Sic maxillæ inferioris ossa duo sunt in infante, tempore procedente in vnum abeunt. Occipitis tria sunt ossa, nonnunquam plura, quæ postea vnum efficiunt. Sic sternum in senibus ex vno osse constat, in adultis extribus, in pueris qui pubertatem nondum egressi ex quatuor, in modo natis ex octo. Ex his autem ossibus, quædam citò coeunt, quemadmodum sunt occipitis & maxillæ inferioris, quæ in primo septennio coalescunt; alia tardius, vt ossa capitis, quæ non nisi in vltimo senio vniuntur, primumque fere obliteratur sagittalis futura, hinc lambdoides, post hanc coronalis; extremum deniq; squamiosæ, quæ temporum ossa cranio iungunt. Senibus enim diuturnitate & siccitate, non secus atque appendices, futuræ sic abolentur & connascuntur, vt vix vestigium aliquod remaneat: postremæ tamen semper sunt temporales, nec vnquam obliteratæ fuerunt obliteratæ reliquis remanentibus. *In situ* quoque ossa admodum variant: sed cum situs, & sedem ossis, & connexionem eiusdem cum altero indicet, Natura quidem prouida, *sedem* cuiq; eam largita est, quam exposcebat, vt instituto muneri promptius satisfaceret. Alia ergò ossa sunt superiora, alia inferiora, alia antica, alia postica. *Nexus* verò diuersus est valdè, prout inferuire debebat motui euidentiori aut obscuro, vel etiam robur & stabilitatem partibus communicare. Ratione *sensus* nonnulla, sed oppido quàm lenis, occurrit differentia. Soli enim dentes tactu præditi, reliqua sensu destituta videntur, si quidem os citra periostrum consideres, à quo mutuare sensum ossa consueuerunt. Quamquam profectò nec ipsi etiam dentes per se sensum habeant, sed eum potius acceptum referant membranæ, quæ internam dentium concauitatem succingit. Vt enim cætera ossa omnia foris membranam quædam obtinent qua vestiuntur, quæ propterea *περίστρον* dicta est, ita dentes intrinsecus vndiq; tenui quadam pellicula, quæ tactum exquisitissimū ipsis largitur, circumuoluuntur. Tandem *ratione temporis sue generationis* ossa differunt. Sunt enim quædam, quæ vna in vtero cum homine generantur, quemadmodum ossa capitis, femoris, tibiæ, cubiti, radii, & pleraq; alia: quædam edito in lucem fætu nascuntur, cuiusmodi sunt ossa carpi, & pedii omnia. Dentes quoque iam nato accedunt, ex quibus quidam celerius, quidam tardius prodeunt, nonnulli etiam in senio, vt sunt illi, quos *σφωσῆες*, sapientiæ dentes, Hippocrates vocauit, quod tum demum homini erumpant, cum iam sapientiæ ætatem attigerit. Ex iis etiam quæ in vtero prodeunt, nonnulla perfecta absolutaq; in lucem veniunt, vt tria ossicula auditui inferuientia, cætera omnia imperfecta nascuntur, quod vel processus ipsis, vel sinus, aut aliquid aliud desit.

CAPVT II.

De partibus ossium, ubi nomina, quorum frequens in ossium historia mentio fit, simul explicantur.

TAMETSI ossa, vt supra iam à nobis determinatum est, simplices sint partes, nec propriam propterea figuram requirant, vt quæ organicis duntaxat competit: ob vsum tamen, quem vel ad motum corporis, vel ad fulcimentum molliorum membrorum conferunt, diuersas partes, formamque peculiarem acceperunt. Nisi enim certa ossium inter se fieret articulatio & commissura, profecto motus omnis animalis necessarîo periret: neque si nullibi aut protuberarent, aut in se subsiderent, quidquam aut nasci ex ipsis, aut inferi iisdem potuisset. Quamobrem prouida Parendes sic ossa condidit, vt modò collium ritu extuberarent, modò vallium instar rursus subsiderent. Ceterùm cum protuberantia eiusmodi aut cavitates variæ sint, ac propterea diuersas sortitæ fuerint appellationes, in præsentia de ipsis agendum duximus, vt ossium quæ sequetur dehinc particularis historia, in qua sæpiissime earum mentio nobis facienda est, ab illis tenebris, quæ ignoratis his vocabulis affundi solent, libera præsteretur. Ossa autem in quibus eminentiæ hæ aut cavitates reperiuntur, non vnius semper sunt generis, sed quædam partes ossis præcipuæ, quædam vero partes tantum adnatæ. Voco nunc *partem præcipuam*, quæ os est à Natura primario constructum, durissimumque adeo, & in medio adnatarum partium consistit. *Adnatam* verò illam, quam Natura ossi primario, quasi ipsa sui oblita, vt os breuius factum, necessarîo elonget, adiunxit. Illa, vulgo communi appellatione Os dicitur; hæc apud Græcos propriam accepit denominationem, & *ἔμφυσις* vocatur; Latini autem cum multa habeant nomina, quibus

Appêdix. expriment, rectissime ab elegantioribus *Appendix* vocatur, quo pacto & nos semper in sequentibus appellabimus. Horum naturam qui velit intelligere, vituli, agni, alteriusve iunioris animalis os grandiusculum, puta femur, aut humerum, à carnibus liberum, (prius tamen bene coctum,) duriore contrectet manu, protinusque partem ossis, quæ appendix est, discedere experietur. Sunt autem epiphyse ossa quidem vt cætera, minus tamen quàm præcipua duræ, propterea quod ita solidam substantiam nactæ non sint, sed potius cauernulis plurimis, spongiæ pumicisve in modum intus plenæ. Accedit quod nec cavitatem, vt cætera, tam amplam acceperint, quin potius cavitatē reliqui & præcipui ossis medullâ plenam, obstruant, vt Galenus idcirco non sit veritus scribere, appendices omnes opercula esse ossium medullam continentium. Prouetioribus tamen calore aucto, & accedente motu ita indurâtur, vt parum à reliquo osse differant. At enim Natura in efformandis his appendicibus mea quidem sententia singulare suæ prouidentia exemplum reliquit. Nam cum ossa integra, ex primario, adeoque duro, sicco, & solido osse, constare haudquaquam possent, quòd animali fuissent ponderi, sicque motum, cui destinata erant, impediissent potius, quam eidem aliquid tulissent adiumenti: neque tamen ex eiusmodi quoque molli & rariore, quales sunt epiphyse, quod tum in uneri suo minime satisfacissent, & singulis momentis fracturis opportuna periculis hanc mortalium vitam cumulassent: Natura solertissima

Vsus appendicū.

I.

tissima ingeniosum commenta est inuentum, & mediam quidem ossis partem, duram solidamque, extremas verò molliores rarioresq; fabricata est. Hac ratione provida prudensq; Parens, quod imminebat graue discrimen facillimo negotio auertit, cum ita comparatum sit, (quemadmodum vel in scipione, cui quis innititur id videre est) vt semper in medio rupturæ periculum fiat maximum. Quare vt hoc euitaretur, aut medium durius, aut crassius faciendum erat. Sed crassius cum commodè non posset, ingeniosè durius effecit. Omnibus ergò grandioribus ossibus epiphyfes affixit, nec tamen hoc solo nōmine: sed etiam vt gratia articulationis molliores ossium extremitates fierent, & muscoli, qui (vt carnei) molles sunt, tutius ab iis originem ducerent, inque eas infererentur. Quin nec opportuna articulatio tam duras ferebat partes, cum durum duro iunctum in motu facillimè atteratur: neq; durum molli tuto coniungitur, cum hoc facillè vincatur. Et hæc causa est, cur præter magna ossa, minora quoq; suas habeant epiphyfes. Ossibus ergo omnibus, quæ articulari inter se ad motum euidentem debebant, epiphyfes adnatæ sunt: non tamen læui, plana; superficie, cum facillè sic diuellerentur, sed quibusdam asperitatibus cum ossis alterius sinibus commissis. quæ sanè vno in tenerâ ætate, iunioribusque, admodum infirma est, propterea; citra coctionem, aut putredinem, facillimè ab ossibus separabilis. Ossia autem, siue appendices sint, & epiphyfes, siue ossa primaria præcipuaque, superficiem habebunt, aut æqualem vbiq; & nullibi asperam: vel inæqualem, & alicubi protuberantem, alicubi cauam, & exsculptam, sinuosamque. *Protuberantia ossis*, Græcis *στόφους* dicitur, Latini *Processus*, estq; ea ossis pars, quæ ex ipso extra superficiem eminet, ac quasi protuberat. Tales processus in singulis ferè ossibus reperiuntur, præcipuè tamen in ^a vertebra, cum nulla sit, quæ non pluribus donetur; & in ^b maxillâ inferiore, quæ vtrinq; duos insignes processus obtinet. *Sinus* autem est in sculpra quædam ossi cauitas, qualis est in ^c Coxendicis ossè, in ^d scapula, aliisq; insignis. Vterq; autem processus, & sinus multiplex est: sed imprimis processus, cum alius acutus sit & tenuis, alius verò rotundus, & sphaericus. *Acutus*, Græcis *τεράχνη*, & *αὐχλῶ*, *Collum*, & *Cervix* dicitur, estq; protuberantia quædam acuta, & longiuscula. Differt tamen collum, quod aliud quidem simpliciter acutum sit, & à latiore basi in angustio rem verticem abeat, *κροῶνη* dictum à Græcis, à Latinis *cervix* aut *processus acutus*, cuius quoq; plures sunt species, pro-
ut vel *stylum* refert, & dicitur ^e *στυλοειδής*, aut *γαλφιδής*: vel *mammæ*, *μασσοειδής*; vel *anchoræ*, *ἀγκυροειδής*; vel *rostrum coruinum*, *κροκειδής*: Aliud collum, siue cervix vbi acutum aliquantisper mansit, in latam extremitatem desinit, quæ vel caput constituit articuli, vt ^h cervix femoris, qui ossi coxendicis articulatur; vel sinum, quemadmodum ⁱ scapulæ cervix. At processus, qui rotundo eminent tubere, *Capita* vocantur, *κεφαλή*, & *κεφάλαια*, suntq; processus, qui alterius ossis cauum articulationis gratiâ ingrediuntur. Hæc capita, aut oblonga sunt, & prominentia, vt est ^l femoris caput, vel depressa, vt ^m digitorum capita. Illa à Græcis *κεφάλαια*, nomine generis: hæc *κένδυλοι* *κένδυλα* dicuntur. Sic enim Galenus has voces accepisse videtur, cum ^r de motu musculorum, *κεφαλῶ* cum *κρότη*, *κένδυλον* autem cum *γλῶττι* & sinu confert. Latini non habent proprias voces, quibus has Græcorum exprimant. *Sinus* autem cauitas est caput excipiens; & cum caput duplex sit, (vt dictum,) sinus quoq; bifariam commodè di-

a, 2.8. G.

H.I.K.

b, 2.7.

fig. 2.3.

4. A. B.

c, 2.9. fig.

5.6.7. a.

d, 2.7.

13. A. B.

e, 2.3.2.0

f. N.

g, 2.7.13.

N.O.P.

h, 2.10.

i. a.

j, 2.7.13

C. D.

l, 2.10.

m b.

1, 2.10.

9. a.

στόφους

Processus.

Sinus.

Processus acutus.

τεράχνη

Cervix.

κροῶνη.

κεφαλή.

Caput.

κεφάλαια.

κένδυλοι.

κένδυλα.

Sinus.

κητύλη. uiditur. Altior enim profundiorque, qui κεφαλῶ, seu caput eminentius suscipit, κητύ-
 λη, Latinis *Acetabulum* dicitur, qualis est, cuius iam sæpè mentionem iniecimus, coxen-
 dicis sinus, qui femoris caput excipit. Depressior verò ac superficialius, qui capiti re-
 spondet depressiori, siue κενόυλω, γλῶν ab ocularis sinus forma, quæ palpebris clausis
 γλῆνη. apparet, cognominatur. Tales inuenire licet in ossibus tarfi, vbi pedii ossibus iungun-
 tur, quemadmodum & in carpi ossibus, vbi postbrachiali copulantur. Quamobrem
 κητύλη, sinus erit insignis admodum & conspicuus: γλῆνη autem adeò obscurus, vt am-
 biguum merito videatur, si verè sinuum numero debeat ascribi. Cæterum in summi-
 tate sinuum processus quidam occurrunt, labiorum instar, qui in profundis maximè
 ἴπτες. sunt conspicui, & Græcis ἴπτες, ὀφρυνες, ἢ χεῖλη, Latinis *Labra*, & *Supercilia* appellantur.
 ὀφρυνες. Atq; hæc sunt illa vocabula, quibus ossium partes ab Authorib. inscribuntur, quæ tāto
 χεῖλη. diligentius memoriæ mandanda sunt propterea, quod particularis ossium historia, his
 non optime prius intellectis, necessario obscura atq; difficilis valdè videatur.

C A P V T III.

De ossium inter se structura ac connexu.

NATURA solers omnium parens, Hominem sapientiæ studio, & earum rerū, quas
 toto mundi complexu coercuit, contemplationi addixit. Quare non ex vno osse
 continuo ve fabricari debuit, ne Homo omnium dominator, immobilis trunci instar,
 in vno perpetuo loco affirmatus hæretet, sicq; varietatem tantarum rerum ubiq; dif-
 fusam, ex oculis conspectuq; amitteret. Plura ergo fecit ossa, ex quibus constaret, & vt
 eommode inuicem mouerentur, non temere, sed vt cætera omnia, diuino artificio,
 singulariq; solertia, inter se copulauit. Huiusmodi ossium compagem, Græci σκελετὸν
 vocant, quasi reficcatum aridumque (intellige σῶμα,) σπὸς σκέλειν, quod siccare si-
 gnificat: cæterum mutuam illam connexionem ἄρθρον siue *Articulum*, quemadmo-
 dum Hippocrates libro de locis in homine indicauit, dum ὅσα ῥθ, inquit, ὅσα ῥθ
 ἑαυτὰ ἀμειβάουσιν πάντῃ ἄρθρῳ ποίουσιν, hoc est, quæcunque ossa inuicem commit-
 untur, ea omnia articulos efficiunt. Quamquam id vocabuli ambiguitate non ca-
 reat maxima, quam explicare nunc decreuimus, quòd plurimam lucem in authorum
 lectione studiosis adferre possit. Significatione enim *generali*, ἄρθρον appellant Græci,
 extremitatem ossium inter se connexorum, siue caput sit, siue sinus, quemadmodum
 in diarthrosi: siue etiam asperum aliquid, vt in suturis. *Magis strictè*, pro capite tantum
 sumitur, vt testis est Galenus, in proæmio lib. de oss. ad Tyrones, cum inquit, Hippo-
 cratem extremam partem alterius ossium sibi inuicem cohærentium, ἄρθρον vocare,
 non tamen quamuis, sed quæ orbiculata est, & in cauum proxime inferitur. Hoc pa-
 cto in lib. de articulis ab initio scribitur; Humeri articulum vno modo prolabi, in
 alam videlicet, noui. Sæpe pro ipsa coniunctione ossium, vt dixi, accipitur, quomo-
 do & Galenus in proæmio dicti libri de ossibus ad Tyrones, definit, naturalem esse
 ossium σύνταξιν, & constructionem. Interdum tamen *pressiore significatione*, non quam-
 libet, sed eam tantum notat, quæ motus edit manifestos. Sic Hippocrati, lib. de
 arte,

arte, ἄρθρα vocantur, ἐν οἷσιν αἱ συμβολαὶ τῶν κινουμένων ὁστέων ἐγκυκλέονται, in quibus ossium, quæ mouentur, commissuræ vertuntur. A medicis etiam locus circa articulos ossium, ἄρθρον vocatur, vt cum vocant ἄρθρων ἀλγήματα, dolores articulorū, qui tamen non in ipsis articulis sunt, sed potius in partibus articulos circumstantibus, puta in tendinibus, carnibus, neruis, & membranis. hincq; Arthritis nomen accepit, & arthritici dolores. Caterum vt omnes ossium compositiones in medium afferamus, (iplas potius ex structuræ varietate, quàm ab vsu, & motu euidentiore, vt plerique Anatomici petentes) alias dicimus continuas esse, alias contiguas. Græci dicunt alias κατὰ σύμφυσιν, per coalescentiam fieri, alias κατ' ἄρθρον, per articulationem. In quibusdam enim ossium nexibus ita iunguntur inuicem, vt prorsus sensum eorum compositio effugiat, & potius vnum os cōtinuum, quàm duo, videatur, quē admodum in structura eorum, quæ κατὰ σύμφυσιν dicuntur iuncta esse: in quibusdam laxiore modo cōmittuntur, & duo separata ossa remanent, seque inuicem contingunt tantum, vt sic facile euidentis structura conspectui se offerat. Κατὰ σύμφυσιν ergo copulari dicuntur ossa duo, quæ continua sunt, & ita inter se nexa, vt in vnum coalescant ac ita connascantur, vt sine alterius partis ruptura, separari a se inuicem non queant. Quemadmodum autem duplex est vnio; prima, quæ per se fieri dicitur, cum duæ partes diuisæ nullo intercedente medio coeunt, quemadmodum vulnera quæ per primam intentionē curari dicuntur: altera, quæ per accidens, interueniente aliquo heterogeneo, quemadmodum illa, quæ per secundam intentionem consolidantur, vbi aut per carnem, aut cicatricem labia vulneris inter se iunguntur: eodem modo etiam ossa inter se, modo nullo interueniente medio coalescunt, quæ vera & legitima, modò aliquo medio intercedente, quæ minus propria symphysis vocatur. Priorem illam speciem obseruare tibi licet in maxilla inferiore, quæ ex duobus ossibus per σωχόνδρωσιν iunctis, in vnicum os degenerat, cartilagine illa, quæ vtrumque interueit, ita ossescente, vt ne vestigium quidem eius postea relinquatur. Cum ergo in prima hominis natiuitate, ossa duo maxillæ per σύμφυσιν improprie dictā iuncta fuerint, per legitimam deinde copulantur, vbi cartilago abolita fuerit. Sic ergo in ossibus fœtus ex vtero egressi, innumeras cernere licebit appendices, per σωχόνδρωσιν, & σωεύρωσιν vnitas, quæ postea vinculo intermedio euanescente, ac in osseam naturam abeunte, primaria symphyseos specie cæteris agglutinantur. Sic vertebræ quoque singulæ, ex tribus officulis infantibus constant, cartilagine sibi iunctis, quæ paulò post in vnum continuumq; os facessunt. Sic ossa innominata, sic sternum se habet. Sed aduertenda hic diligenter causa est, quam huic diuersitati symphyseos Galenus libr. de ossibus, assignauit. Mollia enim, inquit, & spongiosa ossa faciliè coalescunt, & ita connascuntur, vt vnum euadant: at quæ dura sunt, & solida, ac densa, quo coeant, medio aliquo indigent. Quæ enim multum natura à se inuicem distant, vt durum, & molle, ea vniri, nisi per medium, non possunt. Molle quidem cum molli faciliè connascitur: at durum cum duro coire, nisi quid interueniat, quod vtrumque liget, non potest. Quare quæ sicciora, & densiora sunt ossa, alterius interuentu coalescunt. Sed cum medium illud triplex sit, cartilago nempe, neruus, & caro, tres quoque vulgo symphyseos species ponuntur, σωχόνδρωσις, σωεύρωσις, & σπασάγκωσις. Ego tamen relinquens σωεύρωσιν, quod

Compositio ossium duplex.

1. κατὰ σύμφυσιν.

Symphysis quæ medio caret.

Oss.

nullum os alteri per neruum propriè dictum iungatur, alias duas species pono, quas propriis magis vocabulis insignio, *σω δέσμων*, & *σω πένων*, cum ipsi etiam Veteres, per *σω έρωσιν*, ligamentum, & tendinem intellexerint. Impropriis tamè potius, quàm certis, & definitis vocibus uti in hoc negotio voluerint. His addo postea aliam quoque differentiam, de qua ante me nullus verba adhuc fecit; *σω ύμνησιν*: adeo ut pro ratione medii quintuplicis, quinque etiam species constituam, *σω χόνδρωσιν* inquam, *συσσάρκωσιν*, *σω δέσμων*, *σω πένων*, & *σω ύμνησιν*. Est autem *σω χόνδρωσις* vnio ossis continua, facta intercedente cartilagine, & vtrumque os colligante. Sic ossa inferioris maxillæ in pueris, sic pubis ossa in adultis iunguntur. In medio enim pectine, cartilago est, quæ vtrumque os vnit, & dissectanti per longitudinem pubis ossa, euidentissime apparet. *συσσάρκωσις*, siue concarnatio, ea vnio est, quæ fit per carnem. Hoc pacto generatim loquendo, omnes articuli musculis obducti committuntur. Cum enim ab vno plerumque osse originem trahentes, alteri inserantur, ligamenti cuiusdam vicem subire creduntur, quo vtrumque copuletur, & nectatur. Dicitur hæc vnio *συσσάρκωσις*, quia musculi, quorum ope fit, à plerisque Veteribus, ut Hippocr. lib. de artic. & potissimum Aristot. carnis nomine appellantur. Vnde & de musculis loquens, 2. de part. animal. 9. (quos tamen nunquam hac voce expressit) Caro, inquit, circa ossa consistit, vinculis fibrarum modo tenuibus adhærens, cuius causa ossium genus habetur. *σω δέσμων* est, cum ligamento accedente fit nexus. Hoc autem modo latum est, & totum articulum inuoluit, ab vno osse enascens, & alteri implantatum, quale ferè articulos omnes coniungit, utque illud est, quod os femoris cum coxendice, os humeri cum scapulâ ligat: modo rotundum, & teres, validissimum tendinem referens, & tantum maximis ossibus, & quæ facile excidere possent ex suo sinu, appositum, ut vtrique femoris capiti, tum illi, quod superius coxendicis cavitati præponitur, tum illi duplici, quod tibiæ iungitur. Nonnulla ergo ossa duplici *σω δέσμώσει* vniuntur, vt femoris articuli, qui rotundum & teres ligamentum habent: nonnulla tantum simplici, ut digiti. *σω πένων* vocant illam vnionis speciem, quæ per tendinem fit. Sic patella femori, & tibiæ; sic ossicula sesamoidea appellata, digitorum ossibus nectuntur, quod tendo hæc intercipiēs ad ossa alligat. Vltima tandem species est *σω ύμνησις*, quæ fit ope membranæ, qua ratione in recens natis ossa syncipitis cum osse frontis iunguntur.

Quinq;
species
symply-
seos quæ
medium
habet.

1.
σω χόνδρωσις.

2.
συσσάρκωσις.

3.
σω δέσμων.

4.
σω πένων.

5.
σω ύμνησις.

II.
Κατ' άρθρον.

συνάρθρωσις.

Διάρθρωσις.

Ενάρθρωσις.

Species
diarthro-
teos.

1. *Ενάρθρωσις*.
2. *Αρθρο*
νία.

Κατ' άρθρον, siue per articulum componuntur, quæ contigua sunt, cumque; vel laxa sit, vel stricta hæc compositio, & laxa iterum, vel motum habeat euidentem, vel motu euidenti, aut etiam omni careat, hinc sequitur, tres alias oriri differentias, quarum illa, quæ stricta est & compacta, *συνάρθρωσις*, Coarticulatio dicitur; altera, quæ laxa, & conspicuum motum partibus largitur, *Διάρθρωσις*, siue Perarticulatio vocatur; tertia, quæ laxa quidem, sed motum, aut nullum, aut certè non euidentem habet, *ένδεδίχθαι* Neutra, cum Galeno de ossibus ad Tyrones, cap. 13. vocari potest, quia ratione compositionis *Διάρθρωσις* est similis; cæterum propter impeditum motum *συνάρθρωσις*. Hæc fortassis *Διάρθρωσις* spuria, si cui nomina libeat fingere, non incommode appellabitur. *Διάρθρωσις* ergo tres species sunt, *ένάρθρωσις*, *άρθρωδια*, & *γύγγλυμο*. *Ενάρθρωσις* est, qua cavititas profunda rotundum & eminens caput excipit: siue, ut propriis vocabulis utar, quæ κετύλη κεφάλαιον suscipit, qualis articulatio est ossis femoris cum Ischio. *Αρθρωδια*, qua

qua

qua caput depressum, cum sinu leuiter cauo iungitur, ut est articulatio capitis cum prima vertebra, radii cum humero, & digitorum inter se. In qua articulatione maxima sane latitudo conspicitur, quæ in maiori minori; capitis rotunditate, aut sinus profunditate sita est. *Ginglymus* tandem est, quædo os idem est, quod excipit, & quod excipitur, fitq; cum vnus ossis gibba, alterius caua subeunt: & rursus vnus ossis sinus, alterius gibba admittunt, non secus ac ostiorum fenestrarumq; cardines, qui Græcis γίγλυμοι dicti, huic tertiæ articuli speciei nomen inuenere. hac ratione cubitus cum humero, & vertebræ inter se copulantur. Cæterum hæc vocabula ἐναρθρώσις, ἀρθρώσις, & γίγλυμος etsi prisca illis, & antiquis Anatomix Patribus in vsu non fuerint, neq; cognita satis, non dubitauit tamen Galenus ad vsu primus, doctrinæ gratia, reuocare, cum in quauis methodo aut disciplina, in qua inopia verborum obscuritati occasionem parit, vocabula pro arbitrio cuiusuis fingere liceat, dummodo proposito conueniant, & recto iudicio inueniantur. Neutrius species similiter tres sunt, iisdemq; appellationibus donatæ. Prima est *Enarthrosis*, quæ rotundum caput, & sinum profundum obtinet, motu tamen caret, qualis est ossis tali cum nauculari. Altera *Arthrodia*, quæ caput depressum, & sinum superficiali cauum habet, quemadmodum ossa pedii cum tarso, & tarso ossa inter se. Tertia *Ginglymus*, in quo ossis vnus cauum alterius gibbum, aut contra, suscipit. Hac articulationis specie, ossicula auditui inseruientia coniuncta sunt, quæ etsi mutuo se excipiant, motum tamen euidentem nullum habet. *Synarthrosis* quoq; tripartita est, & in ῥαφίω, ἀρθμονίαν & γόμφωσιν diuiditur. ῥαφή seu *Sutura*, est compositio quædam, ad rerum confuturam, vel compactarum similitudinem facta. Confutis similes sunt suturæ vulgo dictæ nobiliores, & propriæ, coronalis, inquæ, sagittalis, & lambdoides, quæ ossa frontis, verticis, & occipitii iungunt: Compactis verò assimilantur, suturæ temporum, squamosæ appellatæ. Sciendum tamen, ne æquiuocatione quis hic decipiat, apud Authores etiam melioris notæ, suturam aliquando pro altera synarthroseos specie, quæ Harmonia dicitur, accipi, ut cum multas capitatis Harmonias futuras appellant. Est autem *Harmonia* compositio, in qua ossa quæ se inuicem contingunt, vsq; adeo sibi æqualiter incumbunt, ut neutrum in alterum aliquid asperitatis immittat, sed prorsus æquilinea sint, ad quem modum maxillæ superioris, & nasi ossa plæraque iunguntur, os sphæroides, cribrosum, & cætera. Raro tamen exquisita harmonia reperitur, sed semper ferè ossa extremitatibus suis aliquid aspredinis habent. quæ causa est, ut harmonia inter suturas quoq; relata sit à peritiis, & veluti improprie dicta sutura constituta. *Gomphosis*, tertia synarthroseos species, ῥαφή & γόμφος, id est, clauo, denominationem habet. In hac os ossi clauo ritu infigitur, quomodo dentes maxillarum præsepilis impinguntur, qui ut omnes, ita soli in vniuerso sceletio hanc articulandi rationem obseruant. Atq; hi quidem modi sunt, quibus inter se ossium compositiones fiunt: cæterum cum illa articulatio omnium sit nobilissima, quæ motui inseruit, Natura quoq; perfectiorem eam cæteris condidit, magisq; compositam. Præter enim ossa, quæ ad eam constituendam concurrunt, alia quoq; accedunt, cuiusmodi sunt, ligamenta, & humor quidam vnctuosus, crassus, albus, ac pituitosus. *Ligamentum*, Græcis συνδεσμός dicitur, quod colligat copuletq; inter se ossa articulum facientia, estq; bipartitum, cum modo-larum sit modo rotundum.

Species Neutrius.

1. Enarthrosis.

2. Arthrodia.

3. Ginglymus.

Species Synarthroseos.

1. Sutura.

2. Harmonia.

3. Gomphosis.

Alia quæ ad articulationem laxam concurrunt.

1. Ligamentum.

2.
Humor
articulorū
ris.

dum acteres, quemadmodū tum antea dictum est, tum libro sequenti fufius dicitur. *Humor* albicans, tenax, ac glutinosus, in spatio quo ossium extremitates sibi articulantur, continetur, vulgoq; articulorum humor dicitur. Variat quantitas eius pro articuli magnitudine, cum maiores plus, quā minores contineant. Augetur tamen etiam, aut diminuitur, pro causarum præternaturam corpori accidentium diuersitate. Nam pituitoso humore suppetente copiosior est, itemq; si articuli debilitati fuerint, vt alimentum suum neq; concoquere queant, nec residua expellere. *Deficit* quoq; post longas febres, exercitia vehementia, & inedia plurium dierum. *Copiosior est* iunioribus, quā senibus, quibus exsiccatur. Interdum quoq; prauis humoribus in corpore sca- tentibus, malignam qualitatem induit, & sæuos dolores excitat. Cæterum quocunq; modo præternaturam se habeat, motum articuli lædit, maximè tamen si penitus absit, vt notauimus sapius, cum tumore circa articulos oborto, apertoq; abscessu, humor hic efflueret. Chirurghi enim imperiti, purulentam materiam esse existimantes, summa ad- nitebantur opera studioque, vt prorsus euacuarent: sed vna cum humore hoc, motum parti adimebant, immobilem articulum relinquentes, sicq; in tempestiuo & impru- denti officio, ægrotis admodum officiebant.

C A P V T IV.

De nutrimento quo ossa aluntur, & per quas vias ad ipsa deducatur.

ET si iam ad particularem ossium historiam pedem mouere fas erat, quò dea omnia, quæ in vniuersum de ossibus dici poterant, persecuti esse videamur: libuit tamen in gratiam curiosi ingenii duo addere, quæ tamen nec sua prorsus vtilitate carebunt. Inuestigabimus primò, quodnam sit ossium alimentum, & per quas vias ad ossa perueniat: deinde, cum omnium Anatomicorum consensu, venæ, arteriæ, & nerui, originem certam ab vno quodam principio ac primo habeant, dubitabimus, an simile quid in ossibus reperiatur: quibus sic præmissis, ad pressiora viam parabimus. Ac de nutrimento quidem, quale illud sit, si Aristotelem sequamur, dubitatione nulla animus fluctuabit. Passim enim, vt 2. de partibus animal. 3. 4. de partib. 2. 2. de gener. 4. 3. de gener. 1. & 2. de somno 3. *sanguinem esse animalibus sanguineis alimentum vltimum* omniū partium: ex sanguibus verò, id quod vice sanguinis habetur analogum, pronunciat. Imò determinatius loquens, de ipsis ossibus affirmat, 2. de partib. animal. 6. eaque sanguine necessario ali attestatur, quòd omnes partes eo nutriantur, ex quo facta sunt, at omnes ex sanguine constant; quare etiam omnibus ex sanguine alimentum petendum est. Obstat tamen authoritas primò Hippocratis, lib. de alimento, vbi *medullam ossium nutrimentum* inquit: deinde Galeni, qui 11. de vsu part. capit. 18. Demonstrauimus, inquit, medullam proprium esse ossibus alimentum, & ossibus cauitate carentibus tale quiddam in eorum cauernulis contineri, neminem quoq; mirari oportere, si medulla sit crassior eo succo, qui in cauernulis continetur, quamquam eiusede vsus gratia hic extiterit. Quin alibi, ut 3. de natur. facult. cap. vltimo, qualis, inquit, est carnibus sanguis, talis ossibus medulla est. Cæterum in hac controuersia, quæ apud Medi-

Sanguis
ex Aristo-
tele ali-
mentum
ossium.

Medulla
ossium
alimentū
ex Hip. &
Galeno.

Medicos satis celebris est, & habemus quæ contra Galenum dicamus, & alia, quæ pro Aristotele in medium offeramus. Multa enim sunt argumenta plurimæque rationes, quæ convincere videntur, medullam nullo pacto ossium alimentum esse. *Mirum* enim primum videtur, cur Natura medullam ossibus pro nutrimento assignare voluerit, cum ad alendum ea sit ineptissima, ut quæ temperamentum prorsus contrarium ossibus sit nata, calidum puta atque humidum, illis contra frigidis & siccis existentibus. *Præterea* medulla pinguedo quædam est, unde & pinguis in pinguibus, seu autem similis est in iis animalibus, quibus sanguis seu similis per coctionem euadit, at pinguedo 2. de part. animal. excrementum est utile, non alimentum corporis. *Quinime*, si medulla ossium proprium nutrimentum constitutur, omnia ossa medullam continebunt necessario. at omnia ossa non habent, ut parua, teste vel ipso Galeno libr. de ossibus ad Tyron. *Quin*, si medulla potius, quam sanguis alimentum aptum statuatur ossium, profecto absurdum sequeretur admodum graue, sanguine multo frigidior, & siccior medullam esse, quod à nullo tamen concessum unquam videtur. Et hæc sunt quæ mouent, ut à Galeno discedamus: cur Aristoteli autem contra faueamus, maxime ista impellunt. Nullum est animal, quod ossa habens, sanguine careat: neque vllum, quod sanguine carens, os habeat. At tamen quæ ossibus prædita sunt, non omnia medullam habere videntur, quemadmodum Leo: ex quo consequi videtur, ossa necessario nutriri sanguine, & non medulla. Si quis *obiiciat* Realdum Columbū, qui li. i. anat. cap. 19. ossa Leonis solida esse negat, sed medullam intus continere scribit, quod Florētia ossa Leonum viderit amplis cavitatibus prædita: si quis etiam opponat Epicurū, qui apud Athenæum 8. dipnosoph. Aristotelis 3. histor. anim. 7. nimis curiosas ac e mentitas obseruationes (sic vocat) deridet, negatque Leonis ossa ita solida esse ac dura, ut collisis inuicem, non secus atque ex lapidibus, ignis prosiliat. Huic respondeo, non bene concludere argumentum Columbi, ossa leonum medullosa esse, quod amplis cavitatibus sint prædita, cum sinus ossium, non ad medullam continendam, sed ad euitandum pondus ossium inutile primariò conditi sint. Nec sequitur vel ideo quoque, quod etiam modica medulla in ampla cavitare contineatur, quemadmodū in veruecum ossibus, proportionem cavitatis, parum medullæ coercetur. Et hæc causa est cur Aristoteles quoque; 3. hist. animal. 20. & 2. de part. animal. 6. vere affirmet, medullā non nisi in ossibus conclusam esse, non tamen propterea omnia ossa medullam intra se continere, sed ea tantum, quæ cava habentur, tametsi ne ipsa quidē omnia contineant. Causam subiungit: Ossā enim Leonis, partim nullam, partim admodum exiguam habent, quamobrem & nullam omnino medullam Leones habere nonnulli existimarunt. Si quis autem quærat, cum medulla ossium alimentum non sit, quem *vsū* præbeat, is hæc responsionem à me ferat, ossa ob perpetuum motum, & quod natura sua sicca essent, requirere, ut assiduo humectentur, cui vsui præstando medulla perquam apta est. *Sed restat explicandus locus*, qui apud Aristotelem habetur, 2. de part. anim. 6. quod contrarius videatur dictis, tum à nobis, tum ab ipso etiā Philosopho, aliis, iisque pluribus in locis. Ossium enim ibi inquit, naturam inesse animalibus necesse est, & ut medullam quoque habeant, quæ pro alimento contineatur, ex quo ossa consistant, necesse est. Videtur hic locus manifestissime statuere, medullam ossium nutrimentum esse: sed

Medulla non esse alimentum ossium monstratur.

1.

2.

3.

Sanguine esse alimentum ossium probatur.

Obiectio.

Medulla quem vsū præstat. Explicatur locus obscurus Aristotelis.

se: sed facillè satisfieri huic difficultati potest, si quis græca tantum verba inspexerit, quæ male hic ab Interprete versa, sic sonant. ἀναγκαῖον οἰοῖς ὑπάρχειν καὶ μυελὸν, ἐμπελασθενομένης τῆς τροφῆς, ἐξ ἧς γίνεται τὰ ὀστέα. Reddidit Interpres passiuè, ἐμπελασθενομένης τῆς τροφῆς, cum hoc verbum passiuum non sit, sed medium, & propterea a-ctiue vertendum erat hoc pacto: Necesse est quibusdam inesse & medullam, quæ contineat alimentum, ex quo ossa generentur. Quodnam autem sit alimentum illud, statim subiungit, ὅτι ἡ τροφή πᾶσιν αἵμα, ἐρητιγ πέπερον, quod autem omnibus partibus alimentum sit sanguis, iam ante dictum est. Quasi diceret, quodnam sit alimentum illud, facillime erit ex aliis, quæ à me dicta iam sunt & tradita, colligere, cum semper statuerim docuerimque, sanguinem omnium partium vltimum esse alimentum. Cum ergo sanguis ossa alat, quæritur per quas vias ad ossa deferatur? Per venas, quæ sibi foramina in ipsis etiam durissimis ossibus efformarunt, per quæ transeant, & alimentum deducant, vti videre est in caluaria, femore, & tibia. Solent etiam vasa in ipsis cavitatibus ossium maioribus vndiq; medulla stipari & sustineri, ad quod Philosophus allusit, cum inquit, medullam esse, non quidem alimentum, sed alimentum in se continere.

C A P V T V.

An ossum aliquod sit principium, quemadmodum venarum, arteriarum, & neruorum, tum quale illud sit, inuestigatur.

RECEPTVM est ab omnibus ferè dissectionum Professoribus, Vasa appellata principium aliquod primum habere, à quo oriantur. Hinc Iecur venarum; Cor, arteriarum; Cerebrum, neruorum ferè origo statuitur. Ratio quæ in hanc opinionem ipsos induxit, videtur fuisse omnium vasorum continuitas, & quod nulla vena seorsim esset, sed omnes partes viderentur vnus. Hæc causa si alicuius momenti est, vt certè esse ab omnibus creditur, rectè dubitare meritoq; videmur, sitne ossum quoq; principium aliquod, cum ossa alia aliis nexa, & omnia inter se apta videantur, vnâque continuâ seriem venarum in morem constituere: imo os nullum sit, quod seorsim ipsum per se subsistat, vt loquitur Aristot. 3. histor. animal. 7. Accedit & ratio, quæ id concludere firmiter videtur. Cum enim ossa motus gratia inuicem coarticulata sint, motus autem omnis fiat à mobili in quiescente, rectè videtur sequi, vnum os alterum motum semper sustentare. at cum quiescens illud in alio quiescat, tandem ad aliquod primum quiescens peruenire necesse est. Hoc vt inueniatur, accipiendum ab initio est, illud statui merito ossum principium, quod longitudinem ac rectitudinem totius hominis contineat, & à quo veluti ex trunco rami, reliqua ossa exoriantur.

At hæ conditiones non alteri, quam spinæ dorsi competunt, vnde rectè etiam ipsam ossum principium esse statuere conuenit.

CAPVT VI.

In quo breuis omnium totius corporis ossium diuisio, & enumeratio instituitur.

CVM iam recta nobis ad particularem ossium historiam eundum sit, præmittere eorum omnium numerum placuit. Sed cum is admodum ratione ætatis differat, aliusque sit in recens natis, quam homine perfectam ætatem adepto, nos eum afferemus, qui in adulto reperitur, ossaq; describemus, qualiter se in perfectis habeant. Nam ea, in quibus differentia sunt infantium ossa, ex iis quæ de formato fætu scripsimus, satis patebunt, vbi diligenter totum hoc negotium complexi sumus. Vniuersa ergo ossium compago, quadripartito à nobis diuiditur, in caput puta, thoracem, infimum ventrem, & artus. CAPVT vocatur, totum id quod supra colli vertebrae situm est, & bifariam iterum, in Cranium, siue Caluariam; & Faciem, siue maxillas dispesci potest. *Caluaria* est, quicquid supra parte cerebri tegit, & ipsum vicissim capillis rectum est, quibus decidentibus caluities oritur, à qua nomen ipsa caluaria accepit. Græcis *κεφαλή* dicitur quasi *κεῖν* & *galea*, à figura & vsu: *κρυψος* autem & *σκαφίον*, si inuerse consideretur. Constat hæc in adultis communiter ex quatuordecim ossibus, quorum alia sunt propria ipsi, alia communia cranio cum maxilla superiore. *Propria* sunt, os frontis, duo syncipitis, occipitis vnum, & temporum duo: sex deinde auditui dicata ossicula, in qualibet aure tria, malleus, incus, & stapes. *Communia* similiter duo sunt, cuneiforme, & spongiosum. *Maxilla duplex* est, superior, & inferior. *Superior*, præter communia duo dicta, vtrinque sex propria obtinet. *Inferior*, ex vno osse constat. Vtrique infixi sunt *Dentes*, quorum in homine adulto triginta duo sunt, in qualibet puta maxilla sedecim, ex quibus quatuor incisorii, duo canini, & decem molares. THORAX diuiditur in partem anteriorem, laterales, & posteriorem. *Anterior*, duas clauiculas, & os pectoris, ex tribus constans ossibus in adulto homine, complectitur: *laterales*, costas vtrinque duodecim: *posterior*, scapulas duas, & duodecim vertebrae. Thoraci adiungenda est *Ceruix*, quæ septem vertebrae complectitur, & os hyoides dictum, quod ad linguæ radicem in summitate laryngis situm est, & maxima ex parte vnde cum ossibus componitur. INFIMVS VENTER *antica* parte duo pubis ossa habet; *ad latera* ossa ilium, & coxendicis; *postica* sede lumborum quinque vertebrae, sex ossa ossis sacri, & quatuor coccygis. ARTVS, in manus, & pedes diuiduntur. MANVS iterum in humerum, cubitum, & extremam manum. *Humeri* os vnum est. *Cubitus* duo habet, Radius, & Vlna. *Manus extrema*, Carpum, Metacarpium, & Digtos continet. *Carpus* octo constat ossibus, duplici serie distinctis. *Metacarpium* quatuor ossa habet. *Digiti* quinque sunt, & singuli tria tenent, vt sic quindecim sint omnium. Præter hæc ossa duodecim quoque sunt alia minima, quæ cum sesamoidem referant, sesamoidæ sunt appellata. PES quoque trifariam diuiditur, in femur, tibiæ, & pedem extremum. *Femur*, vnum os est. *Tibiæ* duo habet, tibiæ & fibulam. *Pes extremus*, in tarsum, metatarsum, & digitos dispescitur. *Tarsus*, septem habet ossa: *Metatarsus*, quinque: *Digiti*, quatuordecim. Ad hæc referri debent duodecim sesamoidæ, & *Patella*, quæ femori, & tibiæ anteponitur. At-

Capitis
ossa re-
censentur.
Caluaria
ossa.

Maxilla-
rum ossa.

Thoracis
ossa.

Infimi
ventris
ossa.
Artuum
ossa.
I.
Manus.

2.
Pedis.

que hæc est omnium ossium enumeratio, quæ si in vnam redigantur summam, CAPVT, quinquaginta nouem habebit: THORAX, sexaginta vnum: INFIMVS VENTER, viginti vnum: MANVS vna, quadraginta duo; PES, totidem, adeoque ambæ manus & pedes, centum sexaginta octo: ET TOTVM CORPVS HVMANVM, trecenta, & nouem.

CAPVT VII.

Agit de Cranio in vniuersum, Suturasq; capitis proponit.

CEREBRVM viscerum omnium nobilissimum, cum in excelso corporis loco collocandum esset, qui externis iniuriis maxime expositus est, prouida in singulis Natura, osseo tegumento tanquam galea quadam circumsepsit, vt contra irruentes calamitates liberum foret, atque optime munitum. Non tamen ex vno solidoque osse construxit, sed ex pluribus, quæ certo quodam articulationis genere coniunxit inter se, quale in vniuerso reliquo corpore reperire non licet. Cum enim

Caluaria
vsus.
Caluaria non tantum propugnaculi cuiusdam munere fungeretur, quod habet proprium quasi officium ab aliis ossibus: sed firmamenti etiam cuiusdam, atque stabilimenti, quod ipsi cum cæteris commune est: ne cerebrum partium omnium nobilissimum subito concideret, ventriculosque, & cavitates suas obstrueret, firmandum omnino erat. Id quod Natura commodissime fecit, fibras quasdam membranæ duræ, qua cerebrum inuoluitur tegiturque, per capitis suturas traiciendo, vt cerebrum, quod perquam promptè mollitiei gratia concideret, suspensum veluti, & affirmatum teneretur. Verendum enim profecto foret, si magna illa cerebri moles sustentaculis his, quibus veluti in æquilibrio perpetuo detinetur, careret, ne in validis illis motibus (quales eueniunt in saltationibus) vbi cerebrum concutitur, aut in sepe periculose ipsum concideret, aut vero allisum ad cranium, plurimum damni pateretur.

Suturarum
vsus.
1. Accedit ad hunc vsus alius, non minus nobilis, quod cum in summo excelsoque corporis loco collocandum foret, in quo vapores in summa effumantes perpetuo suscipit, cranio exitus præpararetur, per quem fumi illi exspirarent, quos singulari inuento Natura per suturas depellit. Hinc illud est, quod vulgò videmus, eos qui suturis omnimode carent, continuo capitis dolore affici, facillimeque ab internis causis obladi. Contingit enim ferè ipsi, quod illi, qui, vt Galenus narrat, doloris gratia fasciis circa caput constrictus erat, iu eum vti dolorem incidant, vt fere inflammationis periculum incurrant, etsi leuibus à causis tententur. Non desunt qui & aliū assignent vsus, vt vna scilicet parte læsa, altera seruetur incolumis, & fractura cum osse finiretur, nec vltra serperet. Sed nos sæpissimè experiētiā, rationem hanc admodum esse friuolam edocti sumus, cum ictus pluries per ipsas etiam suturas penetrasse viderimus. Os ergò quod cerebrum tegit,

Substantia cranij.
2. 3. *Caluaria* dicunt, Græcis κεφαλὴν, à quo Latini suam vocem *Cranium* mutuarunt, quasi κεγὼς, Galea, quòd militaris galeæ formā referat, & vsus præstet. *Substantia* huius ratione ætatis plurimum variat. In nuper enim natus membranea potius est, quàm ossea, præsertim circa suturas, maximeque coronalem,

nalem, vbi ad aliquot vsq; annos tantam molliciem retinet, vt manuum compressioni proutissime cedat. *Crassities* etiam non eadem semper est, cum senum cranium, quàm *Crassities* iuuenum multo sit crassius; & marium, quam fœminarũ. Quin imò & regionũ diuersitas varietatem parit, si quidem verum est, vt credimus, quod Ouedus in Indica historia testatur, Indis cranium esse adeo crassum, vt aciem gladii quoq; acutioris eludat. Sed nec in vno eodemq; homine æqualem vbique crassitiem retinet, cum in aliis atque aliis locis crassius sit, quemadmodum in singulorum Cranii ossium historia fufius id dicemus. *Figura* eius sphaerica est, & quidem oblonga, qualem cerebrum ipsum, cuius gratia est conditum, efflagitat. *Superficies* autem tam intima, quàm extima sede leuis est: intima quidem, ne duram membranam; extima verò, ne pericranium læderet. Illa

Figura.
Superficies.

b, 2. 4. 2.
E. E.

c, H.
d, I.
e, K.

tamen^b inæqualitates quasdam habet, quæ cerebri vasorũ referunt vestigia: hæc vero processus nonnullos, pro exortu quorundam musculorum. Constat autem ex duobus ossibus, tenuibus quidem, sed duris admodum, c vno interiore, d altero exteriori, quæ inrer^e substantia quædam pumici non absimilis, & plena sanguine medullaque continetur, cuiusmodi quoque in aliis ossibus cernitur, veluti sunt illa carpi, & tarsu. Vocantur hæc ossa ab Anatomicis duæ *Caluaria laminae*, quarum quæ exterior est, crassior, & durior: quæ interior, tenuior molliorq; existit. Et hæc ratio est, cur sæpe in capitis validioribus ietibus, extima remanente illæsa saluaque, intima rumpatur. Viris autem, quam mulieribus vtraque est crassior: senibus etiam, quàm iuuenibus. Et hæc est illa celebris Hippocratis *δυσλόν*, quã ipse describens lib. de vuln. capit. spongiæ similè pronunciat, & os ipsum in se carunculas multas humidas habere affirmat. Cranium ergo cum ex diuersis ossibus constet suturarum beneficio inuicè connexis, antequã ea omnia membratim intueamur, suturarum natura, & singulæ species explicandæ sunt. Est autè SVTVRA, vt supra quoque dictum est, certa quædam ossium capit. cõpositio, rerum filo consutarum referens imaginè. Dico esse *compositionem*, ex quo ipsius genus intelligatur, nempe quod non sit *ένωσις* & vnio, sed articulatio quædam *κρῆτ' ἀρθρον* facta. Huius formã accuratius explicant verba vltima, cum & ipsa sutura ab hac similitudine consutorum pannorum nomen repperit. Cæterũ non conuenit aliis hæc species articuli, nisi solis capitis ossibus, quæ verũ subiectum suturarum sunt; competit autem vsq; adeò, vt quemadmodum solis his propriæ sunt, ita etiam omnibus capitibus insint, raroque admodum inueniatur caput suturarum expers, neque illud nisi in senibus fortasse, in quibus cũ ætate ob siccitatem sensim obliterantur, & appendicum more coalescunt, primoque ferè occipitis suturæ id vsu euenit, deinde sagittali, hinc coronali, vltimò omnium temporalibus, seu squamosis. Insunt etiam vtrique sexui numero pari, nec verum est quod tradit Aristoteles 2. de part. cap. 7. maribus esse plures, pauciores fœminis, cum experientia repugnet, quamuis ratione admodum probabili Philosophus niti prima fronte videatur. In infantibus quoque reperiuntur omnes, sed rectam potius lineam, & harmoniam, quam futuram referunt. Cum ergo omnibus capitibus adsint, rectè, mea sententia, vulgo ab Anatomicis in proprias & communes dispescuntur. Proprias vocant, quæ soli cranio competunt; Communes quæ ad cranium pariter, os cuneiforme, atque maxillam superiorem pertinent. Propriæ iterum, vel veræ sunt, vel mendosæ; & veræ numero tres, mendosæ

Caluaria
laminae.

Sutura.

Quæ suturæ prior obliterantur.

Sutura vtrique sexui insunt, & quidem parinumero.

Sutura duplex.

quinque. Id tamen habent peculiare inter se, quod veræ simplices sint, mendosæ autem duplices. Dico simplices, quod coniuge destituantur, & vna tantum sit: verbi gratia, vna solum est coronalis, vna sagittalis, vna lambdoides; at mendosæ coniuges suas habent, quarum vna dextrum, altera sinistrum capitis latus occupat, quemadmodum in vtroque latere sunt squamosæ agglutinationes. *Prima* ergò verarum *σεφανιαία* dicitur, *Coronalis*, vel quod coronæ instar capitis anticam partem cingat; vel quia coronæ olim puellarum eo loci gestabantur. *Altera* *λαμειδοειδής*, à *Λ* maiusculo Græcorum, cui similis, quemadmodum eadem ratione *ψιλοειδής*, ab inuerso *υ* quod refert, cognominatur. *Occipitis futura*, à situ dici posset, aut si omnino græcæ notationi insistere velimus, *Lambdiformis* non male vocaretur; sed vulgo græca ferè vox in vsu est, & lambdoides appellatur. has inter duas, media est, quæ *ὀβελιαία*, *Sagittalis*, à figura sagittæ dicitur. *Coronalis* ergo semicirculum refert, transuersim ab vno temporum ad alterum diductum, qua frontis ossa ossibus syncipitis nectuntur. *Lambdoides* est, quæ occipitii basi, & vtrinque processibus mammillaribus duobus cruribus insitens, verticem in occipitii summitate ponit. *Sagittalis* tandem quæ inter has media, verticem lambdoidis, cum centro coronalis coniungit. Vocantur hæ futuræ veræ, quod futurarum, id est, pannorum filo confutorum imaginem vere exprimant, mendosæ contra lineam tantum referentibus. Non tamen in vtraq; lamina sub forma futuræ apparent, sed in exteriori tantum, siue superiore. nam in ¹intima, harmonia potius nectuntur, quæ causa esse solet, quam propter interior futura, quàm exterior, multo celerius aboleatur pereatq;. In nonnullis capitibus strictiores quoq; sunt, in aliis laxiores; in nonnullis grandiores, in aliis exiliores.

Suturæ
proprie
veræ tres
sunt.
Coronalis

Lambdiformis.
Sagittalis

*Cur dicantur
veræ.*

Sutur.
mendo-
sarum
quinque
paria.
Primum.

Secundū.

Tertium.

Quartū.

Quintū.
Comu-
nes futu-
ræ quin-
que.
Prima.

Mendosarum autem ¹*par primum* omnium maximum est, maximeque conspicuum, & ²insigne, squamosas combinationes referens, à quibus etiam nomen accepit, vt *λεπιδωειδής* *περσοκορύματα* à Græcis, squamiformes agglutinationes à nostris dicantur, cum per hanc verticis ossa & temporum inter se iungantur, ex crasso osse in exacte acutam lineam squamarum ritu desinentia, ita vt externa illa, hæc interna parte attenuentur. Initium ducunt à latere posteriore basis processuum mammillariorum, & circulari ductu, quem toto processu obseruant, ad basim capitis feruntur, totum latus cranii conficientia. ³*Alterum par*, in latere capitis consistit, totoq; ductu, anteriori & superiori parti paris primi, seu squamosarum agglutinationum socium est, à cuius summitate initium accipiens, oblique deorsum ad originem primæ communis protrahitur. ⁴*Tertium*, in basi posterioris sedis capitis est, quod initium suum cum principio crurum lambdiformis futuræ continuum habet, in basi processuum mammillariorum, iuxta quorū latera posteriora toto ductu oblique fertur, vsque ad basim capitis, qua capitula sunt, quibus cum prima vertebra connectitur. ⁵*Quartum*, prope processus vespertilionum alis similes in capitis media prope basi inferius, rectam quasi lineam transuersam exprimit, vtrinq; contermina duabus illis rimis asperis, quæ à sphænoïdis, & temporum finibus conficiuntur. ⁶*Quintum*, in anteriore internæ caluariæ parte transuersim ad ossis cribrosi, siue spongoidis angulos inferiores, harmoniam potius, quam futuram refert, cum vna recta linea esse videatur, etsi duæ reuera sint, à duobus lateribus cuneiformis ossis, qua frontis ossi iunguntur, effectæ. *Communium quinque sunt.* ⁷*Prima*, in supercilii

f. A.

g. C.

h. B.

i. 2. 4. 2.

A. B. C.

l. 2. 3. 1.

o. 2. II.

m. 2. 3. 2.

II.

n. 2. 5. 2.

III.

o. IV.

p. 2. 5. 1.

V. V.

q. 2. 3. 1.

o. 2. I.

percilii exteriore sede obliqua, quæ frontis ossis processum exteriorem, cum primo maxillæ superioris osse coniungit. ^{r. 2. 2.} *Secunda*, in oculi sede externa & laterali, à sine ferè secundæ propriæ mendoſæ deorsum recta ducitur, ad foramen vsque in cauistemporum existente, & communis est cuneiformi, cum maxillæ superioris osse primo. *Secunda.*
^{f. 3. 3.} *Tertia*, in elatiore oculi orbitæ parte, & narium summitate sita est, oblique à radice illius ad summitatem huius perducta. Iungit frontis laminam, quæ partem orbitæ superiorem efformat, & processum interiorem, cum maxillæ superioris ossibus, secundo, *Tertia.*
^{r. 4.} ^{u. 5.} tertio, quarto, & quinto. *Quarta*, obliqua est, in ipso ossis iugalis medio, quæ processum primum ossis temporalis, cum primo maxillæ superioris osse connectit. *Quinta*, *Quinta.*
inter processus pterygoides sita, antrorsum ducitur, cuneiformi ossi cum septo narium communis.

CAPUT VIII.

De ossibus capitis siue Caluaria propriis agit.

CRANIVM ergo, vt dictum, sex ossibus constat propriis, vno frontis, & occipitis, duobus syncipitis, totidemque temporum, quæ omnia inter se futurarum beneficio connectuntur. Primum OS FRONTIS est, τὸ κατὰ μέτωπον ὀστέον, quod in anteriore parte situm, totam frontem, & oculorum orbitæ elatiorem partem constituit. *Os frontis.*
^{u. 2. 6. 2.} *Figuram* habet circularem ferè, ^u patellam non incommode profundiusculam exprimens, nisi iuxta oculorum sedem, à rotunditate in rectam lineam abiret. Habet enim cauitatem insignem admodum, qua cerebri anteriorem conuexam partem excipit. *Figura.*
^{x. 2. 3. 2.} ^{A. A. A.} ^{y. 1. 3. 3.} ^{x. 11.} *Connectitur* superius, ^x ope suturæ coronalis duobus syncipitis ossibus, ^y inferius, ossibus maxillæ superioris, & cuneiformi; ² à lateribus, duobus processibus ossis cuneiformis alas vespertilionum imitantibus. *Substantiam* inter verticis ossa & occipitis, mediā habet. nam vt illa tenuissima sunt, ita hoc crassissimum. Non tamen æquabilem præ se fert vbique crassitiem, sed ad elatiorem oculorum sedis regionem tenuissimum est: tenue etiam vbi temporalibus ossibus committitur: in cæteris autem partibus, vbi frontem excipit, crassius est, quàm verticis ossa, duplicique lamina substantiam pumici similem complectitur, tenuius tamen fit sensim, vbi hinc ad verticis ossa, quibus committi debet, declinat. Est autem *unicum* os in adultis, quamuis in pueris geminum sit, *Numerus*
^{A. 2. 4. 2.} ^{1.} in quæ diuiditur à sagittali sutura ad nasum vsque excurrente. In fæminis etiam adultis similiter id obseruari semper, Aristoteles tradidit: sed experientiam refragantem habet. In hoc osse obseruanda est ^a *Cauerna satis ampla*, inter vtramque laminam ad nasi radicem consistens, interdum vna, nonnunquam (& magna id quidem ex parte,) gemina, vtrinque; tum ad superciliorum sedem sublimiorem sita, à qua foramina duo ad narium cauitatem expanduntur. *Cauerna*
Hanc membranula viridis succingit, materiam in se continens viscidam, & cerebri substantiæ non valde absimilem. Voci inferuire, vt canora magis sit, vulgo traditur: sed ego existimem, ad odores hauriendos facere, cum ibi aër excipiat odor prægnans, conserueturque paulum, ne præterlabatur tam subito nares. Exemplum si vis similis rei, auriculam inspicere, quam Natura quoque ad latera capitis veluti aliquod velum expandit, vt fugientem sono refertum aërem detineat,

- Foramina.** tineat, leuiterq; remoretur. *α* Foramina habet duo in sede superciliarum media, in oculi orbitam desinentia, per quæ ramus primus nerui tertiæ cerebri coniugationis in musculus frontis egreditur. *β* Processus quoq; constituit quatuor, quorum maiores duo, ad maiorem oculi angulum: minores ad minorem consistunt.
- Processus.** *β* SYNCIPITIS OSSA, aliis *ossa verticis* dicta, quod Vertex horum centrum sit, locus inter frontem, & occiput medius. Græcis *βρεγματὸν ὄστρον* & *βρέχεν τὸν ἐγκέφαλον* dicuntur, quod cerebrum ibi semper sit madidum. Numero duo sunt, quadrilateræ figuræ, sed altera parte longioris, vt Euclides loquitur, cum quatuor constant lineis, quarum laterales transuersis longiores sunt, non tamen plana, sed concaua ipsa sunt, ob capitis sphericam figuram, cui accommodantur. Committuntur *c* anterioribus lineis, ossi frontis, sutura coronali: *d* posterioribus, ossi occipiti, sutura lambdiformi: *e* internis lateribus, sibi inuicem, sagittali: at *f* exterioribus, ossibus temporum, ob quarum coniunctionem, in *ff* squamas degenerant. Maxima sunt, omnium consensu, inter ossa cranii: sed & tenuissima quoque, ac infirmissima, cum omnium tardissime in pueris indurescant & ossium naturam induant, imò Plinio teste, non ante sermonis usum. Crassa tamen sunt æqualiter, nisi vbi in squamas attenuantur. Superficiem habent *g* extrinsecus læuissimam: *h* interius asperiusculam, ob vestigia, quæ venæ *i* Iugulares per cerebri meninges dispersæ imprimunt. Et hæc Chirurgis sedulo notanda sunt, ne, vbi terebra cranium aperiendum erit, imperite venas cum vitæ periculo vulnèrent, sed caute agendo eas illæsas conseruent.
- Occipitis os.** *l* OCCIPITIS OS, τὸ κατ' ἰνίον ὀστέον, *Μετὰ τὸ ἰνὸν δὲ εἶναι* Galeno appellatum, quod ibi fibræ neruæ oriantur, ab Arabibus memoriæ dicatum est, & posticam capitis partem claudit. Figura pentagonum ferè exprimit: *m* primum enim, & secundum latus sunt, quibus verticis ossibus iungitur, ope suturæ lambdoideæ: *n* tertium, & quartum, quibus ossibus temporū additamētis lambdoideis, siue sutura tertia mendosa: *o* quintum, quo cuneiformi. Vnicum est numero in adultis, quamquam in recens natis tripartitū sit. Substantiam habet duram, adeoque crassam, vt omnium caluarie ossium crassissimū perhibeatur: inæqualis tamen est crassities illa, cum in superiore parte admodum crassum sit, duplicemq; habeat testam: inferiore, qua basin cranii accedit, tenuissimum, & vnica simpliciq; lamina donatū. *p* Externa superficies læuis est, præterquam vbi sinus quosdam habet semicirculares, quorum *q* duo superiores insignes sunt admodum, pro musculis, tum iis qui caput extendunt, tum qui scapulam dorso admovent, quos Cucullares vocabimus: *r* duo verò inferiores parui, circulos fere confidentes, pro musculis rectis caput extendentibus exsculpti. *s* Interior impensè inæqualis est, idque ob sinus multiplices ipsi insculptos, *t* quorum duo transuersi per totum os excurrunt ad latera ossium temporalium, qui propter sinus, primum & secundum crassæ cerebri membranæ, conditi sunt. *u* Vnus inter hos rectus per totum caput vsq; ad nasi verticem distrahitur, pro sinu tertio eiusdem membranæ. Duo alii rotundi sunt super hos, alique duo infra, *x* quorum illi minores, cerebri prominentias, quod bipartitum est; *x* hi maiores multo, cerebelli protuberantias, excipiunt. *y* Capita, siue appendices duos habet, ad basin sitos, qui primæ colli vertebræ articulantur, &
- Superficies.** *z*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*, 2. 3. 1. *ο*, 2. 3. 1. *π*, 2. 3. 1. *ρ*, 2. 3. 1. *σ*, 2. 3. 1. *τ*, 2. 3. 1. *υ*, 2. 3. 1. *φ*, 2. 3. 1. *χ*, 2. 3. 1. *ψ*, 2. 3. 1. *ω*, 2. 3. 1. *α*, 2. 3. 1. *β*, 2. 3. 1. *γ*, 2. 3. 1. *δ*, 2. 3. 1. *ε*, 2. 3. 1. *ζ*, 2. 3. 1. *η*, 2. 3. 1. *θ*, 2. 3. 1. *ι*, 2. 3. 1. *κ*, 2. 3. 1. *λ*, 2. 3. 1. *μ*, 2. 3. 1. *ν*, 2. 3. 1. *ξ*

- tur, & capitis motui, flexioni extensionique dicato, inferuiunt. Quod spectat *foramina*, ² *unum* habet maximum, rotundum pene, in basi sua inter prædicta capitula situm, per quod ex cranio spinalis medulla ad dorsum descendit. ² *Duo alia* huic adiacent, (secundum inquam, & tertium) inter dicta capita & styloidem processum sita, oblonga, & satis ampla, per quæ ab inferioribus, venæ iugularis internæ ramus maior, & arteriæ carotidis minor, ascendentes, cranium intrant: sextum autè par nervorum totum descendit, & ex caluaria prodit. His vicina sunt, sub ipsis quasi capitulis posita ^b *duo alia*, (quartum, & quintum), quæ rotunda, vix sextam partem amplitudinis prioris obtinent, per quæ nervorum septimum par transitum habet.
- ^c TEMPORVM OSSA, τῶν κρατῶν ὀστέα, ad latera ossium verticis situm suum sunt nacta. Minima sunt ex omnibus caluariæ ossibus, vtrinque vnum, multiplicem figurâ referentia. nam in superiore parte semicirculum ferè effingunt: at inferiore, ob asperas inæqualitates, modo processibus extuberantia, modo foraminibus subsidentia, scopulos horridasq; rupes. ^d Elatiore parte, qua circularia sunt, iunguntur ossium verticis exterioribus lateribus futura squamosa: ^e antè, maxillæ superioris ossi primo processu suo primo: ^f posterius ossi occipitis, futura tertia mendosa. *Substantiam* habent durâ admodum: ^g parte tamen superiore & circulari, tenuem valde, & duplici illa lamina, quam cætera caluariæ ossa habere diximus, destitutam: ^h inferiore vero, quæ ad basim cranii est, eo vsque duram, vt lapideam duritiem vel æmuletur, vel æquet, vnde, & totum propterea os apud Græcos λιθοειδές, lapidiforme dictum est, apud Latinos, Petrosum. *Sinus* habent duos: ⁱ *primus*, inter processum mammillarem, & alterum, iugale os constituens situs est, amplius, rotundus, longusque satis, qui ex lato foramine in angustius intro tendi, cartilagineque incrustatus, πορὸς ἀκουσικὸς, siue *meatus auditorius* dicitur, per quem soni ad interiorem aurem deferuntur. ¹ *Secundus*, primo adiacet, in basi cranii, sub processu primo, iugale os efformante, situs, transversus & oblongus, cartilagineque contextus, qui capitulum maxillæ inferioris excipit.
- Foraminibus* etiam pluribus donantur. ^m *Primum* est in caluariæ interna sede, in processu petroso, figuræ ovalis, longo ductu in os penetrans, vsque ad labyrinthum, quod viam præbet nervo auditorio, siue quintæ coniugationi. ⁿ *Alterum*, satis amplum, inæquale, & oblique antrorsum ductum, sub appendice styloide situm, per quod arteriæ carotidis maior ramus, ad ossis cuneiformis foramen quintum fertur, indeq; cerebrum petit. ^o *Tertium*, inter occipitis & temporis os, quibus commune est, magnum, & inæquale, pro ingressu venæ iugularis, & arteriæ carotidis: at egressu nervi sexti par. ^p *Quartum*, inter processum mammillare, & appendicem styloidem situm, in canalem oblongum terminatur, & arteriam carotidem immittit. ^q *Quintum*, retro processum mammillarem, ad latus transversum futura lambdiformis, per quod ramus primus venæ iugularis externæ cranium ingredientis, transit. Hoc modo in vno, modo in vtroq; latere deesse solet.
- Processus quatuor* sunt. ^r *Primus*, à meatu auditorio, vel anteriore sede sinus capitis maxillæ inferioris, ex lata basi antrorsum fertur, & cum processu ossis primi maxillæ superioris concurrens, futura obliqua necitur, os iugale, de quo postea, constituens, ^s *Alter*, ex lata basi, in posteriore temporalium ossium sede, & capitis fundo, in obtru-

Foramina.

1.

2. 3.

4. 5.

Temporū ossa.

Figura.

Connexio

Substantia.

Sinus duo

1.

2.

Foramina.

1.

2.

3.

4.

5.

Processus.

1.

2.

- obtusam verticem definit, vaccinam exprimens mammillam ob longitudinem, vnde
 3. *μασθηδής*, mammillaris dicitur. ^t *Tertius*, acutus, longus, inter sinum secundum, & di- ^{t, 2. 3. 2. 0}
 ctum modo processum situs, *συλοειδής* dicitur, & *γεωφιοειδής*, quod styli quo scribimus
 4. formam referat. ^t *Quartus* est internus, durissimus, quem os petrosum vocant, in quo ^{t, 1. 2. 6. 8.}
 triplex illa internæ auris cavitates, de qua postea libro vltimo dicemus, continetur. ^{8. 8.}

CAPVT IX.

Describit tria ossicula auditui inservientia.

IN prima auris cavitare, quam Concham vocant dissectionum periti, tria reperiuntur ossicula, miro artificio efformata à Natura, quorum historia, etsi ad eam tractationem pertinere videatur, quæ auditus organis dicabitur: tamen, ne omisisse quicquam in hac ossium enumeratione credamur, paucis de ipsis agere decreuimus hoc loco. Cæterum *ignota* hæc *Veteribus* fuisse nemini mirum videatur, cum & ipsa per se minutissima sint vt faciliè visum effugiant, & in illo durissimo osse, quod à petræ similitudine nomen habet, abscondita lateant. *Recentiorum* tamen *industria*, qui omnes humani corporis partes summa diligentia rimati sunt, eruta & in lucem producta fuerunt. Quæ in re prima palma merito debetur *Ioanni Carpo Bononiensi*, qui princeps Incudem, & Malleolum dicta ossicula in conspectum protulit: altera *Ioanni Philippo Ingrassia*, viro vndequa; eruditissimo, qui tertii, (cognomento stapedis) inuentionem sibi ipsi iure ascribit. Sunt autem numero tria, quæ nomen potius à figura, quàm vsu acceperunt, cum Malleus, Incus, & Stapes dicantur. *Substantiam* habent durissimam iuxta ac densissimam, non minus tamen cauam pro continendâ medullâ. *Magnitudo* autem recens natis infantibus cum adultioribus eadem reperitur, nullaque in re differentiam est cernere, nisi in duritie, propterea quod, veluti cætera ossa omnia, infantibus molliora sunt, ita hæc quoque ossicula perfectam duritiem, abundante adhuc illa humiditate naturali, nondum acceperunt. *Periosio* quoque carent, tamen si alia ossa, vel intus, vt dentes: vel foris, vt reliqua omnia, obtineant. Id quod solerti admodum Natura consilio effecit, ne scilicet ad soni receptionem inepta fierent, cum insonora fiant dura corpora, si molli substantia tegantur, vt puta si quis campanæ pan-num imposuerit.

Malleus. *MALLEVS* ergò, qui primum ossiculum est, ad tympanum, siue membranam primæ cavitati subtenfam, situm habet, ad finem meatus auditorii. Hic ^{u, 2. 7. 1.} capitulo constat ^{D.} crassiusculo, & oblongo, tenui angustaq; inhærens cervici, quod, vti cum incude se-

Processus. cundo ossiculo articuletur, sinum leuem obrinet. *Processus* habet duos ex ceruice erumpentes, quorum ^x superiori, minori, & curuo, chorda tympano subtenfa adhæret: ^y inferiori, membranula toto ductu incumbit. ^{x, F.}
^{y, E.}

Incus. *Alterum* est, *INCUS*, malleo adiacens, capitulo, & duobus cruribus donatum. ^z *Caput* ^{z, G.} enim crassiusculum habet, in cuius vertice levis *cavitas*, quæ malleoli tuberculum excipit: *crura* verò duo habet, ^a alterum quidem longius tenuiusque, stapedis verti- ^{a, I.}
ci alligatum: ^b alterum verò, crassius, breuius, & latiusculum, quod squamoso tempo- ^{b, H.}
rum ossi innititur.

Tertium,

Tertium, STAPES, à forma stapedis nostratis, quam eleganter exprimit, in media Scapes.
 e. L.L. quasi parte primæ cavitatis situm est, ad fenestellam oualem. Constat ex ^c curuo arcu
 d. K. in duo minutissima crura desinente, quæ ^d basi transversæ insistent. In summa sui par-
 e. M. te ^e capitulum habet minutissimum, & rotundum, & arcum quasi medium, cui longius Capitu-
l. 2.
 incudis crus, siue processus, insistit. *Basis* fenestræ ouali, & membranæ illam claudenti Basis.
 apponitur. *Cavitas* autem, quæ in petroso ossè occurrit, ubi de auditus organo verba
 faciemus, describetur à nobis, nunc sufficiat ossiculorum historiam tradidisse.

CAPUT X.

De esse Cuneiformi & Spongioso.

OS S A quæ Caluariæ propria sunt vidimus: nunc reliqua duo, quæ cum maxilla
 superiore communia habet, cuneiforme puta & spongiosum, intueamur. Os cu-
neifor-
me.
 NEIFORME, nomen habet à situ suo, non forma, cum cunei instar cæteris ossibus
 caluariæ, imo omnibus pene capitis & maxillæ superioris, in medio interpositum sit.
 Vnde factum ut eandem appellationem apud Græcos quoque retinuerit, quibus
 σφλωειδές, ὀσίου vocatur: quia tamen ex diuersis constat ossibus, & variam propterea
 formam refert, πολυμορφον etiam, seu *multiforme* dicitur, quamuis ipsæ etiam partes
 postea à propria figura peculiaria nomina sint sortitæ. *Iungitur* anteriori ossi frontis su- Connexio
 tura mendosa quinta: posteriori, occipitis additamento futura quarta: ad latera longo
 ductu comes est temporum ossi petroso, à quo tamen rima aspera disparatur. Superius
 maxillæ superioris primum os, quartum, & sextum attingit: inferius per aliformes pro-
 cessus, palati ossa. Hoc ut varium est, ita *substantiam* quoq; nactum *variā* & inæqualē. Substan-
tia.
 nam ad latera & temporum caua, tenue, sed admodum densum & solidum est: in me-
 dio autem, ubi capitis basin constituit, crassum, imò omnium capitis ossium crassissi-
 mum, non tamen solidum, sed cavitatem conficiens similem duabus cavitatibus, quas
 in superciliorum elatiore sede, ad nasi verticem, & frontis basin effingi diximus, ne
 caput temere aggrauet. *Processibus* donatur, & in interna caluariæ parte & in externa. Proce-
sus.
 f. 2. f. 1. In *interna* quidem, ^f duobus anteriore sede positus, ex lata basi in acutum mucronem de-
 G.G. sinentibus, & *aliis* ^g duobus posteriore regione sitis, quadratis pænè, ad latera in plerisq;
 g. H. H. extuberantibus, qui cum ossis crassam partem cingant, ephippio non absimilem, *Sella*
 h. 2. f. 2. *Turcica* à forma dicuntur. *Extra caluariam* similiter duplex processus est, ^h *anterior* qui
 K.K. dem vtrinque vnus, ad latera foraminum in narium amplitudinem dehiscens, Interni.
 i. M. M. qui à forma vespertilionum alis simili, *περὶ γοειδῆς* dicti, *processus aliformes*: ⁱ *posterior* si-
 ii. c. d. militer duos, à dictis nati, ⁱⁱ duobus apicibus versus styloidem processum extuberan-
 tes, quorum anterior obtusus & parvus, posterior longus & acutus est. Sunt etiam Externi.
 l. 2. f. 1. I. *Sinus* plures huic ossi. ^l in *sella* quidem medio quadratus, latusque, glandulam pituitariam Sinus.
 detinens, cui à cerebro mucosa excrementa destillantia transmittuntur, à quo
 m. K.K. postea quatuor alii deducuntur, oblongi, qui pituitam ad inferiores partes à glandula
 deriuant. ^m *Duo anteriores*, ad secundum foramen in oculi sedis radice positum, per
 quod nervi motorii oculi ingrediuntur orbitam, excurrunt, & pituitam ad oculi pin-
 guedinem, musculorum humectandorum gratia ferunt, ne scilicet in nimio copti-
 G nuoque

nuoque motu exsiccentur, à qua postea per glandulam in maiori oculi angulo positam ad nares transmittitur: ^a *Duo posteriores*, ad inæquale, & asperum foramen, quantum ⁿ, L. L.
 3. sphenoidis, extenduntur, per quod pituita ori & palato potissimum influit. ^o Est &
 4. *sinus insignis* in processibus aliformibus, qui sedem tutam præstat musculis in ore latitantibus. Hic profundus est longusque. *Foramina* plura obtinuit, quorum *Primum* iuxta processum anteriores sellam constituentes, circulare est, pro nervorum opticorum ^p, M. & 2.
 1. in orbitam ingressu. ^q *Secundum*, huic subiaccens ibidem, quod ex inferiore parte rotundum, mox sursum abit, longamque ^q *rimam* efformat, quæ nervos secundi paris ^q, N. & 2.
 2. oculorum motui dicatos, tum tertium nervorum cerebri par transmittit. Per idem ³, L.
 foramen insignis quidam ramus arteriæ carotidis ad oculos abit; tandem pituita, & humiditates cerebri in glandula collectæ, vnde lacrymæ fiunt. Per elatiorem autem ^q, 2. 3. 2. m.
 3. sedem Vena ex oculi sede crassæ cerebri membranæ distribuitur. ^r *Tertium* ad latus prædicti externum, paruum, sed exacte rotundum, per quod quarti nervorum paris ², 5. 1. O.
 4. ramus primus, ad temporales, & in ore latitantes musculos porrigitur. ^f *Quartum*, in externo latere orbitæ oculi, quod oblongum est maximumque, timã potius, quam foramen exprimens, cum antèrius latius sit, posterius circa oculi radicem tenuius. Per hoc ramus quartus tertii paris, & primus quarti nervorum cerebri, in temporales musculos distribuuntur, & pituita oculi orbitam per secundum foramen ingressa, ad fauces elabitur. ^t *Quintum*, longum & asperum, sub finem sinus posterioris sellæ turcicæ, ^t, 2. 5. 1. P.
 5. per quod arteriæ carotidis maior ramus in caput ascendit, ^u *Sextum*, ad huius externum ^u, Q. Q.
 6. latus, longum, ellipsin figuram, siue ovalem referens, quartum nervorum cerebri par transmittens. ^x *Septimum*, à posteriore prædicti sede situm, exiguum admodum, & exacte rotundum, pro venæ iugularis internæ ramo secundo & minore, qui in crassâ meningis substantiam ingreditur, & cuius vestigia in syncipitis ossibus apparent. ^x, R. R.

Os cribriforme Alterum commune calvariæ os, ab aliis, qui cribro cõferebant (ob foramina nullo ordine disposita, quibus cribrum ritu pertusum est) *ἰσθμοειδὲς*, **CRIBRIFORME** & **CRIBROSUM** dicitur: aliis, qui spongiæ comparare maluerunt, quod foramina dicta anfractuosa, non directæ cernerent, *σπογγιοειδὲς*, & *os Spongiosum* appellatur. Os hoc vnum non est, sed multiplex, diuersæ substantiæ, formæ, & situs. ^y *Prima pars*, os est, quadratum altera parte longius referens, à quo totum postea nomen accepit, in anteriore, sed interna calvariæ parte situm, cribrum in modum tortuosis foraminibus perforatum, & tenuissima membrana similiter perforata obtectum, per quæ odores ad cerebrum penetrant. His obstructis à pituita huc effusa, Gravedo oritur, hybèrni temporis in locis frigidioribus commune admodum malum. ^z *Alterà* est, processus in huius medio, longus & triangularis, apicem acutum in supèrmitate habens substantiæ solidæ, qui totam primam partem in duas distinguit, & à forma cristæ galli quam refert, *Crista* communiter appellatur. Huic è directo opponitur inferiori in sede ^a *pars tertia* quæ os tenue est, sed durum tamen, sursum ad olfactus foramina, deorsum ad nares tendens & sic totam narium amplitudinem ac odoratus organa bifariam, in dextram sinistramque partem distinguit. *Quarta*, spongiæ similis est, multis cauernulis prædita, vnde & totum os Spongiosum dictum.

Vfus. Huius ossis ut partes diuersæ sunt, ita quoque *usus* varii. *Prima pars*, aëri odore imprægnata

prægnato, ad cerebrum aspiranti, viam concedit, quæ ut tutior sit, anfractuosa facta est, ne cerebrum qualitate aëris nimium frigida lædatur, sed prius ab osse attemperetur. In catarrhis quoque, pituitæ & cerebri excrementis viam largitur, quamvis id non secundum naturam fiat, cum prouida Parens odoribus potius quam cerebri inquinamenti illam viam destinaret. Copia enim magna, obstructis præsertim legitimis viis, ipsa sibi viam parit, & quacunq; datur exitus nouum iter adornat. *Secunda*, seu galli crista, falci substernitur, & sinui tertio duræ meningis tutam sedem, cui connascatur, donat. *Tertia*, nasum distinguit, ut cum cæteris sensibus duplicia organa odoratus habeat. *Vltima* tandem sensim destillantia cerebri excrementa suscipit colligitque, ne ruentia impetuose & continue ex naribus, fæde sapientissimi animalis vitam contaminent.

CAPVT XI.

Agit de osse Iugali.

OSIUGALE, Græcis οὐγγυδης ὀστῶν dicitur, quod iugi instar, maxillæ superioris lateribus vtrinq; affirmetur. Os vnum non est, sed ex duobus constat, nec tamen, ut reliqua Caluariæ ossa, propriam circumscriptionem obtinet, ut separari à cæteris queat: sed aliis continuum, cum ossa ex quibus conflatur, aliorum sint processus, mediante futura sibi connexi. *Altera* enim pars & *b posterior*, processus est ossis temporum iuxta meatum auditorium, anteriore sede situs: *c altera* vero *antica*, processus maxillæ superioris ossis primi, minorem oculi angulum constituentis. Hæ duæ apophyses, quarum illa anteriora, hæc posteriora petit, in medio *d futura* obliqua connectuntur, & os Iugale efformant. Ex quo, vel nemine monente, statim situs huius ossis se prodit & manifestus est, nempe ad latus vtrumq; faciei, inter meatum auditorium, & primum maxillæ os. Latum alias est, sed subtile: durum tamen, ac fere solidum, nisi cauernulas contineret medulliferas, pro sui nutritione. Firmamentum, & quasi propugnaculum præbet tendini temporalis muscoli, quem complectitur, ut tuto ad processum inferioris maxillæ, cui inferitur, properet. Stabilimentum etiam aliorum musculorum est, maximè tertii paris maxillæ inferioris, quod *μωωντις* vocatur, quod ad manducationem imprimis conferat.

CAPVT XII.

Ossium Faciei, siue Maxilla superioris, & inferioris, descriptionem tradit.

FACIEM bifariam diuidimus, in maxillam superiorem, & inferiorem. *Superior* *MAXILLA*, ἡ ἄνω γένυς; à nobis vocatur, quidquid præter enarrata ossa in cranio superiore continetur, adeoque illa faciei pars ossea, quæ inferiorem oculorum sedem & latera, nasi partem osseam, malas, & palatum, dentium denique superiorum seriem constituit. *Substantia* est osseæ, non tamen exactè duræ solidæque, sed quæ pumicis in modum cauernulis medulla plenis conf-

Connexio

conficitur: inæqualis etiam, cum alibi partes tenuiores, alibi crassiores obtineat, & sic modo durior, modo mollior sit. Quocirca, & solers Natura non ex vno osse, sed ex diuersis condidit, ne scilicet, cum inter se substantiæ ratione differentiam requirerēt, importune continua essent. *Coniunxit* autem tum inter se, tum cum aliis conterminis ossibus capitis, puta caluariæ, & sphenoidis, harmonia potius, quàm futura, si externā faciem respicias: futura autem, quam harmonia, si internam. Has enim compages, si accurate consideres, forinsecus harmoniæ videbuntur, & quandam lineam efformare: at si effringantur, mutuū quendam intus contextum referunt futuris non abssimilem. Sunt autem duplices, aliæ communes caluariæ cum ossibus maxillæ superioris, quarum quinque sunt, iam superius enarratæ, vbi de futuris egimus: aliæ propriæ maxillæ ossibus, nouem numero, de quibus nunc dicendum. nam harum beneficio, vt ossa disternantur, ita quoq; earum descriptio tradenda est.

Sutura
propria
maxillæ
superio-
ris.

1. ^c *Prima* ergo in oculi orbita initium ducens in media sede inferioris partis, oblique ac fere circulari progressu deorsum ad latus externum ossis malæ protrahitur, indeq; per temporum caua. ^d *Secunda*, in ipsa orbita est, & latere eius interno, anteriore sede, circularis, & oblonga, quæ totum secundum maxillæ superioris os ambit. ^e *Tertia*, in eadem orbita est, inque eodem latere, sed sede inferiore, ab ossis cuneiformis futura communi secunda recta ad faciei anteriora ducitur, & in dicta secunda futura terminatur. ^f *Quarta*, in nasi dorso est, à superciliū interstitio per nasi longitudinem osseam totam delata, quintum os bifariam diuidens. ^g *Quinta*, ad nasi latus exterius quartæ toto ductu socia est & comes, à futura communi tertia, recta deorsum secundum ossis quinti longitudinem protensa ad vsque nasi partem cartilagineam. ^h *Sexta*, in palato est, per cuius partem posteriorem transuersum ducitur. ⁱ *Septima*, in eodem est, sed secundum longitudinem eius totam excurrens, à posterioribus antrum. ^j *Octaua*, in interna faciei sede est, in ipsa narium amplitudine, septo cum quinto osse communis. ^k *Nona*, eidem septo cum quarto, & sexto maxillæ communis est. Ex his futuris quædam simplices sunt, vt quarta, sexta, septima, octaua, & nona: quædam duplices, in utroque latere occurrentes, vt reliquæ, puta prima, secunda, tertia, & quinta. Atque hæc sunt futuræ, quæ ossa maxillæ superioris diuidunt, quorum numerus, etsi apud Authores variet, aliis vndecim, aliis duodecim ponentibus: nos tamen cum doctissimis Anatomicis duodecim statuemus, adeo, vt sex sint paria ossium in vniuersum.

Ossa maxillæ superioris. ^l *Primum*, quod externum oculi angulum efformat, & rotundam illam extuberantiam, Hippocrati *κάλον πρὸς ὄπτα*, faciei circulum appellatam, durum satis ac solidū. Superius iungitur ossis frontis processui externo, in cauda superciliū, futura communi prima; inferius, cum quarto maxillæ futura prima propria; posterius, sphenoidi, futura communi secunda; & tandem processu suo, cum processu ossis temporum ad latera capitis, vbi os iugale conficit futura communi quarta.

2. ^m *Secundum*, in oculi maiore, & interno angulo consistit, estque ossium maxillæ superioris minimum, rotundum, tenuis squamæ instar, cui caruncula lachrymalis innititur, quam propter ⁿ foramen etiam inferiore ex parte habet satis insigne, in nasi amplitudinem dehiscens, vt mucum excrementaq; cerebri, ad pinguedinem oculi transmissa,

misla, per nares expurget. Per hoc idem ramus tertius tertii nervorum cerebri paris in narium amplitudinem, ad tunicam hanc succingentem, transmittitur. Iungitur elatiore sede ossi frontis futura communi tertia; depresso & anteriore, cum quarto maxillæ; posteriore, cum sequente.

s. V. ° *Tertium* par, substantiæ quidem solidæ ac duræ est, æquè tamen ac secundum tenuem, nisi quod amplis intus sinibus aëre plenis scatet. Figuram exprimit quadranguli, altera parte longioris. Nectitur quatuor ossibus; superius, ossi frontis futura communi tertia; inferius, quarto maxillæ futura propria tertia; antè, secundo maxillæ futura propria secunda; posterius, cuneiformi, communi tertia.

p. X. X. P. *Quartum* omnium maximum est, & crassissimum, non tamen æquè densum, sed intus refertum cauernulis infinitis medulliferis, maximam faciei partem constituens, maximeq; genam superiorem, qua causa à Galeno 11. V. s. part. 19. Os Malæ nuncupatur. Hoc superiores dentes omnes complectitur, mystacem constituit, narium foramina, deniq; omnia fere quæ ad superiorem faciei partem pertinere videntur, quocirca & pluribus (quam vllum ex maxillæ) ossibus committitur. Superius quidem iuxta nasum, ossi frontis, sed breui ductu, futura communi tertia; inferius, cum cuneiformi futura communi secunda; antè, secundo in oculi angulo interno futura propria secunda; posterius, cum tertio futura propria tertia, & tandem cum suo compari futura propria septima. *Foramina* quoq; habet notatu dignissima. 1. *primum*, duo circa orbitæ oculi sedem inferiorem, quorum alterum in ipsa orbita est, alterum foris, per quod ramus secundus, tertii nervorum cerebri paris, ad faciei musculos excurrit.

q. Y. Y. 2. *Dein*, vnum in palati anteriore parte, retrò duos medios incisivos, in ipsa diuisione ossis palati, siue futura propria septima, per quod ex palato in narium amplitudinem venula atq; arteriola vna cum tunica palatum succingente transmittitur.

f. 2. 3. 2. Z. Z. ° *Quintum* est formæ quadrangulæ, oblongum, durum, mediocriter crassum, cum suo pari nasi osseam partem constituens. Superius annectitur frontis processui interno, portiuicula futuræ communis tertiæ; inferius, futuram quidem non habet, sed asperum admodum & inæquale existit, & cum cartilaginibus nasi committitur; antè, cum suo coniuge, futura quarta propria; posterius, cum quarto futura quinta.

z. 2. 5. 2. F. F. ° *Sextum*, cum suo pari palatum efformat, & narium amplitudinis posteriorem partem, antè, semicirculum, posterius rectam ferè lineam exprimit. Ex his iam patet, quot & quæ ossa sint, ex quibus oculi orbita conficitur. Alia enim ad frontem, alia ad sphenoides os pertinent, alia ad maxillam superiorem. Ad frontis os vnum pertinet, quod superiorem oculi partem constituit: ad cuneiforme vnum, in externo latere, posteriore sede, positum. Quatuor ad maxillam superiorem, sicut os primum, secundum, tertium, & portio quarti. Primum exterius latus cum dicto sphenoidis efficit: sed hoc anteriorem, illud posteriorem partem. Secundum, & tertium, interius latus: quartum, inferiorem partem. Ex quo fit, vt tota orbita ex sex ossibus constetur, quorum figura & substantia qualis sit, ex dictis satis manifestum est.

Altera faciei pars, MAXILLA INFERIOR est, quæ homini inter cætera animalia, Maxilla sola simia excepta, breuissima est, vt cui manus obtigere, quarum beneficio cibum ori appor- inferior.

li homini rotunda , vt maiestas illa diuinitatis , faciei impressa , splendidius eluceat , & pulchritudine sit commendabilior. Habet tandem & hoc peculiare , quod cum cæteris animantibus plarîsq; omnibus ex duobus ossibus per symphyfin iunctis , constet , homini (siquidem ad ætatem iustam peruenerit) simplex sit , & ex vnico confletur. Dico , cum ad iustam ætatem succreuerit , quod infantibus bifida sit , & cartilagine copiosa in medio mento iungatur : at in adultis ita coalescat , vt nullo modo , ne cõctione quidem separari queat , quæ aliorum animantium maxillam facillimo nego-

Mobilis. tio diuidit. *Mobilis* est ciborum gratia, qui motu eius ad masticandum indigent, tum in accipiendo, tum in mandendo cibo. Quocirca & cum superiore eiusmodi articulo commissa est, qui ad motum euidentem aptissimus esse possit, vt postea dicetur.

Dura. quo in officio communi societate æquâ vtraque maxilla conspiret. *Dura* quoque propterea est, non tamen ita, vt vbiq; solida sit, cum pondere suo incommodare pos-

Crassa. ſet: verum ſinibus cauernuliſque medulliferis reſerta. *Crassa* eſt, dentium recipien-
dorum gratia, quem uſum ipſa quaſi Natura docere videtur, cum edentulis ma-
xillam attenuat. Nam dum dentium ſeriem ſenibus ætas longa abſtulerit, crasſities
quoque maxillæ adimitur, atque aboletur. *Figura* arcum pulchre reſert, niſi quòd po-

Proceſſus. ſteriore ſedē attollatur, & bicornis duos vtrinque *Proceſſus* altos exigat, quorum ¹ *an-* 11, 2, 7. fig. 2. 3. 4.

I. *verticem protuberat, os iugale subit, tendinque validissimo musculi primi ma-* A. A.

2. xillæ inferioris, siue temporalis, sedem accommodat. ^x Posterior, ceruicē insigni ^x, B.B. erectum ^y capitulum transversum & longum efformat, quod in sinum secundum ^y, a. a.

offitemporum inſculptum adaptatur, cartilagine incruſtatum. Interponitur au-
tem inter caput & ſinum alia quoque præter hanc cartilago, lævis atque mollis, quæ
non tantum ligamenti officio fungitur, vt proceſſum in ſinu ſuo contineat: ſed etiam
motum lubricum admodum reddit, adeo, vt aptiſſimus & valiſſimus fiat articulus,
qui non ambulationi, non apprehenſioni, ſed vitæ uſui maximè neceſſario inſtitutus.

Foramina. erat. Foramina habet ^z duo, vtrinque vnum in superficie interna, ad proceſſum dicto- ^z b. b. rum fundamenta & origines, quæ per oſſoſtea ad anteriora penetrant longiſſimo

I. ductu, & in externæ superficiæ foraminibus desinunt. Per hæc tertius ramus quarti nervorum cerebri paris, cum venulâ & arteriâ ad dentium cavitates perfertur. Du-

2. ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p ^q ^r ^s ^t ^u ^v ^w ^x ^y ^z ^{aa} ^{bb} ^{cc} ^{dd} ^{ee} ^{ff} ^{gg} ^{hh} ⁱⁱ ^{jj} ^{kk} ^{ll} ^{mm} ⁿⁿ ^{oo} ^{pp} ^{qq} ^{rr} ^{ss} ^{tt} ^{uu} ^{vv} ^{ww} ^{xx} ^{yy} ^{zz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk} ^{lll} ^{mmm} ⁿⁿⁿ ^{ooo} ^{ppp} ^{qqq} ^{rrr} ^{sss} ^{ttt} ^{uuu} ^{vvv} ^{www} ^{xxx} ^{yyy} ^{zzz} ^{aaa} ^{bbb} ^{ccc} ^{ddd} ^{eee} ^{fff} ^{ggg} ^{hhh} ⁱⁱⁱ ^{jjj} ^{kkk}

Asperitates. catam deferuntur. Sunt etiam *asperitates* quædam in maxilla occurrentes diligenter notandæ, musculorum gratia, cum vel caput ibi, vel tendo inferatur. ^b Prima est in an- b, d. d.

1. teriore ossis & exteriorē parte, qua mento subest, vbi vtrinque ad latera extuberat,
2. pro capitibus tertii paris labiorum, quod Deprimens inferioris labii vocabimus. *c* *Al-* *c*, *c*.

3. *terta*, in eadem anteriore parte, sed sede interna leuior asperitas, vbi inferitur tendo secundiparis maxillam deprimentis. *d* *Tertia* tandem, in latere interno, sed postrema *d*, *f. f.* parte, sub capitulo maxillæ, iuxta sinum, per quem neruus ingreditur cum cæteris vasis, vt efformet sedem tutam tendini quinti paris proprii, quem maxillæ Adductorem vocabimus.

Præter

Præter hæc iam enarrata foramina, notandæ veniunt *Cavitates* vtriusq; maxillæ marginis, quas vulgo dentium alueolos, & præsepiola Anatomici periti vocare consueverunt. Dentium enim continendorum gratia factæ sunt, quibus numero & figura sic exacte respondent, vt neq; hanc, neq; illum proprium habeant, sed detibus correspondentem. Tot enim caua sunt, quot dentes, cum quilibet primum erumpens, sibi proprium ac peculiare condant præsepiolum; concidens etiam secum vna alueolum suum perdat, ita vt ne vestigium quidem maneat reliquū, donec (si forte) nouus subeat, qui propriam postea sedem domiciliumq; (vt ita dicam) sibi omnibus modis respondens præparet, & efformet. Hoc autem formam dentis in cunctis sic æmulator, adeoq; exacte vndiq; cingit, & adhæret, vt neq; laxius vacillantem, neq; angustius infirmum reddat, sed æquā interualli proportionem denti adaptetur.

CAPVT XIII.

Dentium numerum, historiamq; proponit.

DENTES ergo sic siti sunt, nempe in alueolis marginum vtriusque maxillæ, siue, vt Galenus loquitur, lib. de oss. ad Tyr. ἐν τοῖς τῶν φαρυγγίων στομαχίοις. *Articulantur* autem certo, nec alteri ossi communi nexu, quem γόμφωσιν Græci, quas didicas Conclauationem, appellant, quod instar clauorum maxillis sint inserti, quanquam pro diuerso, quo adaptantur modo, diuersas etiam alias articulationum species conficere videantur. Nam *ratione nerui*, qui ipsis insitus, malis affirmat, stabilitatemque largitur, synneurosin efficere parent; *ratione gingivarum*, quibus veluti obvallantur, syssarcosin generare putantur. Notandum tamen hoc diligenter, obseruatum à me esse, dentium (præsertim incisorum caninorumque) radices quibus alueolis infiguntur, nonnunquam curua acutius præsepiolis suis infigi, quo fit vt plurimum roboris ipsa articulatio nanciscatur, sed admodum periculose ipsi postea dentes euellantur, cum cedere nequeant, nisi pars quædam vna de ipso alueolo auferatur, quod tamen sine grauissimis symptomatibus fieri vix potest. *Substantiam* duram habent solidamque, imo ossium fere omnium durissimam, cum diutissime flammam incremabiles sustineant. Hæc durities stabilimenti loco inseruit, ne inter mandendum atterantur, quanquam ne sic quidem satis firmi sint, cum semper ex continuo vsu illis aliquid decedat, quod satis manifeste in illis apparet, quibus dens aliquis excidit, cum oppositus semper reliquis eminere videatur, cuius rei causa non est alia, quam quia, vt cæteri, coniuge destitutus, non atteratur. *Figuram* autem singuli acceperunt clauui, cum omnes parte qua eminent extra alueolos, nonnihil lati ac rotundi: posterius qua infiguntur, longi & acuti sint. Non tamen omnes eandem figuram obtinent, & hanc quam diximus, sed ratione vsus sui admodum discrepant, vt postea dicturifumus, dum singularum specierum enumerationem historiamque instituemus.

z. 7. f.
C.

Cauitatem quoque habent singuli intus, eamque satis insignem conspicuamque, non quidem vbique, sed iuxta radicem, substantia quadam membranulam æmulante succinctam, quam etiam dissectionum professores membranam indigetant, & cuius ratione dentes ipsi exquisitissimum sensum obtinere, quod periostii vicē subeat.

Differt

Dentes.
Articulatio dentium.

Obseruatio.

Substantia.

Figura.

Cavitates.

Differt tamen magnitudo huius cavitatis, tum ratione dentium ipsorum, qui maiores sunt, minoresve: tum ratione ætatis, cum in puerulis ad septimum vsque annum, ampla satis sit cavitas, tenui quadam squama apum fauis simili circumsepta, atque albo quodam humore, velut muco, oppleta: at in adultis, resiccato hoc, tota cavitas in angustum sinum coeat. *Vasa* habent omnis generis, venas, arterias, & nervos, à quibus tum nutrimentum, tum vitam, ac sensum accipiunt, quo ita acuto pollent, vt vix pars nostri corporis inueniatur, quæ læsa maleque affecta, maiores cruciatus, ac dentes ipsi, possit infligere. *Nutriti* autem debebant, cum semper atterantur; *viuere*, vt nutriantur; sentire, vt expositi multis iniuriis in loco externo, fugere noxia facilius queant. A primis enim qualitatibus, calore & frigore, admodum læduntur, & propterea eas ferè solas quoq; percipiunt: Secundas, sine sensu & noxa perferunt tuto, sustinentq; Non duritie premuntur, non limâ læduntur: at leui frigore tacti stupeſcunt, leui calore affecti, impenſe dolent. Ineptum autem est, quod Aretæus prodidit, solos Deos esse qui norint, cur ab illis, quàm ab his potius lædantur, cum causa cuius satis in promptu esse videatur. Dentes enim non ipsi per se sentiunt, sed membrana illa est, quæ ipsa, & propter quam illi sentiunt, in penitioribus dentium sinibus abdita. Ergò, cum nec durities, neque mollities, nec lima, neq; ferrum ad ipsam membranam penetret, innoxia illa manet: at calor frigusque, dente calefacto aut refrigerato, ad ipsam membranam successiue tandem penetrat, & quia membrana frigidiusculum nacta est temperamentum, fit, vt celerius à frigore quoque, atq; à calore afficiatur. Cæterum *venas* habent à iugularibus; *arterias*, à carotidibus; *nervos molles*, à tertio neruorum cerebri coniugio *propagatos*. Hæc vasa cum primaria sint, mirum profecto non est, si corpus, primum dentibus erumpentibus, tam misere afficiatur, alui profluuiis, febribus, & conuulsionibus, tractis in consensum partibus principibus, hepate, corde, & cerebro. *Superficies* candida est, nitida, ac æqualis, si quidem Naturæ leges obseruent: sin; nigra, inæqualis, crassaq; materia septa, tartaro vini doliis adhærescenti non absimilis. *Magnitudo* moderata est, cum homo ad manluetum contubernium natus, exertis, instar apri, dentibus non indiguerit. Nec tamē omnes æquales sunt; sed incisores minores, maiores canini, maximi molares, & inter hos, posteriores. *Numero* communiter in vtraq; maxilla sunt sedecim: variat tamen ratione indiuidui sæpe, at nō vt Aristoteles censebat, ratione sexus. Diuerſitas autem hæc in molaribus est, qui modo plures sunt, modò pauciores, raroque admodum debitum numerum explent. Physiognomis dentium numerus absolutus laudatur, cum & robur facultatis generatricis, & copiam materiæ sufficientem ostendat, quæ duo plurimum ad sanitatis vsuram conducere censentur. Sunt autem dentes triplices, ratione tum figuræ, tum vsus: obtinuit tamen consuetudo, vt ab vsu potius quam à figura appellationem habeant, sicq; Incisores, Canini, Molaresq; vocantur.

Incisores f INCISORES, à Græcis quoque *πρῆεις*, eadem notatione dicti, quatuor sunt, in 8 v- f, 3.2.1. traque maxilla siti anteriore parte, vnde & *πρῆεις* nominantur, qui figuram, qua se- & 2. item de gingiuis eminent, acutam habent. *Vsus* enim ipsorum est, ingestum ori cibum inci- 2.7. fig. dere, inque partes diuidere, quas molares facilius comminuant. h CANINI, *κνω-* 2.3. & 4. δῆντες, sunt duo, vtrinq; vnus, extremis incisorebus, tanquam socii adstantes. *Figura*, g, g, g, g h, h, h. inciso-

incisorum figuræ non admodum dissimilis est, nisi quod extremitate sua acutiores non nihil, cæteris quoque dentibus emineant. Horum *munus* est, vt loco, ita auxilio ad-
stare incisoribus: & si quid duriusculum fuerit, quod ab illis diuidi nequierat, ab his
frangatur, & dirimatur. Vsum hunc in nobismetipsis facile aduertemus, si nuces, ossa,
aliaq; solida, non incisoribus, sed caninis frangere nos attenderimus, edocti hoc ab
ipsa quasi Natura officium. Vocantur etiam *Oculares* à vulgo, quod eos ab oculo depē-
dere putat, cum euulsis ipsis oculorum actiones lædi videt, sed alia id ratione accidit,
quæ docet Anatomica inspectio, quæ testatur, nervorum oculis mouentium portio-
nem in hos deferri. *Radices*, vt prædicti incisores, habent singulas, robustiores tamen,
i. i. i. i. altiusq; infixas. *MOLARES*, *μῦλοι*, & *μυλῖται* dicti, quod veluti molis cibus ab ipsis atter- Molares.
ratur, loco sunt postremi, in buccarum cauitate occulti. *Numero*, si adsint omnes, quin-
que, vtrinque, ad latera caninorum, consistentes, vt sic omnes in vniuersum, si vtriusq;
maxillæ numerum requiras, viginti conficiant. Non tamen omni ætate omnes adsunt;
vt plurimum quidem quatuor illi, caninis proximi, & iunioribus adsunt: at vltimi
duo, adultioribus solum, vnde & *σωφρονιστῆρες* Hippocrati dicti, quod non erumpant
prius, atq; homo sapientiæ studio idoneus euaserit. Latinis propterea Sapientiæ den-
tes nuncupati: aliis, vt vulgò, Genuini dicti. Atque hi in causa sunt, vt inter se Authores
varient in numero dentibus assignando, aliufque alio plures, vel pauciores, enumeret.
Modo enim videre liceat in hoc latere quatuor, in alio quinque; modo in superiore
maxilla omnes adesse, modo in inferiore quosdam deficere. *Figuram* habent à cæteris
paululum discrepantem, cum enim illi acuti sint, hi latam habent superficiem & inæ-
qualem, quatuor acutis eminentiis exasperatam, quas inter foveola quædam occur-
rit, ab ipsarum concursu enata. Quare & pars extra gingiuas producta, non, velut reli-
quorum, acuta, sed quadrata est, quæ perfectior in tribus posterioribus, adeo, vt hac
causa à Ruffo Ephesio, *τετραπύζων*, *Mense* appellentur, quas non ineleganter videntur
exprimere, tum lata hac superficie, tum triplici radice, cui hæc incumbit, cum & no-
stræ mensæ cuidam radici semper internantur. *Radices* autem non simplices habent,
vt reliqui iam enarrati, sed plures, in quarum numero quædam occurrit discrepantia,
tum ratione maxillæ, tum etiam dentium inter se. Et inter se quidem, cum proximi ca-
ninis, habeant pauciores; plures, tres posteriores: at ratione maxillæ, cum duo supe-
rioris maxillæ, caninis proximi communiter binis, reliqui extremi ternis radicibus affi-
gantur; at inferioris maxillæ illi singulas habeant; hi, binas. Sunt etiam superioris den-
tes, maioribus radicibus præditi, vt ita satis clarè pateat, & numero, ac magnitudine
ab istis, inferioris maxillæ differre. Id quod non temere, sed prouido NATURA fecit con-
silio, cum illi, qui penduli futuri erant, firmamentum fidelius requirerent: hi, suo pon-
dere satis muniti, onus superuacuum respuerent. Ex his nemini obscurum esse potest,
quem *vsus* dentes præstent corpori. Nam masticando, cibos ventriculo præparant, *Vsus den-*
vt ipsius in chylum conuersio sit faciliior. Hos diuidunt Incisores; frangunt, Canini; *tium.*
*com-*minuunt Molares, & molæ intar in minimas partes diuidunt. hinc *lati* facti sunt, vt ex-
cipiant facilius, retineantq; fidelius; *asper*i autem vt comminuant perfectius. Sic enim
& molares lapides ferreis malleis exasperari videmus, cum nihil æquali superficie
præstent.

CAPVT XIV.

Ossis hyoidis historiam tradit.

SVB maxilla inferiore, in elatissima laryngis parte, ^los continetur, quod vnitatis no- ^{l. 2. 7. 6.}
 mine exprimitur, & à similitudine quam habet cum litera Græcorum υ, ὑψιλοει- ^{7. 6. 8.}
 δēs, & contracte υοειδēs; aut cum Δ, λαμβδοειδēs dicitur. Meo tamen iudicio rectius
 comparari figura eius cum inferiore maxilla poterit, quod anterius sinuosum,
 posterius cornua, veluti processus longos educit. Sunt nonnulli Veterum, qui φ-
 εγγετρον vocauerē, vel, quia faucibus subseruiat velut basis; vel, quia laryngi sub-
 sternatur, quem nonnulli φάρυγγα vocauerē. Os tamen hoc vnum nō est, sed multiplex,
 & ex pluribus conflatum, magnaue ex parte in *Viris* adultæ ætatis, ex vndecim const-
 stat: in *Mulieribus*, expaucioribus, nonnunquam etiam extribus tantum componitur.

Primum
os hyoidis. ^m Primum os, quod in medio consistit duorum lateralium, maiusque est, ac latius ^{m, A. E.}
 ipsis, etsi paulò breuius, exterius, siue ⁿ parte anteriore, conuexum est, & in obtusum ^{n, a.}
 angulum terminatur, at ^o interius, concavum. Sinus habet, P vnum in elatiore regione ^{o, D.}
 transuersum & depressum, vt primum sibi dicatorem musculorum, siue attollens par, ^{p, C.}
 excipiat: q̄ duos alios in parte inferiore, vtrinque vnum, quibus secundum, detrahens ^{q, c.}

Secundū
os. ^c *tertium* par, inseritur. Hoc basin ossis hyoidis inferius in musculorum historia vocabimus. Ex
 huius ^l lateribus *duo alia* ^f ossa secundum scilicet, *& tertium* educuntur, quæ humiliora ^{r, G. G.}
 hyoidis latera dicemus, (alii *Cornua* appellant) & cartilagine, ac ligamento cartilagi- ^{f, E. F.}
 neo satis lato, firmiter sibi iunguntur. Habet & alios, ^t duos processus superiora latera di- ^{t, I. K.}

Quartū,
& quin-
tum os. Etos, quod ex superioribus & lateralibus partibus prodeant, qui *quartum*, & *quintum* os
 faciunt, teretes sunt & graciles, quibus postea ^u alia tria officula vt plurimum adduntur, ^{u. L. M. N.}
 & ossium horum numerus vndenarius absoluitur. * *Connectuntur* hæc ossa cum parti- ^{x, 4. 2. 3.}
bus adiacentibus, puta maxilla inferiore, sterno, scapulis, appendice styloide, lingua, la-
 ryngis thyroide cartilagine, œsophago. Connexio autem hæc non vno fit modo, sed

partim per eam vnionis speciem, quæ συσάγκωσις dicitur, & fit interuentu carnis: par-
 tim per illam, quæ συνύγωσις, vel συνύμενσις, vt nos priuato nomine & strictiore appel-
 lauimus, si quidem liceat eas etiam huc voces trahere, quæ ossibus alias proprio quasi
 iure competere videntur. Primum enim os, linguæ fundamenti instar substernitur, quo
 nomine & *basis linguæ* dicitur, quod huius elatiori sedi lingua innitatur, cum reliqua ca-
 uitas hyoidis epiglottidem excipiat: inferior sedes, vna cum secundo & tercio officulo,
 toto ductu quatuor validis ligamentis laryngis scutiformi cartilagini adnectitur, at hæc
 tandem extremitatibus suis eiusdem processibus committuntur. Reliqua officula toti-
 dem ligamentis appendici styloidi iunguntur. Quamobrem qui explorare manu in vi-
 uente etiam homine officulum hoc voluerit, illi promptè se offeret primum illud à
 nobis descriptum, quod cæteris grandius est, si digitos paululum supra laryngem gut-
 turi iniiciat: reliqua lateralia, fere in intimioribus partibus latitant, nec sese tactui pro-
 dant. Cæterum quomodo reliquis partibus, quas enarrauimus, vt sterno, œsophago,
 aliisque, musculorum interuentu connectatur, dicetur eo loco commodius, quo eius
 musculorum historia à nobis tradetur. *Facit hoc os* plurimum ad detinendum meatum
 fauci-

faucium ea forma, qua ipsum os est apertum, tum vt commodè cibis per œsophagum quando comedimus descendat, tum vt aer in asperam arteriam, dum respiramus, & loquimur, per laryngem transferatur.

CAPVT XV.

Describit Clauiculas.

CLAVICVLÆ, *κλαυιδες* Græcis dictæ, non quod thoracem claudant, vt Anato- *Etymologia.*
3, 2. 7. 9. mici quidam prodiderunt, sed quia figuram referant clauium antiquarum. Ex- *gis.*
10. primunt enim formam *f* Latinorum literæ oblongæ, ad cuius similitudinem antiqui-
 tus clauis ædium conficiebantur. Memini enim & me dum Iuuenis Patauii lite-
 ris & Medicinæ incumberem, in antiquissimis ædibus huius figuræ clauis adhuc v-
 surpatas vidisse. Ex quo patet, figuram clauicularum non rectam esse, sed partim con- *Figura.*
 uexam, partim concavam, adeoque duos quasi constituere semicirculos. Qua enim
2, ab A ad parte *2* ab osse pectoris discedunt, extrorsum gibbæ flectuntur; *a* qua verò summo
B. humero iunguntur, in anteriora curuantur, & cauæ fiunt. *Duo sunt numero,* vna vtrinque, *Numerus*
a, à B. ad inæquali crassitie præditæ. nam *b* prope iugulum dimidia sui parte teretes propemo-
C. dum sunt: *c* at vbi humerum respiciunt, latiusculæ euadunt. Illa pars, sedem largitur
b, 2. 1. 8. principio primo humerum mouentis musculi, quem Pectoralem vocant: hæc,
5, 2. principio primo secundi, quem Attollentem esse, & Deltoidem appellari dicemus.
3, 4, & 2. *Connectuntur* ergo duobus ossibus, *d* sternonempe, & scapulæ, sed sterno superiore *Connexio*
 parte ossis primi, in sinu cartilagine incrustato, capitulo oblongo, depresso, & triang-
 ularis fere figuræ: at summo humero, siue scapulæ processui superiori, oblongiusculo, &
 lato quasi capite. *Caput* quod sterno nequitur, cartilaginem habet, aliis capitibus quo-
 que communem: sed præter hanc etiam propriam, tenuem & æqualem, similem o-
 mnino illi, quem in inferioris maxillæ, cum superiore articulo positum esse, superius di-
 ximus, læuem admodum, vinctuosoque humore oblitum. Habet etiam ligamenta arti-
 culum orbiculatim cingentia. Cæterum ipsa *substantia* horum ossium fistulosa est circa *Substan-*
 capita, in medio minus. *Vsus* autem est, sustinere scapulas, ne vna cum humero in pectus *tia.*
 cadant, id quod euenire videmus, vbi clauicula fracturam patitur. *Vsus.*

CAPVT XVI.

Sterni, siue ossis pectoris historiam proponit.

3, 2. 7. 16. **T**HORACIS parte *e* anteriore in homine os occurrit, ab aliorum animalium
A. sibi correspondente osse plurimum differens, tum breuitate, tum amplitudine
 sua. Hoc communiter Græcis *στέρον*, quasi *στερον*, ab usu dicitur, quia munit, fir-
 matque pectus. Nonnullis à figura *ξίφοειδες*, ensiforme, quæ tamen vox solius ho-
 minis sterno, non aliorum animalium competit, vt audiemus. Latini, *Os pectoris*, à situ
 appellant, quia anticam humani pectoris partem occupat. Quanquam verò vnitatis

nomine vulgo exprimitur, neutiquam tamen os vnum est, sed ex pluribus compositum, cartilaginum beneficio inuicem connexis & vnitis, communiterq; in hominibus prouectæ ætatis ex tribus conficitur, quorum ^f *primum* & ^g *ultimum*, semper in omni ætate vnum idemq; est; ^h *secundum* verò admodum differt, & modo plura, modo pauciora, modo etiam vnum constituit, prout ætas hominis infantie aut virilitati proximior est. Recens natis ⁱ ex tribus vtplurimum conflatum est, quæ septennio elapso inter se coeunt, & in vnum concedunt. *Substantia* autem horum ossium, non vt aliorum solida est, sed rubens, & fungosa, ac plena cauernulis, duplici cinctæ quasi testa, quarum tamen anterior posteriore multo solidior est. Puerulis in primo ortu totum cartilagineum est, postea in os abit: sic tamen, vt superiores partes inferioribus prius solidescant. *Figuram* habet, si tria ossa considerentur iuncta, manubrii alicuius gladii Veterum, quæ lunatis erant lateribus. Primum enim latum cum sit, partem illam quæ sub manu consistit, refert: at lunata pars secundi, partem gladii quam manu apprehendimus: tertia tandem, gladii apicem. Est autem ^l *os primum* omnium crassissimum amplissimumque: crassius etiam seipso parte superiore, inuersum referens triangulum, cuius vertex abscissus sit, nisi quod latera, siue ctura lunata sint vtrinq;. Superior pars in extremitate vtraq; ^m sinum obtinet longum, & cartilagine incrustatum, qui clauiculæ caput, de quo dictum, excipit: in horum medio ⁿ foveam habet lunatam, quam *σφαγιον*, iugulum, vocant. ^o *Secundum os* minus crassum est, minusq; latum, sed multo priore, imo fere quadruplo longius, pluribus sinibus exasperatū, quibus postea costarū tertiæ, quartæ, quintæ, & sextæ cartilagines protuberantes inferuntur. ^p *Tertium* minimū est, quod neq; crassitie, neq; longitudine cum reliquis conferri potest; at latius tamen secundo est, cuius infimæ sedi adnectitur. Huic in fine ^q *cartilago* apponitur oblonga, quam *ξίφος*, ensiformem, & *mucronatam* appellant, sed imperite, cum ignarum dissectionum vulgus, canum intuens cadauera, vidensq; nulla ratione hanc vocem sterno coaptari posse, cartilagini postea nomen tribuerit, vt quod aliqua ratione propius ad similitudinem ensis accederet. At enim, qui humani cadaueris copiam habuere, satis vident, quàm benè hæc appellatio toti sterno possit congruere. Cæterum cartilago hæc, cum incertæ sit figuræ, vtplurimum tamen est triangularis, nonnunquam bifida, sæpe rotunda. Sub hac cavitās occurrit, nostris *scrobiculus cordis*, Veteribus *καρδία*, *Cor*, dicta, quod ibi *καρδία* sita sit, siue orificium supernum & sinistrum ventriculi, cuius dolores omnino similes apparent doloribus cordis, vnde & *καρδιαλγία*, & *καρδιωμοί* à Practicis Medicinæ scriptoribus vocantur. Quem *vsus* præstet nemo non videt. Propugnaculum enim est thoraci, & firmam sedem costis, cui implantantur, largitur. Cum enim thorax necessario ex costis fabricandus esset, ne vel osseus totus, vt Caput; vel carneus foret, vt infimus Venter, quorum vtrumque motum ipsius mirum in modum impediisset, cum os continuum inflexile, & caro instabilis futura esset, alicubi profecto firmamentum & sustentaculum, cui infereretur, requiri videbatur.

CAPVT XVII.

Scapularum historiam explicat.

^{r, 2. 7. 13.} ^{6. 14.} **S**CAPVLARVM, ^r quas Græci *ἀμωμδάτας* appellant, quasi dicas, ossa humeri lati- Scapula.
 tudinem constituentia, duæ sunt, vtrinq; vna, in dorso, inter primam & quintam
 thoracis costam sitæ, cum raro admodum ad sextam vsq; pertingere videantur. Hæ
 in gracilibus tibi obnoxiiis, quod impense protuberent, alæ videntur, ex quo huius-
 modi *πτερυγεῖς*, hoc est, alati, dicuntur, signumq; futuræ tabis secum circumfe-
 runt, teste Galeno 4. Aphorism. *Figura* ipsarum conuexa foris est, tutelæ gratia, ^r intus
^{f, fig. 13.} ^{r, fig. 14.} concaua; illam nos *dorsum scapulae*, hanc *cavitatem* vocabimus. Tota autem scapula trian-
 gulum, & quidem scalenum, vt Mathematici loquuntur, exprimit, cum inæqualibus
 lateribus constet, primumq; tanto secundo sit maius, quanto secundo tertio. Est au-
 tem ^{u, E. F. G.} *primum latus* illa scapulæ sedes, quæ iuxta dorsi longitudinem, thoracis vertebra-
 rum spinis proxime obtenditur, quamuis non exquisitè lineam rectam exprimat, sed
^{x, G. D.} superius inferiusq; ad externa corporis paululum se flectat. ^x *Alterum latus*, ab inferiore
^{y, E. C.} primi sede, obliquo ductu sursum fertur: at ^y *tertium* à superiore eiusdem regione, recta
 fere linea, ad exteriora similiter cum secundo progreditur, vbi postea vtrumq; veluti
 in vertice trianguli, in processu illo, qui sinuosam ceruicem pro humeri capite consti-
 tuit, coit. Vocatur primum latus *Basis*, quod fundamentum sit reliquorum laterum cui
 insistent: at reliqua duo, *Costæ*, ducta appellatione à triangulis, in quibus à Geometris
 costæ dicuntur latera basi incumbentia: discriminis tamen gratia secundum *Infe-*
 rior; tertium autem, *Superior costa* vocatur. Cæterum vt in omni triangulo tres reper-
 untur anguli, veluti & tria latera, ita hic quoq; tres sunt, duo tamen præcipue muscu-
^{z, C.} lorum gratia ab Anatomicis notantur. ^z *Alter angulus elatior* est, qui à basi, & superiore
^{a, G.} costa circumscribitur: ^a alter, *humilior*, à basi, & inferiore costa continetur. In illum in-
 feritur secundus scapulæ, Eleuator, musculus; ab hoc, enascitur quartus humeri, De-
 primens, siue Rotundus. *Connectitur* autem scapula diuersis partibus, interuentu mus-
 culorum, adeoq; per illam vnionis speciem, quam supra *συνάγκωσιν* vocari diximus,
 ossi scilicet occipitis, tum vertebrae ceruicis, dorsi, ac costis. Et *ossi* quidem *occipitis*, per
 musculos cucullares dictos, siue primum par scapulas mouentium, qui iidem etiam
 dorsi vertebrae annectunt. *Vertebrae* autem *ceruicis*, per secundum par earundem, Ele-
 uans, quos patientiæ musculos vocabimus. *Dorso*, per rhomboidem, siue par tertium:
Costis verò, per ferratum minorem, siue scapularum par quartum adducens. *Substan-*
 tiam habent duram ac solidam, si partes duntaxat nonnullas exceperis, quæ spongiæ Substan-
 tia.
 modo raræ sunt, ac pluribus cauernulis distinctæ. Crassitiem tamen admodum inæ-
 qualem habent. Costa enim inferior crassiuscula est; superior, tenuis; medio modo se
 basis habet: at superiori in sede, qua costæ inuicem coeunt, crassissima euadit, conspi-
 rantibus quasi lateribus in illam crassitiem: in cæteris quæ inter has sunt partes, tenuis-
^{b, A. B. C.} sima est. *Processibus* donatur *tribus*, quorum ^b *primus* oppido quam brevis est, breuioreq; *Proces-*
^{D.} *cervicis* donatus, in ^d sinum desinit, superiore parte acutum, inferiore orbiculatum. *Proces-*
^{c, C. D.} *Sinus* hic humeri caput excipit, pro cuius tamen ratione haud altè satis exsculptus est, *Cervix.*
^{d, A. B.}

quod ideo factum videtur, ut omnis generis motus promptius humerus obiret. Neta-
men ideo articulus luxationibus fieret opportunior, prouida Natura ligamenti val-
dis, & peculiari processu cavit, maxime tamen præter cartilaginem, qua sinum hunc in-
crustauit, aliam in ambitu adiungens, quæ sinui quidem haudquaquam adnascitur, li-
gamenti tamen adstrictus, crassior incipit, sensimque versus centrum extenuatur. Hoc
pacto, cum sinus de bitam altitudinem non haberet, ope cartilaginis maiorem profun-
ditatem nactus est: nec tamen propterea in illis circumrotationibus vel tantillum im-
peditur, cum caput humeri cartilaginem, utpote mollem, ubique obsequentem inue-
niat. Quæ res Chirurgiæ candidatis obseruanda est, ut in humero restituendo cautius
discant agere, neque vi ipsum importune, ut plerique, intrudent, sed legitima potius ex-
tensione facta, sensim reponant, cum citra grauem articuli noxam cartilago illa auelli
lædive non possit. Alter processus, ^e Spina scapulae dicitur, qui validus est, ex dorsi ipsius to-
ta propemodum latitudine enatus, non in ipso quidem longitudinis medio, sed sede
aliquanto elatiore, & non nihil sub angulo superno. Hic ubi ex ^f angusta quasi vertice, ^g F.
iuxta basium scapulae ad anteriora delatus est, sensim fit latior ac crassior, cumque ad cer-
uicem iam fere appulit, à scapula discedens, ^g in longum, moderateque curuum, ^g K.L.M
& latiusculum appendicem finit, qui supra humerum euectus, ad anteriora deferretur,
& in extremitate sua antica ^h lauem sinum insculptum obtinet, cui clauiculæ caput ^b, M.
articulatur. Totus autem hic processus qui dorso scapulae necitur, Spina scapulae dicitur:
at illa pars spinæ, quæ abscedit, & supra humerum fertur, Græcis ἀγκύριον, Latinis Sum-
mus humerus, quo nomine & nobis, in musculorum præsertim historia, semper vocabi-
tur. Spina autem duas cavitates efficit, superiorem & inferiorem, quarum utraque με-
τασθένιον, Inter scapulum dicitur, adeoque ἡ ἄνω ἡ κᾶτω, ⁱ superius, aut ^l inferius. ^m Ter-
tius processus ille est, qui ex costa superiore, qua ceruici contermina est, enascitur, minor
prædicto, & situ quoque inferior. Semicirculum refert, cum ⁿ ex angusta basi ^o in a-
cutiorem verticem circulari linea fastigietur, humeri articulo præfixus, quo firmitus
in sua sede contineatur, minusque excidat. Sed quia figura hæc pluribus, & quidem di-
uersis rebus accommodari commode potest, factum hinc est, ut diuersa nomina ipsi ab
Authoribus imposita sint, prout quisque huic, aut alteri rei assimilare voluit. Hinc aliis
à cognitione quam habet cum C Gracori. σπυροειδής; aliis, ab anchoræ figura, ἀγκυροει-
δής; aliis denique à rostri corniculæ forma, κροστιοειδής dicitur. Nos latine Ancoriformem
processum appellabimus.

Vsus. Vsus scapularum per se satis manifestus est ex historia. Cum enim sinum pro hume-
ri osse contineant, ipsius gratia creatas esse, haud difficulter quisvis crediderit. Et quo
in loco articularetur humerus, si absque scapulis foret, cum costæ Thoracis, non modo
opportunitatem: sed etiam locum penitus omnem denegent, ut ideo in reliquis etiam,
præter hominem, animalibus, scapulae os brachio articuletur? Accedit, quod plures hinc
musculi, humeri motui dicati, commode enascantur: ut taceam interim Naturæ proui-
dum consilium, quo dorso voluit prospicere, dum scapulis quasi clypeo quo-
dam textit, & aduersus externas iniurias à tergo incidenti-
bus, muniuit.

CAP V T XVIII.

Quæ de Spina in vniuersum dici possunt, persequitur.

- p. 2.7.15. **S**PINA DORSI, P Græcis quoque *ἀκνρθα*, à spinosis processibus appellata, non Spina. Sex vero constat ossè, tamen si id tutius fortasse erat: sed ex pluribus conflata est, tum propter motum, cuius beneficio corpus flexitur extenditurque, tum propter nervos, qui ex medulla, quam continet, pluribus ramis in vniuersum fere corpus disperguntur. Hæc ossa Græcis *σπονδυλοι*, Latinis VERTEBRÆ vocantur, numero Vertebra. que sunt viginti quatuor: 1 septem quidem Cervicis: 12 duodecim Thoracis: 5 quinque denique Lumborum. Vocamus autem nunc 1 *Dorsum*, doctrinæ facilioris gratia, quicquid à primæ colli vertebra ad sacrum os protenditur, etsi magna pars eorum qui corporis humani historiam literis prodiderunt, os quoque sacrum dorso addiderint. Habent hæc vertebra quædam communia inter se, adeo ut omnibus totius spinæ vertebri competant: quædam communia vertebri solius cervicis, thoracis, aut lumborum: nonnulla etiam propria. Hæc ut fideliter omnia & ordine tradamus, primum ea quæ generalissima sunt, quæque de omnibus in vniuersum dici possunt, hoc capite persequemur, deinde quæ singulis competunt breuiter subiiciemus.
11. 2.7.15. **Commune** ergo hoc omnibus est (excepta prima) *spinam constituentibus vertebri*, habere in antica sui parte 2 corpus quoddam extuberans nonnihil anterius, siue ea parte, qua pectus respiciunt, posterius, qua dorsum, modicè cauum: supra vero, infraque, plana superficie donatum. Corpus hoc non ex solido osse ac duro: sed molli, fungoso, ac pumicis substantiam referente conficitur, quod ideo quoque leuissimum est. Magnitudinem huius quod spectat, minus id est (quemadmodum ipsæ etiam vertebra) superioribus, adeo, ut quo remotior quæque est à prima cervicis, tanto maiora sumat incrementa, ut propterea merito lumborum vertebra, omnium quæ in spina continentur, sint maximæ. Id quod Natura sapientissima summo effecit consilio, cum ea corpora, quæ sustinent, maiora semper sustinendis esse debeant. Netamen propterea benignissima Parens animali pondere incommodaret, ingeniose aliud quoque commenta est, & quanto maiorem fecit vnamquamque, tanto fungosiorum quoque, ut ita dicam, pluribusque & maioribus cauernulis refertam efformauit, ut adeo vertebrarum lumborum corpora leuissima quoque sint, & nullo fere pondere prædita. His corporibus tria deinceps processuum genera adnata sunt, transuersi nempe, obliqui, & acuti. 2. Processus. x Transuersi dicuntur, qui ad corporis vertebra latera consistunt, vtrinque vnus: Obliqui autem, qui situm obliquum obtinent, & quatuor singulis sunt, quorum duo 3 ascendentes, duo alii 2 descendentes, pro mutua vertebrarum inter se articulatione effecti. Inter hos in medio vnus est, posteriore sede a acutus, ex vtriusque horum concursu enatus, deorsumque delatus, superne acuta linea se stringens, at inferne latiore basi extendens. 3. Foramen proprium. b. 2.8.M. Habet præter hos processus, quælibet vertebra b foramen grandiusculum, inter corpus vertebra, & triplices processus consistens, quod transitum præbet medullæ à cerebro per totum dorsum descendenti. Atque hoc quidem foramen proprium dicitur: nam à lateribus, qua inter se committuntur, excavata sunt, & sic dum inuicem iunguntur, ex cauo

4. *Foramen commune* ex cauo superioris inferiorisque, vnum quasi rotundum foramen, (vnde *c commune* 6. 2. 7. 15. *vertebrarum foramen* dicitur) constituunt, quod postea neruo exitum, venæ autem & arteriæ, ingressum in spinæ cavitatem largitur. Cæterum harum *connexio*, quo pacto inter se fiat, libro tertio, vbi de ligamentis agemus, fufius dicitur.

5. *Connexio.*

C A P V T XIX.

De Vertebri Cervicis.

Oblongi colli homines cur phthisi obnoxij. CERVI x septem constat^d vertebri, raro octo, in iis scilicet, qui longo sunt collo, *d. 2. 8. 1. 11* & quibus vna postea deest in Thorace, vnde oblongi colli homines phthisi admodum sunt obnoxii, quod duodecima vertebra deficiente, necessario breuior sit Thorax, minusq; se pulmones expandant; quo fit, vt sanguis circa illos contentus & effervescens, acrimonia sua erodat vasa, vlceraq; ac tandem totius corporis marcorem inducat. Est autem ceruix pulmonum gratia condita, quatenus asperam arteriam in se pulmo continet, id quod vel inde satis colligitur, quod animalia pulmone destituta, ceruice careant: & contra, quæ pulmone donata sunt, ea etiam vniuersa collum obtineant. Habent cervicis vertebra communia quædam cum cæteris dorsi vertebri, quæ præcedenti capitulo persequuti sumus: quædam communia inter se, nonnulla etiam propria, de quibus nunc agendum.

Communiæ vertebra ceruicis. Communia inter se habent, *primò* ratione corporis, quod in ipsis semicirculare non est, vt in thoracis aut lumborum vertebri: sed quadrilaterum potius, & oblongum, longitudine altero tanto latitudine maiore. Posterior sedes plana ferè est: *f* superior sinuata, & inferior conuexa modicè, vt scilicet inter se fidelius committantur, & motus fiat expeditior. *Magnitudinem* habent inter thoracis & lumborum Vertebra mediam, cum summo loco sint positæ. Quantum ergo ipsæ thoracis: tantum hæ lumborum vertebra minores sunt. *Osse* autem *durior*e constant ac cæteræ vertebra, tum quia motu continuo exercentur, tum quia reliquæ magnitudinis ratione porosiores sunt. reddita, vt dictum est. Processus habent *h* obliquos, *i* transuersos, & *k* posteriores, qui potestremi in omnibus, (excepta prima, & duabus vltimis) sunt bifidi. *Foramina* quoque omnes obtinent, *l* primo magnum illud, per quod medulla traicitur, *deinde* *m* alia duo, vtrinque vnum, in transuersis processibus, quod nulli, nisi cervicis vertebra competit, per quod venæ & arteriæ in caput ascendunt: tandem *communia dicta*, quæ tamen in eo hoc habent proprii, quod in colli vertebra, inferiori vertebra plus quam superiori debentur, cum illa, atq; hæ, magis excavata sit.

Propria vertebra ceruicis. *Primæ. Tuberculum. Sinus. Processus.* *n* Prima vero cervicis vertebra cæteris omnibus minor est, solidior tamen & durior, quod tenuis esse debuerit, ob cauum amplum, ad transmittendam medullam, quæ crassior huic est, ac reliquis, cum proxime ibi ex cerebro erumpat. Corpus sola non habet, sed eius loco *o* anterius tuberculum, (in quod primus flectentium ceruicem inferitur) *p* intus vero sinum quadratum, cartilagine incrustatum, qui dentiformem secundæ vertebra appendicem excipit, cartilagine similiter obductum. *Processus* *q* ascendentes pariter ac *r* descendentes paulum differentes habet ab aliis, cum vtrique sinuati sint, illis occipitis tubercula; his, secundæ ascendentes, excipientibus. Super illis motus capitis in prio-

e, A.

f, C.

g, D.

h, H. I.

i, G.

k, K.

l, M.

m, C.

n, 2. 8. 11.

1 fig. 1. 2.

o, 3.

o, A.

p, 2.

q, H.

r, I.

- f. G.* in priora & posteriora fit, hoc est, flexio capitis & extensio; super his, circa dentiformem processum circularis, quo caput ad latera ducitur. ^f *Transuersi* processus simplices sunt, maiores tamen ac reliqui, quod propter musculorum caput mouentium sextum septimumque par contingit. ^t *Spina*, siue posterior, admodum ab aliis differt. nam neque bifida, ut cæteræ colli, neque acuta, ut thoracis, sed simplex est, in tuberculum, & obtusum valde angulum terminans, breuissimaque. Imo vero vix spinæ dignanda nomine, cum spina sibi esset, plurimum musculis ea in parte delatis (quos infra Rectos *Foramina* Minores caput extendentes vocabimus) incommodatum fuisse. ^u *Foramen* obtinet in medio proprium, maius cæterarum foramine: at inferius cum secunda, ut & secunda cum tertia, commune efficit, non tamen reliquis simile: sed per sinus rimæ foramen exprimentes, exsculptos, ad processum obliquos descendentes, quibus secundæ vertebræ ascendentes processibus, committitur. In reliquis cervicis vertebris, sinus commune foramen efformans, orbicularis est.
- uu. 2. 8. num. II.* ^u *Altera vertebra* corpus nanciscitur, sed strictius id est minusque aliarum corporibus. *Processus* ^x *transuersos* similiter minores habet, & ^y *foramina* ipsis insculpta minoribus, deorsumque respicientia: ^z *posteriorem* bifidum, ut cæteræ. ^a *Superiores* leuiter extuberant, ^b *inferiores* leuiter sinuantur: ex medio autem corpore inter duos ascendentes processus, ex elatiore regione ^c alius quidam erumpit, nulli alteri vertebræ communis, altus, admodumque solidus, & acutus, qui cartilagine contactus, in sinum primæ vertebræ, de quo diximus, inseritur, super quem circularis capitis motus obitur. Hic cum dentis, præsertim canini, formam exprimat, *ὀδὺς*, & *Dens magnus* Hippocratis, à dissectionum peritis vocatur: quamvis Hippocrates totam potius vertebram hoc nomine, quam processum hunc solum indigarit. Hic elatiore in parte, qua primam vertebram superat, asper est, ut tutiorem sedem ligamento largiatur, quo cum osse occipitii connectitur, anteriore parte magni foraminis, per quod spinalis medulla ex crano descendit.
- d. 2. 8. num. III. f. 1. 2.* ^d *Tertia* deinde, *quarta*, *quinta*, & *sexta vertebra*, siue quatuor secundæ subiacentes, similes fere sunt in omnibus. ^e *Laterales processus* omnes aliis ampliores habent, & bifidos, non secus ac bifidæ quoque sunt ipsarum ^e *spinæ*, quo validiore nexu plures musculi adaptarentur: quamvis sexta spinam non ita manifeste duplicem habeat. *Obliquos processus* quoque habent similes, ex quibus ^f *ascendentes* quidem tuberculo, siue capite donantur, leuiter admodum extuberante, ut difficile sit distinguere, capitulum sit, an sinus vocandus: ^g *descendentes* vero modice exsculptum orbicularem sinum obtinent.
- h. 2. 8. num. IV. f. 1. 2.* ^h *Septima* tandem omnium cervicis maxima est, & quemadmodum loco, ita quoque figura thoracis vertebris propior. nam neque ⁱ *transuersos* processus, neque ⁱ *posteriorem* habet bifidum, sed admodum extuberantem ac propendentem, non secus ac thoracis spinæ dependent.

CAPVT XX.

De Thoracis, ac Lumborum vertebris.

m. 2. 8. num. V. f. 3. 1. 2. ^m *Septem* cervicis vertebras, *duodecim* ^m *THORACIS* excipiunt. Quamquam interdum etiam tredecim inueniantur, quibus totidem costæ respondent, sed rarum

I id est:

id est : nonnunquam etiam vndecim, vt dictum, sed multo adhuc rarius.
 Corpora harum orbicularia sunt ⁿ antèrius, ^o posterius leuiter caua, ac quasi luna-
 ta p superius inferiusque plana superficie donata, dum modo primam excipias, cuius e-
 latior sedes inæqualis est, similisque omnino vertebrarum colli. Et quamuis planæ sint,
 circa tamen ambitum omnes leuiter extuberant, vt ligamenta firmius illic vinciantur,
 ne vertebræ extra suam sedem tam prompte prolabantur. *Processus* obtinent similiter, vt
 reliquæ dorsi, quatuor quidem obliquos, at duos laterales, vnumque posteriorem acu-
 tum, siue spinam. *Obliqui* inseruiunt articulationi, quorum beneficio inter se com-
 mittuntur: sic tamen, vt semper ^q superiores capitulorum vicem gerant, & inferiori-
 bus proxime adiacentium superiorum vertebrarum inarticulentur: ^r inferiores contra,
 sinuum, leuiterque cauati sint, vt capitula proxime inferiorum vertebrarum excipiant.
 Et hanc articulationis rationem communem habent cum cernicis vertebris, adeo qui-
 dem, vt à secunda colli ad vndecimam vsque thoracis eadem sit omnium inter se quoad
 iuncturam ratio. Duodecima enim propriam postea obtinet, & quemadmodum prima
 cernicis vtrosque obliquos, ascendentes dico & descendentes, sinuatos habebat, vt in-
 fra supraque capitula exciperet, infra secundæ colli, supra capitula occipitis: ita thoracis
 vltima vtrosque capitatos habet, vt supra ab vndecima thoracis, infra à prima lumbo-
 rum excipiat. ^f *Transuersi* processus rotundo veluti capite extuberant, sursumque fe-
 runtur. *Magnitudine* æquales fere sunt inter se, in superioribus nouem: at in tribus inferi-
 oribus sensim decrescunt. ^t *Spina* omnibus data, sed tamen haud eadem magnitudine
 & forma: omnibus tamen simplices sunt, neque, vt colli, bipartitæ. Superiorum enim
 nouem proceræ admodum sunt, supra acutæ, infra latiusculæ, oblique deorsum latæ;
 inferiorum trium, vt laterales quoque liquido superioribus breuiiores, sed vtro-
 que crassiores tamen, rectæque delatæ. Id vero in duabus infimis, vndecima, inquam, & duo-
 decima manifestius apparet, in quibus multo adhuc rectius progrediuntur, lumbarium
 spinarum, ad quas accedunt propius, ritu, non ita tamen, quin agnoscas deorsum spe-
 ctare, & thoracis morem sequi. *Foramina* naclæ sunt, vt aliæ dorsi vertebræ, ^u pro-
 prium vnum, maximum, in medio, per quod medulla transit: *communia* duo, vtrinque v-
 num, quæ fiunt ex sinibus inter corpus & processus obliquos exsculptis, sic tamen, vt in
 thoracis vertebris vterque sinus, tam superioris, quam inferioris vertebræ, æqualis sit,
 adeoque magnitudine ambo sibi respondeant.

Atque hæc quidem communia magna ex parte cum aliis obtinere, duo adhuc sunt
 reliqua ipsis *propria*, ac *singularia*. Primum quidem, sinus duo, vtrinque vnus, pro co-
 starum capitibus inferendis, læuis admodum, & cartilagine inuestitus. Sinus hic à
 prima vsque ad nonam, vni atque alteri vertebræ communis est, vtraque dimidiam vel-
 uti partem conferente, non secus ac modo diximus, communia foramina, iuxta quæ &
 ipsi hi sinus consistunt, ab vtriusque veluti symbola produci. In reliquis tribus inferiori-
 bus, totus in ipso corpore, eiusque superiore parte incisus est. Alterum est similiter
 * sinus læuis, cartilagine succinctus, insculptus transuersis processibus nouem vertebrarum
 superiorum, quibus costæ inseruntur, & quasi affirmantur. Vnde fit, vt longiores
 quoque tribus cæteris inferioribus sint, & quamdiu costas excipiunt, etiam processus harum
 gratia conditos proceriores exigant. Sinus autem hi, non æqualiter omnibus insculpti
 sunt.

Propria
vertebra-
rum tho-
racis,
1.

2.

x, d. d.

sunt: sed in prima vertebra deorsum magis spectant; in vltima, siue nona paulo sursum: in mediis, medio quodam modo se habent.

^{y. 2. 3. 44.} ^{VI fig.} ^{1. 2. 3.} ^{7. A.} ^{8. H.} ^{9. I.} ^{10. G.} ^{11. K.} ^{12. M.}
 y Thoracis vertebrae immediate **LUMBORVM** ^{quinque} subiiciuntur, quæ ² corpus Lumbe-
 obtinent semicirculare, sed oblongum, grandius corpore superiorum, vt facilius ab ^{rum ver-}
 ipsis ferantur, cum Naturæ legibus admodum conueniens sit, vt basis paulò latior vali-
 diorque sit re, quam sustinet. Constat autem ex substantia rara, & pumicis ritu ple-
 na foraminibus, partim vt grauitate minus animali molestum sit, partim vt venæ ali-
 mentum deferentes, viam apertam liberamque inueniant, per quam excurrant. ^a ^{1.} ^{2.} ^{3.} ^{4.} ^{5.} ^{6.} ^{7.} ^{8.} ^{9.} ^{10.} ^{11.} ^{12.} ^{13.} ^{14.} ^{15.} ^{16.} ^{17.} ^{18.} ^{19.} ^{20.} ^{21.} ^{22.} ^{23.} ^{24.} ^{25.} ^{26.} ^{27.} ^{28.} ^{29.} ^{30.} ^{31.} ^{32.} ^{33.} ^{34.} ^{35.} ^{36.} ^{37.} ^{38.} ^{39.} ^{40.} ^{41.} ^{42.} ^{43.} ^{44.} ^{45.} ^{46.} ^{47.} ^{48.} ^{49.} ^{50.} ^{51.} ^{52.} ^{53.} ^{54.} ^{55.} ^{56.} ^{57.} ^{58.} ^{59.} ^{60.} ^{61.} ^{62.} ^{63.} ^{64.} ^{65.} ^{66.} ^{67.} ^{68.} ^{69.} ^{70.} ^{71.} ^{72.} ^{73.} ^{74.} ^{75.} ^{76.} ^{77.} ^{78.} ^{79.} ^{80.} ^{81.} ^{82.} ^{83.} ^{84.} ^{85.} ^{86.} ^{87.} ^{88.} ^{89.} ^{90.} ^{91.} ^{92.} ^{93.} ^{94.} ^{95.} ^{96.} ^{97.} ^{98.} ^{99.} ^{100.} ^{101.} ^{102.} ^{103.} ^{104.} ^{105.} ^{106.} ^{107.} ^{108.} ^{109.} ^{110.} ^{111.} ^{112.} ^{113.} ^{114.} ^{115.} ^{116.} ^{117.} ^{118.} ^{119.} ^{120.} ^{121.} ^{122.} ^{123.} ^{124.} ^{125.} ^{126.} ^{127.} ^{128.} ^{129.} ^{130.} ^{131.} ^{132.} ^{133.} ^{134.} ^{135.} ^{136.} ^{137.} ^{138.} ^{139.} ^{140.} ^{141.} ^{142.} ^{143.} ^{144.} ^{145.} ^{146.} ^{147.} ^{148.} ^{149.} ^{150.} ^{151.} ^{152.} ^{153.} ^{154.} ^{155.} ^{156.} ^{157.} ^{158.} ^{159.} ^{160.} ^{161.} ^{162.} ^{163.} ^{164.} ^{165.} ^{166.} ^{167.} ^{168.} ^{169.} ^{170.} ^{171.} ^{172.} ^{173.} ^{174.} ^{175.} ^{176.} ^{177.} ^{178.} ^{179.} ^{180.} ^{181.} ^{182.} ^{183.} ^{184.} ^{185.} ^{186.} ^{187.} ^{188.} ^{189.} ^{190.} ^{191.} ^{192.} ^{193.} ^{194.} ^{195.} ^{196.} ^{197.} ^{198.} ^{199.} ^{200.} ^{201.} ^{202.} ^{203.} ^{204.} ^{205.} ^{206.} ^{207.} ^{208.} ^{209.} ^{210.} ^{211.} ^{212.} ^{213.} ^{214.} ^{215.} ^{216.} ^{217.} ^{218.} ^{219.} ^{220.} ^{221.} ^{222.} ^{223.} ^{224.} ^{225.} ^{226.} ^{227.} ^{228.} ^{229.} ^{230.} ^{231.} ^{232.} ^{233.} ^{234.} ^{235.} ^{236.} ^{237.} ^{238.} ^{239.} ^{240.} ^{241.} ^{242.} ^{243.} ^{244.} ^{245.} ^{246.} ^{247.} ^{248.} ^{249.} ^{250.} ^{251.} ^{252.} ^{253.} ^{254.} ^{255.} ^{256.} ^{257.} ^{258.} ^{259.} ^{260.} ^{261.} ^{262.} ^{263.} ^{264.} ^{265.} ^{266.} ^{267.} ^{268.} ^{269.} ^{270.} ^{271.} ^{272.} ^{273.} ^{274.} ^{275.} ^{276.} ^{277.} ^{278.} ^{279.} ^{280.} ^{281.} ^{282.} ^{283.} ^{284.} ^{285.} ^{286.} ^{287.} ^{288.} ^{289.} ^{290.} ^{291.} ^{292.} ^{293.} ^{294.} ^{295.} ^{296.} ^{297.} ^{298.} ^{299.} ^{300.} ^{301.} ^{302.} ^{303.} ^{304.} ^{305.} ^{306.} ^{307.} ^{308.} ^{309.} ^{310.} ^{311.} ^{312.} ^{313.} ^{314.} ^{315.} ^{316.} ^{317.} ^{318.} ^{319.} ^{320.} ^{321.} ^{322.} ^{323.} ^{324.} ^{325.} ^{326.} ^{327.} ^{328.} ^{329.} ^{330.} ^{331.} ^{332.} ^{333.} ^{334.} ^{335.} ^{336.} ^{337.} ^{338.} ^{339.} ^{340.} ^{341.} ^{342.} ^{343.} ^{344.} ^{345.} ^{346.} ^{347.} ^{348.} ^{349.} ^{350.} ^{351.} ^{352.} ^{353.} ^{354.} ^{355.} ^{356.} ^{357.} ^{358.} ^{359.} ^{360.} ^{361.} ^{362.} ^{363.} ^{364.} ^{365.} ^{366.} ^{367.} ^{368.} ^{369.} ^{370.} ^{371.} ^{372.} ^{373.} ^{374.} ^{375.} ^{376.} ^{377.} ^{378.} ^{379.} ^{380.} ^{381.} ^{382.} ^{383.} ^{384.} ^{385.} ^{386.} ^{387.} ^{388.} ^{389.} ^{390.} ^{391.} ^{392.} ^{393.} ^{394.} ^{395.} ^{396.} ^{397.} ^{398.} ^{399.} ^{400.} ^{401.} ^{402.} ^{403.} ^{404.} ^{405.} ^{406.} ^{407.} ^{408.} ^{409.} ^{410.} ^{411.} ^{412.} ^{413.} ^{414.} ^{415.} ^{416.} ^{417.} ^{418.} ^{419.} ^{420.} ^{421.} ^{422.} ^{423.} ^{424.} ^{425.} ^{426.} ^{427.} ^{428.} ^{429.} ^{430.} ^{431.} ^{432.} ^{433.} ^{434.} ^{435.} ^{436.} ^{437.} ^{438.} ^{439.} ^{440.} ^{441.} ^{442.} ^{443.} ^{444.} ^{445.} ^{446.} ^{447.} ^{448.} ^{449.} ^{450.} ^{451.} ^{452.} ^{453.} ^{454.} ^{455.} ^{456.} ^{457.} ^{458.} ^{459.} ^{460.} ^{461.} ^{462.} ^{463.} ^{464.} ^{465.} ^{466.} ^{467.} ^{468.} ^{469.} ^{470.} ^{471.} ^{472.} ^{473.} ^{474.} ^{475.} ^{476.} ^{477.} ^{478.} ^{479.} ^{480.} ^{481.} ^{482.} ^{483.} ^{484.} ^{485.} ^{486.} ^{487.} ^{488.} ^{489.} ^{490.} ^{491.} ^{492.} ^{493.} ^{494.} ^{495.} ^{496.} ^{497.} ^{498.} ^{499.} ^{500.} ^{501.} ^{502.} ^{503.} ^{504.} ^{505.} ^{506.} ^{507.} ^{508.} ^{509.} ^{510.} ^{511.} ^{512.} ^{513.} ^{514.} ^{515.} ^{516.} ^{517.} ^{518.} ^{519.} ^{520.} ^{521.} ^{522.} ^{523.} ^{524.} ^{525.} ^{526.} ^{527.} ^{528.} ^{529.} ^{530.} ^{531.} ^{532.} ^{533.} ^{534.} ^{535.} ^{536.} ^{537.} ^{538.} ^{539.} ^{540.} ^{541.} ^{542.} ^{543.} ^{544.} ^{545.} ^{546.} ^{547.} ^{548.} ^{549.} ^{550.} ^{551.} ^{552.} ^{553.} ^{554.} ^{555.} ^{556.} ^{557.} ^{558.} ^{559.} ^{560.} ^{561.} ^{562.} ^{563.} ^{564.} ^{565.} ^{566.} ^{567.} ^{568.} ^{569.} ^{570.} ^{571.} ^{572.} ^{573.} ^{574.} ^{575.} ^{576.} ^{577.} ^{578.} ^{579.} ^{580.} ^{581.} ^{582.} ^{583.} ^{584.} ^{585.} ^{586.} ^{587.} ^{588.} ^{589.} ^{590.} ^{591.} ^{592.} ^{593.} ^{594.} ^{595.} ^{596.} ^{597.} ^{598.} ^{599.} ^{600.} ^{601.} ^{602.} ^{603.} ^{604.} ^{605.} ^{606.} ^{607.} ^{608.} ^{609.} ^{610.} ^{611.} ^{612.} ^{613.} ^{614.} ^{615.} ^{616.} ^{617.} ^{618.} ^{619.} ^{620.} ^{621.} ^{622.} ^{623.} ^{624.} ^{625.} ^{626.} ^{627.} ^{628.} ^{629.} ^{630.} ^{631.} ^{632.} ^{633.} ^{634.} ^{635.} ^{636.} ^{637.} ^{638.} ^{639.} ^{640.} ^{641.} ^{642.} ^{643.} ^{644.} ^{645.} ^{646.} ^{647.} ^{648.} ^{649.} ^{650.} ^{651.} ^{652.} ^{653.} ^{654.} ^{655.} ^{656.} ^{657.} ^{658.} ^{659.} ^{660.} ^{661.} ^{662.} ^{663.} ^{664.} ^{665.} ^{666.} ^{667.} ^{668.} ^{669.} ^{670.} ^{671.} ^{672.} ^{673.} ^{674.} ^{675.} ^{676.} ^{677.} ^{678.} ^{679.} ^{680.} ^{681.} ^{682.} ^{683.} ^{684.} ^{685.} ^{686.} ^{687.} ^{688.} ^{689.} ^{690.} ^{691.} ^{692.} ^{693.} ^{694.} ^{695.} ^{696.} ^{697.} ^{698.} ^{699.} ^{700.} ^{701.} ^{702.} ^{703.} ^{704.} ^{705.} ^{706.} ^{707.} ^{708.} ^{709.} ^{710.} ^{711.} ^{712.} ^{713.} ^{714.} ^{715.} ^{716.} ^{717.} ^{718.} ^{719.} ^{720.} ^{721.} ^{722.} ^{723.} ^{724.} ^{725.} ^{726.} ^{727.} ^{728.} ^{729.} ^{730.} ^{731.} ^{732.} ^{733.} ^{734.} ^{735.} ^{736.} ^{737.} ^{738.} ^{739.} ^{740.} ^{741.} ^{742.} ^{743.} ^{744.} ^{745.} ^{746.} ^{747.} ^{748.} ^{749.} ^{750.} ^{751.} ^{752.} ^{753.} ^{754.} ^{755.} ^{756.} ^{757.} ^{758.} ^{759.} ^{760.} ^{761.} ^{762.} ^{763.} ^{764.} ^{765.} ^{766.} ^{767.} ^{768.} ^{769.} ^{770.} ^{771.} ^{772.} ^{773.} ^{774.} ^{775.} ^{776.} ^{777.} ^{778.} ^{779.} ^{780.} ^{781.} ^{782.} ^{783.} ^{784.} ^{785.} ^{786.} ^{787.} ^{788.} ^{789.} ^{790.} ^{791.} ^{792.} ^{793.} ^{794.} ^{795.} ^{796.} ^{797.} ^{798.} ^{799.} ^{800.} ^{801.} ^{802.} ^{803.} ^{804.} ^{805.} ^{806.} ^{807.} ^{808.} ^{809.} ^{810.} ^{811.} ^{812.} ^{813.} ^{814.} ^{815.} ^{816.} ^{817.} ^{818.} ^{819.} ^{820.} ^{821.} ^{822.} ^{823.} ^{824.} ^{825.} ^{826.} ^{827.} ^{828.} ^{829.} ^{830.} ^{831.} ^{832.} ^{833.} ^{834.} ^{835.} ^{836.} ^{837.} ^{838.} ^{839.} ^{840.} ^{841.} ^{842.} ^{843.} ^{844.} ^{845.} ^{846.} ^{847.} ^{848.} ^{849.} ^{850.} ^{851.} ^{852.} ^{853.} ^{854.} ^{855.} ^{856.} ^{857.} ^{858.} ^{859.} ^{860.} ^{861.} ^{862.} ^{863.} ^{864.} ^{865.} ^{866.} ^{867.} ^{868.} ^{869.} ^{870.} ^{871.} ^{872.} ^{873.} ^{874.} ^{875.} ^{876.} ^{877.} ^{878.} ^{879.} ^{880.} ^{881.} ^{882.} ^{883.} ^{884.} ^{885.} ^{886.} ^{887.} ^{888.} ^{889.} ^{890.} ^{891.} ^{892.} ^{893.} ^{894.} ^{895.} ^{896.} ^{897.} ^{898.} ^{899.} ^{900.} ^{901.} ^{902.} ^{903.} ^{904.} ^{905.} ^{906.} ^{907.} ^{908.} ^{909.} ^{910.} ^{911.} ^{912.} ^{913.} ^{914.} ^{915.} ^{916.} ^{917.} ^{918.} ^{919.} ^{920.} ^{921.} ^{922.} ^{923.} ^{924.} ^{925.} ^{926.} ^{927.} ^{928.} ^{929.} ^{930.} ^{931.} ^{932.} ^{933.} ^{934.} ^{935.} ^{936.} ^{937.} ^{938.} ^{939.} ^{940.} ^{941.} ^{942.} ^{943.} ^{944.} ^{945.} ^{946.} ^{947.} ^{948.} ^{949.} ^{950.} ^{951.} ^{952.} ^{953.} ^{954.} ^{955.} ^{956.} ^{957.} ^{958.} ^{959.} ^{960.} ^{961.} ^{962.} ^{963.} ^{964.} ^{965.} ^{966.} ^{967.} ^{968.} ^{969.} ^{970.} ^{971.} ^{972.} ^{973.} ^{974.} ^{975.} ^{976.} ^{977.} ^{978.} ^{979.} ^{980.} ^{981.} ^{982.} ^{983.} ^{984.} ^{985.} ^{986.} ^{987.} ^{988.} ^{989.} ^{990.} ^{991.} ^{992.} ^{993.} ^{994.} ^{995.} ^{996.} ^{997.} ^{998.} ^{999.} ^{1000.} ^{1001.} ^{1002.} ^{1003.} ^{1004.} ^{1005.} ^{1006.} ^{1007.} ^{1008.} ^{1009.} ^{1010.} ^{1011.} ^{1012.} ^{1013.} ^{1014.} ^{1015.} ^{1016.} ^{1017.} ^{1018.} ^{1019.} ^{1020.} ^{1021.} ^{1022.} ^{1023.} ^{1024.} ^{1025.} ^{1026.} ^{1027.} ^{1028.} ^{1029.} ^{1030.} ^{1031.} ^{1032.} ^{1033.} ^{1034.} ^{1035.} ^{1036.} ^{1037.} ^{1038.} ^{1039.} ^{1040.} ^{1041.} ^{1042.} ^{1043.} ^{1044.} ^{1045.} ^{1046.} ^{1047.} ^{1048.} ^{1049.} ^{1050.} ^{1051.} ^{1052.} ^{1053.} ^{1054.} ^{1055.} ^{1056.} ^{1057.} ^{1058.} ^{1059.} ^{1060.} ^{1061.} ^{1062.} ^{1063.} ^{1064.} ^{1065.} ^{1066.} ^{1067.} ^{1068.} ^{1069.} ^{1070.} ^{1071.} ^{1072.} ^{1073.} ^{1074.} ^{1075.} ^{1076.} ^{1077.} ^{1078.} ^{1079.} ^{1080.} ^{1081.} ^{1082.} ^{1083.} ^{1084.} ^{1085.} ^{1086.} ^{1087.} ^{1088.} ^{1089.} ^{1090.} ^{1091.} ^{1092.} ^{1093.} ^{1094.} ^{1095.} ^{1096.} ^{1097.} ^{1098.} ^{1099.} ^{1100.} ^{1101.} ^{1102.} ^{1103.} ^{1104.} ^{1105.} ^{1106.} ^{1107.} ^{1108.} ^{1109.} ^{1110.} ^{1111.} ^{1112.} ^{1113.} ^{1114.} ^{1115.} ^{1116.} ^{1117.} ^{1118.} ^{1119.} ^{1120.} ^{1121.} ^{1122.} ^{1123.} ^{1124.} ^{1125.} ^{1126.} ^{1127.} ^{1128.} ^{1129.} ^{1130.} ^{1131.} ^{1132.} ^{1133.} ^{1134.} ^{1135.} ^{1136.} ^{1137.} ^{1138.} ^{1139.} ^{1140.} ^{1141.} ^{1142.} ^{1143.} ^{1144.} ^{1145.} ^{1146.} ^{1147.} ^{1148.} ^{1149.} ^{1150.} ^{1151.} ^{1152.} ^{1153.} ^{1154.} ^{1155.} ^{1156.} ^{1157.} ^{1158.} ^{1159.} ^{1160.} ^{1161.} ^{1162.} ^{1163.} ^{1164.} ^{1165.} ^{1166.} ^{1167.} ^{1168.} ^{1169.} ^{1170.} ^{1171.} ^{1172.} ^{1173.} ^{1174.} ^{1175.} ^{1176.} ^{1177.} ^{1178.} ^{1179.} ^{1180.} ^{1181.} ^{1182.} ^{1183.} ^{1184.} ^{1185.} ^{1186.} ^{1187.} ^{1188.} ^{1189.} ^{1190.} ^{1191.} ^{1192.} ^{1193.} ^{1194.} ^{1195.} ^{1196.} ^{1197.} ^{1198.} ^{1199.} ^{1200.} ^{1201.} ^{1202.} ^{1203.} ^{1204.} ^{1205.} ^{1206.} ^{1207.} ^{1208.} ^{1209.} ^{1210.} ^{1211.} ^{1212.} ^{1213.} ^{1214.} ^{1215.} ^{1216.} ^{1217.} ^{1218.} ^{1219.} ^{1220.} ^{1221.} ^{1222.} ^{1223.} ^{1224.} ^{1225.} ^{1226.} ^{1227.} ^{1228.} ^{1229.} ^{1230.} ^{1231.} ^{1232.} ^{1233.} ^{1234.} ^{1235.} ^{1236.} ^{1237.} ^{1238.} ^{1239.} ^{1240.} ^{1241.} ^{1242.} ^{1243.} ^{1244.} ^{1245.} ^{1246.} ^{1247.} ^{1248.} ^{1249.} ^{1250.} ^{1251.} ^{1252.} ^{1253.} ^{1254.} ^{1255.} ^{1256.} ^{1257.} ^{1258.} ^{1259.} ^{1260.} ^{1261.} ^{1262.} ^{1263.} ^{1264.} ^{1265.} ^{1266.} ^{1267.} ^{1268.} ^{1269.} ^{1270.} ^{1271.} ^{1272.} ^{1273.} ^{1274.} ^{1275.} ^{1276.} ^{1277.} ^{1278.} ^{1279.} ^{1280.} ^{1281.} ^{1282.} ^{1283.} ^{1284.} ^{1285.} ^{1286.} ^{1287.} ^{1288.} ^{1289.} ^{1290.} ^{1291.} ^{1292.} ^{1293.} ^{1294.} ^{1295.} ^{1296.} ^{1297.} ^{1298.} ^{1299.} ^{1300.} ^{1301.} ¹

hæc ossa separatim cernere licet, cartilagine inuicem contexta, cum in adultis ita iungantur, vt vnum potius quàm multiplex appareat, fereque ne vestigium quidem iuncturæ ullum videatur, nisi anteriore sede, in qua leuia quædam cartilaginum rudimenta in conspectum se proferunt. Sunt autem hæc ossa *Vertebræ*, id quod nō solum ex forma ipsorum, sed etiam vsu satis manifeste pater. *Ex forma* quidem, cum in omnibus, & corpus sit, & processus: *ex vsu* autem, quod vertebrarum ritu excuata sint pro spinali medulla recipienda, quæ in hoc quoq; ossē tandem finem suum recondit. Ac ossa hæc quidem contrario modo se habent, quàm reliquæ dorsi vertebræ, cum illæ, quo inferioribus approximabant magis, tanto incrementa maiora sumebant: hæc è diuerso liquido decrescant. Quare supremum omnium maximum est, infimum minimum, cum sensim angustentur, ac propterea non absurde figuram trianguli totum os sacrū exprimat, aut cucullam aliquam Monachorum. Partem habet ^g gibbam, & ^h concauā; illa dorsum, hæc pectus respicit. In vtraq; ⁱ *foramina* cernuntur, quæ ex sinibus vertebrarū conficiuntur vnitis iunctisque, ^l interiora tamen maiora multo, quàm ^m exteriora sunt, similiterq; neruorum transitui patent. Habent & ⁿ *magnum foramen*, per quod medulla descendit, sed quod euidenter in inferioribus vna cum ipsa medulla decrescit. ⁿ, B.

Processus. *Processibus* donatum est omnis generis. *Obliqui* obscuriores paulō sunt, præterquam in prima, in qua conspicue eminent, ⁿⁿ superiores sinuosiq; capitula excipiunt infimæ ⁿⁿ, C. lumborum vertebræ. ^o *Transuersi* longiores sunt, sic inter se vniti, vt vnus esse omnibus ^o, D.D. videantur: quanto autem elatiores ipsi sunt, tanto quoq; crassiores existunt. Horum cuius in postrema sede, asper & inæqualis sinus insculpitur, qui ilium os suscipit. ^p *Posterioriores*, siue *spina*, similes sunt spinis vertebrarum lumborum, minores tamen multo, & qui, quo sunt decliuiores, semper imminuuntur magis, adeo vt vltima processum minime accipiat, sed orbiculari duntaxat eminentia extuberet. ^p, E.E.

CAPVT XXII.

De osse Coccygis.

Coccygis os ^q, 2.9.3. **C**OC CYGIS OS, quod *Cauda* vulgo sermone latino appellatur, quemadmodum & sacrum os, haudquaquam simplex est, sed ex pluribus coagmentatum. ^q, 4.

Constat enim ex quatuor, vel tribus ossibus, sed vt diximus, pro ratione sacri, quod quinq; aut sex obtrineat. *Substantiam* habent ossicula hæc admodum mollem & spongiosam, nullo nec processu, neque foramine, aut cavitare donata, nec medullam continentia spinalem, quæ omnia in reliquis vertebris inueniri, antea diximus. Omnia tamen ^r superiore sede latiora sunt, quàm ^s inferiore, superiusq; semper ossiculum sub- ^r, A. se- ^s, B. quens magnitudine vincit, adeo vt in mucronem terminentur, pſitaci rostro nō valde dissimilem. *In Mulieribus* hic paulō extrorsum cedit, ob vteri ceruicem, ne in grauida comprimitur: in *Viris* introrsum curuatur, vt intestinum rectum, cuius gratia conditus est, defendat. Et hanc causam esse puto, quam propter puerulis, in quibus cartilaginis naturæ, quàm ossis propius accedit, frequens satis & familiaris morbus sit, Aniprocidentia. Sphincter enim musculus, ac ipsum quoq; rectum intestinum, huic ossiculo nexu coherent, & cum humida admodum sit puerorum temperies, fit vt harū partium funda-

Nota.

fundamentum instabilius reddatur. *Connectitur* autem ossi sacro, beneficio cartilaginis, sed nexu admodum laxo, ut in conatu valido, dum excrementa maiora secernuntur, cedere valeat. Absq; eo enim foret, sapissime profecto luxationē incurreret, quemadmodum videmus contingere quoq; non raro in partu difficiliore fæminis, quibus tamen facile, fascia circa nates valide constricta, restituitur. Habet autem *prima* superne sinum exiguum, quo postrema sacri ossis vertebra excipitur: at ubi sacrum os ex quinque; vertebribus constituitur, supremum coccygis ossiculum transuersos duos processulos acutos exigit, qui sursum educti, processui quintæ sacri ossis vertebræ validè coalescunt, foramenq; conficiunt, per quod sextum nervorum par ossis sacri educitur.

CAPUT XXIII.

De Costis.

THORAX, cum motus gratia, neque ex vno osse, ut caput, constare potuerit: neque ex sola carne, quemadmodum abdomen: sed partim propter cor, omnium viscerum nobilissimum, firmum propugnaculum requirebat, partim propter pulmones motu indigebat; Natura solertissima perquam commode utrique prospexit, dum carnes ossibus alternatim intertexuit. *Ossa* ergo Thoracis antè quidem sunt, x Sternum, & Claviculæ: *posteri* u, y Vertebrae: à *lateralibus*, z Costæ: quæ sic ingenioso inuento carnibus contextæ sunt, ut & muniri firmiter ossium, & moveri commodè carniū gratia possent.

Sunt autem *Costæ duodecim*, tam in maribus, quam fæminis, ut figmentum & fabula merito habeatur, deesse vnam potiori sexui, quod sequior ex costâ virili sit conditus. Illud sane inficias nequit iri, & experientia ipsa confirmat, fuisse nonnullos, in quibus tredecim repertæ sunt, sed rarum admodum id est, rariusque adhuc defuisse vnam. Quicquid sit, cum duodecim ut plurimum inueniantur, a septem superiores Legitimæ vocari solent ab Anatomicis, b inferiores quinque, Spuriæ. Vocantur *Legitimæ*, quod vere sint costæ, perfectum complentes circum, & ad sternum vsque pertinentes: at *Spuriæ*, quia minores illis sint, nec thoracem ambiant, aut pectoris os attingant, sed potius in latere ipso finiantur. *Substantia* omnium partim c ossea est, partim d cartilaginea, cum ex osse constant admodum fungoso quidem, & molli, sed in veris multo duriore, quàm in nobis. quibus molle ac pæne cartilagineum est, ut tum ipsæ costæ, tum per ipsas partes subiectæ sint tutiores. *Cartilago* quoque veris sic crassa est & dura, ut senescentibus facili adeo negotio in ossa conuertatur, quemadmodum & Virginibus, mammis augeſcentibus, quo firmior sedes incumbentibus mammillis paretur. Spuriis ramen contra ita mollis est, ut neque in extrema senectâ cartilagineam naturam, ut cæteræ, exuat, sed si quo forte pacto mutetur, duriuscula tantum non nihil fiat. Est etiam brevior multo legitimis, ut cunque crassior: spuriis contra, tenuis & angusta. Cæterum *com-*mittuntur antè quidem septem veræ sterno; posterius vero vertebribus; & e sterno quidem, per eâ enarthroseos neutrius speciem, quæ arthrodia dicitur, cum sterno sinus insculpti sint, qui capitula cartilaginum recipiunt: at vertebribus, f primum per capitula cartilagine incrustata, in sinibus illis corporis vertebræ, deinde g per tubercula quædam

Connexio

Costarū numerus

Diuisio

Substantia

Cartilagine

Connexio

similiter cartilagine teſta, ſinibus tranſuerſorum proceſſuum inſculpta, vbi quoq; aſperæ ſunt paulum & inæquales, vt ligamenta originem validiorem habeant, vertebris neſtantur, & alligentur. At ſpuræ anterieus, ſuſum quaſi retortæ, longo ductu ſe comitantur, actandem ſibi iſpis quaſi, & cartilaginibus verarum, vna excepta duodecima, agglutinantur: poſterius autem octaua & nona, non ſecus ac legitimæ duplici articulo vertebris connectuntur, decima rariſſime duplici, ſæpiſſime vno: at vndecima, & duodecima vnico duntaxat capitulo, ſinui corporis vertebræ inhæret. Sinus autem ille non æqualiter in omnibus ſe habet, eodemq; modo; ſed in prima quidem vertebra in ipſo corpore totus inſculptus eſt: at in octo ſequentibus ad latera proceſſuum ſuperiorum & inferiorum, vtriq; communis, vt dictum: ternæ vltimæ, inſimo loco poſitæ, ſimiliter proprios habent. *Figura* omnibus ſemicircularis contigit, gibba exterius, interius concaua. at *magnitudo* non eadem eſt, cum *ſuperiores inferioresque* breuiores ſint, *media*, longiores. Prima ergo & vltima, omnium breuiſſimæ ſunt, paulo maior ſecunda & vndecima; hinc tertia, & decima, ſexta vero, ſeptima, & octaua longiſſimæ, quod Thorax inferius & ſuperius anguſtus, in medio autem ampliſſimus ſit. Cæterum coſtarū longitudini, cartilaginis longitudo reſpondet, cum longiores longiorem cartilaginem habeant. Eodem pacto latitudinis & craſſitiei eandem rationem obtinent: vnde prima coſta, quæ latiſſima eſt, in latiſſimam finit cartilaginem: vndecimæ verò, & duodecimæ, quæ tenuiſſimæ ſunt, tenuiſſima quoque adiuncta eſt cartilago. Ipſa autem oſſea coſtarum pars, poſteriore ſede, qua vertebris neſtantur, craſſa eſt & ſtriſta: at antetiore quo proprius à ſterno abſunt, attenuatur latiorq; ſit magis. Vnde euenit, vt illa quidem pars *ωπιόν*, *remulus*; hæc, *πλάτη*, *palmula* vocetur, deſumptis eleganter his vocib. à remis, à quibus & totæ coſtæ *σπῆλαι* vocantur, cum figura & ſitu, ſi totius thoracis oſſa reſpicias, non incommode remigum exprimere videantur. Superna parte hebetes ſunt: inferna, acutæ, ſic tamen, vt in hac ^h ſinū, *b. 2. 7. 18.* canali ſimilem, ſecundum totum ipſarum longitudinem efforment, qui craſſior eſt circa F. vertebraſ, at in progreſſu ad anteriora ſenſim attenuatur, in quo intercoſtalia vaſa, venæ, inquam, arteriæ, & nerui tuto reconduntur. *Vſus* coſtarum nemini ignotus eſt. Natura enim prouida nobiliſſimo viſceri in Thorace contento, Cordi ſ firmamentum ac tutelam oſſibus his parare voluit: cui promptitudo motus, in inſpirantibus exſpirantibusve accedit, ſultis carnibus oſſeis his fundamentis.

CAPVT XXIV.

De oſſe Innominato.

AMPLEVM illud os, ad latera ſacri conſiſtens, INNOMINATVM ⁱ Galenus, *i. 2. 1. & 2.* libr. de oſſ. ad Tyrones, capit. 30. appellauit, quod ſuo tempore nomine care-
ret, quanquam hac ipſa occaſione proprium nomen inuenerit, quo à cæteris *sed im-*
omnibus diſtinguitur, dum hodieque Innominatum vocamus. Meminit ta-
meneius, multis ante Galenum ſeculis, doctiſſimus Poetarum Homerus, in Ili-
de, propriamque impoſuit appellationem, *ὀσχεον* vocando, quæ poſtea à Ruſſo, & qui
poſt ipſum doctiores exſtiterunt Anatomici, retenta fuit, cum vulgo *οσχις*, aut *ilium* dica-
tur: Vt cuiq; autem vnitatis nomine vbique veniat, minime tamen vnum ac ſimplex
eſt,

est, sed ex tribus cartilaginum beneficio inuicem iunctis, conflatum. Et iunctura quidem hæc in pueris ad septimum vsque annum maxime euidentis est: in adultioribus vero, cartilagine illa exsiccata, sensim perit, ut ad eò per *σύνφυσιν*, siue vnionem, in simplex & vnicum os, tria illa abeant. Vsu tamen venit adhuc apud omnes, qui nobis humani corporis descriptionem tradiderunt, ut ossa innominata etiam in adultis trifariam diuidantur, ac sic veluti triplicia proponi soleant.^k *Primum* os, Ilium, siue *λαγώνων ὀστέον* vocant,

Os innominatū
ex tribus
compositū
ossibus.

^k, I. A. quod lateri respondentem sedem constituit; ^l *Secundum*, Coxendicis, quod illam partem conficit, cui acetabulum pro femoris capite insculptum est: ^m *Tertium*, Os pubis, aut petinis, magnoque foramine est incisum. Primum elatiorem sedem occupat: secundum, inferiorem: tertium, anticam. Horum ossium discrimina in magno illo ⁿ coxendicis sinu depræhendi solent, in quo ^{n n} lineæ ducuntur cartilaginosa à centro ad circumferentem ambitum, quarum duæ versus superiora excurrunt, sed altera ad anteriora, ut prima; altera ad posteriora, ut secunda: tertia à centro ad inferiora trahitur. Ex his primæ duæ ilium os constituunt: secunda & tertia coxendicis: tertia & prima, os pubis.

1.

2.

3.

^o, I. 2. A. Os ergo ILIUM, omnium latissimum maximumq; superius semicirculi fere imaginem refert, & intrinsecus cauum, extrinsecus conuexum est. Semicirculus ille P *Spina ossis Ilium* dicitur, at I cauitas, *Costa*; ^r gibbositas vero, *Dorsum*. *Spina* hæc, appendix est admodum aspera, ob musculorum nexum, cum ab externa eius parte abdominis obliqui ascendentes oriantur, & desinant descendentes ab interna, pars carnosa transuersa: ab anteriore, primum par tibiae flectentium. *Dorsum*, tres primi femur extendentes, quos *Glutæos* vocabimus occupant, à quo cum & enascantur, ^r tres habet asperas lineas sibi insculptas, ut principium stabilius nanciscantur: at *Costam*, femur flectens secundus, siue Iliacus internus, totam contegit. *Connectuntur* hæc ossa cum sacro ^t longo ductu, qui simillimus est eiusdem transuersis processibus, variis tuberculis sinibusq; exasperatus, adeo, ut exacte horum ossium sinus, processibus illius, & contra processus sinibus respondeant, sicq; firmior coniunctio fiat.

Os Iliū.

Spina.

Costa.

Dorsum.

Cōnexio.

^u, 2. 3. Q. Alterum ^u Os COXENDICIS, aut COXAE dictum, inter Ilium & pubis ossa medio loco situm est, quod sinum habet, (quem ^x *coxendicis acetabulum* vocant) pro excipiendo femoris capite, quo maior in humano corpore non datur, si conferas cum cæteris, quibus aliarum partium articuli connectuntur. Sinus hic *undique y labris cingitur*, posteriore tamen parte magis, quam antica; & superiore, quam inferiore, ut femur nobis sedentibus in acutum angulum commodius flectatur. ^z Deficiunt tamen hæc labra, qua parte sinus pubis ossa respicit, ob venam ibi transeuntem, quæ articulo nutrimentum deducit, pro generando humore glutinoso & tenaci, ad irrigationem articuli maximè necessario, quod facillime in validis illis motibus, quibus continuo agitur, præsertim in longis itineribus, summo cum animalis detrimento exsiccaretur. Est autem hic sinus cartilagine contextus vbique læuissima, præter ^a anteriorem partem, quæ foraminibus exasperata, ob ligamentum teres, quod inde originem ducens, capiti femoris inseritur. Notandus vero hic quoque alius ^b sinus est ossis coxendicis, posteriori & internæ ipsius sedi insculptus, circa quæ, veluti ad trochleæ rotulam, tertius femur circumagentium musculus, siue Obturator internus reflectitur. Nec prætereunda si-

Oscoxēdicis.

Acetabulum.

Sinus.

- Appendix.* da silentio est, eiusdem ^c *appendix* quæ toti infimæ ipsius sedî, cui sedentes innitimur, ^e, L. adnascitur. Hæc admodum lata est pro ratione ossis cui adnascitur, cum ab ea insignes musculi originem ducant, tres nempe posteriores tibiæ flectentes, tertius puta, quartus, & quintus. Habet tandem etiam *duo tubercula* in ambitu acetabuli, vnum ^d *internum*, alterum ^e *externum*. Ab illo initium sumit Secundus tibiæ extendentium, si- ^d, ^e, ^Q, ^P. ue Rectus; in hoc, quod acutum valde est, ligamentum inseritur, quod à quinto ossis sacri processu exoritur.
- Os pubis* Tertium tandem ^f *Os Pubis* in anteriore parte positum est, vbi cum osse pubis ^f, ⁱ, ³, ^M. alterius lateris committitur & linea aspera & crassa recta descendente, quam interce- ^g, ^M. dit cartilago quædam non admodum dura. ^h *Foramen* habet omnium totius corporis ^h, ^N. maximum, auriculam non absurde exprimens, inter sinum coxendicis, eamque partem, qua suo coniugi, seu alterius lateris ossi pubis committitur, positum. Leuitatem affert ossi hoc foramen, sedemque præbet duobus femoris musculis, extrinsecus externo, intrinsecus interno Obturatori, siue secundo & tertio circumagentibus musculis, qui à se inuicem ligamento forti, quod foramen hoc subtendit, disparantur. Supra foramen hoc insculptus est ⁱ *sinus*, per quem venæ & arteriæ transeunt, quæ ad crura deducun- ⁱ, ^O. tur, siue Vasa cruralia appellata. Cæterum hæc tria ossa cum sacro iuncta, constituunt cavitatem, quam vulgo ^l *Peluis* vocant, in qua intestinorum, vesicæ, & vteri pars, con- ^l, ², ^I, ^V. tinetur. *Vsus* horum ossium est, femoris caput in se recipere, & sic vniuersum corpus sustinere; deinde partes infimi ventris tum fulcire, tum munire, præsertim verò intestina, vesicam, & in fæminis genitalia membra.
- Differētia horū ossium in vtroque sexu.* Cæterum cum *infæminis aliqua differentia* circa hæc ossa occurrat, & haud parum à virilibus diuersa sint, sub calcem huius capituli illud discrimen breuiter subiicere decreuimus. *Primum circa ilium ossa* inuenitur, quæ latiora multo atque ampliora sunt in fæminis, spinam quoque magis in latera educunt, id quod vteri gratia factum est, ut ipse, dum in magnam attollitur molem grauidus, histanquam fulcris innitatur, suumque pondus facilius sustineat. *Alterum, in coxendicis ossibus cernitur*, quorum inferiores partes à se magis, quàm in viris distant, ut infanti ex vtero egredienti, transitus sit maior. *Tertium, in ossibus pubis* aduertitur, in quibus linea aspera, qua diximus inter se hæc ossa committi, in fæminis multo breuior est, ac in maribus: at cartilago contra, ipsa ossa inter se connectens, duplo crassior, laxior, ac mollior. *Processus quoque inferiores*, qui sub dicta linea siti sunt, ad externa magis à se diducuntur, ut sic in fæminis cavitatis infimi ventris, quam Peluis nominauimus, multis modis, quàm in maribus sit maior, quod cum intestino recto, vesicaque, vterum, & quando plenus est, fætum etiam continere debuit.
- QVÆSTIO.* De his ossibus quæstio esse solet inter Medicos, verane sit quorundam sententia, quæ pro certa à pluribus accipitur, ab antiquissimis Authoribus confirmata, de ossium pubis partus tempore inter se diuisione. Nos cum breuitati studeamus, relictis argumentis quæ pro vtraque parte in medium afferri consueuerunt, quid sæpenumero non tantum ipsi propriis oculis viderimus, sed aliis etiam in publico Theatro conspiciendum dedimus, breuissime hic proponemus. Incedimus enim media via, nec in omnibus hiscere, nec in nulla, ex plurimis obseruationibus statuimus, sed in illis tantum, quæ partum ha-
bent
- Obseruatio.*

bent admodum difficilem ac laboriosum; aut partes ad fatus egressum necessarias, oppido quàm angustas sunt nactæ. Nec quoque ita à se diuidi credimus, vt à se mutuo dehiscant: sed ligamento laxiore reddito, adeoque sequace ad extensionem, non nihil hiare arbitramur. Fieri autem id posse facilius norauimus, quotum maior ante partum ad illa membra generationi fœtu (que exitui dicata; tum in illis maximis doloribus, quibus in partu difficili (præsertim si diutius duret) miseræ mulierculæ conficiuntur, humorum affluxio fieri consuevit. Sæpe enim sæpiusque vidimus, vasa illa, quæ alias minora satis sunt, dum vtero non gestant, in eam accreuisse grauidis magnitudinem, vt minimi digiti apicem fere crassitie adæquarint. Quamobrem profecto fieri nequit, quin ligamenta omnia, adeoque & cartilagine hæ pubis ossium irrigentur, & molliores postea reddatæ, ad aliquem hiatum maximopere præparentur. Neque tamen ossa pubis duntaxat; sed & articulationem illam, quæ sacrum os cum ossibus ilium connectit, pro maiore minoreque difficultate, quam partus peperit, laxatam fuisse aduertimus: vnde illud est, quod exacto labore graui, de doloribus circa os sacrum & pubem puerperæ nonnunquam conquerantur, cui vt obstetrices remedium inueniant, in lectum collocatas, pedibusque crucis in modum impositis, iubent quiescere, vt illa ossium separatio, humoribus digestis, solidè iterum vniatur. Quàm autem promptum sit, vt hæc ligamenta laxentur, quilibet experiri potest, si ossa innominata, adhuc sacro iuncta, & ligamentis suis inuestita accipiat, cartilagineque duorum pubis ossium abscissa, ipsa pubis ossa mutuo à se diuidat. Videbit protinus iuncturam illam laxari admodum posse, quam ipsam nos quoque sua natura in fœminis, quàm maribus laxiorem esse factam deprehendimus. Id vero quoque obseruandum est, ligamentum illud os sacrum innominatis alligans, anteriore parte, qua abdomen spectat, tenue satis esse; posteriore vero crassissimum, vt adeo affluentibus humoribus haud difficulter remitti queat, sicque anteriore parte ossa ilium à sacro hiscant, posterius autem iuncta maneant. Quod sane Natura solertissima in eum fecisse videtur finem, vt luxatio horum ossium præpediretur, quæ necessario cōtingeret, si ligamentum vtrique parte laxaretur. Reuera autem se ita habere, oculisque ipsis cerni posse illam (vt sic dicam) dehiscētiam, probare citra negotium potuimus sæpe in publicis demonstrationibus, in quibus fœminarum ex difficili partu mortuarum, (cuncte siue adhuc integra, seu secta) femur alterum sustulimus, vidimusque os pubis illius lateris, digiti fere latitudine eminuisse, quod alias fieri sine laxitate ligamentorum vtriusque articuli non potuit. Simile accidit cum alterius lateris femur eleuaremus, id quod & ab aliis doctis viris sic obseruatum est. Ex his autem merito omnes, & iure conclusimus, pro difficultate in laborioso partu, magis minusve ossa pubis & sacrum, dehiscere, cartilagine, & ligamento facile ad omnem hiatum, ob maximum humorum ad illas partes affluxum, sequacibus.

Dolores circa os sacrum, & pubem, post difficilem partum.

Nota.

C A P V T XXV.

De osse Humeri.

HACTENVS trium ventrium ossa vidimus; restat ergo vt & artuum ossa inspiciamus, quos supra in Manus ac Pedes diuisimus, vocantes *manum* quicquid à *partes*.
K sum-

Oshu-
meri.

summaſcapula ad extremos vſque digitos pertingit. Hæc in tres partes ab Anatomicis diſpeſcitur, in Humerum, Cubitum, & Extremam manum. Dicitur ^a Os HVMERI, ^{a, 2. 9. fig.} quod à Græcis *βραχιον*, à Latinis quoque BRACHIVM, & HVMERVS *συνεχδοχικῶς* ^{8. 6. 9.} vocatur, & inter ſcapulam ac cubitum, quibus ſupra infraq; committitur, interiacer. Os eſt ſubſtantia duriffimæ ac ſolidiffimæ, in medio per totam longitudinem fiſtulæ modo excavatum, partim vt medullam contineat in ſe, partim vt homini leuitate conſuleretur. *Figuram* habet teretem, ſed variis exaſperatam lineis, pro variorum muſculorum infer-
tione, aut exortu, ſuperius inferiuſq; admodum lateſcens.

Appēdix
ſuperior.
Caput
ſuperin-
ternum.

Caput
ſuperex-
ternum.

Elatiore enim ſede ^b *appendice* donatum eſt, ex qua duo exigit *capita*, quorum ^c *al-* ^{b, A.} *terum* ^{c, a.} *internum*, amplum & circulare eſt, læue, ac vndique cartilagine incurſatum, quod ſinui ceruicis ſcapulæ committitur, & omnes humeri motus, ante, retro, dextrorſum, ſiniſtrorſum, ad ſuperiora denique, & inferiora perficit. Perfectiſſima enim articulan-
di ratione connexum eſt, cuiuſmodi Enarthroſin vocant, & omnibus motibus ciendis abſoluendisque, maxime eſt accommodata & opportuna. ^d *Alterum caput externum* eſt, ^{d, b.} quod non, vt prius, in alium ſinum recipitur, ſed gratia ligamentorum inferendorum factum eſt, illoque multo minus exiſtit, ſed magis inæquale, quod beneficio ſinus, vndique prius caput ambiens, ab illo magno diuellitur. Caput hoc iterum in duo alia diuiditur, ^e *anterior* puta, ^f *poſterior*que, ex quibus illud multis modis maius gran-
diuſque eſt, hoc, minus. Dirimuntur autem intercedente ^g ſinu quodam tereti, qui ^{e, c.} *pro recipiendo primo primi cubitum ſtectentium muſculi*, principio exſculptus eſt, ^{f, d.} quem inferius Bicipitem appellari dicemus. Totus poſtea humerus deorſum fertur, ita tamen, vt ſenſim anguſtetur, in quo progreſſu parte ^h *anterior* ^{h, f.} *teres* eſt, ⁱ *poſterior* ^{i, g.} *depreſſus & latior*, quæ ſane figura muſculis illic locorum poſitis maxime opportuna eſt, & apta.

Appēdix
inferior.

Trochlea

Sinus.

Capitu-
lum.

Tuber-
cula hu-
meri.

¹ *Inſima parte* iterum & euidenter lateſcit, maximamque varietatem, ob proceſſuum ^{l, h.} ſinumque copiam repræſentat. Cum enim duobus oſſibus coniungi debuerit, Cu-
bito & Radio, vtrumque autem os duobus motibus agitur, factum etiam eſt, vt ca-
pitibus differentibus indignerit. Eſt ergo ^m *inferius interiuſque caput pro Cubi-* ^{m, i.} *to*, cui, quod cardinis imaginem quoquo pacto exprimit, per *γῆγλυμον* coniungi dici-
tur, ſed quia trochleam refert, *Trochlea* etiam, aut *Rotula* nomen, ab Anatomix Profeſ-
ſoribus accepit. Nam præter quod orbicularem formam mediam accepit, planam v-
trinque à lateribus, media quoque ipſius pars ſinuata eſt, non ſecus ac trochlea, qua
parte funem ſuſcipit, vtrinque modice prominens. Non tamen exacte trochleæ com-
paraueris, quod ab interna parte magis, quam externa extuberet. *Sinus* habet *duos*, an-
te, retroque vnum, leuiſquama inter ſe diſtinctos, quorum ⁿ *ille*, qui anticam ſe-
dem occupat, minor eſt, & anteriorem proceſſum cubiti ſuſcipit: ^o *hic* maior mul-
to, poſteriori eiudem proceſſui dicatus. A latere externo *aliud caput* coniunctum
habet, cartilagine tectum, cui radius committitur, ſed quia is non niſi anterieus fle-
ctitur, & in prorum aut ſupinum aptatur, anteriora non excedit. Vtrinque ad la-
tera horum capitum, eminentiæ adſunt, quas *Tubera*, & *Tubercula* vocant, quarum il-
lam quæ trochleæ vicinior eſt ^p *internum*, alteram, ^q *externum* vocant: vtramque ex-
ortibus variorum muſculorum deſtinatum. Plærique enim muſculi, qui cubiti radii-
que

que ossibus interna parte incumbunt, ab interno quoque tubere ortum suum habent: similiter ab externo, forinsecus situati. Maius est longe interius externo, vtrumvis tamen à tubere in acutam lineam desinit, & longo ductu superiores humeri partes ascendit. Ad horum latera sinus sunt, & primo quidem ad latus ^r externi in parte humeri posteriore, pro quarto pari neruorum brachii; deinde ad ^f interni, in facie anteriore, pro tertio coniugio neruorum illic transeuntium: in posteriore vero, pro quinto pari. ^t Foramina insignia nulla habet, sed in elatiore sede, parua quædam, nullo disposita ordine, quæ pro ligamentorum insertionem, aut educationem sunt condita. ^u In medio longitudinis, interna parte vnum est euentissimum, quod deorsum vergens in ipsam ossis substantiam intimiorem penetrat, vt per id ramus insignis ad ossis nutritionem, in cauitatem medullarem traducatur.

CAPVT XXVI.

De Vlna, & Radio.

4, 2. 9. fig.
10. & 11.

ALTERA brachii pars ^a CUBITVS dicitur, & duobus constat ossibus, quorum illud, quod minus, superiore sede locatum est; hoc, maius puta, inferiore: vel, si maius cum aliis loqui, illud exteriorem; hoc internam partem tenere dicas. Ratione enim situs brachii, appellatio apud Authores variat, vt modo superius dicitur illud, si cubitus pectori applicetur, totumque brachium in media figura iaceat: modo exterius, si totum à trunco recta dependeat. *Primum os κερκίς, Radius dicitur: alterum πῦξυς* Græcis, Latinis *Cubitus*, vtriusque abusu quodam nominis, totius appellationem parti tribuentibus. Hunc ergo euitare conantes nonnulli, *Vlnam* nominarunt: toti autem parti propriam appellationem retinuerunt, *Cubitum* vocantes. Cæterum hæc duo ossa ita inter se summo Naturæ ingenio constructa sunt, vt *Cubitus* quidem flexionis, & extensionis munus obbeat; & flexionis quidem, in acutissimum angulum, at extensionis ad rectam tantum lineam, quam nunquam excedit; *Radius* vero, manus potissimum gratia conditus sit, quam pronam supinamque reddit.

Habent hæc ossa quædam communia inter se, quædam contraria, nonnulla propria. *Communia quidem*, primo *substantiam*, quæ vtrique durissima est ac solida, si appendices tantum excipias: vtrique etiam fistulæ in modum excavata, vt medullam excipiant, & pondus inutile euitent. Deinde *figuram* non dissimilem valde inter se habent. Vtrumque enim os longum est, variis exasperatum lineis, musculorum gratia; capitibus etiam vtrinque donatum, ex quibus in vtriusque vnum maius latiusque est; alterum, minus tenuiusque. In eo tantum *admodum contraria* sunt, quod *Cubitus* superiore parte grandiusculum caput obtinuit, motus sui gratia, inferius vero tenue: *Radius* vero è diuerso, cum ad flexionem, & ad extensionem parum conferat, cuius gratia potissimum articulus ille humeri inferior, cui superiore parte committitur, conditus est, tenue habet caput ac rotundum; inferius autem latum, vt carpi ossa recipiat, quibus cum totam postea manum pronam supinamque præstat. Voco supernam partem eam quæ summum locum occupat, cubito cum brachio toto dependente à trunco; infimam, quæ contra, inferiorem.

Foramina.

Cubitus.
& eius
ossa.

Vfus.

Cōmunia vtriusque ossis.

1.
2.

Contraria.

CAPVT XXVII.

De ossibus extremae Manus, & Sesamoeideis appellatis.

r. 2. 9. fig.
16. & 17.
f. A. A.

s. B. B.
u. C. C.

TERTIA brachii pars, ^r *Manus reliqua* est, ἀκρόχρη Græcis dicta, quæ totum id, quod ^{Manus} à cubito radioque dependet, complectitur. Constat similiter tribus partibus, ^{extima.} καέπω, ^{Partes.} siue *Brachiali*; μετακάέπω, siue *Postbrachiali*, & δακτύλοις, *Digitis*. ^r *Carpus* suprema pars est; ^r media, metacarpium; ^u infima, digiti.

CARPVS ergo superne radio connectitur, inferne metacarpio, ex octo constitutus ossiculis, quorum substantia mollis, & intus plena foraminibus est, etsi foris solida esse videatur, quod in prima generatione non ossa sint, sed cartilagines, postea vero sensim indurescant. *Figuram*, hæc vniuersa inuicem iuncta, conuexam exterius, intus ^{Figura.} concavam obtinent: at singula per se considerata, diuersas & indicibiles, nullique alii rei, quam sibi proprias referunt, cum magna ex parte nexum adiacentium ossium horum figura sequatur. *Connectuntur* inter se ope cartilaginum ac validorum vinculorum, ^{Connexio} ea articulationis specie, quam Neutram à Galeno vocari supra diximus, quod ratione ipsius compositionis Diarthrosin æmulentur, cum laxa sit connexio; at ratione obscuri motus, Synarthrosin. Componitur ergo ex octo ossiculis, sed duplici serie inuicem distinctis, quarum vtraque quatuor in se cōtinet: ita ut superior ordo tria externa simul sic iuncta habeat, merito ut omnibus vnum esse videantur, & quartum omnium minimum, minimo digito subtensum: inferior autem series quatuor aliis postbrachialis ossibus necitur.

x. B. B.
y. I. II.
& c.

z. g.
a. h.

b. i.

* **M**ETACARPVS autem quæ altera manus pars est, ^y quatuor conficitur ossibus, ^{Metacar} non quinque, ut voluere nonnulli, qui primum pollicis os in huius album referre sunt ^{pus.} conati: sed malè, ut recte notauit Galenus, cum diuersa sit articulatio huic, quàm metacarpi ossibus, tum manifestus motus. *Articulatio quidem*, quia per Diarthrosin carpo committitur, reliquis per Neutram connexis: *at motus*, cum in illo manifestus sit, ante, retro, dextrorsum, sinistrorsum: in his vero, aut nullus, aut certe ita obscurus, ut nulli pateat. Ossium horum *substantia* dura est ac solida, intus fistulæ in modum ca- ^{Substan-} ua, quemadmodum & ipsa ossa figuram teretem obtinent, quæ tamen latior ab ^{ria.} ^{Figura.} ² externa parte est, præsertim superiore sede, vbi planam superficiem habent: ^a interna vero, gibba, duobus quasi planis vtrinque ab extremitatibus externæ partis eleuatis, & in vnam lineam acutam coeuntibus. Atque hæc causa est, ut inter bina ^b interuallum semper cernatur, pro musculis digitorum interosseis, de quibus postea dicemus, recondendis, cum sese exacte tangere non possint. *Magnitudinem* quod spectat, sicum digitorum ossibus conferas, multo maiora sunt: si inier se componas, inæqualia cernes, & longitudine, & crassitie. Longissimum enim, crassissimumque est primum, quod indici præfigitur: minus longum crassumque secundum est, quod medio subrenditur: tertium adhuc breuius quod auricularem sustinet digitum: omnium vero breuissimum, tenuissimumque est minimi, adeo ut proportionem seruata semper ipsa decrescere videantur. ^c *Supra* ^d *infrag*; habent *appendicem*: illa, carpi ossibus; hac, digitis iunguntur: illa, sinum ^{Appendi-} ^{ces.} habet; hæc, capitulum rotundum, & oblongum, cartilagine tectum, sed à lateribus compressum.

c. l.
d. m.

Digiti.

DIGITI e tandem, quindecim constant ossibus, cum quinque sint, & singuli terna e, C. C. habeant, pulchra serie sibi iuncta, quam Græci *Φάλαγγα*, siue aciem, appellant, cum ab ipsis inuicem nexis aliquo pacto videatur exprimi. Cæterum ipsi ossa peculiaria nomina non acceperunt, sed Pollicis, verbi gratia, aut Indicis, primum, secundum, vel tertium dicimus: *primum* quidem vocantes illud, quod metacarpio proximum est: huic vicinum, *secundum*: at *tertium*, quod ab isto dependet. Duram habent omnia *substantiam*, *formam* autem intus cauam, foris conuexam: inferius latam, supra angustam: dextrorsum verò, & sinistrorsum rectis lineis exasperatam, quibus quasi terminis primum & secundum os clauditur à lateribus. Acutum est tertium, quod ex lata basi in rotundum definit capitulum. *Magnitudo*, inæqualis est; minimum enim est tertium, hoc maius secundum, primum omnium maximum, id quod Naturæ legibus admodum conueniens est, cum partes sustententes sustentendis semper maiores esse debeant. Habent *appendices* supra infraque: at tertium superiore tantum parte, cum inferna alteri ossi nulli nectatur. *Superiores appendices* obtinent sinus: *inferiores*, capita: & *primi* quidem *ossis* superior, vnico tantum constat, pro capitulo ossis metacarpii sibi correspondentis recipiendo: inferior vero duplex capitulum, oblongum, vtrinque anteriore sede extuberans. *Secundi* vero superior, sinum duplicem, oblongo distinctum tuberculo, pro dicto capite: inferior autem similiter duo capitula. *Tertium* tandem supra duplicem sinum, at inferius capitulum habet asperum, foris parum, intus plurimum eminens, & quasi lunatum, vt tendinem recipiat musculorum digitos flectentium. *Eodem prorsus modo se habet & Pollex*, nisi quod primi ossis superior appendix, sinum obtineat non ita cauum, sed potius antierius posteriusque extuberantem: inferior vero vnico capitulo constat, vnde & ipsi sinus in appendice superiore secundi ossis respondens necessario simplex est.

Ossicula
sesamo-
eidea.
Situs.
Figura.

Nume-
rus.

Connexio
Vfus.

Ad hæc ossa merito referri debent etiam illa minima, quæ in manu occurrunt, sesamo semini comparata, & propterea *σσεμοειδῆ*, *sesamoeidea* à Veteribus Anatomicis appellata. *Sita* sunt hæc in interna manu, in digitorum internodiis, & *substantia* sunt in ortu cartilaginosa, postea ossæ, sed pumicis ritu foraminulenta, efficta ad similitudinem patellæ, quæ femoris, tibiæque articulo præfigitur, cuius vsum quoque in omnibus referre videntur. Horum *numerus* etsi incertus sit, quod modo plura, modo pauciora reperiuntur pro subiectorum diuersitate, omnibus tamē ferè doctioribus duodecim tantummodo recensentur, quorum duo secundo pollicis ossi, qua primo iungitur interna parte, bina deinde singulis primis quatuor reliquorum digitorum internodiis, vbi cum metacarpio nectuntur, & denique secundo ac tertio indicis internodio vtrobique vnum præfigitur, idque mediantibus tendinibus musculi tertium digitorum articulum flectentis. *Vfus* est, prohibere quo minus in validis digitorum extensionibus ossa luxentur, & ex sua sede profiliant.

f. 2.9. &
fig. 18. &
19. sed si-
tus eorū
figura 17.
cernitur.

CAP V T XXVIII.

De offe Femoris, & Patella.

g, 2. 10. f.
1. 2. & 3.
VT brachium trifariam diuidebatur; ita quoque Crus commodissime in tres partes *Cruris tres partes.* discescit, in Femur puta, Tibiam, & Pedem extremum. s FEMUR, Græcis *μυγός, Femur.* os est, vt humerus, vnicum, omnium quæ in corpore nostro sunt maximum, non solum longitudine, sed crassitie quoque, robore, ac soliditate reliqua superans. *Substantia enim habet si quod aliud durissimam, intus tamen fistulæ in modum excavatam, non tantum ne pondere nimio homini incommodaret: sed etiam, vt medullam in se reciperet, quæ ad nutritionem ossium, vt ostendimus, propter illam naturalem, quam habent, siccitatem cum duritie iunctam, maxime est necessaria. Figuram* *naustum est oblongam, non tamen rectam; sed antè h gibbam, i posterius concauam, vtrinque circa extremitates, maxime verò inferna parte impenſe latam: cætera in harum medio exactè teres, nisi à postica fede ipsam inæqualem redderet ii aspera linea, satisque protuberans, quæ à summa ipsius ad infimam vsque partem ducitur. Conneditur superius ossi coxendicis, inferius autem tibiæ.* *Figura.*

h, fig. 1.
i, fig. 2.
ii, a. a.
l, A.
m, B.
n, C.
o, D.
p, E.
 Habet *duas appendices*, quarum *superior*, versus intèriorem partem, i ceruicem exigit satis insignem, oblique sursum protensam, cui *m* caput impositum est, omnium quæ in corpore sunt maximum, exactè semiglobosum, læue, æquale, ac densa cartilagine incrustatum, quod, in medio fere, *n* foramen habet, cui fortissimum ligamentum rotundum, ex sinu ossis coxendicis pronatum, inseritur. Sed præter caput, & ceruicem, *duos* quoque *processus* educit, quorum *alter* *o* *externus*, ex lata basi sensim angustatus, insignis admodum, imo omnium processuum, qui alteri ossi non committuntur, in corpore maximus est; *alter*, *p* *internus*, multis ab illo parafangis, si magnitudinem spectes, superatus, obtusum referens tuberculum. Processus hi duo, cum aliis nostri corporis commune habent officium, vt musculorum insertiones excipiant, indeque appellationem propriam sunt nacti, vt apud Græcos *τροχαυτήρες, ὅτι ἔτροχάζειν*, à Latinis *Rotatores* dicantur, quod scilicet eos musculos excipiant, qui femoris motui auxilium præstant. Circa primum & maiorem, sinus, impressiones, ac linea diligenter obseruanda sunt, cum in libro quarto horum frequens futura sit mentio, quando de femoris musculorum insertione loquemur. *q* *Sinus* in interna parte est eximius, in quem secundi & tertii femur circumagentis musculi tendines implantantur. *Impressiones* *quatuor* sunt, ad gibbam eius sedem & externam. *r* *Prima*, in procliuiore & humiliore sede est, ampla, vt extendentium femoris primi; *s* *secunda*, in anteriore sede, quæ aliquatenus aspera est & sinuosa, vt eiusdem secundi; *t* *tertia*, in inferiore sede, ac inter duas impressiones media, gibba nonnihil, vt tertii; *u* *quarta*, in elatiore, & apice ipso processus, vt quarti tendinem suscipiat. *x* *Linea* denique *aspera*, à prima impressione deorsum ducitur, nonnihil oblique per femoris posteriora incedens, vbi primus musculorum, femoris inseritur. *Processus siue rotatores.*

q, 2.
r, 1.
s, 2.
t, 3
u, 4.
x, F.
p, G.
Inferior femoris appendix, duo insignia capita in posteriorem potius, quam anteriorem partem vergentia constituit, quorum *y* *alteram*, quod *internum* est, & corpus respicit, *duo*. *Sinus.* *Impressiones.* *Linea aspera.* *Inferior appendix. Capita duo.*

Sinus
duo. cit, crassius existit: ^z *alterum externum*, latius, cæterum magis depressum. Inter hæc ^z, H. ante retroque *sinus* est: ^a *ante* quidem, lævis admodum & cartilagine tectus, qui patellæ tuberculum excipit: ^b *retro*, grandis, & qui pollicis latitudinem exæquat, partim ^a, I. ^b, K. ut sedem præbeat firmam valido illi ligamento ex femore enato, quod tuberculo inter duos sinus in tibiæ elatiore sede exsculptos, enato, inseritur, partim ut viam tutam præstet valis per crus excurrentibus, nempe neruo omnium maximo, venæ, & arteriæ. Vtrumque caput ad latera sinus obtinet, qui sedem præbent tendinibus musculorum tibiæ illic transeuntibus.

Foramina
na. ^{bb} *Foramina* quoq; sunt circa appendices lenia, quæ inseruiunt validiori ligamentorum rotundorum articulos ambientium insertioni. Illud tamen obliuioni tradendum non est, in posteriore parte inferiorum capitum, duo ossa sesamo semini similia reperiri, quæ Natura solers ad primi pedem mouentis musculi duo principia affixit, ne scilicet musculus ab illis capitibus in motu validiori attereretur, damnumq; caperet.

Patella. Cæterum cum Patellæ modo mentio iniecta sit, occasione situs eius in anteriore inferioris appendicis femoris parte, ipsaque ad articulationem femoris cum tibia faciat, eodem capite de ipsius quoque historia differemus. Est ergo ^c *PATELLA*, siue *μύλη*, *Mola*, & Barbaris *Rotula*, os subrotundum, latum, vix duos transversos digitos exæquans, ^c, 2. 10. *f.* foris planum, & foraminulis refertum, ^d *intus* gibbum quodammodo, & cartilagine ^d, *fig. 9.* tectum, quod ^e *femoris & tibiæ ossi* antè prius præponitur, ne vltia modum extendantur, neve à tibia femur procidat, sicque in locis decliuioribus, & ubi pedis extensio firmior requirebatur, ambulatio impediretur, aut prorsus pessumiret, quemadmodum solet accidere iis, quibus huiusmodi os fractum aut luxatum est, cum plana quidem loca tuto adire, at decliuiora sine metu casus, nequeant. *Substantia* huius, in primo ortu mollis est, & cartilaginea, talisque per plures menses remanet, postea sensim in durius os ætate prouectis abit. Plenum tamen foraminulis est, quemadmodum reliqua omnia, ^e, *fig. 10.* ^f, 2. 1. *T.* quæ ex cartilaginibus in ossa transeunt. *Connectiur* non secus ac sesamoidæa ossa digitis, ita his duobus ossibus; beneficio tendinum crassiorum, secundi, tertii, & quarti tibiæ extendentium musculorum, qui per genu ad tibiæ descendunt, & tuberculo ipsius anteriori implantantur.

C A P V T XXIX.

De Tibia utroque osse.

TIBIA & altera pars cruris est, inter genu & pedem sita, duobus constans ossibus, quorum illud quod crassius est, nomen totius retinet, & Tibia, Græcis *κνήμη* vocatur: ^g, 1. 1. *oss.* alterum, quod tenuius, Fibula, *περόνη*. Illud internam, hoc externam partem occupat, vtrumque substantiam habet duram solidamque, intus fistulæ in modum excavatam.

Tibia.
Appendix superior. ^h *TIBIA* autem, ut ab hac initium dicendi faciamus, duabus donata est appendicibus, quarum vtraq; reliquo osse latior est. Illa quæ ⁱ *superior* est, femori per enarthrosin committitur, non nihil ab anterioribus ad posteriora discedens, quo loco sese in duas fin- ^h, 2. 10. *f.* ⁱ, 5. *fig. 6.* ^j, A. dit eminentias, extra os aliquantulum protruberantes. Habet hæc appendix in sum-
mitate

- I. B. B.* mitate¹ *duos sinus oblongos*, sed superficiales tantum, læui incrustatos cartilagine, qui
m. C. bus inferiora duo femoris capita excipit. Inter hos ^m *tuberculum* est interiectum, inæ- *Sinus. Tuberculum.*
 quale, & asperum, posteriore ossis sede, aspero eminens apice, in quem inseritur va-
 lidissimum illud ligamentum, quod ex sinu illo magno & amplo inter capita inferioris
 femoris appendicis interiecto, enasci, & procedere, capite præcedente diximus. Ne *Cartilago sinui adiuncta.*
 vero in tam leuibus his sinibus, qui necessarii maxime erant, sit tibia ad acutum admo-
 dum angulum flecti debebat, facile exciderent, sicque perpetuum luxationis pericu-
 lum homini impenderet, Natura peculiarem in ambitu vtriusque cartilaginem appo-
 suit, quæ crassa, versus centrum sensim attenuatur, & ligamentorum ope annectitur.
n. D. Habet etiam ⁿ *capitulum in posteriore parte*, sub externa protuberantia, quod superio- *Capitulum laterale.*
 ris fibulæ appendicis sinum ingreditur. Hoc rotundum habet ambitum, admodum,
o. E. tamen leuiter prominet, & cartilagine incrustatur. ^o Reperiuntur autem & forami-
 nula plura in anteriore sede capitis tibiæ, quæ superficiem illam asperiores red-
p. F. dunt, & ^p *tuberculum in signe*, secundum longitudinem primæ lineæ, superiore sede non-
 nihil excurrens, in quod tendo inseritur, extenditibus secundi, tertii, ac quarti tibiæ
 extendentium musculorum commistus. Hinc tibia recto tramite deorsum tendit,
 nonnihil semper angustata, non tamen vt plæraque ossa omnia teretis figuræ est, sed
q. I. triangulæ, ex tribus composita lateribus, quæ totidem lineæ conficiunt ^q *Primali- Tresli-
nea.*
r. 2. altera ^r *interna*, & obtrusa est; altera ^r *externa*, acuta similiter, quæ ligamentum susci- *1. Spina.*
s. 3. pit tibiæ oblongum. Ex his conficiuntur *tria Latera*, quorum duo anteriore sede, *2.*
s. I. vnum posteriore est. ^t *Primum*, in anteriore parte à latere interno est, gibbum, & *Interna.*
u. II. mni carne destitutum, quod *ἀντινύμιον*, dicitur: ^u *secundum*, externo latere pro mus- *3. Externa.*
x. III. culis in tibia hærentibus anterioribus: ^x *tertium*, posteriore sede, pro musculis poste- *Triala-
tera.*
y. G. rioribus. Hoc superiore parte lineam habet asperam, longo ductu ad inferiora excur- *1.*
z. H. rentem. Circa hanc lineam media fere sede, ^y foramen insigne est exculptum, quod *2.*
 in partem internam ossis penetrat, & venulam deducit pro ossis nutritione. ^z *Altera* *3.*
a. K. *appendix*, inferiorem tibiæ partem constituit, multo priore minor, qua ipsa cum talo per *Appen-
dix infe-
rior.*
b. L. ginglymum articulatur. ^a *Sinum* habet *geminum*, cartilagine tectum, linea media à *Sinus du-
plex.*
 posteriore parte in priorem excurrente distinctum, vbi postea in leue tuberculum ter-
 minatur. Horum qui ab interna parte consistit, maior est & profundior, ob ^b proces-
 sum quem ibi locorum tibia exigit. Processus enim crassus est, intus cauus, foris gib-
 bus & excarnis, *Malleolus internus* ab Anatomicis vocatus. Externa autem parte in hac ap-
 pendice alius sinus oblongus occurrit, qui fibulæ caput inferius suscipit, asper, & nulla
 cartilagine munitus. *Malleolus internus.*
- s. 2. 10. f.* ^c *FIBULA* autem tibiæ adstans ab externo latere, multo minor est ipsa crassitie, Fibula.
7. & 8. etsi longitudine æqualis, cum infratibiam excedat, quantum superna parte ad genu
d. M. superatur. Solida quoque est, & duplici appendice firmata, quarum ^d *superior* in la- *Appendix
superior.*
e. N. tere interno, sinum habet cartilagine tectum, à quo excipitur capitulum laterale, quod *Appendix
inferior.*
 sub superiori tibiæ appendice subsistit. ^e *Inferior* vero in acutum angulum definit, & *Malleo-
lus ext. r.
nus.*
 in sinum inseritur externum & oblongum inferioris tibiæ appendicis, nulla, quemad-
 modum & sinus, tectum cartilagine, ibique *Malleolum externum* constituit, qui cum in-
 terno

terno talum in sua sede continet, imo magis, quàm ille, cum fibula descendat altius, & producat: ex quo fit, ut exterior interiore semper humilior appareat. ^f Reliqua fibula pars, quæ inter hæc duo capita interiacet, inæqualis est, & triangulum exprimit, & tribus lateribus inter se iunctis, in quibus aptissime locantur pedem ac digitos mouentes muscoli. Conficiuntur latera hæc ex totidem ^h lineis, una anteriore: duabus vero posterioribus. Anterior acuta est, quemadmodum & posteriorum interior: exterior autem rotunda. Ab anteriore & interiore, primum latus constituitur: ab anteriore & exteriori, secundum: at tertium, à duobus posterioribus. Cæterum cum hæc duo ossa, inter se in medio dehiscant, ut musculi pedis illic commodius reponantur, ligamentum membraneum Natura condidit, quod utrumque os medio spatio complectitur. Iungit autem externam tibiæ lineam cum interna fibulæ.

Linea
tres.

C A P V T XXX.

De ossibus Pedis extremi.

QUEMADMODUM Manus extrema tribus constabat partibus, carpo, metacarpo, & digitis; ita ^l pes quoque extremus totidem conficitur, illis planè respondentibus, ^{l, 2. 10. fig.} ^{11. & 12.} ^{m, A. A.} ^{n, B. B.} ^{o, C. C.} ^{p, D. D.} ^{tarso} inquam ⁿ iuxta tarso, & digitis. Præter has tamen & alia quædam est, cui nulla manus particula accommodari potest, quam tria ossa componunt, puta talus, calcaneus, & os naviculare à forma appellatum. Vtunque autem non desint nonnulli, qui & hæc ad tarsum rectè referri statuunt, quia tamen insigne quoddam discrimen inter ipsa, & carpi ossa, quibus exacte tarsi à nobis vocata ossicula respondent, aduertitur, doctrinæ facilioris gratia, distinctionem hanc ossium pedis, quam illam, sequi cum probatissimis Authoribus maluimus, quartam hanc pedis ossium partem *Innominatam* vocantes. Incipiamus ergo ab istis tribus primum, postquam nonnulla ab initio, ipsis communia, enumerauerimus.

OSSA hæc ergò omnia, tum tria scilicet dicta, tum quatuor quæ tarsum constituunt, in primo ortu mollia sunt, & cartilaginea potius quàm ossea dicenda: progressi autem temporis in solidiorem abeunt substantiam, quæ tamen ut omnium aliorum, quæcunque in recens natis cartilaginea esse solent, pumici similis est, & plena cauernulis. Quamquam nec omnia æqualiter mollia sint in ipsis etiam infantibus, sed alia aliis duriora, in primis calcis os, quod ut omnium durissimum postea est, ita etiam in tenella ætate, medio modo inter ossa & cartilaginea se habet. *Figuram* nata sunt inter se omnia differentissimam: *magnitudinem* etiam inæqualem, cum omnium maximum sit calcaneus, hinc talus, inde os naviculare, tum cyboides, siue cubiforme: posthæc cuneiformia, quorum primum maius, alterum minus, tertium medium, à quantitate cognominatur.

TALUS ergo, Græcis ἄστρον, καὶ ἀστέρας, quæ vox à Romanis ciuitate donata est, cum & vulgo *Astragalus* vocatur. Os est variæ formæ, quo cum tibia fibulaque committuntur, sicque pes flectitur extenditurque, nonnihil etiam ad latera mouetur. Hoc ergo non solum Homo donatus est, sed cætera quoque omnia anima-

Talus.

q, 2. 10. ff.
13. 14. 15.
16.

animalia, quæcumque pedibus in digitos scissos, incedunt. Vt autem eius historia
facili methodo tradatur, cum sex constet lateribus, ordine singula examinanda
erunt. Et sane ^rsuperius, quadratam fere figuram exprimit, nisi quod ^rposterior li-
nea ^rpriore paulò breuior sit, cæterum cartilagine molli ac lubrica incrustatum. Non
tamen plana superficie constat, sed rotunda ac gibba, in cuius medio, lateribus non-
nihil prominentibus, ^uleuem quendam sinum habet, in quem linea inferiorem ti-
biæ sinum bifariam secans, inseritur, ut tibia sic cum talo per ginglymum articuletur.
Vocatur Græcis à forma $\pi\tau\epsilon\gamma\omega\varsigma$, à Latinis nonnullis *Quatrium*. Latera autem hæc,
quorum illud ^xinternum est, hoc ^yexternum, ^zsuperne læui cartilagine, qua malleo-
los suscipiunt, obducta sunt: ^ainferne sinus habent asperos, in quos ligamenta infe-
runtur, quæ duo ossa tibiæ talo colligant. Verum tamen illud exiguo spatio incrustatum
est, hoc longiore, quod fibula externum constituens malleolum, altius descendat, quam
processus tibiæ, internum efficiens. ^bAnterior pars, in ^ccervicem oblongam excurrit. ^d
cui exquiritur rotundum capitulum priore loco adnascitur, quod postea in sinum nauic-
ularis ossis inseritur, atque huius beneficio in latera pes circumducitur. Inter hoc, &
superius latus, occurrit ^esinus rotundus, mediocriter cauus, in quod dum pes ad acu-
tissimum angulum flectitur, tuberculum illud, quod in medio lineæ anterioris sinus
tibiæ eminet, ingreditur. ^fPosterior latus, quod omnium minimum est, totumque aspe-
rum, ^gsuperne transversum sinum per totum latus exigit, quod recipit ligamentum ti-
biæ: ^hinferne sinum habet descendente paruum, per quem transeunt tendines mus-
culorum pedem mouentium. ⁱInferior pars, cuius beneficio cum calcæ nequitur, quia par-
te posteriore hoc recipere, parte anteriore ab ipso recipi debeat, ^lillic sinu, ^mhic capite,
utroque cartilagine obducto, donatur. Caput rotundum est, oblongum, sed triplo mi-
nus sinu; sinus à posterioribus ad externa excurrit oblique, coracoidem scapulæ pro-
cessum non male exprimens. ⁿInter hunc autem & illud, ubi talus calcem non attingit,
sinus longus & satis profundus occurrit, modice latus, cuiè regione calcis sinus re-
spondet. In hoc coaceruatur mucosa quædam substantia, quæ ligamenta cartilaginea,
hoc loco talum calci iungentia, irrigat & humectat, ne in longis, crebrisque motibus
nimium exsiccentur.

CALCIS OS, & ^oCALCANEVS, Græcis $\pi\epsilon\gamma\omega$, alterum os est, quod talo subster-
nitur. Huius ^psuperius latus, partim talum excipit, ut anteriore parte, ubi ^qsinum ha-
bet & ^rcaput, quibus ipsi committitur: partim à talo liberum est, quemadmodum sede
^rposteriore, ubi sinum habet asperum, qui ligamentum accipit à tibia talum constri-
gens. Latus vtrumque sinuatum: ^tinternum quidem admodum euidenter, quod tendo
ibi transeat primi oblique pedem mouentium, & duorum tertium & secundum inter-
nodium flectentium, quemadmodum & venæ, arteriæ, ac nerui; at ^uexternum versus
anteriora paruum sinum obtinet, eumque cartilagine tectum, protendine secundi ob-
lique pedem mouentium, & secundum eundem flectentium musculorum. ^xInferior pars,
lariuscula est: ^yposterior, modice gibba ^zleues sinulos habens, in quos tendo primi &
secundi pedem extendentium infiguntur. ^aAnterior leuiter prominet capite amplo, quo
cubiformis sinui fere plano coarticulatur.

^bNAVICULAR E tertium est, $\sigma\kappa\alpha\phi\omicron\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$, à naiculæ forma appellatum, cum ob-
longum

Cauitas. longum sit, & *intus* cauitate insigni exsculprum, ^d *foris* conuexitate promineat. *Cauitas* e, A.
Conuexa hæc læui cartilagine obtegitur, in quam ingreditur caput Astragali; at *conuexa pars* ^d B.
pars. liter incrustata, ^e tres obtinet superficies, adeo leues, vt ambiguum sit, excipiant, aut ex- ^e, 1, 2, 3.
Situs. cipiuntur. His committuntur tria tarsi ossa, inter quæ maximum internum latus occupat;
 minimum, externum. *Situm* ergo est in parte interna pedis, cuius beneficio præcipua tar-
 si pars talo committitur.

Quatuor Hæc tria ossa quatuor Tarsi sequuntur, quæ vnum ordinem efficiunt: sed primum
 ossa tarsi. *calci, reliqua tria naviculari committuntur.* Efficiunt autem omnia iuncta inter se, for-
Forma. nicem, cum parte superiore conuexa sint, inferiore concava. Tria etiam illa nauic-
 ulari commissa, fornicis in modum à terra eleuantur, solo cubiformi ipsam attin-
 gente, adeo, vt insignis relinquatur cauitas in pede in qua recondantur tum tendines,
 tum musculi, ne in ambulatione conterantur lædanturque, si plana inferior plantæ su-
 perfacies foret. Hæc quia superiore sede lata sunt, inferna angusta, adeoque non ine-
 pte cuneum exprimant, Fallopius *χαλκον* hoc est, Cuneiformia appellauit, quæ no-
 mina etiam nos retinebimus; distinctionis autem gratia cum aliis Anatomicis magni-
 tudinis suæ rationem addemus. *Connectuntur* hæc ossa inter se cartilagineis ligamentis:
Conexio. qua tamen parte se mutuo respiciunt ab omni cartilagine nuda sunt ac libera; antè
 vero, qua metatarsi ossibus, & posterius, vbi naviculari nectuntur, læui cartilagine in-
 crustantur.

Cubiforme. Ex his ergò primum est *κυβοειδές*, ^f CVBIFORME, sic dictum à senis lateri- ^f, 2. 10. fig.
 bus, quibus cubo responder. Hoc g anteriori calcis lateri præponitur, cum quo postero- ^{22. 23.}
 re suo latere nectitur; antè, metatarsi ossi quarto & quinto inngitur, vbi superficiem ^g, 2. 10. 18
 geminatam habet; interno, quarto tarsi. Reliqua tria latera, externum, superius, & infer- ^e
 rius nulli iunguntur, sed soluta sunt.

Cunei- ^h CVNEIFORME MAIUS, siue Tarsi secundum, maximum ex cuneiformibus, in- ^h, 2. 10. fi.
 forme ^{24.}
 maius. ternum pedis latus occupat, antè latum & longum, quo primum os pedii, quod
 maximo digito, siue pollici, subternitur, suscipit. Hoc an sinuatum sit, an promineat am-
 biguum valde est: videtur tamen prominere, cum primum pedii os, quod huic coniun-
 gitur, sinum leuem quidem, at euidentem satis habeat. ⁱ *Posterius* sinum habet, quo na- ⁱ, a.
 uicularis processulum internum suscipit. ^l *Superiore latere* conuexum, ^m *interiore* cauum, ^l, b.
 vtroque tamen admodum aspero. ^m, c.

Cunei- ⁿ CVNEIFORME MINUS, siue Tarsi tertium, quod medium locum obtinet, ^o *superam* ⁿ, 2. 10. fi.
 forme ^{26.}
 minus. *partem* quadratam habet, leuiter arcuatam, ^p *inferam* acutam, vnde omnium apertissime
 cuneum exprimit: ^q *anterior* ^o, a.
^p, b.
^q, c.
^r, d.
 oblonga, ex quibus *internum*, sinum ingreditur lateris externi primi cuneiformis, *exter-*
 num cum tertii interiore iungitur.

Cunei- ^f CVNEIFORME MEDIUM, seu Tarsi quartum, simile minori, nisi quod maius est, ^t *su-* ^f, 2. 10. fig.
 forme ^{25.}
 mediū. *perna* sede similiter quadrilateram figuram altera parte longiorem refert: ^u *inferne* acu-
 minatum, sed obrusore modo, in cuius medio tuberculum exiguum, cui primus pedem
 oblique mouentium, siue Tibiæ posticus inseritur: ^x *anterior*, tertium metatarsi os ad-
 mitit; *posterius*, leui sinu nauiformis externum tuberculum suscipit: *lateralibus* tarsi os ter-
 tium, & primum, attingit. Tar-

y, 2. 10. f.

11. & 12.

B. B.

z, 1.

a, 2.

b, 3.

c, 4. & 5.

d, 2.

e, b.

Tarsum excipit *Metatarsus*, altera pedis pars, quam Græci *πυδίων*, Celsus *Metatarsus*. *Plantam*, alii *Pecten* appellant. Componitur ex quinque ossibus, cum pollex, siue magnus digitus suum quoque sibi ex his vendicet, secus ac in manu. Omnia vero *substantiam* habent solidam, intus fistulæ ritu excauatam, longioraque sunt multo, quam ossa metacarpi in manu, cum ipse etiam pes manu longior sit. In *magnitudine* eam obseruant proportionem, ut omnium crassissimum sit quod ^z pollicem sustinet; ex reliquis longissimum, quod ^a indici subternitur; hinc quod ^b medio; ^c reliqua quoque sensim breuiora fiunt: crassitiem tamen pene æqualem retinent. Vtrinque desinunt in *capita*, ex quibus ^d *anterior* multo ^e posteriore minus est, rotundum fere, compressis tamen admodum lateribus. Caput hoc versus superiora magis, quam inferiora diductum est, secus ac in manibus, cum pedum digitos in extensione paulò magis, atque manuum, eleuari necessum fuerit. Caput tamen illius quod pollici præpositum est, orbiculatius cæteris est, quod præ aliis digitis magis ad latera moueatur. *Posteriora* capita crassa sunt superius, infra acuta, à lateribus compressa, ut non inconcinne triangulum efficiant. Sinum leuem quidem, at conspicuum tamen, cartilagine contextum habent. Anteriora ergo in sinus digitorum profundos, & quidem primorum articularum inseruntur: at posteriora tarsi ossa excipiunt: & *primum* quidem quod pollicis subternitur, cuneiforme maius; *secundum*, quod indici subest, cuneiforme minus; *tertium*, quod sustinet medium, cuneiforme medium, siue tertium: *duo reliqua*, cubiformis duo capitula, ex quo patet, per arthrodiam neutram cum tarso coarticulari. Verum os pollicis substratum, inferne processum exigit; ubi inseritur secundi pedem oblique mouentium, siue Peronei primi tendo. Illud etiam, quod è regione minimi situm, externo latere insignem processum habet, cum quo nequitur tendo secundi pedem flectentis musculi. Ceterum *media pars horum ossium*, quæ interiecta est capitibus, quo loco magis recedit à tarso, gracilior sit, supra lata, infra acuta est, lateribus in acutam lineam ex superna superficie coeuntibus, unde fit, ut spatium inter singula relinquatur, in quo musculi interossei reconduntur.

f, 2. 10. f.

11. & 12.

C. C.

f *DIGITORVM OSSA* pedem finiunt. Sunt autem quatuordecim, quod pollex duobus tantum constet: reliqui vero ternis. Ossa hæc *substantia*, situ ac structura, à manus digitorum ossibus parum differunt: sed *magnitudine* apprimè cedunt. Omnibus *substantia* solida est, & caua: omnibus *tria internodia*, eaque duplici appendice munita, quarum anterior caput est geminum, & excipitur à sinu similiter duplici prioris internodii: posterior contra, excipit. Hoc discrepant solum, quod articuli primi profundiorē habeant sinum, cum in eos maiora capita metatarsi inserantur.

Sesamoidea quoque ossa sunt eodem propemodum ordine, numero, ac situ, quo in manu: sola *magnitudine* differunt, cum pedis ossicula minora sint, prout etiam ipsi digiti.

Metatarsus.

Magnitudo.

Appendices.

Connexio

Digiti.

Sesamoidea ossicula.

CAPVT XXXI.

De Vnguibus.

Vngues.
An sint
partes no-
stri cor-
poris.

VNGUES, Græcis ὄνυχες dictos, ad ossium historiam referendos censuimus, quod extrema ossium regant. Hos nonnulli ex albo parrium nostri corporis delendos censuere, quod in nullo similarium, quæ vulgo recensentur ordine, commode reponantur. Nec enim, inquit, cartilagine sunt, quia præcisi renascuntur, neque in viuis solum, sed etiam in mortuis, ut tradit Aristoteles 3. histor. animal. 11. Nec ossa dici possunt, cum substantiam habeant oppido quam mollem. Multo ergo minus ad alias reducentur, cum videantur his aliqua affinitate coniuncti, neque sint tamen, à cæteris autem plurimis parasangis distent. Verum hæ disceptationes Logicæ sunt, quibus optime satisfacimus, si vngues sui generis partes statuerimus, quæ neque ad cartilaginem proprie, neque ad ossa commode reduci possint, mediam tamen inter vtramque substantiam habeant. Sic infra ostendemus, cutim quoque, etsi similis pars reuera sit, ad nullam tamen speciem vulgo commemoratarum referri: sed sui generis esse propriam. Nec desunt tamen & alii, qui prorsus partes esse negent, quia scilicet non vere nutrantur, neque vitam habeant, accrescant tamen, sed accretione imperfecta, quæ non fit secundum omnes dimensiones, quemadmodum in ossibus, & carnibus, verum secundum solam longitudinem. Quam sententiam probant argumento, ut ipsi videtur satis firmo, negant enim venas, aut arterias ad ipsas accedere, quod necessarium foret ad ipsam nutritionem.

Augētur
secundū

1.
Longitu-
dinem.

2.
Profun-
ditatē.

3.
Latitu-
dinem.
Habent
venas,
arterias,
& nervos
Sensus.

Sed concedamus ipsis augeri secundum longitudinem euidenter satis, quia ut postea audiemus, erat id imprimis necessarium, quod nimio vsu perpetuo atterantur, quemadmodum etiam dentes, quos similiter supra in longitudine magis atque aliis dimensionibus, eodem nomine augeri retulimus: probat tamen ipsa experientia, eos etiam secundum profunditatem & latitudinem accessiones facere, etsi non ita conspicue, nisi quis oculis etiam animi & mentis simul velit aduertere. Et secundum profunditatem quidem, quod, si quis vitro aut cultro abradat, ut ad summam tenuitatem vnguis abeat non citra dolorem, paucis diebus debita crassitie ipsum iterum munere suo fungi videas, etsi huius ipsius limites, quos Natura semel præscripsit, nulla postea ratione egrediatur. Et quis est qui nesciat, senioribus, multo quam iuuenibus crassiores esse, ut quibusdam propterea magno labore præscindantur? Secundum latitudinem, cum nemo ita sit ineptus, quin confiteri cogatur, iuxta ætatem augeri vngues, & iuuenibus esse latiores multo, quam puerulis, recensque natis. Illud autem quod venas negant & arterias, quæ tum nutritionem, tum vitam appoient, refutat satis historia & inspectio anatomica: imo vero Galenus ipse, 2. admin. Anatom. qui vasa omnis generis in vnguuium radices porrigi testatur, adeoque non venas solum, sed & arterias, & nervos, à quibus & exquisitus ille sensus est vnguuium, etsi sensus non proprius, verum communicatus; non per se, sed per accidens sit, quia vnguis substantiam ipsam nervi non ingrediuntur, pari modo ut neque ossa, nec dentes: sed sub vnguibus ad digitorum summa reperiuntur, quemadmodum & venæ, & arteriæ, quæ & ipsæ in substantiam non penetrant.

Sub-

Substantia ergo horum media est inter cartilaginem & os, quare & mediocriter dura & flexilis; tenuis etiam admodum, & mediocriter lata, ita ut extremum digitorum commode contegat. Quare *magnitudo* omnibus æqualis non est, sed proportionem digitorum sequitur. Pollici maximus est unguis, minimo digito minimus, cæteris mediocriter, & quidem secundum omnem dimensionem: crassiores autem sunt pedum ungues, quam manuum. *Figura* sunt, ante & retro semicirculari: sed ante latiores: exterius, gibbi, interius, qua parte carnes tangunt, concaui. *Numero* respondent digitis, & sunt viginti, ut manus decem, totidemque pedes habeant. *Conneſtuntur* autem, quominus vacillent, ligamento quodam circa radicem: & quia antè tantum liberi sunt, ubi prominent; postè circa radicem & latera: cuti carniq; connasci debuere, foris cutem circum, intus autem cutem subnatam habent, tendinesque digitos flectentium musculorum subiacentes. Quæ res sane iis diligenter aduertenda est, qui exterorum morborum curationibus animum applicant, ne in affectibus unguium, si discedant, corrodentibus substratam tendineam carnem auferre conentur, cum & ea res sine immensis dolorum tormentis transigi nequeat, & deformitas renati unguis sequatur. Quin potius magna solertia studeant, quidquid adest illius carnis, eo aptare, ut speratam noui unguis generationem facili negotio assequantur. *Colorem* nullum habent proprium, sunt enim pellucidi: sed quemadmodum cutis, ita & ipsi à subiectis partibus colorem mutuantur, qui talis in unguibus apparet, qualis in illis reuera est. Hinc Europæis ungues albicant, pauca rubedine interfusa; contra Æthiopibus nigricant. Hominum enim, inquit Aristoteles, 3. histor. animal. 9.2. de generat. 6. nigrorum dentes, naturam ossium æmulantur; quamobrem Æthiopum dentes & ossa candicant, ungues nigricant suæ cutis in modum. Paulò autem ante dixerat, colores cornuum, unguium, & ungularum, cutis pilorumque colorem sequi. Contingit ergo ut unguium colores pro varietate temperamentorum diuersi sint, & ex colore eorundem morbi etiam sæpè numero innotescant, ut icterus, ex flauis unguibus; febrium paroxysmi, ex liuidis.

V s v s Unguium est, tegere extremas partes, tum manuum, tum pedum. Sed quia manus apprehensionis gratia factæ sunt, pedes autem ambulationis: in illis tegunt, ut res firmitus apprehendamus; in his, ut securius terræ insistamus. Qui enim non cecissent digiti, nisi robore muniti essent? aut qui pedes solo se firmarent, si apices digitorum cederent mollitiæ? ut adeo utrique solers Natura recte prospexerit. Accedit, quod quæ minuta sunt, nec digitis arripi possent, ea unguium beneficio tractamus: & quæ dura pedibus propulsanda, ea facile abigimus. Sic nullum unquam beneficii genus in nos benignissima Parens effundit, quin protinus ex illo immensum bonorum

Ilias redundet, ubique bonitate inæſtimabili diuina
quadam sapientia condita.

FINIS SECUNDI LIBRI.

ADRIA-



ADRIANI SPIGELII

BRUXELLENSIS,

DE HUMANI CORPORIS FABRICA,

Liber Tertius.

Qui de Cartilaginibus, & Ligamentis agit.

CAPVT PRIMVM.

Cartilaginis naturam, vsus, & differentias proponit.



I quæ Natura prouida rerum omnium parens, tum substantiæ, tum vsus ratione inter se coniunxit; vt eadem propemodum, aut certe parum differentia esse videantur, Ars Naturæ imitatrix, & methodus separare à se inuicem non debent, iure profecto meritoque videmur facere, si postquam ossium historiam vniuersam tradidimus, nunc eodem pacto cartilaginum tractationem prosequamur. Nihil enim in toto corpore ossibus sic simile est, ac cartilagine ipsæ, cum substantia ita conueniant, vt ex cartilaginibus facilis sit in ossa transmutatio, quemadmodum iam sæpe monuimus in superioribus, apophyses omnes, & ossa pleraque in pueris cartilagine esse, postea vero in osscam naturam progressu temporis degenerare. Vsus autem & ipse vsque adeo conuenit, vt idē prorsus esse videatur, cum sustentandi molliores partes gratia, non secus ac ossa ipsa efficta & composita esse pateant. De his ergo vt agamus, insistentes nostræ methodo, ea primum quæ generatim de his dici possunt, in medium afferemus: deinde quid in singulorum historia obseruandum sit, breuiter quoque trademus.

*Cartilaginis definitio.
Est pars.*

CARTILAGO ergo, vt à definitione initium capiamus, *pars est nostri corporis simplex, dura, ac sicca, sed flexibilis, ad stabilimentum securum partium molliorum, & ad eludendos duriorum rerum extrinsecus accidentium impetus.* Dico esse partem, quia definitio partis ipsi conue-

conuenit, quæ est, esse corpus toti cohærens, & communi vita fruens, in aliquem usum aut actionem comparatum. Adiungo autem esse *simplicem*, quia cum partes nostri corporis, vel similes sint, vel organica, cartilago similis est, quia tota sibi similis est, nec reperire licet particulam cartilaginis, quæ non naturam & nomen totius mereatur. Est autem *dura & sicca*, quibus verbis à cæteris omnibus similaribus partibus separatur: sed quia cum osse conuenit in hoc ipso, additur vox *flexibilis*, quæ ab osse distinguit. Cartilagine enim omnes hoc in se habent, ut quamquam duræ sint & siccæ, semper tamen flexibiles maneant. Tandem *usus* subiungitur, qui est *stabilimentum partium molliorum securum*. *Stabilimentum* quidem, quia fundamentum largitur non secus ac ossa, fundamenti autem ratio in eo sita est, ut & robur conferat, & rectitudinem, & formam. Hanc stabilitatem præstat non quibuscumque partibus, sed mollioribus, quia enim molles necessario erant faciendæ ob suam actionem, sed molles se tueri sustinereque non poterant, idèd solers Natura partem duram molli addidit, ut huius quidem beneficio actioni præessent, illius autem opera consisterent. Verum etsi ossa quoque idem officium mollioribus partibus præstent, *cartilago* tamen *securius* id facit, qua voce similiter, ab osse distinguitur. Hanc securitatem explicuimus ultimis verbis dum dicimus, cartilagine *ad eludendos impetus rerum externarum duriorum fucere*. Ossa enim cum nimis dura sint, à duro forinsecus accedente facile franguntur: at cartilagine cum moderatam obtineant duritiem & flexibiles sint, cedunt facile, sicque impetum omnem declinant. Quamobrem videmus partes illas, quæ expositæ admodum sunt iniuriis externis, cuiusmodi sunt nasus, & aures, cartilagineas esse factas, cum in finitis modis frangerentur, si ex duro aliquo osse constarent, nisi crassitie, quæ tamen indecora foret & admodum molesta, munirentur. *Stabilitas* ergo ipsis à duritie: at *securitas*, à flexibilitate est. Cæterum hic *usus* egregie in larynge, siue capite asperæ arteriæ, conspicitur, quæ cum ex cartilaginibus tota effecta sit, ipsi muscoli plures & implantantur, & ab ipsa enascuntur. Sunt tamen & alij multi quos cartilago præstat *usus*, sed secundarij. *Primum* enim osseum laxa articulatione iunctorum extrema tegunt: *deinde* propugnaculorum vicem obeunt ad tuendas partes subiacentes, quod quidem munus, etsi ossibus quoque comperat, in hoc tamen discrimen est, quod cartilagine ibi sint, ubi propugnaculum flexibile requirebatur. Sic sterni & costarum cartilagine factæ sunt. *Tertio*, ossa inter se ligant, quemadmodum ossa pubis inter se cartilagine iuncta sunt, & ligamenta multorum ossium cartilaginea existunt, qualia sunt imprimis ligamenta vertebrarum corpora connectentia, & illa teretia, quæ in articulo femoris cum coxendice, & altero cum tibia inueniuntur.

Sed enim maxima cartilaginum inter se differentia est, quas omnes ut in vnum colligamus, ea nunc ordine, quæ singulis partibus quandam compositionem subeuntibus aduenire solent, inspicimus. Ac primo quidem *Temperamentum* ipsum, quod tametsi omnibus cartilaginibus frigidum sit & siccum, alias tamen alijs sicciores, adeoque etiam duriores existere cernimus, nec id tantum ipsarum cartilaginum inter se, sed etiam ætatis, sexus, & morborum ratione contingere. Et ipsarum quidem, *inter se*, quia aliæ sint admodum duræ, & quæ tandem in ossa degenerant, ut sunt, quatuor illæ quæ laryngem efformant: aliæ molles, ut quæ articulos connectunt mutuo, & ligamen-

M

torum

Est simili-

Dura, & sicca.

usus.

1.

2.

3.

Differen-
tiæ carti-
laginum.
A tempe-
ramento.

torum munia subeunt, *χονδροσυνδεσμοί* propterea dicta: alia tandem mediam in duritie & mollitie naturam præ se ferunt, & quæ nunquam ossescunt, cuiusmodi sunt, epiglottis, & palpebrarum cartilagine. Ratione *atatis* differunt; pueris enim cartilagine omnes molliores sunt, senibus contra sic indurantur sensim, vt nonnullæ fragiles, ac friabiles, ossium instar, fiant. *Femina* etiam, mollioribus prædita sunt, vt quæ maribus humidiores esse consuevere: id tamen è diuerso peculiare habent præ maribus, quod cartilagine illæ costarum, quæ mammis substant, his augefcentibus in ossa abeunt, vt pondus sustentent facilius, cum flexibilis alias cartilaginum substantia, cum periculo partium in thorace contentarum compressa subsideret. Tandem *morbi* ipsi calidi, vt febres ardentes, duriores & sicciore ipsas reddunt. *Ratione figura* quoque magnum est discrimen, à cuius multiplici varietate diuersa etiam nomina sunt sortita. Sic illa quæ pectoris ossi subnectitur *ἐπιφοειδής*, ensiformis dicitur: si claryngis cartilagine diuersa nomina obtinere, cum alia *θυροειδής*, scutiformis; alia *κεκκοειδής*, annularis; alia *ἀρτυροειδής*, guttalis vocatur. Sunt & semicirculares quædam, vt palpebrarum cartilagine, & quæ in bronchiis pulmonum conspiciuntur *σχιμοειδής* dicta à Græcorum C, quod exprimunt. *Magnitudo* quoque diuersa est, cum alia sint magnæ, alia parua, quædam inter vtrasque mediocres. Magnæ sunt laryngis, parua bronchiorum, mediæ palpebrarum. Ex magnis quædam longæ sunt, vt costarum; quædam latæ, vt auriculæ: & contra ex paruis, alia breues, alia angustæ. *Ratione superficiei*, pleræque omnes, quæ ossium extremitates incrustant læuitate politæ sunt: nonnullæ inæqualem asperitatem obtinent, ob musculorum ibi vel exortum, aut insertiones, quemadmodum laryngis cartilagine. *Quoad numerum*, tot sunt, quot requirebantur. Natura enim, neque deficit vquam in necessariis, nec abundat in superfluis: plures tamen sunt infantibus, pauciores adolescentibus, paucissimæ omnium senibus, quia in his sensim, vt sæpe dictum est, in ossa facessunt. *In situ* præcipua occurrit discrepantia: verum cum situs nomine duo includantur, sedes scilicet cartilaginis ratione corporis totius, & connexio cum vicinis partibus, *sedem* quidem vnaquæque obtinuit, quam requirebat, & cuius beneficio, quam commodissime vsum suum præstaret, sicque alia sunt supernæ, infernæ, anticæ, posticæ, internæ, externæ, dextræ, aut sinistræ: at *connexio* paulo aliter se habet. Sunt enim quædam cartilagine, quæ nulli parti iunguntur, sed solitariae sunt; quædam alijs conterminis committuntur, & vel cartilaginibus, vel ossibus. Solitariae sunt, palpebrarum cartilago, & auricularum, quia alijs non associantur; at cartilaginibus iunguntur, vt scutiformis laryngis, & guttalis, cum annulari: ossibus vero quam plurimæ necuntur, vt omnes illæ quæ capitibus, vel sinibus affiguntur. Connexio autem hæc fit vel alligando inuicem ossa ligamenti instar, vt illa quæ pubis ossa inter se iungit: vel adnascendo, vt narium cartilagine ossibus narium, & cartilago ensiformis sterno: vel articulando, vt cartilagine costarum cum osse pectoris per arthrodiam. Vtunque enim in cartilaginibus, tam exactam articulationis speciem obseruare non liceat, qualis in ossibus occurrit, tum quia pauciores sunt, atque ossa, tum quia alios potius vsus, quam articulationis præstare debeant, in ijs tamen quæ ossium subeunt officium, expressa est vtriusque compositionis vestigia cernere. Nam vt de prima specie verba faciam, quæ articulatio dicitur, Arthrodiam sat manifestè tum in costarum cum sterno,

tum.

tum scutiformis cartilaginis cum annulari coniunctione cernimus. Nec obscura est altera species, quæ per symphyfin perficitur, cum cartilaginem nasi cum eiusdem ossibus sine medio vniri quiuis videat: & alias plurimam cum medio iungi, inter quas maximè euidens est connexio illarum semicircularium, quæ in bronchiis asperæ arteriæ per *συννέμεσιν* à nobis vocatam, nemine repugnante, iunguntur.

Sed vt ad ipsam historiam nunc pedem moueamus, facilioris doctrinæ gratia methodum nostram obseruantes, singularum tractationem, pro trium Ventrium Artuumque diuisione partiemur. At enim cum multæ, præsertim artuum cartilagines, vel ad ossium extremitates incrustandas, aut articulorum sinus augendos faciant, de his quidem commodior agendi locus in superiore libro fuisse videtur; in quo si quando dicendi occasio sic tulit, earum historiam inspersimus. Quæ sanè, vt in præsentiarum haud tædiosè repetatur, de ijs tantum cartilaginibus dicturi sumus, quæ alij quopiam, quam illi motui dicato vsui inseruiunt, & de quibus superiore libro dicendi ars data non fuit.

CAPUT II.

De cartilaginibus supremi ventris, siue Capitis.

IN Capite complures sunt cartilagines dignæ accurata consideratione: reuocari tamen memoriæ gratia ad tria capita quam commodissime poterunt, si cartilagines palpebrarum, nasi, vel aurium dicamus esse.

PALPEBRARVM cartilagines duæ sunt, cum vtrique vna contigerit, adeoque altera superior, altera inferior, ex quibus sanè superior in homine maior est, minor in auiibus. Vocantur hæ à Græcis *ταρσοί*, à Plinio & Latinis *Cilia*, quæ in extremitate palpebrarum, inter cutem ac membranam palpebras succingentem sitæ, corniculatam lunam haud malè exprimunt. *Vsus* harum cartilaginum est, moderatè palpebram suam durtit expandere, expansamque tenere: queis sine foret, dum palpebræ ad oculos claudendos corrugantur, in se penitus subsidissent, æquabilemque illam, quam faciunt compressionem haud vnquam peregissent. Reperitur & alia quædam cartilago in oculi orbita, sede interiore superioreque, quam primus Fallopius, doctissimus Anatomicus inuenit, & à figura atque vsu *Trochleam* vocauit: de qua sequenti libro, vbi de oculorum musculis agemus tractabitur, cum eo pertinere potius, quam huc ipsius historia videatur.

NASI cartilagines quinque sunt, ex quibus *prima* septum est cartilagineum, quod ab osseo septo exortum, nasum bifariam secat. *Duæ* sunt postea *laterales*, quæ ab inferiore & latiore duorum nasi ossium parte incipiunt, crassiores, ac duriores coniunctæ, hinc circa finem narium attenuantur, sic vt cartilagines esse desinant. *Duæ* aliæ *postremæ* in infima narium parte positæ, extrema prædictarum cartilaginum tegentes, & singulæ in vnum foramen nasi iuxta extremo finientes, idque expansum tenentes. Hæ sub septo cartilagineo sibi inuicem iunguntur, ac per membranas & cutim colliguntur, indeque foramina vtraque nasi ambiunt, alas eius constituentes. Duriores sunt sub septo cartilagineo, & quasi semilunares, curua parte ad nasi se-

prum cartilagineum obuerſæ, circa alas molliores, & fere ſemicirculares. Aliquando hæ ſingulæ in duas veluti partes dirimi conſpiciuntur. nam quæ alas conſtituit, ab ea quæ ſepto cartilagineo ſubiacer, diuiditur, ac tunc naſus ex ſeptem cartilaginibus conſtare videtur.

Cartil. Auriculæ. A V R I C U L A tandem, ſiue *externa auris*, parte ſuperiore, quam Pinnam vocari diximus, cartilaginea eſt; at inferiore, quæ Lobus vocatur, carne conſtat. Eſt autem cartilaginea facta, vt & duritie ſua ſuſtinere ſe, & flexibilitate tueri contra externas iniurias poſſet. Enaſcitur ex foramine meatus auditorii, quod in oſſe temporum eſt, hinc ſeſe in orbicularem cartilaginem continuam expandit, ac cum in principio ſui exortus durior ſit, & craſſior, ſenſim quo longius ab origine procedit, mollior, tenuiorque euadit. Habet hæc cartilago varias circumuolutiones, & modo ſi-
mas, modo gibbas partes, quæ omnes proprias ſortitæ ſunt appellationes, quas ipſas ſupra libro primo, vbi de nominibus auriculæ egimus, iam dudum perſequuti ſumus.

C A P V T I I I.

De cartilaginibus medii, infimique ventris.

Larynx. Cartilagines Laryngis. I N Thorace Pulmones ſiti ſunt, quorum aſpera arteria pæne tota ex cartilaginibus conſtiti videtur. Nos vt ordine omnes perſequamur, arteriam in *Caput*, ſiue Laryngem, & in *Fiſtulam*, cum peritioribus Anatomicis diuidemus. ^a L A R Y N X ergo ^{a, 9. 1. fig. 1. 2.} ex quatuor conſtat cartilaginibus, quibus quinta ſuperpoſita eſt ἐπιγλωττῆς, dicta. Vocatur ex illis ^b prima, *Συρκοειδής, ſcutiformis*: ^c ſecunda, *κεκοειδής, annularis*: ^d tertia & ^{b, A. A. c, E. d, I. I.} quarta, *δεξτρυνοειδής, guttales*. Vtemur autem vocibus græcis, tum quia vſitatioribus ſunt apud Authores, tum etiam quia in ſequenti libro, vbi laryngis muſculos enarrabimus, memoria gratia ex græcis appellationibus nomina muſculis imponemus.

^{r.} **Thyroides.** ^c Prima ergo cartilago *Thyroides*, ſiue *Scutiformis*, ſic dicta à figura, quæ ſcuti anti- ^{e, A. A.} quorum non eſt diſſimilis, omnium quæ in larynge ſunt, maxima eſt, anteriore parte ſita, adeo vt in viuo etiam homine digitis contrectari poſſit; & in maribus nonnullis, iis ſcilicet, qui temperamentum non nihil ſiccius naſti ſunt, admodum euidenter conſpicua eſt, quam Pomum Adami tunc vocare ſolent, ficta fabula, protoplaſtæ noſtro, ob diuinæ vocis, poſt contempta monita, minas pauſcendenti, de pomo deglurito aliquid circa eam gulæ ſedem reſtituiſſe. Hæc vnica numero eſt, foris conuexa, intus cana, quadrilaterum altera parte longius non inepte exprimens, niſi quod in ſui medio, anteriore & ſuperiore parte, (quæ ſimiliter in viuo tangi poteſt nullo negotio) ^f *fiſſuram* habeat, in extremitatibus autem ſat eminentes proceſſus. In ſingulis enim terminis ^{f, B. g, C. C. h, D. D.} *proceſſus* obtinet, adeo vt ſupra infraque bini ſint, quorum ^g illis, qui longiores ſunt, oſſis hyoidis inferioribus lateribus, interuentu ligamenti oblongi iungitur: ^h *hiſce*, qui breuiores, cum ſecunda cartilagine, ſiue cricoide articulatur. Articulationis autem ea ſpecies eſt, quæ *απ' ὀφθαλμοῦ* dicitur, cum capitulo depreſſo, in ſinus cricoidis leuiter cauos proceſſus illi inferantur. Ex quo conſequitur, Thyroidem cartilaginem euidenti motu eſſe præditam, cuius ſcilicet beneficio Larynx tum dilatatur, tum conſtringitur.

i Altera

i.E.

ⁱ Altera *Cricoides*, vt situ, ita etiam magnitudine secunda est, annuli noīnen à figura sua adepta. *Innominata* etiam quibusdam dicta, quod ante Galeni tempora appellatione caruerit. Hæc merito omnium laryngis cartilaginum Basis dicenda est, cum infimo loco sita, reliquas omnes sustineat. Neque enim fistulæ cartilaginibus, utpote nimium infirmis, inniti; neque cum iisdem admodum tenuibus vlllo pacto articulari poterant: quare cricoides facienda erat, quæ vtrumque officium præstaret, & simul Laryngem perpetuo apertum seruaret. ¹ Anterior gibba est, semicircularis, ac tenuis: ^m posterius latior, plana, ac maior, ubi in ⁿ medio linea quædam aspera eminet, quam Galenus *Spinam innominatæ cartilaginis* vocabat.

2.
Cricoides.

L.F.

m.G.

n.H.

o.I.I.

^o Tertia, & quarta, *Arytanoides*, omnium minimæ sunt, superiori & posteriori cricoidis sedi, in cavitare thyroidis insistentes. Iunguntur enim cum crycoide per ginglymum, ut & flecti, & extendi, partim recta; partim ad latera possint, tum pro claudenda, tum pro aperienda rimula. Vocantur autem *ἀρυτανοειδείς*, siue Guttales, quod gutturnii figuram repræsentent, si inspiciantur dum superiores vtriusque processus communi adhuc membrana inuoluuntur. Est autem gemina, cum qui simplicem statuere, ab hac ipsa membrana decepti sint, quæ vtramque tegens, vtriusque separatam substantiam dissimulauit. *Processibus* donantur similiter superioribus, & inferioribus. ^p Superiores molles, laxi, & extra recuruati, simul iuncti gutturnii formam affabre referunt: ^q inferiores, rimulam, siue Glottidem constituunt.

Spina

3. 4.
Arytanoides.

p.L.

q.M.

r.N.

His omnibus in elatiore sede, sed intra Thyroidem superiacet alia, mollis admodum cartilago, quam ^r *ἐπιγλωττίδα* vocant, ὅτι ἐπὶ τῇ γλωττίδᾳ κεῖται, quod supra glottidam, siue rimulam sit posita. Hæc enim glottidi incumbens, hederæ folium ex Hippocratis sententia refert, & rigida atque erecta existens, viam spiritui pulmones ingredienti largitur: sed flexibilis admodum, & assumptorum pondere pressa, rimulam exacte claudit, ne quidquam asperæ arteriæ illabatur.

Processus

Epiglottis.

s.O.

t.P.

u.Q.

^f *FISTULA* tandem asperæ arteriæ, quam *βρόγχον* vocant, ἀπὸ τοῦ βρέχεσθαι, ab irrogando, quod Veteres potum in hanc descendere crederent, quemadmodum cibum in ventriculum, tota ex cartilaginibus pluribus, membranarum beneficio mutuo cōnexis, conflatur. Cartilagines autem hæ annuli figuram referunt, & tenues sunt, ac moderate latæ, integrum tamen circulum non absoluunt: ⁿ sed ea parte, qua dorsum spectant, tanguntque œsophagum, quarta quasi parte deficiunt, sicque Græcorum C exprimunt, vnde *σχιμοειδής*, signiformes dictæ. Ut autem integer circulus perficiatur, membrana subuenit, quæ reliquam partem succingit, etsi rotundum exacte circulum minime faciat. Ex his superiores maiores sunt, & latiores; inferiores, minores atque angustiores, donec paulatim in minimas degenerent. Feruntur enim non tantum ad iugulum vsque, quod quibusdam visum est: sed cum toto canali per vniuersos pulmones disperguntur. Id tamen verum est, ubi ad iugulum peruenere, ac iam pulmonum substantiam ingrediuntur, circulum eas perfectum complere, quod asperam arteriam, ad aeris tractionem expulsionemque semper patere necessum foret.

Fistula.

x, 2. 7. 16.

C.

Est & alia in *THORACE* cartilago, quæ ^x *ἐνσφοειδής*, & *ensiformē* vocari diximus, quæq; Cartil. ensiformis. ossi pectoris subnectitur. De hac agendi cum melior occasio fuerit superiore libro, ubi sterni historiam persecuti sumus, hoc loco nihil, quod ipsam respiciat, addimus.

Cartil.
infini
ventris.

IN INFIMO VENTRE cartilago nulla est, nisi vna, eaque insignis, quæ in pueris præcipuè conspicua, toti superiori ossis ilium circulo adnata, quam *Spinam & Appen-* y, 2. 9.
fig. 5. 6. 7.
A, A
dicem ossium innominatorum appellant. Ab hac insignes, & plurimi muscoli originem suam ducunt, vt propterea ipsius mentio nobis sæpissimè postmodum iniijcienda sit; sed tamen in adultioribus penitus in osseam naturam, quemadmodum & cæteræ appendices omnes degenerare consuevit.

C A P V T IV.

De Ligamentis agit, quorum naturam, usum, & differentias breuiter persequitur.

Ratio or-
dinis.

VIDIMVS Ossa & Cartilagine, quæ diximus in nostro corpore basis cuiusdam & propugnaculi vices obire, cum molliores partes sine sustentaculo sese tueri, & erectas conseruare minime potuerint. Sed cum nec ipsæ inter se connecti valerent, nisi vinculis quibusdam stringerentur, maxime ea ossa, quæ articulatione insigni & laxa opus habebant, ligamenta solers Opifex condidit, quibus inuicem sic coniunxit, vt & vacare suis muniis commode possent, ac secure & absque periculis luxationum persistere. De his ligamentis merito videmur hoc loco agere, postquam illorum historiam tradidimus, cum imperfecta esse videatur, nisi quo pacto inuicem alligarentur, perspectum cognitumque foret,

Defini-
tio liga-
menti.
Est pars
similaris.
Media
intercar-
tilaginē
& mem-
branam.

Est autem **LIGAMENTVM**, pars similaris nostri corporis, sensu carens, inter cartilaginem & membranam substantie ratione media, pro colligandis inuicem ossium articulis. Dicitur esse pars similaris, quia quamcumque eius particulam inspicias, alteri consimilem videbis. Est autem media inter cartilaginem & membranam, quod illa quidem mollior sit, hac autem durior. Non tamen (vt dicitur) æqualiter semper ab vtroq; extremo distat, sed interdum ad cartilaginis, quandoq; ad membranæ naturam propius accedit, vnde fit, vt duplicis generis ligamenta oriantur, Membranea scilicet & Cartilaginea. Nec vero hæc mediocritas in temperamento duntaxat & substantia consistit; sed & in ijs, quæ temperamentum sequi consueuerunt. Quodenim sic medium est, tantum à frigidityte & siccitate cartilaginis declinat, quantum ad membranæ naturam propius, & contra, accedit. Eadem ratione mollius quoq; ac flexibilis erit, quanto minus frigidum, & potissimum minus siccum est. Sunt autem facta pro colligandis ossium articulis, quibus verbis, *usus* ligamentorum *primarius* indicatur, à quo etiam nomen accepere, vt Ligamenta Latinis, Græcis *συνδεσμοι*, seu Vincula dicantur. Alligant autem non tantum ea, quæ immobilia manent, vt pubis ossa: sed & illa, quæ ad motum connexa, quemadmodum sunt Articuli. Hoc tantum discrimen vtriusq; vincendi rationis est, quod illa arctius: at ista laxius paulo stringantur. Laxitas autem in eo consistit, vt moueri quidem sic vineta commode possint, elabi autem nequeant, nisi magna aliqua vis & subita forinsecus accedat. Cæterum vt hoc munus fidelius exsequerentur, sensu omni carentem ipsi seruat, cum perpetuo dolori, & nunquam cessantibus cruciatibus obnoxius fuisset Homo, si alius ad ligamenta ossibus, sensus (certe molestus futurum) perciperetur. Præter hunc usum, alias etiam partes in sua sede continent, & quidem

Vsus.
1.

Carent
sensu.
2.

vel

vel Viscera, quæ suspendunt, vt hepar & vterum: vel Ossâ, vt ligamentum secundæ vertebræ: vel Musculos, & musculorum Tendines, vt ligamenta annularia in manibus, cruribusque. Nonnulla etiam, non secus ac cartilagine ossium acetabula adaugent, cuiusmodi ligamentum illud est, quod circa sinum scapulæ, quo humeri superiori capiti committitur, obseruatur, vt supra cum eius historiam persequeremur, complexi sumus.

3.

Sunt autem complures *differentiæ*, quas omnes vt venemur, methodum consuetam obseruabimus, inspicientes ea, quæ partibus aliqua compositione præditis accedunt. Ac primo quidem ratione *Temperamenti* ipsius & *Substantiæ*, magna est & insignis differentia, notatu dignissima. Cum enim dixerimus ligamenta media esse inter cartilaginem & membranam, hinc fit, vt quædam sane in medio inter vtramque consistant, alia verò ad extrema nonnihil declinent; & sic, quædam mollia valde sint, quædam dura admodum, nonnulla mediocria: alia membranis similia, alia cartilaginibus, alia mediæ inter hæc substantiæ. Quæ membranis similia sunt, dicuntur *Membraneæ*: quæ cartilaginibus, *Cartilagineæ*, Græcis *συνδέσματα νευροχονδρῶδη*. Sunt membranis similia, communia illa ligamenta, quæ articulos ambiunt: cartilaginibus verò, quæ intercedunt articulos, & vel *Teretia*, quæ ab vnius ossis capite in sinum alterius feruntur; vel *Lata*, vt quæ colligant vertebrarum corpora. Sunt etiam omnia in tenera ætate molliora, quàm in senili: & in sexu fæmineo, quàm masculino, & in iis tandem qui humidius temperamentum sua natura sunt nati. Ratione *figuræ*, alia *teretia* sunt, vt cartilaginea, quæ intercedunt ossa, quemadmodum est illud quo caput femoris, cum coxendicis acetabulo iungitur; alia sunt *lata*, vt quæ ambiunt articulos, illa scilicet quæ *Communia* vulgo dicuntur. *Magnitudo* quoque diuersa est. nam quæ articulos maiores devinciunt, necessario maiora sunt; minora, quæ minores. Magnitudo autem hæc non in vna dimensione respicienda est, sed tam in longitudine, quam latitudine, aut crassitie consideranda venit. Crassiora enim sunt, vbi vel robur magnum requiritur propter validos motus, quibus articulus subiicitur; vel vbi ob cavitatem superficiariam inualida est debilisque ossium connexio. *Numerus* etiam insignem, & diligenter aduertendam differentiam parit. Non enim Natura vnum tantum, vni articulo tribuit, sed vbi luxationis periculum metuendum erat, complura consarcinavit. Ita femoris articulus cum coxendice, præter commune, quod latum est, at totum articulum ambit, etiam teres cartilagineum accepit; eiusdem vero femoris cum tibiæ superiore appendice, complura, & quidem sede posteriore, quod ea debilitate maxime laborare videbatur. *Situs* etiam ratione discrimina quædam aduertuntur. Sic enim nonnulla ligamenta superna, quædam inferna, dextra, sinistra, antica, aut postica sunt. Præcipua tamen differentia hæc est, quod quædam extra articulum sita, totum ipsum inuestiunt, vt ea sunt, quæ dicuntur *Lata*: quædam verò in ipso articulo inter ossa, vt sunt *Teretia* illa duo, quæ vtrumque femoris articulum alligant, partim superiorem, cum coxendicis acetabulo, partim inferiorem, cum duobus sinibus tibiæ: illa etiam quæ inter duo corpora vertebrarum sunt posita, & cartilagineâ naturam æmulantur. Adnascuntur autem ossibus articulum constituentibus, capitum scilicet circumferentiis, & cavitatum superciliis, vbi plærumque foramina quædam occurrunt, & superficies ad-

Differen-
tiæ liga-
mento-
rum.A tempe-
ramento.

A figura.

A magni-
tudine.A nume-
ro.

A situ.

cies admodum aspera est, vt tum exortus, tum insertio sit firmior. Sed tempus iam videtur vt ipsam historiam aggtediamur.

C A P V T V.

De ligamentis quæ in capite, thorace, ac infimo ventre occurrunt.

Ligamē-
tacapitis.

CAPITIS, siue supremi ventris ligamenta duplicis sunt generis: quædam enim totum respiciunt, quædam verò duntaxat partem. *Totum caput respiciunt*, quæ ad primam & secundam vertebram pertinent, super quas capitis motus, tam recti quàm laterales perficiuntur: *partem vero*, quæ maxillâ inferiorem, os hyoides, & linguâ concernunt.

Ligamen-
tum quo
caput pri-
mæ colli
vertebræ
alligatur.

Caput ergo primum cum prima vertebra connectitur ligamento membraneo, quod totum articulum ambit. Validissimum autem hoc est, atque ita robustum, vt vertebra prima facilius frangi, quàm luxari possit, cum luxatio talis necessario lethalis futura esset.

Ligamē-
ta capitis
& secun-
dæ verte-
bræ.

Cum secunda autem vertebra duobus connectitur ligamentis. *Primum* validum est, teres, ac cartilagineum, quod ex apice ipsius dentis secundæ vertebræ ceruicis enatum, occipitis ossi à parte priore, propè primum ipsius magnum foramen, per quod spinalis medulla elabatur, implantatur. *Secundum*, ab vno latere primæ ceruicis vertebræ, ad alterum transuersim procedit, & processum dentiformem secundæ vertebræ, à posteriore parte amplectitur, ac in loco detinet. Siue, *secundum illud est*, quod sinum quadratum primæ vertebræ (sic supra à nobis vocatum) pro dente excipiendo exsculptum, posteriore sede claudit. Validissimum autem hoc est, & cartilagineæ naturæ, ne dens in vehementioribus capitis versus posteriora motibus, ex suo sinu exsiliens, cum ineuitabili vitæ periculo, spinalem medullam illuc transeuntem, comprimat.

Ligam.
primæ ver-
tebræ cū
secunda.
Ligamē-
ta reli-
quarum
colli ver-
tebrarū.

Iungitur deinde & *prima vertebra cum secunda*, ligamento tenui membraneo, quod neque substantia, neque colligandi modo ab alijs communibus differt. *Reliquæ vertebrae* duobus ligamentis alligantur. *Primum*, validissimum est, pingui ac mucoso humore oblitum, qualis in alijs quoq; articulis conspicitur, quod vertebrae vndiq; ambit, estque ligamentum commune. Et quamuis robustum sit vndique & crassum, tale tamen potissimum à lateribus versus anteriorem partem, vbi ipsæ quoque vertebræ nonnihil crassiores sunt, apparet. *Secundum* ligamentum, cartilaginofum est, & corpora vertebrarum intercedit, cuius etiam latitudinem & figuram refert.

1.
2.
Inferioris
maxillæ
ligamētū
Ossis hyo-
idis.
Lingua.

Inferioris maxillæ articulum cum ossibus temporum commune ligamentum obuoluit. Os hyoides duo quoque habet ligamenta, eaque valida, quæ ipsius lateribus committuntur: sed & alia cartilaginosa ac rotunda obtinet, vtrique lateri implantata, quibus partibus adiacentibus adnectitur, & velut in æquilibrio seruatur.

Lingua quoque ligamentum validissimum membraneum obtinet, quod medio ipsius corpori substernitur. Huius extremo circa apicem linguæ funiculus quidam adnascitur, quem *Lingua frenum* appellant. hoc si longius sit, vt ad dentes vsque priores exporrigatur, impedit linguæ, (quemadmodum sæpe in pueris videmus) liberum motum, adeoque tunc sermoni plurimum officit, vnde peculiaris huic negotio chirurgica operatio dicata est.

Ligamē-
ta Tho-
racis.
Vertebra-
rum.

THORACIS vertebræ, vt & **LUMBORVM** eadem habent ligamenta, quæ diximus esse reliquis, præter primam & secundam, Ceruicis vertebris. Cæteri ipsius articuli,

articuli, communibus ligamentis membraneis, puta totum articulum involuentibus, vinciuntur. Nam quæ *Costas cum vertebra* iungunt talia sunt, paulo tamen validiora crassioraq; existunt, potissimum in prima & secunda costa. Eadem sunt etiam, quæ easdem *costas cum sterno* connectunt: sed tenuiora, minusque robusta.

In INFIMO VENTRE paulo plura occurrunt. *Primum* est, quod ilium os sacro validissime connectit. hoc robustum est, totumque articulum circumamplectitur; membranam referens forinsecus, at qua parte inter vtrumque os inferitur, durum ac cartilaginofum existit. Hoc ligamentum in partu difficili laxari posse, ^a supra à nobis probatum fuit. *Alterum* ligamentum est, quod os sacrum cum coxendice iungit, & hoc duplex est. *Unum*, quod teres, validissimum ab osse sacro exoritur, ubi quintum ipsius os cum sexto committitur, & in externum tuberculum ossis ilium inferitur, sub primo femur circumagentium musculo, Pyriiformi, statim occurrens. *Alterum*, ex eodem loco enatum in posteriorem appendicem coxendicis implantatur. Tandem *pubis* quoque ossa varia ligamenta obtrinent. *Primum*, cartilagineum est, quod lineam eorum asperam committit. *Alterum*, quod circulariter ea ambir. *Tertium*, membraneum, quod foramen pubis ossium succingit, & secundum ac tertium femur circumagentes musculos, Ob-
turatores vulgo dictos, distinguit.

Costarū cum vertebra.
Costarū cū sterno.
Ligamentū infimi ventris.
Ossis ilii & sacri.
Ossis sacri & coxendicis.

Ossium pubis.

CAPUT VI.

De ligamentis Artuum, ac primo Manus.

CUM MANVS dicatur, quicquid à scapula dependet, varia ligamenta erunt, quæ ad manum pertinent. *Primum*, quæ scapulam cum humero iungunt; deinde, quæ humerum cubito, & cubitum radio, vtrumque autem carpo, inde hunc metacarpio, ac tandem digitorum ossa inter se connectunt.

Ligamenta manus.

Ligamenta ergo quæ *scapula humerum alligant*, quinque communiter numerantur. *Primum*, commune est, latum & membranofum, quod ex supercilijs ceruicis scapulæ orbiculatim enatum, vniuersumq; articulum inuoluens, in humeri internam ac priorem ipsius capitis partem totam inferitur. *Alterum* ligamentum, omnium robustissimum & suprema sede positum, à toto externo ancyroidis processus latere eductum, oblique vehitur, internoque summi humeri, siue acromij lateri, nullibi humerum attingens, implantatur. *Tertium*, rotundum, ab externo latere eiusdem ancyroidis processus exoriens, in externum humeri caput, interna parte, desinit. *Quartum*, ex superiore parte ceruicis scapulæ, quæ proximè ancyroidi processui adiacet, & acuta est, prodians, mox internum humeri caput superans, capiti eiusdem exteriori adnascitur. *Quintum*, ex eodem, quo quartum, loco erumpens, oblique fertur, & in posteriorem partem externi humeri capitis inferitur. Hæc ligamenta humeri esse, eoq; facere vulgo creduntur, quo minus propter leuem illum scapularum sinum luxationibus opportunus sit: meo tamen iudicio solū *primum* est, quod huic muneri satisfacit: *secundum*, quod humerum ne attingit quidem, pro super-scapulari potius superiore, siue primo humerum circumagente exstructum est, ne dum contrahitur forte, ex sua sede profiliat, cum ab hoc tendo ipsius (non minus atque à ligamentis annularibus in manu muscu-

Ligamenta scapulæ humero alligantia.

1.

2.

3.

4.

5.

vjus.

1.

2.

lorum digitos flectentium tendines),superna parte coërceatur. Atque hunc vsum genuinum esse paruo negotio patebit cuius, qui diligenter animum velit aduertere, ipsamque inspectionem anatomicam consulere. Tracto enim ad suum principium hoc musculo,protinus licebit cernere, quam promptum ipsi foret è suo loco excidere, nisi ligamento, eoq; tam valido, prohiberetur. Reliqua tria eo facta sunt, vt insertionibus trium musculorum humerum circumagentium inseruiant. Tertius enim, siue infra-scapularis dictus, in *tertium* ligamentum implantatur: Primus, siue super-scapularis superior, in *quintum*: & Secundus, siue inferior super-scapularis, in *quartum*.

Ligamentum cubiti & humeri
Cubiti & carpi
Cubiti, & radii
Offium carpi ligamenta
Offium metacarpi
Ligamenta annularia

Cubitus ex Radio & Vlna compositus est, quæ ligamentis, & humero, & carpo, tum inter se etiam iunguntur. *Humero* quidem membraneis communibus: at *Carpo*, primum similiter communi, sed deinde & aliis duobus, quorum alterum vlnam, alterum radium carpo adnectit, vtrumque veto teres est. Illud à processu styloide ossis cubiti oritur, inque os carpi quartum terminatur: hoc à radii apice nascitur, & in carpum desinit. *Vtrumque autem os* sibi inuicem, membraneo ac valido ligamento iungitur, quod^a ex tota vlnæ acuta linea enatum, in totam acutam lineam radij aduersam infigitur, & *a, 4. 23. l.* musculos internos cubiti ab externis dirimit separatque.

Carpi ossa, Metacarpii, & Digitorum, ligamenta communia acceperunt, quæ articulos orbiculatim sic ambiunt, vt totos inuicem colligent. Hoc tamen *metacarpi ossa* peculiare præ dictis obtinent, quod non ligamentis tantum forinsecus, sed intus etiam, quæ se mutuo respiciunt, cartilaginibus vinciuntur.

Cæterum præter hæc, quæ nunc exposuimus ligamenta, & quæ ad articulationum securitatem faciunt, alia quoq; in manu occurrunt, tendinibus ad digitos abeuntibus inseruientia, quibus sic coercentur, ne in valido motu extra locum exsiliant. Huiusmodi ligamenta *Annularia* vocantur, transuersim manum subeuntia, & duo sunt: ^b *vnus*, in interna manus sede, pro flectentium: ^c *alterum*, in externa, pro extendentium musculorum tendinibus. Sed & Digiti quoque singuli eiusmodi ligamenta interna parte obtinent, eodem fungentia munere, quæ secundum eorum longitudinem ad latera pronata, canalem æmulantur, per quem flectentium digitorum tendines expanduntur.

b, 4. 22. l.
c, 4. 24. 2. l.

C A P V T VII.

De ligamentis Cruris vniuersi.

CRVS dicitur, quicquid à coxendicis articulo, in aciem digitorum pedis extremam porrigitur. Quare articuli complures erunt in crure qui ligamentis indigent: ac primum quidem femoris cum coxendice parte elatiore; eiusdem cum tibia & fibula sede inferiore: tum tibiæ cum fibula, & vtriusque ossis cum talo. Pedis tandem extremi, vbi talus, tarsus, pedium, & digiti sua ligamenta requirunt.

Ligamentum quo femur ossis alligatur
1.
2.

Femoris ergo caput superius cum acetabulo coxendicis duobus adstringitur ligamentis. *Primum*, commune est & membraneum, quale in aliis quoq; articulis cernitur, latum, totam horum ossium commissuram orbiculatim ambiens, quod robore ac crassitie, vt ipse articulus aliis, ita cæteris ligamentis præcellit. *Alterum*, in ipso acetabulo, interque articulum occurrit, teres & cartilagineum. Hoc ex humiliore acetabuli sede enascitur, quo loco supercilium eius osseum non est, sed ligamento tantum constat, & in medium femoris caput, vbi foramen hanc in gratiam exsculprum habet, inseritur. *In-*

Inferius caput femoris cum tibia fibulaq;, pluribus neſtitur ligamentis. *Primum*, commune *Ligamētū* est, membraneum, quod vniuerſum articulum inuoluit, excepto ſinu illo, in anteriore *genu.* parte, vbi patella eſt, cū eo loco ^d validiſſime tribus tendinibus, ſecundi, tertii, & quarti tibiā extendentium muſculorum vinciatur. *Alterum*, craſſum ac validum in poplite ſitum, à medio partis poſterioris tibiæ incipit, reſtaq; aſcendens, in duo capita abit, quæ poſtea in duo inferiora femoris capita, qua parte maxime inter ſe recedunt, implantantur. *Tertium*, quod ſecundo femoris ligamento reſpondet, cartilagineoſum ac robuſtum eſt, & ex ſinu illo magno, qui eſt inter duo capita inferiora femoris, iuxta inſertionem modo dicti, enaſcitur, ac inter articulū conſiſtens in tuberculum illud, quod inter duos ſinus ſuperioris tibiæ appendicis eſt, qua parte aſpero eminet apice, implantatur. *Quartum*, gracile eſt, & inter duo capita femoris inferiora inferitur, ex medio ligamenti ſecundi nunc enarrati, ea parte, qua in duo capita dirimitur, enatum, & ſuſum ad femur delatum. *Quintum*, teres, genu externo lateri obducitur. *Sextum* contra, inteno lateri attenditur.

Tibia cum fibula primum ſuperne per validum ligamentum neſtitur, quod oſſa hæc, vt cætera ſolent, vndiq; exterius circumdat: *at vero ea parte*, qua inuicem diſtant ſecundum longitudinē, ^e membraneo, lato, ac tenui, obliquis fibris à tibia, ex qua oritur, ad fibulam, cui inferitur, tendentibus. Simile eſt in omnibus ligamento illi, quod cubitum radio iungit, ſimiliterq; muſculos anteriores tibiā occupātes, à poſterioribus dirimit.

Tibia fibulaq;, cum *Talo* neſtitur tribus ligamentis. *Primum* eſt commune, membraneū, quod totum articulum ambit: *reliqua duo* cartilaginea ſunt, ex quibus *ſecundum* à proceſſu tibiæ malleolum internum conſiciente ortum, inferitur interno tali lateri, quod à malleolo excipitur: *tertium* contra, ab appendice fibulæ externum malleolum conſtituente enatum, in externum eiufdem tali latus implantatur.

Talus cum pedis oſibus ligamentiſ illigatur pluribus. *Primum*, commune eſt, calcis articulum cum talo ambiens orbiculatim. *Secundum*, cartilagineum, ab inferiore tali ſede ortum, in calcem inferitur. *Tertium*, totum articulum externa ſede cingit, ex ceruice tali naſcitur, & nauiculari oſſi implantatur. *Quartum*, calcis os cubiformi committit, & articulum circumamplectitur, robuſtum eſt, ac cartilagineum. *Quintum*, à tali ceruice in os cubiforme inferitur.

Tarſi tandem, Pedij, ac Digitorum pedis ligamenta, illis quæ in manu ſunt reſpondent: quemadmodum etiam eodem modo in pedio, ac metæcarpio, quæ oſſium interuallis immittuntur, cartilaginea ſunt, cæteris membraneis exiſtentibus.

Præter hæc etiam ligamenta, quæ ad articulos ſpectant, alia ſimiliter, ac in manu occurrunt, quæ tendines ad pedes tranſmiſſos continent. Horum *primum* tranſuerſum eſt, in anteriore pedis parte, tibiā cum fibula neſtens. *Alterum*, ab interno malleolo enatum, in os calcis inferitur. Hoc etſi ſimplex videatur, triplex tamen eſt, tres veluti annulos effingens. *Tertium*, ab externo malleolo, in idem calcis os implantatur. Per hoc tranſeunt duorum muſculorum tendines, ſecundi ſcilicet podem fleſcentis, & abducentis. *Tandem* in digitorum interna ſede ligamenta occurrunt, qualia in manu, per quæ tranſeunt tendines muſculorum digitorum internodia fleſcentium.

FINIS TERTII LIBRI.

N 2

ADRIA-



ADRIANI SPIGELII

BRUXELLENSIS,

DE HUMANI CORPORIS FABRICA,

Liber Quartus.

Qui Musculorum historiam persequitur.

CAPVT PRIMVM.

Quid sit Musculus, & quæ eius actio.

*Rarior or-
dinis.*



*Utilitas
et neces-
sitas do-
ctrina de
muscu-
lis.*

VM ea in libris superioribus vniuersa hæcenus tradiderimus, quæ ad ossium, & hisce respondentium cartilaginum historiam pertinere videbantur, quæ vt totius corporis, ita etiam solidæ alicuius in studio anatomico cognitionis fundamēta diximus: videtur reliquum nunc esse, vt tractationē de musculis aggrediamur, qui ita longe lateque se fundunt, vt maximam corporis nostri partem, non immerito conficere videantur. Argumentum est non solum summe utile, sed & maxime necessariū in quo diligens versetur oratio, tum quia ad ægrorum curationem, cuius gratia potissimum Medici Anatomix animum applicant: tum ad eorum, quæ postmodum dicenda sunt, absolutum perfectumque intellectum plurimum conducant. Quemadmodum enim musculorum historia, in explicando situ singulorum, summam vbique ossium rationem habet, vt frustra sit, qui se aliquid promoturum in illa crediderit, nisi hanc animo prius fideliter compræhenderit, cum & ab ossibus aut cartilaginibus plerique omnes oriantur, & in ossa similiter aut cartilagines desinant: sic Venarum, Arteriarū, & Neruorum tractatio (medico futuro vnice necessaria, Philosopho autem summe iucunda) nec vnquam tradi feliciter, nec addisci potest, nisi prævia musculorum cognitio, eaque

rio, eaque exacta, fundamenta posuerit cui reliqua superstruantur. Illud ergo hoc loco *Quare-
sub initium monendum duximus, vniceque obseruandum est ab omnibus, qui fru-
ctum aliquem ex his laboribus nostris haurire velint, ne quis ad lectionē huius quarti
libri accedat, quin exactam ossium cognitionem sibi antea comparauerit, eaque sum-
ma diligentia legerit, ac perfecto maturoq; iudicio apprehenderit, quæ à nobis in se-
br.*
cundo libro superius accurate perscripta sunt. Obscura enim & inutilis erit tota hæc
tractatio citra illius præuiam cognitionem: at clarissima contra & perspicua futura
sunt omnia, si bene, quæ exposita fuere, perspecta quisque habuerit.

MVSCVLVS ergo, vt à nomine exordium ducamus, Græcis *μῦς*, dicitur, siue *μῦς* & *μῦς* *MVSCV-
lvs.*
μῦς, quod contrahere significat, quæ eius est actio: siue à figura, vt plerique, & haud
male fortassis, arbitrantur, quando quidem musculus referat excoriatum. Caput e-
nim magna musculorum pars acutum habet; ventrem autem rotundum; longissi-
mamque caudam muris instar. Eadem nominis ratione Latinis quoque Lacertus di-
citur, ab animalis sic appellati similitudine: vnde factum, vt Lacertosus vulgo muscu-
losus denotet, & eum, qui carne abundat. Quanquam reuera omnibus in vniuer-
sum musculis ea figura tribui haudquaquam opportune queat, cum alii potius rotun-
di sint, vt qui sphincteres dicuntur, alii triangulares, vt Deltoides, humerum eleuans,
à Δ litera Græcorum cognomen nactus, alii quadrilateri, vt tertius scapulæ musculus,
Rhomboides, à Geometrarū figura quatuor lineis comprehensa, sic appellatus. Existi-
marim ergo primos nominum impositores, cum Anatomia ignari essent, musculos
vocasse, quod inter secandum tum demum horum naturam aduerterint, cum huius
formæ musculos depræhenderent: reliquos postea, qui diligentiores in sectionibus
aliis idem munus competere obseruarunt, etsi forma non responderet, mutare tamen
commune nomen, quod iam ab omnibus quasi receptum erat, neitiqum voluisse.
Sic scimus membranam carnosam dici, non quod reuera carnosā sit in homine, præci-
pue in adulto, sed potius quia in brutis talis videatur, in quibus se exercebant olim,
qui primi hoc nomen excogitarunt: similitudinis tamen gratia, quæ inter hominum &
brutorum carnosā membranā est, communis illa vox postmodum retenta fuit.
Idem in pluribus aliis rebus contigit, vt primo scilicet inventum nomen, tametsi haud
ita aptum fuerit reliquis etiam quæ aliquam adfinitatem habuere, accesserit. Sic Geo-
metria dicta est à dimensione terræ; quia huius occasione primum reperta est, etsi pro-
prie circa magnitudinem versetur, cuius affectiones persequitur. Sic Medicina, à
medendo, quantumvis non medeatur tantum agris: sed etiam sanis, quo minus in
morbos declinant, prospiciat. Credibile enim est, primos nobilissimæ artis inuentor-
es, miserando mortalium fato commotos, de restituenda amissa sanitate prius, quam
de præsentī conseruanda, aut tuenda cogitasse. Cæterum musculorum mentionem
Aristoteles in genuinis operibus nullam iniecit, vt adeo plerisque ignorasse videatur:
etsi reuera ab Hippocrate se multo antiquiore didicisse poterat, qui aliquoties ipso-
rum in suis scriptis meminit, vt 2. de fracturis, & alibi: sed potissimum libro de arte, v-
bi, quæcunque, inquit, partes carnem in orbem circumsitam habent, quam Musculū
vocant, hæc omnes ventrem obtinent. Meminit tamen sæpe *carnium* Aristoteles, per
quas indistincte cognouisse musculos, à non paucis creditur. Præcipuus locus est 2. de
part.

*MVSCV-
LVS.
Etymolo-
gia.*

*Vnde mus-
culi dicā-
tur opinio
Autho-
ris.*

*Aristote-
les muscu-
lorū men-
tionem
non fecit.*

*Carnes
vocat.*

part.animal.cap.9.in quo cum occasionem habeat mentionem de his aliquam aspergendi, caro, inquit, circa ossa consistit, vinculis modo fibrarum tenuibus adhærens, cuius causa ossium genus habetur. Sic etiam Hippocrates musculos carnes vocat, vt 4. aph. 16. At ille fortasse musculorum nomine dignatus non est, sed generali tantum carniū appellatione. Quamquam Author problematum (quisquis etiam is sit) carniū nomine eorum meminerit.

DEFINITIO.
Motus duplex.
Naturalis.
Animalis.

Cæterum musculus à Galeno definitur, 1. de mot. muscul. ἔργον κινήσεως τῆς κατ' ὅρμῳ. In qua definitione cum aliqua difficultas sit, sciendum est, duplicem esse in nobis motum; *vnū*, qui à voluntate & arbitrio dependet; *aliū*, qui citra omnem voluntatem perficitur: ex quibus hic, naturalis: ille, animalis dicitur. *Naturalis* quidem, quod ijs propriè competat, quæ animæ naturalem facultatē, hoc est, vegetatiuam habent: *animalis* verò, quia solis animalibus inest. *Naturalis* ergo ille est, qui in alimenti attractione, retentione, & expulsionē fit, nec solum in ventriculo & intestinis, sed in toto quoq; corpore, omnibusq; eius partibus: *Animalis* vero, apprehensio, & ambulatio, sc̄cum & vrinæ expulsio, attractio item aëris, aut detentio voluntaria. *Naturalis* enim à sola natura regitur, nec sibi à nobis aut concitari potest, quemadmodum ciborum attractoriam ventriculi vim, nemo pro suo arbitrio, aut sistere potest, aut impellere, sed ipsa pro dispositione eius secundum, aut præter naturam se habente peragitur. *Animalis* autem à voluntate animalis totus dependet, & modo intermitteri potest, modo perfici, quo pacto in nostra voluntate est, aut apprehendere aliquid & capere, aut idem relinquere, ambulare, aut cōsidere. Hic autem etsi animalibus brutis iuxta, ac ratione præditis communis sit, in illis tamen sine electione fit, in his cum electione: in illis spontaneus, in his voluntarius dicitur. Cæterum cum spontaneum voluntarius perpetuo præsupponat, nec citra eum reperiatur vnquam, Galenus profecto rectè, mea sententia, musculum definiuit, instrumentum esse motus κατ' ὅρμῳ, siue secundum animi appetitum, cum non semper opus sit, vt cognitio appetitioq; intellectiua ad mouendum partes commoueat, sed etiam cognitio vel appetitio sensitiua sufficiat. Ex his jam concludimus, quicquid in nostro corpore ad libitum mouetur, id omne per musculos, agi, neq; vllum in corpore inueniri musculum, quin voluntarium motum expedire possit. Appellat autem ἔργον, id est, partem instrumentalem, qua voce indicat, sub quo partium genere contineatur. Est enim pars dissimilaris musculus, quæ ex pluribus similaribus componitur, quæque actionem certam ac determinatam edit, quæ sanè duo propria sunt omnium organicarum partium τέμνηα. Nonnunquam tamen & in similarium catalogum referri à doctissimis videas: sed quatenus scilicet similes partes vocantur, quæ ad vere organicarum constructionem veniunt, ex quorum numero sunt musculi, qui ad manus, pedis, capitis, imò omnium ferè organorum constitutionem concurrunt.

Musculus pars est dissimilaris. Quomodo similis interdu dicitur.

Quamquam autem Galenus musculi definitionem proponens, vt partis organicæ, eiusdem etiam actionem, tanquam finem, à quo organis forma omnis superuenit, indicare videatur, dum motus instrumentum esse asserit: motus tamen actio musculi propriè haudquaquam dici potest, sed potius effectus quidam est, & vsus actionis eorundem. Est autem motus partis eius, cui musculus inseritur: nec tamen motus ille localis semper est, sed alterius quoq; vsus gratia perficitur, vt constrictionis alicuius part-

tis, ver-

tis, verbi gratia, vesicæ & ani: aut apertionis, vt labiorum, deniq; aliorum vsuum ergo. Motus autem localis ad omnes differentias locorum fieri potest, si & partis illius necessitas postulet, & musculi dati sint necessarij, vnde quædam sursum & deorsum, dextrorsum & sinistrorsum, ante & retro mouentur. Destinatus enim omnibus motibus musculus est, & plerumq; vni vnus: interdum, sed raro, duo, vbi validior scilicet vis requiritur, vt cubiti, tum flexioni, tum extensioni.

*Propria autem musculi actio, contractio est, sed contractio non quæuis, verum in seipsum; nec in quamuis sui partem, sed ad principium. Hanc contractionem necessario duo consequuntur; primo, vt pars illa, cui insertus est musculus, moueatur, & deinde, vt ad illam partem, vbi musculi principium est, trahatur. Id autem, quod mouetur, non semper os est, sed variæ sunt partes quibus musculi dicati, quemadmodum postea in differentijs dicetur. Fit autem contractio hæc voluntarie, sequiturque situm fibrarum, modo rectum, modo obliquum, modo transuersum, idque ratione corporis. Cæterum, per contractionem non ipsum tantum contractionis motum qui est adhuc in fieri: sed etiam contractionis iam factæ perseuerantiam intelligimus, cum non minus tum sustinendo partem attractam, quam dum adhuc se contrahit agat; tametsi quiescere omnino videatur. Motus hic distinctionis gratia Tonicus dicitur, cum in eodẽ perpetuo tenore ac situ partem conseruet. Præter hanc tamen actionem & alia musculis tribuitur, quam secundariam vocant, estque sui relaxatio. Cum enim musculus vnus contrahitur, alter qui oppositum motum peragit relaxatur: verbi gratia, dum flexentes cubitum contrahuntur, relaxantur extendentes: & dum hi laxantur, illi contrahuntur. At enim, vt modo contractionis perseuerantia non minus actio, quam ipsa contractio, vocabatur: ita nunc relaxationis perseuerantia non minus motus musculi, quam relaxatio erit, vt sic in vniuersum quatuor enumerari queant musculorum motus, Contractio, contractionis conseruatio, siue tonicus motus, Relaxatio, & relaxationis perseuerantia. Has Galenus agnouit lib. 1. de mot. muscul. cap. 8. ἡ γὰρ συστολή, inquit, ἢ ἐκτείνονται, ἢ μετὰ φέρονται, ἢ τεταμένοι μένουσιν, aut enim contrahuntur musculi, aut extenduntur, aut transferuntur, aut tensi manent. Vterque autem hic motus, modo extremas, modo medias figuras habet. *Extremas* voco, in quibus summe contrahuntur, aut relaxantur musculi: *medias* contra, quæ ab extremis motibus æqualiter distant. Ex his sequitur, extremas omnes dolorificas esse, medias iucundas: illas, diu ferri nõ posse; has, quam diutissime: illis nos vt in actionibus corporis; his, in otio & quiete. Habet autem mediam figuram, & totum corpus, & singulæ similiter partes. *Totius corporis mediam figuram* describit Hippocrates, lib. 1. prænot. eleganter, dum egrorum à medico deprehendi vult, primo in latus dextrum, aut sinistrum, (non in dorsum, aut ventrem) decumbentem, deinde manus, collum, & crura modice inflexa habentem, actandem totum corpus flexibile situm. Subiungit, ita enim plurimi ex sanis decumbunt, quia scilicet hæc figura optime toleratur, & citra dolorem. *Medias figuras partium singularum* inuenies, si facta extrema articuli, tum flexione, tum extensione, notaueris locum inter has medium, membrumq; ad eum postea reducas. Hæ singulæ diligenter in omnibus notandæ & addiscendæ sunt, quod neque fracta ossa coniungi, neq; luxata restitui in suum locum possint, nisi quis mediam partis illius figuram exactè nouerit.*

ACTIO
musculi
propria.

Quid per
contra-
ctionem
intelli-
gendum.
Motus
Tonicus.

Quatuor
musculo-
rum motus.

Figura
extrema
& media.

Media fi-
gura to-
tius cor-
poris.

Media fi-
gura par-
tium singu-
larum.

Notan-

Nota.

Notandum autem coronidis loco est, nonnullos esse musculos, qui semper in media figura situm suum obtinent, cuiusmodi sunt sphincteres dicti, quorum extremæ in dilatatione aut contractione fiunt. Sic etiam frontis musculi, ut postea dicitur, in media figura perpetuo sunt, nisi à nobis contrahantur. Quod si quis iam perfectam, & omnibus numeris absolutam musculi definitionem colligere velit, ex dictis facile poterit, dicendo: *Musculum esse partem nostri corporis organicam, destinatam contractioni voluntariae versus suum principium, pro motu partis cui inferitur, & cuius musculus esse dicitur.*

Musculi
perfecta
definitio.

CAPVT II.

Quæ sit musculi constructio, & quibus ex partibus constet.

CVM ergo musculi actio, ut dictum, voluntaria sit sui ipsius versus principium contractio, videndum nunc est, quænam eius sit constructio tam concinna, tamque elegans, ut actioni huic tam nobili apte satisfaciat. Id vero nos haud magno negotio consequuturos arbitramur, si quæ sint eius partes, ex quibus conflatus est, prius diligenter exploratum habuerimus: deinde, cui ex his ipsi actio proprie comperat, vel accepta referenda sit, solerti rationis indagine perscrutemur. Omne enim instrumentum ita dispositum esse debet, ut finem cui destinatum est, quam aptissime assequatur: non tamen omnes ipsius partes proprie ipsam concernunt, sed quædam sunt, à quibus immediate fluit, quædam usum tantum nonnullum præstant.

Diuisio
partium
musculi
Dissimila-
res mus-
culi par-
tes.
Princi-
pium.

Medium.
Finis.
Diuisio
allata
falsa.

Cæterum duplex vulgo traditur partium musculi diuisio, quarum alia dissimilare est, alia similare. **D I S S I M I L A R I V M** tres enumerantur, principium scilicet musculi, medium, & finis. *Principium*, alàs *caput* quoque dicitur, seruata similitudine cum mure excorticato: *medium*, *venter*: *finis*, *cauda*. Græci hanc etiam *ἀντέρωσις* vocant, *enervationem*, quasi musculus ibi in nervum desinat: aliis *τένον* dicitur, seu *Tendo*. Est autem *principium*, ut communiter ab omnibus definitur, prima musculi pars, quæ ex ligamento ossis & nervo insimul mixto generatur, ut ex utroque composita, inter utrumque; mediam quandam naturam obtineat, & nervo quidem sit durius, ligamento autem mollius. *Medium* verò, pars tumida musculi esse dicitur, ex carne musculosa composita, maiorem eius corporis partem cōstituens. *Finis* tandem, pars nervea & pellucida, in quam musculus terminatur. Verum quemadmodum, ut dictum est, nec nomen musculi omnibus sic appellatis apte conuenit, aliis aliam figuram obtinentibus: ita profecto neque hæc diuisio sic omnibus tribui potest, ut commodè beneque assignata videatur, præterquam quod etiam falsa quamplurima docet, ut modo ostendemus.

1.
Quia non
omnibus
potest tri-
bui.

2.
Quia fal-
sa tradit.

Non potest omnibus tribui, cum multi sint, qui toti carnei, & in quibus finistendinosus non est, ut sunt moventes cutim frontis, multique laryngis, item ani & vesicæ musculi sphincteres, in quibus secundum substantiæ modum, principium nec à medio, nec medium à fine differt. Sunt nonnulli in quibus medium tendinosum est, ut secundum par maxillæ inferioris, digastricum dictum; & quartum ossis hyoidis, Coracohyoideum appellatum. *Falsa etiam tradit*, cum principium neque in omnibus nervaceum sit, ut in carneis enumeratis, & aliis quamplurimis, de quibus in differentiis musculorum dicitur:

cetur:

cetur: neque in quibus neruum mentitur, ex ligamento ossis neruoque compositum est, cum nec ligamentum, nec neruus ad ipsum accedat. *Non ligamentum*, quod oppido quam multi sunt musculi, qui non ab ossibus originem ducunt, sed à membranis, à cartilaginibus, à tendinibus, vt ostenderetur in sequentibus. Quin & ij ipsi qui principium suum ab osse aliquo habent, à ligamento tamen sunt alienissimi, vt tres illi natiuū femur extendentes, Glutæi nuncupati. *Non etiam neruus* esse potest, quod multi sunt, ad quos neruus nec accedit quidem, quemadmodum postea ex inferioribus clarum erit ac manifestum. Si ergo, neque accedunt, neque attingunt musculos, qui ergo dici possunt ipsorum capitis materiam esse, & principium generationis. Quod si vero accedant etiam, quam multi sunt, quorum superficiem tantum lambunt, non vero etiam in interiora penetrant? Et vt neruos etiam in nonnullis sese insinuare largiamur in intima, vel in medium implantantur, & sic caput ne attingunt quidem: vel, si caput etiam ingrediantur, vsque adeo parui sunt, vt ne cogitatione quidem à prudenti & sanæ mentis homine compræhendi possit, quomodo tam exilis neruus, tam magnum corpus, vt caput nonnunquam esse solet, formare & constituere potuerit. Quamobrem jam rectè concludere videmur, principium hoc pacto determinatum non bene esse, cum neque omnibus musculis neruaceum caput competat, neque quibus forte contingit, ex neruo & ligamento confletur. *Sed nec medium bene definitum est.* nam in ijs, qui toti carnei sunt, non differet à principio, aut fine. Adde, quod in dictis bigastricis medium non carneum sit, sed tendinem habeat. *Finis etiam malè distinctus est*, qui neque in omnibus neruaceus est, vt in sphinctere, & carneis: neque in quibus neruosus est, vt ostendimus iam statim, à principio diuersam naturam obtinet. Vnde patet, quam male finis à Græcis *συνέλευσις* dicatur, cum neruaceus omnibus non sit; & ab aliis ineptè *τέρας*, siue Tendo speciali nomine, cum à principio non sit distinctus in substantia. Erronea ergo, & falsa est, hæc musculi in partes dissimiles hoc modo acceptas diuisio: seruari tamen potest, quatenus quibusdam musculis ex aliqua parte conuenit, in quibus scilicet tres hæ partes distinctæ sunt, etsi profecto materia & substantia alia sit, quam statuta est ab ipsis. Vtui etiam esse potest ad faciliorem doctrinam, cum principium semper sit in parte, ad quam mouetur altera mora: finis autem in illa, quæ mouetur: medium, inter utramque interiectum. Præterea dicendum nobis sæpè erit, contractionem fieri versus principium: in principio, aut medio neruum inferi, aliaque in quibus has partes distinctas proprijs appellationibus esse oportet. Non tamen has partes secundum substantiam definire licebit, quæ differentissima est pluribus, nec vniformis semper in principio, finis, aut fine omnibus: sed iuxta usum potius determinare decet, qui omnibus & semper similis est, dicendo: *Principium* esse illam partem musculi, quæ inserta est parti, ad quam fit contractio. *Finem* esse illam, quæ parti quæ mouetur: *Medium* autem, quicquid principio & fini interiacet. Atque hæc de partibus musculi dissimilari-
bus.

SIMILARES, quæ ad musculi constructionem concurrunt, septem sunt numero, Vena scilicet, Arteria, Neruus, Caro, Tendo, Membrana, & Pinguedo. Ex his quædam sunt, quæ musculo cum alijs nostri corporis partibus communes sunt; quædam,

Principiū musculi malè definitū.

Medium musculi malè definitum.

Diuisio tamen hæc retinenda.

1.
2.

Verapartium dissimilariū musculi distinctio.

Partes similes musculi.

quæ propriæ. *Communes sunt quinque, Venæ, Arteriæ, Nervi, Membrana, & Pinguedo. Propriæ, de quibus primo dicemus, duæ, Tendo, & Caro.*

TENDO.

TENDINEM vocamus, partem similem, simplicem, & sui generis, per totum musculi corpus, secundum longitudinem eius diffusam, quæ modo vnita, modo diuisa est carneque stipata, & cum contractioni maxime accommodata sit, ad arbitrium nostrum contracta, partem cui in-

Similaris.
Simplex.

seruitur, vna mouet. Voco similem partem, vt genus assignem: sed addo simplicem, vt distinguam ab illis similaribus, quæ simplices non sunt, sed composita, quemadmodum diximus musculum quoque similem dici, etsi reuera pars sit organica & ex pluribus composita. Est autem, neque neruus, neque ligamentum, neque ex

Sui generis.

Per musculi corpus diffusus.

Vnius vel diuisus.

Carne stipatus.

Diffusus secundum musculi longitudinem.

1.

2.

3.

Modus excarnandi musculum.

Contractioni maxime aptus.

utroque mixtus, quod alii voluerunt, vt ostensum: sed sui generis pars, quæ ligamento mollior, neruo durior est. Addo, per totum musculi corpus diffusa, vt denotem nullam musculi partem esse, in qua tendo non reperiatur: etsi reperiamus sæpe partes, vbi caro non sit, vt fere semper esse solent, in quibus tendo vnitus est. Nec enim sic diffusus per musculum sub eadem semper forma & modo apparet: sed quandoque vnitus est, interdum vero diuisus. Vnitus est sæpe in principio; sæpissime in fine; nonnunquam etiam in ventre, sed rarissime, vt in dictis digastricis. Diuisus contra sæpissime, imo semper in medio, si à digastricis discedas: raro in principio, rarissime in fine. Verum vbi diuisus est, semper carne stipatur, quo autem modo, dicitur postea, cum de carne sermonem instituemus. Dicitur autem diffusus, esse secundum totam musculi longitudinem, quibus verbis tria docentur. Primo, tendinem duci recta iuxta longitudinem musculi, non oblique, neque transuersim. Deinde, esse simplicem hunc ductum, quia si secundum longitudinem tantum ducitur, erunt tantum fibræ rectæ in musculo, non rectæ transuersis, aut obliquis intermixtæ, vt in membranis, & in venis fieri solet. Nec est quod aliquis obiiciat, fibras (quæ nihil aliud sunt, quam diuisus tendo) nonnunquam obliquas dici, & transuersas, vti accidit in musculis abdominis, à quibus propterea obliqui ascendentes, & descendentes, item transuersi vocantur. Id enim nominis ipsis impositum est, non ratione ductus in corpore musculi: sed ratione situs musculi in corpore, qui obliquus, aut transuersus est. Tandem, id etiam illa verba edocent, tendinem non tantum in fine esse, vt plerique Galeni asseclæ tradunt, sed etiam in principio, & medio, quod etsi rationibus confirmari poterat pluribus, probare tamen satius vna duximus experientia, quæ clarissima obscurorum est Magistra, fidelissima ignotorum doctrix, certissima dubitationum solutrix. Sume enim si adhuc ambigis, musculum, eumque à carnibus libera, & inspicere, an non principium medio, & medium fini cohæreat, imo continuum sit? Liberabis autem facile, si in aqua per plures dies maceraueris, aut in eadem abunde decoxeris. Cum vero in aliis atque aliis tendo magis appareat, crassiorque sit, accommodatissimus ad hoc negotium musculus erit, supernus ille in pectore, aut cruribus gallorum Indicorum, in quo exacte, quod desideras, conspicias. Subiungitur in definitione, contractioni maxime esse aptum? Aptissime! Instrumentum enim accommodatum esse debet, ad efficiendum suam actionem, bene, expedite, iucunde. Vt id fiat eo conspirare debent omnia, quæ ad eius constitutionem & fabricam faciunt, substantia, temperies, temperiem consequentia, & tandem materia.

teria. Substantia tendinis est sui generis, neruo non valde dissimilis, qui & ipse in se *Substan-*
 contrahitur, vt patet in neruorum præcisionibus. *Temperies* est frigida & modice sic- *tia tendi-*
 ca, id quod tum constitutio ipsius excarnis, tum venarum & arteriarum inopia osten- *nis.*
 dit. *Temperiem sequentia* sunt, mediocritas inter molliem & duritiem, vt neque *Tempe-*
 propter illam flaccidus sit nimis, neque propter hanc, inflexilis. *Materia* autem, est se- *ries.*
 men, quod omnibus partibus generationis principium est, quæcunque spermaticæ *Temperie*
 dicuntur. *consequen-*
tia.

Quam vero aptus propterea sit ad contractionem, hinc patet abunde, quod
 principio musculi præciso, protinus ad finem se contrahat: fine vero, mox
 ad principium: at medio, ad vtrumque. Imo, si aquæ iniiciatur, confestim to-
 tus in se contrahi videbitur, quemadmodum etiam in fracturis id obseruatur, vbi
 subito in se musculi coeunt, cuius gratia in reñsitione extensio semper maxime
 necessaria est, & difficilis. Vltimis tandem verbis docetur, tum actio tendinis,
 nempe *contractio*, tum actionis vsus, *partis scilicet cui inseritur commotio*: sicque insinua-
 tur leuiter, tendinem esse partem illam quæ primas in musculo tenet, & cui actio tri-
 buenda est, quæ per ipsum in musculo immediate perficitur. Id si demonstratione in-
 digeat, satis ostenderetur ex eo, quod diximus, ad contractionem vnâ ex cæteris mus-
 culi partibus maxime accommodatam esse: at inter cæteras methodos, quibus inuesti-
 gamus præcipuas alicuius organi partes, hæc etiam, & quidem præcipua est, quæ tum
 ex fabrica desumitur, tum aptitudine ad obeundum munus, cum neque finem Natu-
 ra vnquam vclit sine medijs, neque media sine fine. Quin imo, tendines quoque cer-
 nere est robustiores aut debiliores esse in musculis, prout actio validior imbecillior ve
 requiritur. quæ res certe clarissime docet, tendinem motus gratia imprimis factum es-
 se. Hinc recti abdominis musculi, cum, vti ostendimus, totam fere superiorem cor-
 poris partem flectere debeant, tendineis intersectionibus firmatæ sunt, vt robur ipsis
 aspergeretur, qui ob longitudinem alias tanto oneri flectendo non erant. Sic deltoi-
 des humerum attollens musculus, sic femur extendentes. Glutæi, crassissimas fibras ob-
 tinent, quod ille quidem, totius brachii: hi vero, vniuersi cruris motui sint dicati. Ma-
 nifestissime autem hoc, quod dicimus, in pennatorum quorundam cruribus videre est,
 quorum tendines per intervalla cartilagineos fieri cernas, quod firmamento indigu-
 ere, vt quæ noctu dormientis totam molem sustinere debeant. Et in his continuitatem
 etiam tendinis, melius quam in vllis alijs musculis videre licebit, quod durissimæ ac
 crassissimæ sint fibræ, nec facile dum caro separatur, lædantur diuellanturue. Acce-
 dit, quod similis pars in nullo organo occurrat: & quod motus musculi imminuatur
 aut tollatur, pro tendinis dissectione. Seca enim tendinis partem per transversum, mox
 imminute musculum moueri: seca integrum, omnem musculi motum tolli aduer-
 te: at incisa carne secundum longitudinem citra tendinis noxam, motus detrimentum
 haud vllum perferent. Tendo ergo præcipua musculi pars est, per quam contractio
 perficitur. Tendo autem hic, modo vnitus est, modo diuisus. Diuisus quidem, vt aptior sit
 ad sui contractionem: vnitus vero, vt accommodatus ad partis tractionem. Non
 enim tantum in se contrahi debebat, sed etiam contractione sua simul partem cui in-
 seritur, mouere. Vt contraheret se, diuisio eius erat necessaria; vt moueret partem

Tendo
primaria
musculi
pars pro-
batu esse.

1.

2.

3.

4.

Tendo cur
modo v-
nitus, mo-
do diuisus
fit.

vna, vnitio. Quare omnes quidem musculi diuifum alicubi habent tendinem, non tamen omnes vnitum, quia in omnibus contractione opus est, non in omnibus valida attractione. Vnitus ergo est in illis, in quibus magna moles, magnumque os appensum ad commouendum. Ad contractionem autem diuifio erat propterea necessaria, quia tendo, qui durus est sua natura, ne facile rumpatur ab ossis, quod appenditur, pondere, diuifus fit mollior, quemadmodum filum æneum tenue, flexile est; crassum, inflexile. Ad tensionem autem vnio requirebatur, quia sic tendo durior fit: durities autem necessaria est, ne cedat ponderi trahendi ossis. Sic animalia bruta & homines quibus duriores sunt tendines, fortiores sunt; sic Viri, mulieribus; sic adulti, infantibus robore præstant. Non tamen propterea tantum vniti sunt, sed etiam ne musculi in principio & fine comprimentur, ne articuloꝝ circa quos fere tendines inferuntur, sic carnei manerent musculi, motus impediretur. Nam si copiosa caro musculorum finem constitueret, & crassa foret, mole profecto nimia onerarentur articuli & sic circumsepirentur, vt nec flecti, nec extendi possent: sin pauca caro & tenuis esset quæ finem largiretur musculis, aut ponderi ossis mouendi cederet, aut certe rumperetur. *Ex his patet*, non discedere à nostra sententia, qui statuunt, carnem fibrosam præcipuam musculi partem esse. In verbis enim tantum leve est dissidium, cum illi carnem fibrosam; nos potius fibras carnosas, hoc est, tendinem diuifum carne stipatum primariam partem vocare velimus. Nec diuersi à nobis sunt, dum ipsi tendinem, nos finem tendineum, non actionis, sed melioris tantum gratia conditum, affirmant, quandoquidem & nos dicimus, tendinem in fine vnitum, ad ponderosorum ossium eleuationes factum esse. *Caterum*, quoniam Tendinis vox ambigua est, & sic modo pro vnito, modo diuifio sumitur, quoties postea in historia musculorum Tendinis mentionem facturi sumus, semper vnitum intelligemus, cum ita fere apud omnes Aucthores vsus ferat, neque aliud vocabulum, quo exprimamus, commode inueniatur, quod hoc loco monuisse volumus.

*Quoniam
caro fibro-
sa præci-
pua mus-
culi pars
dicatur.*

NOTA.

CARO.

CARO altera musculi pars est, vsque adeo necessaria, vt nullus omnino sit, qui carne destituatur, proptereaque caro cum musculo apud Hippocratem, vt 4. aphor. 16. sapissime confundatur. Non tamen in omnibus musculi partibus est, sed tantum vbi tendo diuiditur, quem stipat caro, & infarcit. Id vt intelligatur facilius, quomodo fiat, exemplum elegans affert Vesalius fscellæ, per quam plures crebrioresque iunci porrecti, quos circa lac affusum in caseum concreuerit. Iuncis respondent fibræ tendinæ; lacti sanguis; caseo caro, quæ ex sanguine coacto à calore concrefcit. Ex quo fit, vt peculiare carnis genus sit musculosa, & quidem perfectissimum, cum pro diuersitate infarctionis quadruplex vulgo enumeretur carniū species. *Prima* est, in qua vnico & simplici ordine, iuxta scilicet longitudinem, fibræ accedit, & circumponitur, qualis est musculorum. *Altera*, in qua duplici ordine, secundum longitudinem & transuersum, quemadmodum in ventriculo, intestinis, & aliis. *Tertia*, in qua nullo ordine, vasis, arteriis scilicet & venis, accrescit, mollis & rara, qualis est glandularum. *Quarta* denique, in qua sanguis effusus circa venas nulla serie dispositas, concrefcit postea, & est viscerum caro, vnde & ab Erasistrato παρέγχυμα, quasi παρέγχυμα, sanguinis affusio, à Galeno autem similis & simplex caro, ab Aristotele 2. de part. animal.

*Quatuor
c. rniū
genera.*

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

τ. πρῶτον δὲ λέγεται, cum inquit: καὶ ἀπὸ τοῦ ῥέοντος ὕδατος ἰλὺς, τ' ἄλλα σπλάγχνα τῆς διὰ τῆς φλέ-
βων ῥύσεως ἔσονται. ὃ δὲ πρῶτον λέγεται ὅτιν. hoc est, si latine veritas, proinde quasi fæx aquæ
profluentis, cætera viscera, veluti profusiones sanguinis per venas fluentis consistunt.
Carnis ergo *usus* est, diuisos tendines infarcire. Infarciri autem necessario debebant, *usus*.
vt, quia tenues sunt, à molli carne robur acquirerent, atque inuicem distincti teneren-
tur, nec in se conciderent. Quin vt in æstu caro umbraculo foret, & humiditate sua
exsiccatio prohiberetur: in algoribus autem tegumento, & caliditate impediret, ne e-
morirentur.

Ex communibus prima pars **NERVVS** est, qui plerisque omnibus musculis inest, **NERVVS**.
adeo vt paucissimi sint qui ipso careant, quemadmodum dicitur. Quibus autem datus
est, iis aut in principium musculi inseritur, veluti maximæ musculorum parti, aut in *Inser-
tio.*
medium. In finem nullus vnquam, teste Galeno, nisi in longissimis, in quibus ex adia-
centibus partibus accedit, semper tamen principio simul transmittitur, & versus fi-
nem, nunquam versus principium implantatur. Insertio autem vel superficialis est, vt
membranam tantum attingat, vel profunda, vt in intimas vsque partes se penetret.
Finditur autem in musculus, non perinde ac stamen: sed vt plantæ radix, aut vena ali-
qua, quæ in minimos surculos diuaticatur: ita neruus in minimas fibellas absumitur. *Distrib-
tio.*
Quin si profunda petat, nudus etiam perpetuo incedit, neque vnquam carne cinctus
aut incrustatus est, quemadmodum tendinis fibræ. Id vero diligenter notandum, mus-
culis non inseri in parte externa, sed interna, quæ ossa respicit, quod tutelæ gratia Na-
tura fecisse videtur, vt in profundioribus semper partibus incedens, externis iniuriis
minus esset obnoxius, cum nec ab ære, nec aliis incidentibus, tam facile lædi queat.

Eadem ratione **VENA & ARTERIA** spargitur. Semper enim, aut principium, aut **VENA.**
medium ingreditur, finem nunquam, nisi in longissimis, quibus à vicinis ramus trans- **ARTE-
RIA.**
mittitur. Nunquam tamen superficiales sunt, sed semper ad interna penetrant, præser-
tim Venæ, quibus etiam hoc peculiare est, vt communi sua tunica, quam habent dum
extra musculos incedunt, careant, sicque simplicissimæ sunt.

MEMBRANA etiam omnis musculus habet, qua foris tegitur. Tegitur autem, **MEMBRA
NA.**
tum vt ab aliis separetur, tum vt ab externis iniuriis defendatur.

PINGVEDO tandem in quibusdam adnascitur, quam cum negare vellent non-
nulli, turpiter admodum se dederunt, quod vel ex bouum mactatorum carnibus id di-
dicisse poterant, & nemo tam in dissectionibus sit rudis, quin viderit mulierum qua-
rundam secundum glutæum, seu femur extendentium musculus quandoq; ita com-
misceri pinguedine, vt ambiguum relinquatur, huic caro, an illa carni adnata, vel in-
tertexta sit.

Ex his iam dictis tandem concludimus, musculus vere motus voluntarii organum
dici. Cum autem in omni organo quatuor requirantur partium genera, vt Galenus tradidit 1.
de vsu part. cap. 8. quarum primum illud est, à quo primò actio proficiscitur, & cui prin-
cipatus debetur; alterum, sine quo actio perfici non potest tertium, quod meliorem red-
dit, & iuvat: quartum denique, quod conseruat. Primi generis erit *Tendo*, modo quidem
vnitus, modo diuisus, qui se, & secum totum musculus ac partem cui inseritur, contra-
hit. Secundi, *Nervus*, sine quo actio fieri non potest, cum facultatem motricem à cere-
bro be-

Partium
requisita-
rum in
organo
genera.
Primum.
Secundū.
Tertium.
Quartū.

bro beneficio spiritus animalis aduehat. Tertij, *Caro* est, quæ iuuat contractionem. Quarti tandem generis, *reliqua*. *Vena* enim, nutriunt; *Arteria*, vitam infundunt; *Membrana*, tegunt, ac defendunt; *Pinguedo*, humectat, & ne exsicceetur in nimijs motibus musculus, prohibet. In omni autem motu, *Musculus motum peragit*, *Nervus facultatem aduehit*, *Cerebrum autem transmittit*.

C A P V T III.

Enumerantur omnes musculorum differentie, quæ alicuius sunt momenti.

MVSCLORVM complures sunt differentie, non tamen omnes eiusdem momenti. Quamobrem potiores tantum in medium afferamus, & quæ ad explicandam historiam vniuersam aliquod pondus habere videntur. Sed cum immensus horum sit numerus, ne sine methodo ac ordine quidquam agamus, in tres classes vniuersæ musculorum discrimina dispecemus, ad eò vt prima contineat eas differentias, quæ à toto musculi corpore petite sunt; altera, eas quæ à dissimilaribus partibus, principio inquam, medio, ac fine ducuntur; tertia denique, quæ à septem similaribus, tendine, carne, nervo, vena, arteria, pinguedine, & membrana desumuntur. Loci autem, ac fontes, ex quibus haurimus, quinque præcipue erunt, substantia scilicet, figura, magnitudo, numerus, & situs.

Tres classes musculorum.

Loci ex quibus differentia desumuntur.

Differentie musculorum primæ classis.

A substantia.

A figura.

Amagnitudine.

Ergo in prima classe, quæ TOTVM MVSCVLI CORPVS respiciunt, si substantiam consideres, alij quidem carnei erunt, quemadmodum sunt plerique linguæ & laryngis musculi; item illi, qui fronti cutis mouendæ dicuntur destinati: alij verò, partim carnei, partim tendinei, vt palmaris in manu, & flectentes digitos; alij exterius carnei, intrinsecus nervosi, vt temporales; alij foris nervosi, intus carnei, vt extendens cubitum primus. Si figuram spectes, multiplex erit differentia. Quidam enim figuram triangularem habent, & eam æquilateram, siue quæ similis est literæ Δ Græcorum maiusculæ, quemadmodum Eleuator humeri, qui & propterea Deltoides dictus, adductor item scapulæ serratus; aut scalenam, vt obliqui descendentes. Alij quadrilateram, & quidem quadrati, vt primus radij pronator; aut altera parte longioris, vt primus tibiæ extendens, aut rhombi, vt scapulæ tertius abducens; aut trapezij, vt detrahens buccas sub collo latitans, *πρόσθια μύες* Galeno dictus. Alij pentagonam figuram sortiti sunt, vt adducens humerum; Pectoralis appellatus. Alij rotundam exprimunt, vt Diaphragma. Alij, non figuras Mathematicorum, sed aliarum rerum referunt, & vel Naturalium, vt pisciculos, quemadmodum Biceps, quem & Itali propterea Piscetto appellant; vel mures excorticatos, vt magna pars musculorum tendentium in tendinem vnitum & oblongum; vel Artificialium formas æmulantur, vt annulos, quemadmodum sphincteres vesicæ, & an, unde hic à Germanis quoque in gallinis annulus dici consuevit. Magnitudo quoque varia est. Maximus omnium est primus thoracis extendentium, quando quidem à fine ossis sacri, ad primam thoracis vertebra, in quibusdam etiam ad occiput vsq; ascendat: minimus, internus auris: crassissimus, flectentium femur tertius, Triceps. Ceteri in horum medio consistunt, & maioribus aut minoribus propius accedunt. Si quis tamē in his distinguendis curiosior esse voluerit, in magnos,

gnos, medios, & minimos diuidat, & singulas classes iterum dispescat in tres ordines, maximorum, mediorum, & minimorum in singulis. Sic Maximi minimorum erunt, qui minimum digitum æquant: Medij erunt, quales sunt plerique laryngis: Minimi, vt auris internæ musculi, aut qui vnguem digiti exequant. *Numerus*, siquidem omnium musculorum spectetur, à nobis postea explicabitur sub finem. vtcunque autem ipse constans fere sit ac inuariabilis, quo pacto sapientissima nostri corporis Parens sibi perpetuò consentit & mutari nescia est, vt quæ vbique perfectionis summum fastigium assecuta, propter quod mutationis indiga non est: inter authores tamen maxima de musculorum numero dissensio oritur, ob difficultatem quæ hic occurrit in secando, cum & Galenus iam olim conquestus sit, natura ita inter se coaluisse plerosq; vt videantur vnus esse, & cum vnus aliquis in multos desinat tendines, jam non vnus amplius solus esse videatur, sed quot sunt tendines. Si quis vero de singularum partium mouendarum musculis sermonem faciat, jam quidem eadem occurrit difficultas: id tamen certum est, alias alijs plures paucioresve habere. Cæterum de hac re loquendi vberior nobis occasio dabitur sequenti mox capite, in quo conabimur quantum in nobis est, huic difficultati remedium aliquod inuenire. Circa *Situm* tot sunt differentia, quot locorum discrimina. Alij enim ante, alijs retro: alijs ad dextram, alijs ad sinistram; alijs supra, alijs infra jacent. Sunt etiam alijs in superficie corporis, alijs in intimioribus partibus & profundis: alijs extra corpus, alijs in corpore; extra, vt abdominis musculi appellati: intra vt iliaci interni, & *scas* dicti. Alij secundum longitudinem locantur, vt biceps cubitum flectens: alijs oblique feruntur, vt radij pronator secundus: alijs transuersum sibi situm vendicant, vt pronator radij quadratus. Et hi, vel ratione corporis totius, quemadmodum musculi abdominis recti, obliqui, & transuersi; vel partit tantum alicuius, vt enumerati.

Quæ à DISSIMILARIBVS PARTIBVS petuntur, maioris momenti sunt, & ad explicandam musculorum naturam plus faciunt. Primum ergo recenscamus quæ à CAPITIBUS desumuntur, & quidem ab eius *substantia*: sic alijs carnei sunt in exortu, fibris tendinosi tantum interiectis diuisisque, vt femur extendentes, siue Glutæi tres, natiui auctores: alijs neruei, vt biceps cubitum flectentium primus capite primo, & recti abdominis: alijs membranosi, vt aniscalptor: alijs mixto constant principio, partim carnosum, partim neruoso, vt alterum caput bicipitis est, quod à scapulæ processu ancoræ simili supra humeri caput defertur, & caput primi extendentium cubitum, siue Longi. Alij partim carnosum, partim membranosum habent principium, vt oblique descendentium abdominis: Alij carnosum, sed ossibus interstinctum, vt primus pedem extendentiū, Gasterocnemius externus, qui mox in exortu scaminū ossiculū sibi innatum utroq; capite habet, quo inferiorum femotis capitum vim eludat. Remanent autem hi, vel diu quales fuerunt in ortu, quemadmodum Biceps; vel statim substantiam mutant, vt maximi in sura musculi, & plurimi in externa internaque cubiti sede, qui mox carnosi redduntur. Alij, principia mista confusa habent, vt Bicipitis secundum est; alijs distincta, vt Cucullaris dictus, qui carnosum principium ab occipitio, membranoso à vertebra colli ac thoracis exoritur. A *figura* quoque magna differentia sumitur. Alijs principium est teres, vt bicipiti, & cubitum flectentiū primo; alijs rectum, vt ter-

A numero.

A situ.

Differentia musculorum secundæ classis.
A capite.

tio sca-

tio scapulæ, siue rhomboidi: alijs ferè circulare, vt tribus femur extendentibus Glutæis: alijs ferræ in modum compositum, vt ferratis dictis, quarto scilicet, & quinto scapulæ musculo. *A magnitudine* exurgunt etiam multæ. Alijs est crassum, vt Glutæi & Deltoidi humerum attolenti: alijs tenue, vt latissimo humerum abducenti: alijs latum, vt pectorali, & eidem latissimo dicto: alijs angustum, vt rectis abdominis: alijs longum, vt bicipiti cubitum flectenti: alijs breue, vt rhomboidi scapulæ tertio. *Numerus* capitis etiam complures suggerit differentias. Plærique enim vnum habent caput, quemadmodum pectoralis humerum adducens, Glutæi femur extendentes, & ceteri: nonnulli duplex, vt biceps appellatus à gemino capite: alij triplex, vel quadruplex, vt leuator scapulæ. Sed præcipuæ differentię suppeditantur à *situ* capitis, siue à loco ex quo ortum adipiscuntur. Alij enim nascuntur ab osse, quemadmodum maxima musculorum pars, alij à cartilagine, vt omnes quos laryngis proprios appellant: alij à membrana, vt omnes oculi, qui à dura membrana neruum opticum inuestiente, originem suam accipiunt, & Lumbricales dicti in manu, qui à membrana cingente tendines tertij digitorum internodij flexoris enascuntur: alij, quasi ex alio musculo prodeunt, vt duo penis inferiores, qui ab ani sphinctere exoriuntur.

A Ventre.

A VENTRE non minus multæ petuntur differentię. *Substantia* tamen ferè omnibus carnea est, nisi bigastricis dictis, vbi tendinem habent interiectum. *Figura*, alijs teres, vt bicipiti; alijs angularis, vt rhomboidi. *Magnitudo*, vel magna, aut parua, pro magnitudine ipsius musculi. Sic venter, longus, aut breuis; latus, aut angustus; crassus, aut tenuis. *Numerus*, vel vnicus est, vt in plærisque; vel duplex, vt bigastricis, secundo scilicet inferioris maxillæ, & quarto ossis hyoidis.

A Fine.

A FINE tandem inter dissimilares partes potissimæ deriuantur differentię, ex quibus *substantia* hæc suppeditat. Finis, vel simplex est, vel mistus ex duplici substantia: simplex, aut carneus, vt rhomboidis, & intercostalium omnium; aut tendineus, vt pectoralis humerum adducens, & flectentium digitos extendentium vè: aut membraneus, vt oblique descendens & ascendens, item transuersorum abdominis. Mistus finis, ex carne & neruo, vt inferioris carpi flectentium. *A figura* etiam quædā elici possunt differentię, quia alijs finis est teres, vt temporalium musculorum, siue primi paris maxillæ inferioris: alijs acutus. *A magnitudine*. Alij fines sunt crassi, vt pectoralis, & bicipitis; alij tenues, vt plantaris. Alij lati, vt rhomboidis scapulæ; alij angusti, vt omnium teretium. Alijs longissimi, vt flectentium digitos, & palmaris, ac plantæ succingentis lato tendine; alijs brevissimi, vt quadrati, primi in pronum agentis radii. *A numero*, alij simplicem habent ac vnicum, quemadmodum plærque omnes; alij plures, vt flectentes & extendentes digitos. Sed & plures musculi vnum constituunt tendinem, vt duo suræ maximi, siue pedem extendentes, qui tendinem vnicum calci inferunt. Quin & duo cubitum extendentes in vnum coeunt, & vni loco implantantur. Sic tres quoque tibiam extendentes maximi, secundus, tertius, & quartus, in vnum tendinē neruosum desinunt, qui patellæ adnascitur. *Situs* suppeditat præcipuas. Intelligo autem per situm insertionem. Inferuntur enim, vel in ossa, vt plærque omnes, vel in cartilagine, vt laryngis multi; vel in membranas, vt obliqui & transuersi abdominis musculi, in peritonæi lineam albam; vel in cutim, vt frontis & labiorum musculi.

Tandem

Tandem à SIMILARIBVS PARTIBVS discrimen musculorum petitur, & pri-
 mum à TENDINE, qui ratione *figura*, vel vnitus est, vel diuifus. Vnitus plarumque
 in principio, & fine: diuifus ferè semper (si bigastricos tantum excipias) in medio. Si
magnitudinem spectes, vnitus vel longus est, aut breuis; vel crassus, aut tenuis; vel latus,
 aut angustus; vel planus, aut teres. Si *numerum* inspicias, aut simplex, aut multiplex. Dif-
 ferentias autem tendinis, quæ ratione *ortus* sunt, aut *insertionis*, ex dictis facile colligere
 est. CARO nullas differentias, quod sciam, vtilis præstat. NERVVS has porrigit; alij
 musculi neruum habent, alij ipso destituuntur. Carent, vt pronator radii quadratus;
 habent, ferè omnes reliqui. Ex his autem, aliis in principium, aliis in medium inferi-
 tur, & vel superficietenus, vel in intimiora. Similiter ARTERIA omnibus non adest,
 quomodo lato illi quadrato genas mouenti, quem Galenus *μάτρουα, μυώδες* appellat.
 VENAS omnes habent; similiter & MEMBRANAS, per quas etiam à se inuicem distin-
 guuntur: sed aliis crassior est, alijs tenuior. PINGVEDO in omnibus non reperitur ho-
 minibus, sed in obesis tantum: neq; in omnibus musculis, sed in quibusdam solum, in-
 ter quos præcipui sunt Glutæi, & inter hos secundus, qui ilium ossibus obtenduntur.

A Differen-
 tiæ mus-
 culorum
 tertiæ
 classis.
 A Ten-
 dine.
 A Carne.
 A Nervo.

Ab Ar-
 teria.

A Vena.

A Pin-
 guedine.

CAPVT IV.

*Quæ difficultates sese in musculorum historia offerant, & quibus
 modis tollantur.*

ARDVAM maximisque difficultatibus inuolutam esse musculorum historiam, à
 nemine nisi admodum rudi, in dubium incertumque reuocari potest. Nam cum
numerus ipsorum penè immensus sit, fieri profecto nequit, quin summa se offerat pro-
 tinus difficultas: & cum *incertus* apud eos, qui in hoc argumento hætenus versati sunt,
 maxima etiam subito obscuritas nascitur. De *Actione* autem & *Vsu*, ita ab omnibus tra-
 ditum est, vt si quam mihi gloriolam nouarum opinionum vendicem, quas veritati
 propius accedere statuam, quam receptæ sententiæ, non merito profecto à quoquam
 arrogantia sim reprehendendus. His tamen omnibus difficultatibus remedium affer-
 re conabimur, vt neq; *numero* quis ab hoc studio deterri, nec *obscuritate* defatigari,
 neq; *Ignorantia* veri vsus errare debeat. *Numero* medebimur ordine: *Obscuritati*, bonis
 præceptis, *ignorantia*, experientia, & ratione. Nihil enim tam immensum, quin metho-
 dus compræhendat; nihil tam obscurum, quin ratio dilucet, nihil tam ignotum,
 quin animus solers inuestiget.

Vt ergo musculorum omnem numerum in certas redigamus classes, retineatur di-
 uisio illa nostri corporis, quæ supra proposita est, dicendo, *Musculos*, vel *ad Ventres*, vel *ad Artus*
pertinere: & *ad Ventres* quidem, qui respiciunt caput, thoracem & abdomen: *ad Artus*
 autem, qui manus, aut pedes. Cæterum vel integrum Ventrem, vel aliquam tantum
 ipsius partem respiciunt: vtriusque autem tot fere sunt, quot motus ipse obtinet, cum
 ita pæne comparatum esse cernamus, vt tot cuique parti dicati sint musculi, quot ipsa
 motus exsequitur. Quanquam interdum vni motui etiam plures dicantur, & inter-
 dum pluribus motibus vnus duntaxat destinatur musculus. Vni quidem motui
 plures, vt flexioni cubiti, quemadmodum & extensioni, duo: pluribus motibus vnus,

P

quem-

Appella-
tiones.

Utilitas
harum
appella-
tionum.

Numeri
propositio.

quemadmodum carpi flexioni, & obliquo ad latera morui, flectentes feruiunt, illic quidem simul agentes, hinc separatim & leorsim. Fere enim vbique id obseruauit solers Natura, quæ nihil vnquam frustra condidit, sed semper vario potius multiplicique v sui sua opificia prudentissime destinauit, vt vbiunque coniungia musculorum sunt, si recta totum par moueat, ad latera, alteruter se contrahens, ducat, sicque postea flectat, aut extendat, cum motu obliquo vnus idemque musculus. Sed enim vt facile animo compræhendantur, propria singulis nomina assignabimus ab actione cuiusvis petita, quibus interdum à situ quoque differentiam addemus. Vocabimus ergo flectentes aut extendentes, adducentes aut abducentes, leuatores aut depressores, denique circumagentes. Flectentes quidem, qui ad acutum angulum articulum mouët; Extendentes, qui ad rectam lineam: Adducentes, qui ad internam partem; Abducentes, qui ad externam ducunt. Leuatores, qui sursum, Depressores, qui deorsum pellunt. Circumagentes tandem, qui membrum in orbem circumgyrant. In hoc ordine non tantum id erit commodi, vt facili negotio quoscunque musculos animo quisque suo compræhendant, sed & situm omnium, tum ratione corporis, tum inter se etiam, id quod scire plurimum profecto ei qui in hac tractatione cum fructu versari cupit, interest. Vt autem verum omnium Numerum assequamur, qui alias ita diuersus est, vt nullus Anatomicorum cum altero sit concors, quandoquidem illa diuersitas ex eo potissimum orta est, quod duplici nonnulli capite consent, & vnicum finem habeant, sicque vnicus potius, quam duo videantur esse: nonnulli vnicum caput & fines plures, sicq; plures potius quam vnus: tum alii diuersæ substantiæ capita obtineant, & diuerso loco prodeuntia, totam litem sic dirimemus vnico præcepto. Omnes musculi simplices, aut plures erunt, prout vna membrana, vel pluribus, inter se iuncti aut distincti fuerint. Est enim hoc axioma & principiū in arte Anatomica, vt distincti musculi dicantur illi, qui distinctis membranis involuuntur. Sic ergo nobis Gasterocnemii, qui ab aliis duo statuuntur, vnus erunt, & Gasterocnemius externus dicentur, quia vna membrana teguntur. Et quanquam cum alio musculo subiacente, quem Gasterocnemium internum vocabimus, vnum tendinem conficiant, tamē cum priore Gasterocnemio externo ipsum non confundemus, quod scilicet ab eo distinctam membranam, quæ ipsum inuestit, obtineat. Eodem pacto, primus cubitum flectentium, et si geminum caput habeat, vnus tamen erit musculus, quia vna membrana est, qua venter postea inuoluitur in quem capita desinunt.

Actionis
inuesti-
gatio.
Methodus.

In Actionibus enarrandis nostram sententiam libere proferemus, & qua causa impulsus à communi opinione recedamus, vbi necessarium videbitur, aperiemus. In singulorum autem historia persequenda, hanc rationem obseruabimus, vt diligenter explicemus, substantiam, figuram, magnitudinem, numerum, & situm partium dissimilariarum in musculis, ex quibus fontibus antea differentias eorundem hausimus.

C A P V T V.

Frontis, palpebrarum, oculorum, nasi, buccarum, labiorum, maxilla inferioris, & aurium musculos proponit.

Ratio ordinis.

AGGREDIAMVR nunc ergo singulorum musculorum historiam, incipientes ab *Quonia musculis* iis, qui ad caput pertinet, inter quos primum locum illis assignabimus, qui in antetiorē

parte omnes in Tabulis & in suo situ, atque extra ipsum adumbrati sunt, visum est nobis utile futurum, si vtriusque delineationis locum hic quasi digito demonstravimus. Signum ergo hoc ostendit quoloco musculus extra situm designatus inveniendus sit.

teriore parte capitis, seu facie occurrunt, cuiusmodi sunt frontis, palpebrarum, oculorum, nasi, genarum, labiorum, maxillæ inferioris, & aurium.

Musculi ergo, ab aliis simpliciter ^a FRON- TIS, à nobis (vt simul vsum addamus) CVTIS FRON- TIS appellati, ii sunt, qui cutem frontis os tegentem adducunt. Quamquam profecto rectius fortasse *Superciliorum musculi* dicerentur, cum non frontis corrugandæ, sed potius supercilii attollendi gratia videantur facti. Quod si adducentem humeri latissimum musculum, non dorsi musculum dicimus, quia in dorso situs est, sed humeri potius, quod & in hunc inferatur, & huius moribus destinatus sit; merito profecto iureque maximo, musculi hi duo qui frontis dicuntur, superciliorum musculi appellandi erunt, in quæ tum implantantur, tum quorum motui inferuiunt. Nec ab hac sententia alienus videtur Galenus ipse lib. 9. de Vsu part. cum frontis cutem & musculum tam stricte coalescere scribit, vt amborum motus vnicus sit, qui supercilia attollat. Quidquid huius sit, ^b oriuntur hi musculi ab elatiore frontis parte, vbi capillorum finis est ad temporales musculos, eo loci, quo membrana carnea cranio firmissime adnectitur, rectaque deorsum progressi, ^c in cutem quæ supra oculos est, & in supercilia inferuntur. Crassiores sunt in medio, quam in extremis, & reuera musculosam substantiam habent, nec (vti nonnullis complacuit) membrana tantum carnosa sunt, carneis fibris hoc loco aucta, cum ipsi potius subiecti sint, etsi in macilentis difficulter admodum à cute separentur, facilius in obesis, quibus inter hos, & cutim, pinguedo interiacet, quæ ratio quoque est, cur in obesis, dum frons attollitur, minus rugis exasperetur. Horum vsus est, cutim frontis cum supercilio attollere quando cunque lubuerit, vt illo elato, palpebra vna aperiat. Quod si in media figura maneant, quemadmodum supra diximus, in media figura perpetuo hos musculos persistere, nisi pro lubitu arbitrioque nostro dimoueantur, supercilia in situ naturali continent, qui vsus quantus sit, & quam necessarius, tum demum satis nobis manifestum fieri cõsuevit, cum videmus dissectis à vulnere per transuersum ipsorum fibris, supercilia dependere, & palpebrarum apertionem impediri. Quamobrem diligenter etiam horum musculorum fibræ obseruandæ iis sunt, qui chirurgiæ operam suam locant, ne scilicet in frõtis abscessibus, transuersim in caute cutim, incidant, sed potius fibrarum ductus sequentes, deorsum scalpellum recta diducant.

MUSCULI FRON- TIS. Rectius supercili- orum musculi dicuntur.

Reuera musculosam substantiam habent.

Vsus.

Nota.

PALPEBRARUM musculi. Morus palpebrarum. Numerus musculorum. Aperiens.

^c PALPEBRÆ duæ sunt in vtroque oculo, quatum *superior* sursum deorsumque mouetur, vt oculus & aperiri & claudi queat: *inferior* sursum tantum. Debit aperiri, vt videret oculus: sed debuit & claudi, ne periret. Qui enim ad oculum externa visibilia penetrassent, nisi oculus nudus ipsis exponeretur? Qui autem ab externis iniuriis liber tutusque præstaretur, nisi nuditatem, quando opus est, tegeret defenderetque? His ergo moribus tres destinati sunt musculi, vnus rectus, & duo semicirculares. Ille oculum aperit, & propterea à nobis *apertor oculi*, aut *attollens palpebram* superiorem dicitur: hi contra claudunt, & ideo *claudentes* vocabuntur. ^d *Aperiens*, in superiore orbitæ regione situs est, supra iuxtaque oculi eleuatorem, cum quo ^d ab eodem principio oritur, nempe ad foramen per quod in orbitam opticus nervus transit, eodemque progreditur ductu, eadem figura substantiaque, puta carnea, præditus, donec tandem ^e tendine satis lato ab illo discedens, in cartilaginem superioris palpebræ inferatur.

tur, cæterum illo paulo minor est, vt qui minus pondus commoueat. Huius *vsus*, palpebram attollere, & sic oculum aperire. *Claudentes* palpebras, siue *Semicirculares*, duo sunt. Vnus, superior, in superiore palpebra situs: alter, inferior. ille, maior est; hic, minor. Non desunt autem qui singularem esse & vnicum velint hunc muscolum; ego tamen geminum statuo, quod in admodum musculosis duos esse perpetuo obseruari distinctis principiis & insertione, tametsi fibras eorum circulares sese inuicem contingere verum sit. his adde, quod distinctos nervos, & à distinctis locis vterque accipiat. Cæterum siti sunt hi muscoli inter membranam carnosam, & eam quæ à pericranio educitur, *figuram* habentes semicircularem, ex quibus ^{ee} superior siue maior, ^{ee} acuto principio, ex interiore oculi angulo, & supercilii parte, quæ naso proxima est, ^{B. 2.} nascitur: sicque versus externum angulum transuersim incedit, statim carneus, & ita ^{f. 1.} latior factus, vt totum spatium illud occupet, quod inter supercilium & tarsum ^{ff. B.} oculi, siue extremum cartilaginis, è quo pili erumpunt, interiacet, tandem ^{g. 2.} in angulum externum inseritur ^{gg. 3. C. 4.} Minor vero membranofus, ac tenuis, ^{h. 3.} à nasi vertice, iuxta anteriorem angulum inferioris palpebræ exortus, principio similiter acuto, vbi, transuersim vectus, ad mediam palpebræ partem peruenit, carnosior factus, externum angulum circuit, & ad superiorem palpebram ascendens, ^{h. h. 4.} in ipsam lato sine inseritur. Hi duo muscoli contracti in se, oculos claudunt, cum maior superiorem palpebram detrahat, minor inferiorem attrahat, eleuetque. Superior ergo palpebra attollitur recto, siue aperiente; interdum etiam vbi opus est, musculo frontis: detrahitur contra, primo circulari, siue claudente: inferior tantum attollitur, & quidem secundo claudente.

O C C V L I variis cientur moribus, sed ad tres commodissime omnes referuntur, ad rectos, obliquos, & tonicum. *Rectis*, mouentur sursum, deorsum, dextrorsum, sinistrorsum. *Obliquis* voluntur sursum ac deorsum: *tonico*, ad interna ducuntur. *Recto* vt-mur cum oculos elevamus ad cælum, vel deprimimus ad terram, adducimus ad interna & nasum, aut abducimus ad externa. *Obliquis*, dum amatorie oculum volumus. *Tonico*, cum demisso capite cernui terram contemplamur. *Rectorum* ergo *primus*, nobis à suo munere Eleuator dicitur: *secundus*, depressor: *tertius*, adducens: *quartus*, abducens. *Obliquorum* *primus* voluens interior, iuncto discriminis gratia nomine situs: alter, exterior. *Tonico* motui in homine peculiare muscoli dicati non sunt, sed in belluis tantum, quod illi os sublime Natura dederit, cælumque iusserit tneri: has pronas è contra ad pastum abiecerit. Vbi ergo opus est, tonico motui recti ad sua principia simul contracti, in homine præsent. Ex his concluditur, sex esse in vniuersum oculorum musculos, quorum quatuor recti sunt, duo obliqui. Dicuntur Recti aut Obliqui, tum quia motus rectos, aut obliquos efficiunt: tum quia recto, aut obliquo ductu progrediuntur, & oculo inseruntur. ⁱ Sunt autem omnes in oculi orbita siti, substantia carnei, & figuram pyramidalem cum oculo constituentes. Ex his Recti crassiores sunt obliquis, magisque carnosius: singuli eandem figuram & magnitudinem inter se obseruantes. Eadem enim quod *principium* omnibus origo est, eadem quoad *progressum*, structura: quoad *finem* denique, eadem insertio. *Principium* enim omnibus est contiguum & acutum, iuxta foramen, per quod nervus opticus orbitam oculi ingreditur, à cuius membrana exo-

*i. vide 4.
1. fig. 5. vbi
in situ iacentes
depinguntur:
fig. 6. non
nihil separati
cernuntur. & fig.
7 & 8. ex
trastrum,
in illa qui
dem parte
superiore,
at in hac
inferiore,
conspicui.*

Numero mus-
culorum.
Ratio nomi-
nis.
Sunt.

na exoriuntur. *Medium*, siue Venter carnosus omnibus, & teres fere. *Finis*, tendo tenuissimus & membraneus, quo corneæ tunica, qua parte pellucida est, iuxta iridem inferuntur, sicq; oculum totum antèrius cingunt, oculique candidum constituunt. *Obliqui* contra tum ab his, tum inter se differunt.¹¹ *Primus* ergo, *attollens*, siue *elevator*, in elatiore orbitæ sede situs est, depressore paulo maior, quod difficilius sit onus aliquod attollere, quam deprimere. Hic ab aliis etiam *Elatus*, & *Superbus* dicitur, quod his, præ aliis hominibus, rotundior esse, & ad officium suum promptior videatur.^k *Secundus* siue *Depressor*, parte inferiore, & opposita priori situs est, ipsoque minor, qui ab aliquibus etiam *Humilis* vocatur. ¹*Tertius*, *Adducens*, internum oculi angulum occupat, *Bibitorius* ab aliis dictus, quod bibentes, ut vitrum intueamur aut poculum, eo uti consueuimus. ^m*Quartus*, *abducens*, externum angulum occupat, *Indignatorius* dictus, quod torvum faciat visum, qualis iratis conuenit. ⁿ*Quintus*, qui *Obliquus primus* est, & *Voluens* siue *Circumagens exterior* nobis dictus, aut *inferior*, à situ, cum in exteriori, & interna orbitæ sede sit positus, inter oculum & tendines depressoris, & adducentis musculorum. *Minor* etiam à magnitudine, cum sexto admodum cedat. Hic à rima, quæ in inferiore parte orbitæ est, & primum maxillæ os quarto iungit, originem ducens carnosò principio, gracilis, nec penitus teres, oblique toto suo ductu fertur per externum oculi angulum, sensimque ascendens ex inferioribus ad oculi sedem superiorem, in tendinem breuem & aliquomodo rotundum, sed neruosum definit, qui iuxta iridem implantatur obliqua linea, inter elevatoris & abducens musculorum tendines, ubi & alter obliquorum inferitur, ita ut idem tendo utriusque esse videatur. Huius *munus* est, oculum oblique deorsum ad externum angulum circulari motu voluere, sicq; pupillam naribus admouere. ^o*Sextus* qui vltimus est, & *Obliquorum secundus*, *Circumagens interior*, aut *superior*, vel etiam *maior* dictus, quod omnium oculi musculorum sit longissimus: tamen ut ceteros longitudine sua vniuersos superat, sic è contrario tenuitate omnibus impense cedat. Hic exacte obliquus, ut præcedens, non est: sed partim rectus, partim obliquus: rectus, quamdiu progreditur usque ad trochleam; obliquus, cum ab hac discedit. *Oritur* ex eodem loco, à quo adducens nascitur, nempe à foramine per quod nervus opticus orbitam intrat, rectaque progreditur versus externam partem interni anguli, quo ubi deuenit, modice crassescit, rursusque attenuatur, ac teres efficitur, & per trochleam ibi sitam transit, à qua ubi evaluit, flectitur, sed ita, ut rectum angulum cum dicta iam & exposita sui parte constituat, & versus superiorem oculi regionem incedens, iam obliquus fieri incipit, supergrediensque levatorem musculum, inter ipsius & abducens tendinem superiori oculi regioni inferitur, ubi quintus etiam innascebat. ^p*Trochlea* autem hæc, sic dicta est à doctissimo Falloppio, primo inuentore, quod trochleæ & figuram, & usum huic musculo præstet, cum ibi reflectens oculum neutiquam mouisset, nisi inuenisset, ubi firmare se valens, vires acquireret. Est autem Trochlea hæc, cartilago exigua, teres, canalis modo excavata, & particulae alicuius paleæ non absimilis, quæ in oculi angulo interiore per ligamentum suspenditur, à qua musculus nomen suum accepit, ut *Trochleæ musculus* à nonnullis dicatur. *Vsus* est, oculum versus internum angulum circulari quodam motu voluere, sicque pupillam à naribus abducere.

N A S V S non quidem totus mouetur, sed eius tantum inferiores partes cartilagineæ,

ii, t. 4. I. 7
& 8. A.

k, t, B.

l, t, C.
m, t, D.

n, t, E.

o, t, F.

p, G.

Primus.

Secundus.

Tertius.

Quartus.

Quintus.

Sextus.

Trochlea.

Motus nasi. ginæ, quas PP Alas vocari supra diximus. Hæ aut adducuntur, aut abducuntur, vt vel pp, 1. 1. 4. aperiantur nares, vel claudantur. Duplici huic muneri, duplex musculorum genus tributum est, & vtrique muneri par geminum, quorum illud Abducentes, aut Aperientes, hoc Abducentes, vel Claudentes nasum, vocabimus. ¶ *Primum* ergo par, *nasal* alas q, 4. 1. 1. D. *abducens*, siue *nares aperiens*, exiguum est, carnosum magis, quam membranofum, quod r, c. ab osse maxillæ, iuxta labiorum primum par proprium, & à subiecto ipsi sinu ortum trahens, f partim in nasi alam inferiorem, partim in labij superioris elatiorem partem, s, d. & philtrum dictum inferitur. ¶ *Alterum* par, vtrumque nasi lateris contegens, triangulum refert, u cum in vertice ipsius acuto & carnosio principio exoritur, descendens, e. que oblique per nasi ossa, in latam basin desinat, ac carnosum remanens, x in alas implantetur. Hæc duo paria nasalas versus superiora trahendo, dilatant, & aperiunt nares. *Constringentes alas*, siue *Claudentes nares*, minimi sunt, vt vix nisi in nasutis exactè videri distinguere queant, quorum *primum par* externum est & carnosum, circa alarum radicem exortum, quod ascendens transuersum eas perreptat, tandemque vbi ad summum dorsum peruenerit, in nasi globulum inferitur. *Secundum* vero, internum est, & in narium cavitatem absconditum sub tunica nasi, membraneum ab ossibus nasi vbi desinunt circa cartilagine, exortum, & alis inferitur. Illud contractum deprimat alas, hoc introducit, & sic nares constringit. *Constringit autem & alius adhuc musculus*, qui communis est, Orbicularis puta labij superioris, qui deorsum trahens labium, nares simul constringit & occludit.

GENÆ RVM musculi. Motus genarū. Numerus musculorum. ¶ *GENÆ* vel *Buccæ* tribus agitantur motibus; trahuntur enim deorsum, xx, 1. 1. i. mouentur introrsum, & extrorsum. *Deorsum*, cum vnum oris lateris trahimus, ac cynicum spasmodum mentimur: *introrsum* aguntur, cum inter comedendum, buccis extradentium limites excisos cibos, in locum suum repellimus: *Extrorsum*, cum buccas inflamamus, quod tubicines faciunt. Primis duobus motibus musculi dicati sunt, & quidem duo, quorum *Primus* à Galeno, 1. dissect. muscul. πλάπωμα μυώδες, musculi dilatatio dicitur, à Recentioribus ob figuram, *quadratus*: alter *Buccinator* ab vsu, quasi ad tubarum inflationem conferret, tertiumque buccarum motum perageret, qui nullius tamen musculi ope perficitur: sed potius laxatis huius fibris contingit, dum spiritu in oris amplitudine retento, clausis labijs distenditur hic musculus maximam buccarum partem constituens. Quare secunda ipsi actio debetur, nimirum buccarum adductio contractioq; cui à Natura destinatus est. Sunt autem musculi hi, non proprii buccarum, sed cum labijs communes, vt adeò nec vnquam moueantur, quin eodem motu labia quoque trahant; quia tamen plus buccis atq; illis inferuire videntur, ad has potius reuocare volumus, sufficitq; si moneamus hic, ipsos *Communes buccarum labiorumq;* dicendos esse, & quidem primum illum, detrahentem quadratum: hunc vero contrahentem, aut adducentem communem appellitandum. *Detrahens* ergo *quadratus*, tenuis est musculus, etsi latus ampliusq; membrana quippe carnosae fibræ adacta. Hic sub collicute statim latitans, totamq; inferiorem maxillam in facie succingens, originem suam à spinarum vertebrarum ceruicis regionibus, colli parte externa, scapula, clauicula, & pectoris osse ducit, sensimque ad faciem obliquis fibræ ascendit, & in mento implantatur ea sede, vbi labrum superius cum inferiore iungitur. Huius *munus* est, buccas deorsum

3. 4. 1. F. deorsum trahere. y *Contrahens* alter, prædicto in superiore sui sede subiacer, totam buccarum eam partem, quam inflammas conficiens, cum ille ipse sit musculus, qui à cohibito in ore spiritu distenditur. Hic à summis gingivis maxillæ superioris, in summas gingivas inferioris terminatur circuli instar, totus tenuis ac membranofus, varijsque fibris intertextus, cuius internam partem oris tunica succingit, vti ita prompte ab ipsa separari non possit. Hic dum contrahitur, intro vertitur, sicque cibum, qui extra dentium sepes elapsus est, iterum, quasi manus, in locum propellit, & dum cibus conteritur, intus Lingua, foris hic contrahens, cibum quo minus à dentibus decidat, retinet.

Contrahens.

LABIA multis ducuntur motibus. Trahitur enim vtrumque *fursum*, *deorsum*, *ad latera*, & *in seipsum*. *Sursum* autem, recta, vel oblique: *ad latera*, dextrorsum, vel sinistrorsum. Quare musculorum alij attollentes erunt, deprimentes, abducentes, aut sphincteres: non tamen cuilibet motui peculiare sunt dicati, sed vti in manu ad latera mouent iidem qui flectunt aut extendunt, si scilicet alteruter tantum agat, non totum par: ita hic quoque musculorum attollentium alteruter si agat, oblique labium trahitur: at si vterque, recta. Musculi autem hi, partim communes sunt cum buccis, vti dictum, quos iam enumerauimus: partim proprii, de quibus nunc dicemus. Sunt autem propriorum quatuor paria, quorum *primum*, Attollens par superioris labii dicemus: *alterum*, Abducens ad latera: *tertium*, Deprimens inferni labii: *quartum*, Corrugans & Constringens, quod etiam Osculatoriū alias ab vsu vocauimus, cum hic musculus labia contrahat dum basia figimus. *Primum par* si simul agat, labium superius recta totum: at si alteruter tantum, oblique alterutrum eius latus, attollit. *Secundum par*, ad latus trahit, vel vtrumque, vel alterutrum, prout par totum, aut vnus tantum agit. *Tertium*, deorsum totum inferius labium ducit: sed habet socium primum par commune, detrahentem quadratum, à quo oblique etiam mouetur ad alterutrum latus, dextrum aut sinistrum, prout alteruter tantum agit. *Quartum*, constringit & in se ducit labium: sed vti semicirculares illi palpebrarum, constringendo se, superiorem palpebram deorsum, & inferiorem fursum trahunt: ita hic Constringentes, siue Osculatorij superius labium non tantum stringunt, sed etiam deprimunt: inferius autem simul

Lumborū musculi. Motus labiorum.

Numerus musculorum.

2. 4. 1. G. & attollunt. ² *Primum ergo par*, siue *attollens labium superius*, ^a à primo superioris maxillæ osse, vbi mala consistit, principio lato & carnosio educitur, deorsum obliq; in anteriore fertur, & ^b in labij superioris latera prope narium pinnas inferitur. ^d *Secundum par*, *ad latera trahens*, siue *abducens*, ^c à cavitare malis subiecta, carnosum, sed teres exoritur, multa inuolutum pinguedine, ^f & in eam sedem inferitur, vbi duo labia inuicem conueniunt, & junguntur. ⁸ *Tertium par*, *deprimens inferius labium*, ab ^h infima anterioreque ea sede inferioris maxillæ carneum pronascitur, vbi asperitas quædam est, protuberans ad menti quasi latera, mox oblique ascendens, in labij medium inferitur, latum vbi que permanens. ⁱ *Quartum par*, *Constringens*, vtrumque quasi labium efformat, & in quibusdam maxime conspicuum est, quibus scilicet magna sunt labia. Constat autem ex substantia fungosa, orbicularibus fibris sphincteris instar præditum, ex quibus vtriusque labij extrema conficiuntur, quæ in nobis, dum valemus, rubicunda apparent, pallida, dum ægrotamus.

Primum par.

Secundū.

Tertium.

Quartū.

Tandem

MAXIL- Tandemⁱⁱ MAXILLA INFERIOR & ipsa plures motus obtinet, cum cibus ne- ^{ii, 2.7.2.}
 LÆ in- que recipi in os; neq; diuidi acceptus, aut comminui possit, nisi oris cavitates aperiatur ^{3. & 4.}
 ferioris iterumq; claudatur, dentes autē abducantur, & mutuo collidantur. At cum & in mo-
 musculi. la, saxo vno quiescente, alterum circummoueatur, si frumentum comminui debeat,
 Motus quiescente superiore maxilla circumagitur inferior. Habet enim motus sex simplices, ex
 maxillæ quibus vnus compositus nascitur, quorum beneficio sursum, deorsum, dextrorsum, sini-
 inferioris strorsum, & retrorsum ducitur. Priores duos, vt cibo intraturo os aperiatur, ingresso clau-
 ris. di possit, & dentes incisorijs vel canini postea dissecant, aut frangant: vt vero molares &
 comminuant, ceteros quatuor, ex quibus compositus ille constat, quo ad omnes partes
 circumducitur. Non enim voluitur, vt oculus, sed in diuersa trahitur, vnde nec vno
 motu prædita est vt ille, sed ex pluribus composito: neq; proprium & vnicum obtinuit
 musculum circumagentem, sed illos habet omnes sibi seruientes, qui præstant simpli-
 ces ex quibus ipse componitur. His motibus quinque; musculorum paria destinantur, vt
 ad eodē decem in vniuersum sint maxillæ inferioris musculi, quinque; à dextro latere, & to-
 tidem à sinistro. Horum primum, vulgo Temporales musculi, κροταφίται, à situ dicuntur, &
 celeberrimi sunt apud omnes Medicinæ scriptores: à nobis autem, attollens maxillam
 temporale par vocabitur. Hoc maxillam inferiorem validè ad supremam adducit, sicq;
 os claudit, dentesque constringit. Alterum, deorsum trahit, & deprimens digastricum, siue
 biuentre dicitur, invento nomine ab vsu & figura. Tertium, dextrorsum & sinistrorsum.
 Vulgo μασσθηρὲς dicuntur, quod propria eorum actio sit μάσσησις, manducatio, at nos
 laterales ab vsu appellabimus. Quartum par, antrorsum mouet, & à nobis abducens pterigoi-
 deum vocabitur, vt vsus cum situ iungatur in appellatione. Quintum, retrorsum mouet,
 à Galeno μασσθηρὸς ἐν ὄντι τῆς σόματι, massorium: alterum in ore latitans vocatum 4. admin.
 anat. 4. & dissect. muscul. 6. A nobis adducens maxillam nominabitur. ¹ Temporalis ^{l, 4. 14. H.}
 par. igitur attollens, totam ossium temporum cavitatem adimplens, ^{m, 22.} principium suum
 ab osse frontis, sincipitis, temporum, & sphenoides, carnosum ac semicirculare, &
 latum habet, qui sensim carnosior redditus, simulque angustior descendit, & sub osse
 jugali, breui, sed carnosio validissimoque tendine, ^{n, 2.7.4.} in processum maxillæ inferioris,
 quem κροτώνω vocari diximus, inseritur, quem vndique & amplectitur, ^{A.} Velatur hic
 musculus externa sui parte pericranio, quod ipsum superuehitur, & inuoluit, cum
 interna parte nudus sit, nudoque accumbat ossi. Est autem hoc loci durum admodum,
 crassum, ac nerueum, cuius nomine exterius hic musculus liuet, propterea que occasio-
 nem dedit Columbo doctissimo, vt exteriorem huius musculi tendinē esse crederet.
 Continet enim in media sui carnea substantia, validi tendinis latum & quasi semicir-
 culare principium occultatum, quod paulatim coangustatur perinde ac ipse musculus,
 antequam in κροτώνω implantetur. Hic tendo per totum dispersus musculus in causa
 est, cur ipso vulnerato inflammatoque, acerbissimi succedant dolores, aliaque pericu-
 losa & lethalia symptomata. Sed & membrana, qua inuoluitur, cum ab interna cere-
 bri crassa meninge oriatur per suturas cranij excidente, totamq; caluariam inuestien-
 te, vt inferius monstrabitur, fieri nequit, quin inflammata, principium suum primum
 lege consortij afficiat. Cæterum hic musculus sursum maxillam trahit, & sic os clau-
 dit: tanta autem violentia & robore præditus est, vt meminerim, me, dum Iuuenis ef-
 sem,

p. 4. 2. 1. sem, florentibus adhuc annis, aliquot plumbi libras dentibus sustulisse, & portasse. *PAL-* *Secundū.*
B. B. † 1. *terum par, Deprimens biuentre,* à nonnullis etiam *χαφιοειδής* dictum, quod à styloide proces-
N. m. su ossis temporum similiter vocato, initium neruosum & latiusculum ducit, statim-
q. C. que carnosum, tenue, ac teres factum, descendit, & in medio, vbi ad flexuram infe-
rioris maxillæ peruenit, carneam substantiam exuit, totumque in tendinem nerueum,
atque exacte teretem degenerat, pauloque progressum, iterum carneam naturam in-
ducit, & iuxta latus internum maxillæ inferioris progreditur, donec perueniat ad an-
teriore partem, quæ mento subest, vbi internæ eius sedi, quæ propterea aliquantulum
p. 2. 7. 3. e exasperata est, inseritur. *†* Duos ergo habent ventres hi muscoli, à quibus etiam
f. 4. 2. 1. *Digastrici* vulgo: à nobis Biuentres dicuntur, quibus in medio tendo interiacet. hunc
B. B. membrana quædam adiacentibus partibus adnata, inuoluit, trochleæ speciem expri-
†, ad lite- mens, quam sapientissima Natura propterea condidit, vt cum muscoli hi ab inferiori-
ram C. bus colli partibus originem non ducant, sed potius ex superioribus nascantur, circa in-
fernas maxillæ partes, veluti ad trochleam reflecterentur. Deorsum ergo maxillam
mouent, & os aperiunt. *‡* *Tertium par, laterale,* duplici principio exoritur, quorum* alte-
u. 4. 1. 4. rum nerueum, iuxta futuram, qua primum maxillæ os cum quarto jungitur, originem
l. †. 4. 1. 1. ducit, validam, atq; amplam: *‡* alterum, carneum, ab osse jugali, sicque versus mentum
x. b. 1. fertur, *‡* rotiq; maxillæ inferioris amplitudini, valida insertionem implantatur. Huius
y. b. 2. fibræ ob capita diuersa, & diuersimode se respicientia decussatim interfecantur, vnde
z. c. c. fit, vt quanquam ad latera dextrorsum, & sinistrorsum hoc par moueat, tamen simul
nonnihil vel ad anteriora, aut posteriora mouere queat. *Quartum par, Pterygoideum ab-* *Quartū.*
ducens, quod antrorsum directe ducat maxillam, & quasi abducat à capite: partim à su-
perno, sed externo latere processuum aliformium; partim ab aspera & acuta linea ossis
cuneiformis ipsi adiacentis ortum ducit, & quidem initio, tum nerueo valido, tum
carnoso, rectis postea fibris progreditur, maius factum, & crassius, validoq; tendine
definit in maxillæ inferioris internam partem lateralem, quæ est sub tendine tempo-
ralis musculi, & opposita ei, quam occupat prope hunc finis tertii paris, sicq; antrorsum
mouet ipsam maxillam. *Quintum tandem par, maxillam abducens* dictum, quod quasi ad
caput ipsam attrahat. Hoc crassum est, ac breue, à cavitare interna processuum aliform-
ium neruosum admodum pronatum, mox carneum, amplum, crassumque reddi-
tum, recta descendens, maxillæ inferiori, tendine valido, nerueo, latoque implanta-
tur parte interna, sed postrema, iuxta sinum per quem neruus ingreditur, vbi eius gra-
tia asperitates leuiter protuberantes inueniuntur. Hic productam maxillam reuocat,
& retrorsum mouet.

AVRIVM musculi duplices sunt, cum alij ob *externam aurem* ab Anatomicis sic di-
ctam, alij ad *internam* referantur *illos*, cum Latinis scriptoribus *Auriculæ*, *hos* *Auris*,
doctrinæ gratia vocabimus. Auricula autem, etsi in plæriscq; omnibus hominibus im-
mobilis sit, raroq; inueniatur, qui brutorum instar mouere soleant: aliquam tamen
ipsi mouendi vim inesse, ex eo licet cōprobare, quod motus instrumentis præditam
videamus, cum & musculi, & nerui circa ipsam reperiantur. Motus tamen sensui vix
evidens est, quod ipsi musculi exigui admodum sint, & propterea etiā à Galeno 16. vñ.
par. 6. 11. vñ. part. 12. delineamenta tantum quædam musculorum vocentur. Si tamen in

Q

nonnullis

AVRI-
VM mus-
culi.

nonnullis euidentior sit, magisq; conspicuus, ij etiam postea hos musculós crassiores corpulentioresque sunt nacti. Mouentur autem in his quatuor motibus, *sursum, deorsum, antrorsum, & retrorsum*, quibus totidem musculi dicati sunt, *attollens, detrahens, adducens, & abducens*. ^a *Attollens*, in anteriore parte faciei situs, musculo temporali maxillam attollenti superpositus, tenuis est, & membraneus, à fine musculi frontis externo, vbi temporali contiguus est pronatus, sensimq; angustior redditus descendit, & in auriculâ superiorem partem inferitur. ^b *Detrahens*, in posteriore capitis parte situs latus, carneus, ac fibrosus quandoque inuenitur, à mammillari temporum processu originem suam petens, hic in progressu angustatur, & in tendinē desinit, qui totam auriculâ cartilaginis radicem amplectitur, sic vt vna eius portio superiorem, altera mediam, tertia inferiorem attingat. *Adducens ad anteriora*, communis est musculus, quippe particula illius, quem vocauimus Quadratum buccas detrahentem. Hic enim nonnunquam carnosus redditus, fibrisque suis ascendens, in radicem auriculâ implantatur. *Abducens ad posteriora* in occipitio situs est, ab inuolucris musculorum occipitii ortus, supra mammillarem processum, principio angusto, deorsum transuersum fertur, aurique posterius implantatur. A V R I S vero *interna* duos musculos habet, nostra ætate inuentos à duobus Excellentissim. Anatomicis, Hieronymo inquam Fabricio ab Aquapendente, & Iulio Casserio Placentino. Ex his alter, extra; alter, intra primâ cavitatē & tympanū situs est, vnde externus ille, hic internus nominatus fuit. ^c *Externus*, exiguus est, à cute & mēbrana meatū auditorium inuestiente, exortus, postea carneus fertur, & exterius tendine breui in membranæ, tympanum dictæ, exteriorem partem, eiusque fere centrum, inferitur ea sede, qua intus malleus membranæ adnectitur. ^d *Internus* vero, in ossē petroso situs est, admodum exiguus. Huius origo est, in ossis cuneiformis basi eo in loco, quo cum radice processus petrosi, & additamento ossis occipitis foramen effractum constituit: mox carneus redditus, iterumque vbi medium sui superauit, angustior, in duos tendines abit gracillimos, quorum alter, in superiorem mallei processum, alter in ceruicem implantatur.

CAPVT VI.

Persequitur historiam musculorum linguae, ossis hyoidis, faucium, & laryngis.

LINGVÆ musculi. Motus linguæ. Numerus musculorum. ^{Primum par.} LINGVA, cum non modo vocis primarium instrumentum sit, sed & cibis voluentis in ore inseruiat, motus voluntarios complures obtinuit. Mouetur enim *antrorsum*, & extra os exferitur: trahitur *retrorsum*, *ad superiora*, *ad inferiora*, *dextrorsum*, *sinistrorsum*, *stringitur*, & *dilatatur*. Pro his motibus abfoluendis sex musculorum paria accipit, quibus nomina memoriæ gratia imponemus, nostro more, ex officio, ortu, ac insertione inuenta. ^{Primum par.} *linguales* continet, qui à basi ossis hyoidis carnei oriuntur, & in apicem linguæ desinunt, longiores quam latiores, & lati magis quam profundi, crassiores etiam in exortu, quam fine. Obliquis & transuersis præcipue fibris donati sunt, sed & rectis, quæ omnes per totum corpus sic disperguntur, & inuicem confunduntur, vt nequeant à sese mutuo, vel summa adhibita industria, seiungi. Videtur autē tota

tota linguæ moles ex his duobus musculis constare, qui mediâte linea candida, quam Hippocrates primus, *διχοῦν*, *Medianam*, in Coacis vocauit, diuiduntur, quæ superficie-
 tenus linguam percurrit, & in dextram partem sinistramq; secat. Hos Linguales etiam
 idcirco musculos vocauimus, si tamen musculi dicendi sunt, in quos cæteri deinceps
 enumerandi terminantur. Quod si quis accuratior in album musculorum referendos
 denegat, illi ego non vsque adeo repugnauerim, cum in omnibus musculi naturam
 non referant, nec tamen in omnibus etiam discrepent. Vsum autem, meo iudicio, ha-
 bent, vt *transuersæ* quidem fibræ, linguæ corpus in se contrahant in crassentque: *obliquæ*
 vero dilatent, & à sese abducant; at *rectæ*, ad palatum & fauces retrahendo constri-
 ngant ^d. *Secundum par*, *Extrahens linguam*, *Genioglossum* ab ortu & insertione dictum, quod
 ab asperitate, quæ in media maxilla inferiore, sed interna facie est, initio angusto sa-
 tis pronatum, mox latius redditum, in linguæ fere radicem inferatur, contractumque
 linguam extra dentes labiaque profert. *Tertium par*, *Retrahens*, *Hypsiglossum* eadem
 ratione dictum, ex ossis hyoidis media superioreque sede ortum, carneum, secundum
 linguæ longitudinem productum, in ipsius medio inferitur. Hoc contractum, intro
 & ad posteriora recta trahit. ^e *Quartum par*, *Attollens*, *Myloglossum*, ab inferioris ma-
 xillæ interno latere, iuxta molarium dentium radices, initio lato exoritur, fibrisque
 transuersis delatum, sub linguæ basi, in ligamentum, qua faucibus ligatur, inferitur.
 Hoc, si totum agat, linguæ apicem recta sursum & retrorsum, ad palatum & supe-
 riores dentes eleuat: at si alteruter contrahatur, in suum tantum latus oblique attol-
 lit. ^f *Quintum par*, *Deprimens*, siue *Ceratoglossum*, à superioribus ossis hyoidis cornibus
 siquidem adsint: sin desint, ab humilioribus enascitur, & in linguæ latera, iuxta eius
 radicem inferitur. Hoc si totum agat, lingua deprimitur, versusque inferiores den-
 tes recta deorsum & introrsum: at si alteruter, oblique in alterutrum tantum latus tra-
 hitur. *Sextum par*, *oblique trahens*, *Styloglossum*, carnosum, gracile, à styloide processu, acu-
 to principio exoritur, & crassius latiusque factum, linguæ lateribus implantatur, vt si
 alteruter agat, lingua ad latera recta dextrorsum aut sinistrorsum ducatur: sin vterque,
 ad ipsa fauces retrahatur.

^{ff} *O S H Y O I D E S* sursum mouetur, deorsum, antrorsum, retrorsum, & ad latera. Hos
 motus præstant quatuor musculorum paria. *Primum* enim par, recta sursum mouet,
 & simul modice antrorsum: *secundum*, deorsum recta, & parum retrorsum: *tertium*, &
quartum ad latera, sed illud sursum non nihil, hoc simul deorsum. ^g *Primum par*, quod
recta attollens vocabimus à primario vsu, & *Geniohyoideum*, quod à menti, siue ma-
 xillæ potius inferioris mento subiacentis interiore parte, enatum, in basin ossis hyoi-
 dis, circa elatiorem partem, vbi sinus eius gratia exsculptus est, amplo fine inferatur.
 Latum hoc est, breue, & carneum. ^h *Secundum par*, *deprehens*. *Sternohyoideum*, à sterni e-
 latiore internaq; sede, latiusculum & carneum exortum, sub cute in collo, ad asperam
 arteriam, & laryngis thyroideam cartilaginem attensum, ascendit, eadem semper ser-
 uata amplitudine & substantia, ac tandem in basin hyoidis infigitur. ⁱ *Tertium par*,
oblique sursum trahens, siue *Styloceratohyoideum*, ^l à processus styloidis radice exortum
 in cornua hyoidis totum gracile ac teres ^m ea sede desinit, vbi cum basi junguntur.
ⁿ *Quartum*, *oblique deorsum trahens*, *Coracohyoideum* appellatum, gracile ac longum, ut
 nullum

nullum hoc simul gracilius & longius in corpore reperiatur, ° duplici donatum est L.L.† 4.2.
 ventre p tendine distincto, quemadmodum secundum par maxillam inferiorem de- 1.H.
 trahens. ¶ Oritur enim carnosio principio ex superiore scapulæ costa, iuxta ceruicem i- o, L.L.
 psius, ac processum Coracoidem, & sub scapulæ leuatore, (quem Patientiæ muscu- p, f.
 lum vocauimus) occultatus ac latitans, ° oblique sub caput flectente pari mastoideo q, g.
 ascendit, vbi, vt ipsi veluti digniori cedat, ° carnosam substantiam exuit, & in tendinem r, K.
 neruosum ac teretem degenerat. Hunc vbi superauit, iterum carne donatur, carnosus- f, f.
 que remanet, ° donec in cornua hyoidis, eadem sede ac par tertium, sed loco paulo in- t, h.
 feriore, inseratur.

FAUCIUM
musculi.

Motus
faucium.

Primum
par dila-
tans.

Secundū.

Primum
par con-
stringen-
tium.

Secundū.

Tertium.

LARYN-
gis mus-
culi.

Laryngis
cartila-
gines mo-
biles.

Motus
laryngis.

FAUCIUM musculi, à nonnullis *Pharyngis* siue principij Oesophagi musculi di-
 cuntur, cum caput Oesophagi superius, membrana faucium esse videatur. Sunt autem
 illi, qui deglutitioni inferuiunt. Cum enim pro nostro lubitu deglutiamus cibos po-
 tumque, necessario musculi instrumentum voluntarij motus creandierant, quos Na-
 tura œsophagi principio merito iure maximo tribuit. *Dilatantur* autem fauces, vel
constringuntur: & dilatantur quidem, paribus duobus; constringuntur autem, tribus.
Primum par dilatans, quod aliquibus *sphæropharyngeum* dicitur, à cuneiformis ossis acuto
 apice, principio tenui & neruo enascitur, per internam pterygoidis cauitatem de-
 scendit, & in tendinem tenuem desinit, qui in palati partem cutaneam, à qua garga-
 reon dependet, inseritur. *Secundum par*, ab eodem fere loco prodiens, & descendens, in
 totam fere faucium lateralem, ac posteriorem partem, inseritur. *Primum par constringen-*
tium, *Oesophagiaum*, œsophagi superiori & posteriori parti præpositum, quod totum car-
 neum est, lata origine secundum laterum scutiformis cartilaginis longitudinem exor-
 tum, sphincteris musculi more circa gulæ initium circumfertur, adnasciturque fibris
 transuersis, quibus caput gulæ in deglutitione constringi consuevit. u, † 4.2. f.
Secundum par, in faucium posteriore ac laterali cauitate, quam ambit, situm, *Cephalopharyngeum* dicitur, B.B.
 propterea quod ortum suum habeat inde, vbi caput ceruicis primæ vertebræ iungi-
 tur, postea descendens, in hyoidis latera, thyroidem cartilaginem, & œsophagi princi- x, † C.C.
pium, cuius tunicam conficere videtur, inseritur. ** Tertium par*, *Stylopharyngeum* appella-
 tum, ab interna styloidis processus facie, gracili principio exoritur, & tendine mem-
 braneo, thyroidi cartilagini, lateribus ossis hyoidis, & radici linguæ, implantatur.

LARYNGIS (sic vocant caput asperæ arteriæ) musculi dieuntur, non quod mo-
 veant Laryngem totam, sed quod cartilagine ipsius. Cum autem ex cartilaginibus
 quatuor constet, tres tantum sunt mobiles, Thyroides, seu scutiformis, & duæ Ary-
 tænoïdes, siue guttales. Cricoides, annularis dicta, immobilis est, quia illas susti-
 net, cum omne mobile moueatur super immobili, & quiescente. Sunt ergo duplices
 Laryngis motus, quibus tum dilatatur constringiturque, tum clauditur & aperitur:
 vnde & duas articulationes nacta est, quarum singulæ diuersis motibus inferuiunt. *Prima*
 enim est thyroididis cum cricoide, per arthrodiam: *altera*, arytenoidis cum eadem cri-
 coide, per gyncglimum. Dilatio & constrictio, pendet ab illa: clausio & apertio, ab
 ista. Itaque cum Thyroides dilatetur, & constringatur: Arytænoïdes vero, è
 contra aperiatur & claudatur, voluit Galenus, in thyroidem dilatantes & constringen-
 tes musculos: in arytenoidem vero, aperientes & claudentes inferi, vt iam con-
 cluden-

cludendum sit, *laryngis musculos*, *alios esse dilatantes*, *alios constringentes*, *alios aperientes*, *alios claudentes*. *Constringitur* larynx cum thyroidis latera flectuntur, & intro mouentur : *dilatatur*, cum eadem extenduntur, & foras pelluntur. Sic *clauditur*, cum arytaenoides flectitur, & in cauitatem truditur : *aperitur*, cum extenditur, seu extrorsum reuellitur. Vterque autem motus, vel rectus est, vel ad latera. *Flectens Thyroidem* ergo, vnum par est, quod *Hyothyroides* dicitur, propterea quod ab ossis hyoidis tota inferiore parte, latum, carnosumque exoritur, sicque descendens rectis fibris, totamque thyroidem cartilaginem exterius contegens, ² in eius infimam partem implantatur. Hoc dum contrahitur, superiorem thyroidis partem flectit, introrsum pellit, & sic rimulam constringit. Trahit simul etiam laryngem sursum, vnde fit vt nos ipsi in nobis, dum acutam vocem formamus, laryngem sursum ferri, obseruare soleamus.

Flectens
Thyroidem.

Extendentium thyroidem, duo sunt paria. ^a *Primum*, vulgo *Bronchium* dictum, at nobis inuento nomine nostro more, ab ortu & insertione, *Sternothyroideum*. Hoc ^b à sterni superiore, & interiore parte, vbi iugulum est, initio lato, & carnosum exortum, eandem latitudinem & substantiam seruans, fibris rectis toto ductu lateribus arteriæ asperæ attensum, ascendit, ^c tandem in thyroidis infernum latus, eodem fine inferitur. Inferiorem thyroidis partem constringere, simulque totam deorsum trahere creditur, vnde superior pars extenditur, vnaque rimula dilatatur. Hunc motum deorsum versus, similiter notare licet, & tactu percipere, dum grauem vocem edimus. Atque *hæc duo paria Communia* ab Anatomicis vulgo dicuntur, quod caput, siue initium in alia parte habeant, quam Larynge : sequentia autem omnia, dicuntur propria, quia tota sunt in larynge, initium ab ipso, & finem habentia. ^d *Alterum par extendentium*, *Cricothyroideum anticum* dictum, in inferiore, & antica laryngis parte positum, originem habet carnosam, à cricoideis cartilaginis antica parte, & in lateris exterioris thyroidis inferiorem sedem carneum implantatur. Hoc dum contrahitur, extendit cartilaginem & sic rimulam dilatat, pro graui ac magna voce. *Flectens*

Extendentes
Thyroidem.
Primum par.

recta arytaenoidem, siue *Claudens rimulam primum par*, *Thyroarytaenoideum*, carneum, ac latum, in laryngis amplitudine transuersum situm est, & à thyroidis parte interiore media, secundum totam eius longitudinem exoritur, sursumque progressum, in latera Arytaenoidis, quæ glottida constituunt, inferitur. Hoc arytaenoidem cartilaginem ad thyroidem trahit, à posterioribus antrorsum ducit, & sic glottidem comprimit, & claudit. Hoc par si in angina inflammetur, cum exacte claudat rimulam, lethalem morbum adducit. ^e *Flectens ad latera*, siue *Claudens secundum*, *Arytaenoideum*, admodum paruum est, & exile, carnosum, obliquis fibris ab arytaenoide incipiens, vbi iungitur crycoidi, & in arytaenoidē definit, vbi cū coniuge colligatur. Hoc arytaenoidē oblique, & ad latera, dextrorsum, aut sinistrorsum mouet, sicque basin eius constringit, & glottidē claudit. ^f *Extendens recta*, siue *aperiens rimulam par primum*, *Cricoarytaenoideum posticum*, à cricoideis postica & inferiore sede, carnosum exortum, mox rectis fibris ascendit, & cauitatem quæ in cricoide est adimplens, in inferiorem arytaenoidis sedem, qua cum cricoide articulatur, neruosum definit. Hoc extendit arytaenoidem, & retrorsum ad exteriora conuertit, sicque glottidem aperit. ^g *Extendens ad latera*, siue *aperiens rimulam secundum*, *Cricoarytaenoideum laterale*, à cricoide, qua parte latior est, angusto principio carneum prodians, mox

Secundū.

Flectens
Arytaenoidem.
Primum par.

Secundū.

Extendēs
Arytaenoidem,
Primum par.

Secundū.

amplius factum, ad aryænoïdis latera juxta articulum implantatur, 'ea parte', quæ à priori pari attracta non est. Hoc extendit ad latus, sicque rimula aperitur. Ex his manifestum est, opponi inter se, primum flectentium & primum extendentium: secundum item cum secundo. Quantum enim secundum par flectentium, ad mutuum contactum trahit, tantum secundum extendentium exterius deducit, & inuicem disparat.

CAPVT VII.

De musculis Caput, & Cernicem mouentibus.

CAPITIS **musculi.** **INTER** musculos, qui ad caput referuntur restant adhuc illi, qui caput vniuersum mouent. *Mouetur autem CAPVT, motu vel primario, vel secundo; primario, supra primam colli vertebram antrosum, & retrosum, hoc est, flexione & extensione, eaque vel recta, vel obliqua, prout totum par simul agat, aut alteruter tantum contrahatur musculus. Deinde supra secundam, circa processum eius dentiformem, circumuolutione quadam, velut adaxem. Secundario motu, & per accidens, beneficio colli, quo modo caput mouetur similiter ante & retro, sed & ad latera, dextrorsum & sinistrorsum. Dicamus primo de ijs musculis, qui proprii sunt capitis, & septem paria numerari solent, ita vt in quouis pari vnus musculorum dextram, alter sinistram partem occupet. Ex his vnum par flectit, quatuor extendunt, duo circumagunt.*

Motus
Capitis.
Primarij.
Secundarij.
Numerus
musculo-
rum.
Flectens.

^h **FLECTENS** par, à nonnullis *Mastoideum* dicitur, quod ad processus temporum mastoideos, siue mammillares inferatur. Anteriore colli parte situm est, sub quadrato buccas detrahente musculo. ⁱ Oritur autem duplici principio, cavitae quadam inter se distincto, quorum alterum nervosius est, & à summo sterno incipit: alterum, carnosius, & à clauiculæ parte elatiore, qua sterno coniungitur, procedit. Oblique deinde, totum carnosum redditum, ad collum ascendit, longum potius, quam latum, & latum verius, quam teres in initio, at vbi ad mammillarem processum deuenerit, teres fit, & carnosus crassusq; sine ipsi inseritur. ¹¹ Hoc in homine etiâ viuo obseruatur, præsertim in macilentis & senioribus, in quibus admodum conspicuum est. Quod si totum par agat, caput recta flectitur: sin alteruter tantum musculus contrahatur, caput ad anteriora quidem ducitur, sed ad latus.

h, 4. 1. 4. K

i, d. d.

ll, 1. 1. 1. cc.

Extens-
dentis.
Primum
par.

^m **EXTENDENTIVM** *primum par, Triangulare*, alijs *Splenium* dictum, oblongum est, latum, & vertebris instratum, duplicique principio exoritur. Altero enim ex apicibus quintæ, quartæ, tertiæ, secundæ, & primæ thoracis vertebrarum prodit, altero à quinque inferiorum colli vertebrarum spinis, vbi rectis fibris sibi mutuo necluntur, & ⁿ cum ad tertiam colli vertebram peruenerint, seiunguntur, ^o fibrisq; nonnihil obliquis in occipitio medio, quod inter vtramque aurem est, inseruntur. ^p **Interval-** lum hoc, quod interiacet inter vtrumque cum diducuntur, triangulum æquilaterum ferè efformat, ^q quod exprimit etiam totus musculus, sed scalenum, à quo & nomen imposuimus, vt triangulare par vocaremus. ^r *Primum latus*, amplum est, ab exortu vsque ad tertiam vertebram, vbi dehiscunt: ^s *alterum*, ab hoc loco ad occipitium: ^t *tertium*, ab occipitio ad exortum. Est autem hoc par in thorace nerueum, in ceruice ve-

m, 4. 3. A.

A. + 4. 4 B

C + pulcre

enolurus

4. 5. A. A.

n, a.

o, b.

p, tb. a. b.

q, a. b. c.

r, a. c.

s, a. b.

t, b. c.

ro car-

ro carnosum. ^u *Secundum extendentium par*, priori subiectum, *Trigeminum*, aut *Compositum*, quod ita distincto triplici principio sit præditum, ut ex tribus musculis in vnum coeuntibus conflatum esse videatur. ^x *Primus*, principium acutum habet, ex transuerso processu, quartæ, & quintæ thoracis vertebræ enatum, quod illico ab exortu carneum redditum, per reliquas thoracis vertebrae, ascendit, & vbi ad colli radicem peruenit, carneam naturam exuit, inque teretem tendinem abit; mox vero, vbi hunc superauit, iterum carneam induens substantiam, vsque ad occipitium ascendit, ibique in medium ipsius inseritur. ^y *Alter*, à septimæ ceruicis vertebræ spina, breui, neruo, teretique principio oritur, sed mox, ascendens, carnosus redditur, & cum priore ante eius insertionem coit. ^z *Tertius*, ex primæ secundæque thoracis vertebrarum, transuersis processibus, partim neruosus, partim carnosus prodians, oblique extrorsum reductus, ad radicem processus mammillaris, cum secundo iunctus, occipitio valide affigitur. His musculis, aut secundi paris principiis varijs, carnea quædam moles subiicitur, & secundo pari adiungitur, ita ut secundum hoc par ex quatuor quinqueue initijs, aut musculis constare videatur. ^a *Tertium par*, *Recti maiores* dicti, sub propositis statim occurrunt, parui sunt, substantia carnosi, forma graciles, teretesque. Hi ab apice spinæ secundæ colli vertebræ prodeunt, vbi contigui sunt inuicem, sed statim à se diducti, ascendunt, & in medium occipitium inseruntur. ^b *Quartum par*, *Recti minores* appellati, sub maioribus siti sunt, quibus figura, substantiaque & progressu respondent, sed magnitudine cedunt. Teretes enim à tuberculo primæ colli vertebræ, spinis aliarum dorfi vertebrarum analogo, contigui similiter prodeunt; mox à se inuicem abscedentes, & sursum delati, in occipitium medium desinunt, sub finibus rectorum maiorum. Horum musculorum omnium ope, si totum par simul agat, caput recta extenditur: at si alteruter, in latus mouetur. Præfecit autem sapientissima nostri corporis architectrix NATURA tot musculos extensioni capitis, quod ad acutum fere angulum caput extendendum erat, ut Homo cælestium corporum contemplationi commodius vacaret. Ad hoc autem requirebantur parui muscoli, cum longi id præstare non possent. At quia iidem inualidiores necessario futuri erant, nec diu officio satisfacerent, cum pondere suo caput ad anteriora ruat, magnos longosque in auxilium surrogauit. Mouentur ergo semper longiores prius, at vbi admodum acutum ad angulum caput extendendum est, recti subueniunt. Voluit enim Natura, ut assidue cælestium corporum diuinæ moles contemplando patriæ nostræ memores redderemur, & illa simul reuocaremus ad animum, quæ dignos nos cælestium animorum jugi societate post obitum aliquando præstarent.

Tertium.

Quartū.

Circum-agentes.

Superius par.
Inferius.

CIRCVMAGENTIVM duo sunt paria, qui vulgo *Obliqui* dicuntur à situ, estque alterum par superius; alterum inferius, vtrumque subiacens rectis extendentibus, quibus substantia & forma responderet. ^c *Superius par*, è medio occipitio iuxta externum latus rectorum maiorum exortum, oblique descendens, in apicem transuersi processus primæ colli vertebræ transuersim inseritur. ^d *Inferius par*, à spina secundæ ceruicis vertebræ pronatum, oblique ascendit, & in processum transuersum primæ vertebræ cum præcedente inseritur. Hi cum contrahuntur, circulariter versus spinam, retro primam vertebram super secundam circumagunt, vnde fit, ut caput super ipsam consistens, vna circular-

circulariter moueatur. At quia exigui admodum sunt, duo priora extendentium paria, vbi alteruter agat, horum motum (non secus ac rectorum, vt antea diximus) adiuuant.

CERVI-
CIS musculi.
Cervicis
motus.
Numerus musculorum.

Caput etiam *secundario* mouetur *ratione cervicis*. Cervice enim mota caput ipsi incumbens vna cietur. Habet autem CERVIX motum *quadruplicem*, cum agatur ante, retro, dextrorsum, & sinistrorsum. Absoluuntur hi motus quatuor musculorum paribus, non tamen ita, vt quilibet motus suos sibi proprios vendicet, sed cum duo paria priora flectentia sint, & antrorsum mouentia, duo posteriora extendentia retrorsum: si simul illa agant, aut hæc, caput recta: at, si alteruter, oblique ad latus, flectitur, aut extenditur. Quod si vero flexores & extensores sui lateris simul contrahantur, in illud latus, dextrorsum aut sinistrorsum agitur, in quo ipsi suum situm obtinent. At si omnes simul agant, ceruix erecta & rigida seruetur, ac in tonico motu, vt in Tetano. Duo ergo prima paria flectentia erunt, quæ parte anteriore colli, vt primum, & laterali, vt secundum, locata sunt: reliqua duo extendentia, in posteriore colli parte, sub capitis musculis,

Flectentium primum par.

FLECTENTIVM ergo *primum par*, siue Longum, sub œsophago jacens, longum est, principio acuto & carneo, à quintæ thoracis vertebræ corpore, parte anteriore, vbi costæ jungitur enatum. Hoc superiora petens, omnibus vertebrarum corporibus à latere adnectitur, vsq; ad primam cervicis, vbi vterq; musculus se tangit, & acuto nervo soq; tendine desinit in processum primæ vertebræ, qui est analogus corporis vertebrarum reliquarum, vt ceruix flectatur. *Secundum par flectentium* Triangulare, siue vt alijs placet, (qui simul speciem trianguli, quod refert sua figura exprimunt) *scalenum*, carnosam amplamq; originem, à prima superioreq; thoracis costa habet: postea versus caput iter faciens, angustatur, & in omnium colli vertebrarum transuersos processus, (prima & secunda nonnunquam excepta) qua interiora spectant, obliquis fibris terminatur. Hi musculi si simul agant, recta anteriora versus, ceruicem, & consequenter caput, flectunt: at si alteruter solum agat, in latus contracti antrorsum ceruicem inclinant.

Secundū

Secundum par extendentium *primum par*, à sex superiorum thoracis vertebrarum transuersis processibus (vnde *Transuersales* quibusdam dicuntur) exorti, paulatim crassiores facti, in omnes cervicis vertebrarum processus transuersos, externa sede infiguntur. *Secundum par*, inter spinas situm, vnde & *Spinatum* aliquibus dicitur, totam ceruicem occupat. Hoc è radicibus spinarum septem superiorum thoracis vertebrarum principia plura sumit, sursumque ascendit, ac similiter ex singulis transuersorum processuum cervicis radicibus alia sibi asciscit, tandem hisce, in totam inferiorem spinæ secundæ vertebræ partem valide implantatur, vbi dexter cum sinistro jungitur, et si toto per ceruicem progressu mutuo sibi ita accubuerint, vt, non nisi spinis à sese disparati fuerint. Hæc duo pariter ceruicem primo, deinde & caput extendunt, vel recta, si vterq; simul agat; vel oblique, si alteruter tantum.

Extendentium primum par.

Secundū.

Extendentium primum par, à sex superiorum thoracis vertebrarum transuersis processibus (vnde *Transuersales* quibusdam dicuntur) exorti, paulatim crassiores facti, in omnes cervicis vertebrarum processus transuersos, externa sede infiguntur. *Secundum par*, inter spinas situm, vnde & *Spinatum* aliquibus dicitur, totam ceruicem occupat. Hoc è radicibus spinarum septem superiorum thoracis vertebrarum principia plura sumit, sursumque ascendit, ac similiter ex singulis transuersorum processuum cervicis radicibus alia sibi asciscit, tandem hisce, in totam inferiorem spinæ secundæ vertebræ partem valide implantatur, vbi dexter cum sinistro jungitur, et si toto per ceruicem progressu mutuo sibi ita accubuerint, vt, non nisi spinis à sese disparati fuerint. Hæc duo pariter ceruicem primo, deinde & caput extendunt, vel recta, si vterq; simul agat; vel oblique, si alteruter tantum.

CAPUT VIII.

De musculis Thoracis.

AB SOLVIMVS musculos omnes, qui ad primum Ventrem, siue Caput pertinere THORACIS mus-
videbantur: nunc eorum aggrediemur historiam, qui ad secundum mediumque culi.
referendi sunt, quos THORACIS musculos doctrinæ gratia vocabimus: etsi non ig-
norem vulgo ab Anatomicis sic appellari illos tantum, qui respirationi dicati sunt, &
vel dilatant thoracem, aut constringunt, quibus opponuntur DORSI musculi, qui
thoracem extendunt. Verum cum ab horum sententia sim alienissimus, & eos mus-
culos plerosque omnes, qui communiter ad respirationem facere dicuntur, alium v-
sum habere longè diuersum ab eo, qui vulgo docetur, & ratione, & experientia ana-
tomica inuenerim, à me hoc loco *Thoracis musculi* vocabuntur, omnes quicunque ad
thoracis, hoc est, medijs Ventris motum quemcunque conferre statuentur. Dico quem-
cunque, vt non solum intelligatur ille, quo dilatatur, & stringitur: sed &, quo flecti-
tur, aut extenditur.

THORAX ergo, vel primario mouetur, vel secundario. *Primario*, à musculis si- Thoracis
bi proprijs: *secundario*, à musculis lumborum. Motis enim lumbis, thorax ipsis incum- motus.
bens, vna necessario mouetur, quemadmodum ceruice mota, Caput, vt dictum est.
Cietur autem quintuplici motuum genere *primario*, cum dilatetur, & constringatur, Primarij.
flectatur, extendatur, & ad latera circulariter moueatur: *secundario*, triplici. Secundarij.
Ad la-
tera enim mouetur, flectitur, & extenditur. Dilatatur autem Thorax, & constringi-
tur, respirationis gratia. Respiratio autem duabus constat partibus; Inspiratione, in
qua recipitur aër, & attrahitur in asperam pulmonum arteriam; & expiratione, in
qua iterum à pulmonibus expellitur: in illa, cum sine thoracis motu respiratio nun-
quam fiat, thorax dilatatur; in hac contrahitur, & in se stringitur. In Dilatatione au-
tem, non totus thorax dilatatur, sed tantum eius partes inferiores, superioribus con-
tra modice angustatis: in Contractione vero, inferiores constringuntur, superiores
partes è diuerso nonnihil dilatantur. Quamobrem & Natura sapientissima, cum vni-
uersum thoracem intertextis vbique inter carnes ossibus, flexibilem motuiq; accom-
modatissimum reddidit: tum verò infimas eius partes cartilaginibus ferè solis muni-
endo, imprimis ad hunc vsum adaptauit. Cæterum etsi hic motus naturalis alias sit,
non quidem, quod citra musculi subsidium perficiatur, quo pacto alios motus natura-
les fieri cernimus (semper enim Diaphragma hic primas partes tenet, quod musculus
verè est, & rectè esse statuitur) sed quia nobis ad respirationem etiam non aduertenti-
bus, Thorax nihilominus semper amplior fit aut angustior, ne vnquam respiratiò de-
ficiat, cum qua vita pari passu perpetuo ambulat: verè tamen & animalis motus est,
quando quidem respirationem intendere, aut sistere ad tempus pro nostro arbitrio,
quam commodissime possumus. Quis enim in loco admodum calido constitutus,
thoracem, vt aërem attrahat in copia, pro suo lubitu non extendit? contra in admo-
dum frigido, non aliquantulum contrahit? Si ergo motus est voluntarius, vt instru-
mentis motui huic destinatis, hoc est, musculis peragatur, necesse est.

Musculi
Thoracis
ex opi-
nionē a-
liorum
quot
sint.

Respira-
tio du-
plex.

Sententia
Authoris.
Ex opinio-
ne Au-
thoris.

Muscu-
los ab-
dominis
ad respi-
rationē
nihil fa-
cere.
Argum.
aduerfa-
riorum
Primum.
Secundū.

Respon-
sio ad ar-
gumēta.
Ad pri-
mum.

Ab Anatomicis ergo *MVSCVLI THORACIS*, (sic vocant,) *id est, dilatationi, & constrictioni eiusdem inferuientes* sexaginta quinque recensentur, à nonnullis etiam, plures, illis scilicet, qui Intercostrales, in Interosseos atq; Intercartilagineos, sed male, ut postea probabimus distinguunt. Vtrique ergo lateri thoracis, triginta duo assignat, nempe *intercostales viginti duos*, ex quibus vndecim externi, totidem interni sunt: *vnus* vtrique lateri communem, puta *Diaphragma*: quatuor deinde musculos, *Abdominis* vocatos, de quibus sequenti capite, & tandem *sex Thoracis proprios* appellatos. Iam ipsam *Respirationem* duplicem quoque faciunt; vnā liberam, alteram coactam. *Liberam* vocant illam, in qua aeris quantum sufficit, placide tum accipitur, tum expellitur: *Coactam* vero, in qua magna vi, & magna copia attrahitur, similiterque truditur. Illa, contingit cum naturaliter se calor noster habet; hic, cum præter naturam. Illa, citra nostram voluntatem fit, vnde & *Naturalis* iure dicitur; hæc, nostro arbitrio concurrente accidit, ex quo *Voluntaria* à nobis non inepte vocabitur. Illa, à solo diaphragmate contracto, aut laxato fit: hæc cooperantibus diaphragmati ceteris musculis sexaginta quatuor, ut ipsi dicunt.

At enim, ut lubentissime amplector hæc omnia, simulq; coactus experientia concedo, in libera respiratione diaphragma solum moveri: ita è contrario noui, in coacta, solos intercostales musculos, & Diaphragma operari. Reiciuntur ergo à me, tum abdominis quatuor paria, tum sex thoracis coniugia propria. At ne citra rationem reici videantur, nostræ opinionis fundamēta breuiter hic proponemus, refutatis argumētis, quæ Aduersarios in hanc sententiam protraxere. *Ac quod musculos Abdominis attinet*, ut ab iis exordium nostrum petamus, duo primario videntur esse, quæ doctissimos Viros adduxerint, ut respirationi eos inferuire crederent. *Primum* est, quod non visu solū, sed & tactu deprehenderint, in thoracis validioribus motibus, musculos hos proportionē quadam obseruata cum Thoracis motu, moueri. Inspirare enim si qua vi cupias, abdomen protinus exigi dilatarique videbis; expirare si è contra cupias fortiter, inigi aduertere, & intro contrahi: ut propterea Galenus, lib. de dissect. muscul. cap. 26. ad exsufflationes, & ad vocatas spiritus cohibitiones, siue *τὰς πνύματις καταλήψεις*, ut Praxagoras olim vocabat, tū ad acutas quoq; magnasq; voces edendas, Naturam hisce musculis uti, non veritus sit scribere. *Alterum* argumentum est, eam partem moueri semper, in quam fines musculorum desinunt. Quod si jam anatomica inspectio demonstraret, abdominis musculos in thoracem inferi, quemadmodum Andr. Laurentius probauit, oblique descendentes illic desinere, finemque suum figere; profecto sequi hinc merito iureque videtur, Abdominis musculos thoracis motibus plurimū auxiliij præstare. At enim nihil hic quidem promptius erit nobis, quam his rationibus satisfacere. Nam quod primam spectat haud vlla ratione diuersus ab iis sum, qui in vtraque respirationis parte abdominis musculos vna cū thorace vniformiter moueri credunt, quin lubentissimo illud animo amplector, ut cui testimonium perhibet ipsa experientia, nō tamē propterea quod ipsi hinc inferunt vnquam elargiar, instrumenta videlicet eo nomine fieri respirationis, numerumq; illum musculorum, qui respirationi seruiunt, augere. Nec enim thorax, costæue, quod hi muscoli moueantur, siue distenditur, seu stringitur: sed si quis motus thoracis est, ille totus quantus quantus Diaphragmati ac Inter-

Intercostalibus musculis acceptus referendus est. Et hoc ipsum erat, quod postulatur, ut thoracis dilatationi constrictione inferuire dicantur, ut videlicet, ex ipsorum contractione motu thoracis ille motus consequeretur: cum contra fieri videas, ut motus abdominis, qui in valida respiratione percipitur, moto thorace accadat, cum eleuetur in inspiratione, ut cedat descendens visceribus, & contrahatur in expiratione, ut ascendens iterum in suum locum, sese undique accomodet, eaque contineat. Solent enim cum Diaphragmate in respiratione viscera una descendere, & ascendere: quemadmodum id in vivis dissectionibus eleganter intueri licet. Ex quibus consequi videtur, accidentalem tantum hunc motum esse: neque musculos ipsos per se contrahi, sed vel pelli thorace dilatato, vel iterum recedere in suum locum constricto. *In secundo argumento* errorem noto doctissimorum alioquin Columbi, & Laurentii, qui oblique descendens abdominis finem circa thoracem esse crediderunt, originem autem à superiore ossis pubis iliumque parte, tum à transuersis lumborum processibus. Nam si recta rem omnem tecum repares, ipsamque potius inspectionem consulas, quam vanos novarum opinionum fucos, aut probabiles sententias, principium horum musculorum (quod paulo post, cum de abdominis musculis agemus, demonstraturi sumus,) ex inferna parte costarum sextarum, septimarum, octavarum, & nonarum, antequam in cartilagine abeunt, carnosum, tum à membrana à vertebra lumborum ligamenti, & dimidia ossis ilii appendice membranoso nascitur. Id quod, etsi & argumentis probari quamplurimis nullo negotio poterat, vnicum tamen hoc duntaxat loco, sed Achilleum in medium adducemus. Cum enim apud omnes dissectionum Proceres, tanquam axioma quoddam & indubitata fidei principium receptum sit, illic perpetuo musculorum originem esse, ubi nervorum insertiones comparent, cum nunquam in finem, raro in medium nervi implantentur, profecto circa costas, dictasque partes, principium horum musculorum esse, necessum est. Singulis enim fibris pectinatis, quibus cum serrato maiore coniungitur, ex enumeratarum costarum interstitiis singuli nervi porriguntur, ut nemo possit ambiguus, vel anceps animo de origine porro herere, dummodo vel concedat anatomis suum principium, vel ipsi sensui propriam fidem nolit derogare. At enim cum doctissimi Viri & ipsi habeant argumenta, quibus suam opinionem fulciant, neque sint admodum de nihilo, illa hic in medium afferenda esse merito censuimus. *Primum*, inquit, si statuamus finem oblique descendens circa Ilium & pubis ossa, aut ea mobilia dicendum erit esse, aut accusanda imprudentie Natura, quæ musculos motus voluntarij organa, in partes immobiles inseruit: at illud dicere ignari erit motum humani corporis, cum sciant omnes mobilia esse pubis & ilii ossa: hoc vero summæ impietatis, quandoquidem nimis quam verum illud est, Naturam nihil inquam temerario consilio; sed omnia summa potius & incredibili providentia construxisse. *Secundo*, eandem rationem, quæ nostræ sententiæ fuit fundamentum, contra nos adducunt. Nam Galeno teste, inquit, si nervi in musculorum vel principia, vel paulo post, raro in medio, nunquam ultra medium desinunt, & musculi hi nervos habere conspiciantur circa pubis os, & lineam candidam, profecto principium ipsorum circa has partes esse necesse est, finem autem circa costas. Neque vero alio instituto, illic principium, hic finis positus est, nisi ut costas deorsum trahendo, thoracem una constringant. Sed enim magni hi

Ad secundum.

Principium oblique descendens esse circa pubis ossa. Argumentum primum. Secundum. Responso. Ad primum.

Viri, dum à Galeno in hoc negotio discedunt, & imprudenter mihi facere, & eius opinionem non recte assecuti videntur. *Largiamur enim ipsis*, ilium & pubis ossa immobilia esse: indene recte inferent, propterea muscutorum finem illic non esse? Nam ex Galeni quidem sententia si loquamur, nihilominus hi muscoli officio suo fungentur, cum munus eorum præcipuum ipso docente sit, abdomen sua cōtractione comprimere: quam certe compressionem citra pubis ossium motum quam optime perfici posse, quis est qui non obleruet? Cū enim abdomen conuexum sit & prominens, maxime vbi cibo potuve Venter turget, horum muscutorum cōtractione ab vtroque latere in planum componitur. Quamobrem non bene illi videntur concludere, qui, quod ilium ossa moueri non credant, propterea muscutorum oblique descendentium fines illic inferi haudquaquam posse existimant. Sed & ego in sequentibus demonstraturus sum, reuera & pubis & ilium ossa moueri, tametsi vnanimem omnium Anatomicorum, qui hætenus quidquam in lucem prodiderunt, in contrariam sententiam consensum esse videam. Nunc ad secundum argumentum me confero, in quo vt haud ægre concedo, Nervos circa lineam candidam iliumque ossa conspici: nego tamen ex iis esse, qui sensum motumve his musculis offerant, de quibus scilicet Galenus loquitur, cum Nervos inquit in muscutorum capita desinere, vel paulo post, vel circa medium, nunquam vltra medium. ^{i, 8. i.} Nervi enim illi perforant, & pertranseunt hosce musculos, non sane vt iis inferantur, (quod dictis Authoribus visum est,) sed vt hinc ex abdomine mox ad membranam carnosam cutimque digerantur, sicque his partibus sensum præbeant. ^{N. N. N.}

Ossa pubis & ilium moueri.

Ad secundum.

Conclusio.

Sed de hac re plura dicendi locus infra dabitur: nūc sufficiat demonstrasse, Abdominis vocatos musculos, ad dilatationis constrictionisve in Thorace motū nihil omnino facere, cum non his motis Thorax: sed potius Thorace moto ipsi moueantur. Falsum autem & hoc est, finem oblique descendentium circa thoracem inferi; quod si vero Ascendentes, & Recti inferantur, iam longe alio fine, quam thoracis gratia inferi, inferius ostendemus, vbi horum muscutorum actio aperietur. Quin imo de ceteris etiam, quos proprios Thoracis appellant, quid statuendum sit, membratim dicemus postea, cum singulorum historiam persequemur. Nam quod ^{l, 4. 18. F.} *Subclauium* attinet, cum Clauiculæ inferi statuimus, vt ipsam deorsum trahat. Ostendemus enim finem non habere circa primam costæ partem, vt communis est opinio: sed potius in clauicula. ^{m, D. D.} *Serratum* vero maiorem scapulæ assignabimus, similiter demonstrantes Anatomicos circa principium ipsius hallucinatos fuisse. ^{n, 4. 3. C. & E.} *Duos posticos serratos*, superiorem, ac inferiorem, Dorsi Capitisque musculos continere, ne in validis motibus exorbitent, & propterea ligamentorum annularium, in manu, ac digitis positorum munere fungi dicemus.

Musculi Thoracis dilatantes ex sententia Authoris.

^{o, K. K.} *Sacrolumbum* autem, Dorsum oblique extendere similiter probaturi sumus. Quare iam concludentes dicimus, musculos thoracem dilatantes constringentesque non alios esse, præter Diaphragma, & Intercostales: & Diaphragma quidem semper mouere & solum in libera ac naturali respiratione: in coacta autem, Intercostalium operam sibi adiungere. Dilatat autem & constringit Thoracem, vnus idemque musculus *Diaphragma*. Quæ res si prima fronte mira alicui videatur, cum vix mente multis comprehendendi posse credatur, quomodo contrarij motus ab eodem musculo proueniant: mirari is mox desinet, si aduertat tale quid in sphinctere quoque musculo, tam vesicæ, quam

ani com-

ani comparere. Idem enim Sphincter, & constringere potest vesicam, contrahendo se, ut contineat urinam: & dilatare eandem, laxando se, ut urinam reddat. Sic diaphragma, contrahendo se ad principium, Thoracem dilatat: at laxando, constringit, ut in usu eius iam demonstraturi sumus. *P. Intercostales* vero muscoli, ut duplices sunt, externi, & interni, ita etiam duplici funguntur munere. Illi enim, dilatationem in coacta respiratione adiuuant: hi, constrictionem.

¶ Musculus ergo, qui *Διάφραγμα* Platoni dicitur, Hippocrati *φρένες*, & *διάφρεξις* vocatur, *ὅτι τὸ διαφρεττειν*, quod discernere, & separare significat, quia scilicet infimum ventrem à medio separat. Aristoteles communiter *διάωμα* appellat, *Succinctum*: interdum & *πέλωμα*, & *ὑπόωμα*. Galenus modo *διάφραγμα*, modo *φρένες* vocat: at Latini Celsum sequentes, communiter *Septum transversum*, ab officio, & situ. Plinius, ob viciniam cordis cui prætenditur, *Præcordia*, quasi *περικαρδία*: at Macrobius, *Disseptum* vocat. Nonnullis qui Græcam vocem *πέλωμα* exprimere studuerunt, *præcinctum* appellatur. Est autem *Diaphragma*, musculus, vnus omnium fama celeberrimus, id quod hæc vocum, quibus apud diuersos auctores venit, multitudo, satis superque testatur. *Situm* habet in corpore transversum, Thoracem ab infimo ventre separans. Situs autem est obliquus, ob thoracis, quem succingit, obliquum ambitum, quem sterni infima pars, & cartilagine spiriarum costarum conficiunt: quare & *magnitudo* ipsius tanta necessario est, quanta ambitus vniuersus medii ventris, quem succingit. *Figuram* obtinet nulli alteri musculo communem, cum musculus sit latus, tenuis, atque orbicularis, & in medio sui principium nactus, à quo, tanquam à centro ad circumferentiam fibræ crassæ excurrunt. In medio enim habet circulum quendam nerveum, qui eius origo est, quem circum alius quidā, totus carneus consistit, per quem, fibræ ab illo egressæ, ad peripheriam sparguntur. Quemadmodum autem circulus interior, quo vicinior centro, tanto nervosior est: ita quo costis & thoraci propius accedit exterior, tanto carnosior crassiorque semper efficitur. Annectitur enim, & inseritur toti thoraci intrinsecus: *y* anteriore quidem parte, sterni infimæ sedî, prope mucronatam cartilagine, quæ eius est propugnaculum, tum ultimæ veræ costæ: *z* à lateribus, costarum spiriarum extremis, & toti duodecimæ costæ: *a* posterius vero, cum vndecimæ dorsî vertebræ inferi debuerit, quam spectat: at vero ibi *b* arteria magna descēdat, & *c* lumbalis adnectatur musculus, *ὅς* dictus, in *d* duos veluti processus (quos *productiones Diaphragmatis* vocant) definit, hinc inde ad vertebrae insertos, nervosos, & carne commixtos, qui acutiores redditî descendunt, donec ad excarnes lumborum vertebrae vsque deuenerint, *e* ubi valida insertionem implantantur. Musculus hic etsi vnicus sit, in structura tamen sua duplex esse omnibus modis videtur. Constat enim, ut dictum est, primum *f* duobus *circulis*, quorum substantia, partim nervea, partim carnea est: deinde *g* *Venas* habet duas, à trunco cavæ ascendenti Phrenicas dictas: duas item *arterias* venarum comites, & homonymas: totidemque *h* *nervos*, à spinali medulla, Cervicis vertebrae inclusa, inter quartam, & quintam vertebrae prodeuntes: duas etiam *membranas*, quibus integitur, superiorem, quæ thoracis cavitatem respicit, à pleura; inferiorem, quæ ventriculum & iecur spectat, à peritonæo originem ducentem. Duo quoque sunt *foramina*, quæ habet: *i* alterum, à dextris, in circuli nervei medio, pro *Venæ ca-*

Diaphragma.

Diaphragma in omnibus duplex.

uæ ex conuexa hepatis parte ad cor, ascensu: ^l alterum, à sinistris, posterius nonnihil, ^l Fr
 vt œsophago, & duobus nervis ad ventriculum descendentibus, transitum præbeat.
^m Inter vtramque productionem, diuisio quoq; est semicirculo similis, per quam Ar- ^m, G.
 teriæ magnæ truncus, & Vena sine pari, siue *ἀρτήρ*, tum nervi sexti paris descendunt.
 Hoc dum contrahitur versus principium, fibræ omnes colliguntur in se, & Thoracis
 inferiores partes, quibus inferuntur, sic propellunt, ac cavitatem ipsius ampliorem
 reddunt: at dum laxatur, sursum abit, (quo pacto in mortuis cadaueribus semper re-
 peritur, quod expirando moriamur,) & ita vna trahit intro inferiores thoracis par-
 tes, cavitatesque minor fit, ac constringitur.

**INTER-
COSTA-
LES mus-
culi.** ⁿ **INTERCOSTALES Musculi**, quatuor numerantur, in quouis latere viginti ⁿ, 4. 18.
 duo, ex quibus vndecim externi, totidemque interni sunt. Nam cum ^o duodecim co- ^{K.K.}
 starum interstitia vndecim sint, in singulis musculi locantur. Sunt autem omnes hi ^o, 2. 7. 16.
 musculi lati admodum, sed pro costarum à se distantia minime longi, toti carnei, obli-
 quis fibris donati, vnde cum contrarias habeant fibras, fit, vt se decussatim intersecēt.

Externi. *Externi* ergo, à superiorum costarum inferna regione orti, in inferiorum proxime co-
 starum elatiorem sedem inferuntur. Initium autem habent primum à transuersis ver-
 tebrarum processibus, quibus costas suo capitulo adnecti diximus: mox carnosi obli-
 quas fibras validas deorsum & antrorsum spargunt, sicque progrediuntur per totum
 costarum ductum, donec perueniant ad cartilagineas, vbi costæ ossæ esse desinunt,
 ibi enim & ipsæ terminantur. *Interni musculi* contra, ab inferiorum costarum superna

Interni. regione orti, in superiorum proximè costarum inferiorem sedem implantantur. Hi non
 à processibus vertebrarum, vt externi: sed potius ab ea parte, qua costæ paululum in-
 flectuntur, originem trahunt, mox carnosi obliquoas fibras sursum & antrorsum por-
 rigunt, ac totum costarum intervallum implent, non tantum qua parte ossæ sunt, vt
 dicti: sed etiam, qua cartilagineæ, eodem semper seruato fibrarum ductu, donec tan-
 dem in ipsum os pectoris, siue sternum desinant. *Cæterum*, cum externi musculi circa
 cartilaginum initia desinebant, ita vt spatia intercartilaginea vacua relinquātur, hinc
 factum est, vt Natura, quæ à vacuo vbiuis abhorret, illa inania intervalla internis
 musculis expleat, proptereaque ad exteriorem illius spatij superficiem eleuarit. At
 enim euenit postea, vt, quia fibræ partis quæ inter cartilagineas est, diuersæ, imò con-
 trariæ videantur illis, quæ inter ossa collocatæ sunt: nonnulli, etiam ex ijs, qui fami-
 liam ducunt inter Anatomicos, Intercostales musculos sexaginta octo enumerarint,
 alios dicentes musculos esse Intercostales, alios Interossæos, & utrosque iterum, vel
 externos, vel internos. Cum ergo vndecim costarum intervalla sint, verarum quidem
 sex, & quinque spuriarum: in verarum singulis quatuor collocant, duos interossæos, &
 duos intercartilagineos: in quolibet autem spuriarum spatio, duos tantum. Externi
 ergo musculi contracti ad suum principium, sursum, & extrorsum costas ducunt, vnde
 thorax dilatatur, & sic cavitates maiores fit: Interni vero, sursum, & introrsum, vnde con-
 stringitur, & cavitates fit minor.

**Extendē-
tes Tho-
racem.** **EXTENDITUR** deinde Thorax, cui motui quatuor musculorum paria Anato-
 mici destinant: quorum *primum*, Dorsi longissimum: *alterum*, Semispinatum:
tertium, Quadratum: *quartum* denique, Sacrum appellant: ex his priora tantum duo
 Numerus ample-

amplectimur, posteriora vero lumbis adscribimus. Nam & in lumborum vertebrae inferuntur, & lumbos mouent, ut postea dicemus, quantumuis de hoc lumborum motu ante me Anatomicorum nullus mentionem fecerit. Adijcio autem illis duobus Dorfi tertium par, quod *Sacrolumbum* vocatur, sed vulgo constituitur vnum ex illis, quæ thoracem dilatant. Nec .n. profecto vel mente animoq; concipere valeo, quomodo ille ad thoracis dilatationē quidquā faciat: ut tacēā, (quod certe vnice meæ opinionis veritatem euincit) vno principio, quemadmodū audiemus, continuo, cum dorfi longissimo enasci, vnde profecto necessario sequitur, in vsu quoq; in eundē finem conspirare. Non .n. musculis, diuersis actionibus, & partibus dicatis, ut manifestum est, vnum

Sacrolumbum par thoracem non dilatat.

p. 4.3 H. continuumq; caput habere conuenit. *Primum* ergo *Thoracem extendentium*, siue Dorfi *Primum*
H. & I. I. *longissimū*, sic dictum, non tantum quod inter dorfi musculos, sed vniuersos totius corporis, longissimū est, cum ab extremo ossis sacri enatū, ad primam vsq; thoracis vertebrā, quandoq; ad processus etiam mammillares ossium temporum, porrigatur. ¶ Hoc ex
H. I. 4. 5. spinis omnibus ossis sacri, & vertebrarum lumborum, itemq; interna ossis iliū sede, qua
I. H. H. sacro nectitur, principio extrinsecus neruoso admodum & valido, sed acuto; intus vero carnosio, egreditur: postea ascendens, vertebrarū lumborum transuersis processibus
q. 4.4. G. innixum, carnosius redditur, *ac singulis transuersis vertebrarum thoracis processibus*, sensim angustius redditum, ab vndecima ad primam vsq; vnum tendinem neruosum, veluti
r. 4.5. x. *ansulam largitur*, & sic tandem *in primam thoracis vertebram definit*: nonnunquā, ut diximus, vsq; ad processus mammillares temporū (quibus implantetur) ascendit. Huic
s. 4. 4. I. pari *Sacrolumbum* totum externo latere adiacet, cuius principium cum principio huius vnum idemq; est, & ab extremo ossis sacri vsque ad duodecimam thoracis vertebram, adeoque toto per lumbos progressu continuum. *Secundum par thoracem* *Secundū*.
u. 4.5. L. *extendentium, Semispinatum*, totum vertebrae incumbit, inter spinosos, siue posteriores, & transuersos processus. Hoc *ad duodecimam thoracis vertebram spina* principio acuto erumpens, mox carneum redditur, *et singulis thoracis spinis* neruosos tendines, quo pacto prius par processibus transuersis, veluti ansulas nerueas elargitur, donec tandem *in spina primæ thoracis vertebræ*, acuto fine desinat. *Tertium, Sacrolumbum*, ut diximus, commune & idem principium habet ab osse tum sacro, tum ilium, ut & vertebrae lumborum cum Dorfi longissimo, cuius quoque externo lateri toti totum adiacet: sed ubi ad duodecimam thoracis vertebram deuentum est, duo musculi esse videntur, etsi profecto difficillime a se sectione separentur, similiterque sensim tenuius redditum, *singulis costis thoracis* *duos tendines*, siue nerueas ansulas, similes prædictorum, ea parte, qua incuruantur, & non nihil inflectuntur costæ, inserit. Cæterum notandum est, ex his tendinibus nonnullos foris esse sitos, quosdam in facie interna. Qui foris sunt, & cutem respiciunt, maiores sunt quasi duplo, & longiores robustioresque: ex aduerso, qui interiorem sedem occupant, tenuiores. Cuius ergo costæ duos largitur tendines, vnum foris jacentem, alterum intus: qui *foris situs est*, inferiori costæ parti; qui *intus superiori* inseritur. *Refutatur ij Anatomici, circa numerum musculorum dorfi.*
c. I. Horum ergo musculorum munus est, Thoracem, & totam dorfi spinam extendere. Et quanquam à me, ne recedam ab Anatomicorum consueto dissectandi numero, tria paria recensentur: reuera tamen vnum tantum par est, quemadmodum tum videre li-

dere licet ex principio continuo, quid vero dico continuo? imo vero vno eodemque, dorſi ſcilicet longiſſimi & ſacrolumbi: tum quia difficillime admodum ipſa ſe-
ctione ſeparari poſſunt. Quod ſi verum eſt illud quoque Anatomicorum axiomā,
quod ſupra fundamenti loco propoſuimus, ſingulos muſculos proprias habere mem-
branas, quibus toti inuoluuntur: hi autem muſculi ſingulis teſti vndique non ſint, vt
cuius videre licebit in ſeſtione, merito vnus certe conſtituendus videtur. Credide-
rim autem Anatomicos idē ſeparalle, quod viderint anſulas diuerſis partibus inferi.
Nam Longiſſimus tranſuerſis proceſſibus: *Spinatus*, ſpinis: *Sacrolumbus* verō, flexurā coſta-
rum duos largitur. Sed enim Natura, vt vbiuis ſolertiſſima eſt, ſic hoc ſumma fabrefe-
cit prouidentia, & hoc pacto commodo motui commodiſſime proſpexit. Vt enim
extenderetur thorax muſculum alicubi inferi neceſſe erat: at inferi vno ſine continuo
non poterat, quia carneus imbecillior, tendineus autem neutiquam bene coſtis inter
ſe diſparatis implantatus fuiſſet: plures ergo fecit tendines, vt ſingulis coſtis ſinguli eſ-
ſent; & quia illi tendines non poterant commode totam partem occupare, plures fe-
cit, quorum alios circa ſpinas, alios tranſuerſos proceſſus, alios coſtarum flexuras in-
feruit, ijs ſcilicet locis, vbi vel articuli ſunt, vel robur ad motum habent. Sic videmus
& Sacralumborum muſculum, triplici anſularum genere donatum eſſe, per o-
mnia ſimilem his tribus, ne tamen triplicem ab vilo muſculum, ſed vnicum duntaxat
poni. Cæterum quidquid de hac re ſtatuatur, tendines duorum, ſpinati inquam dorſi-
que longiſſimi, reſta dum contrahuntur extendunt: at ſacrolumbi, ſi alteruter agat,
oblique: ſin totum par, priorum duorum actionem adiuuat.

His muſculis adnumeramus duos illos, quos *serratos poſticos* appellant, non quidem,
quod in dictorum actione obeunda concurrant: ſed quia actionem eorū conferuent,
& expeditiorem reddant. Nec enim extendunt thoracem, vt illi, ſed prohibent tantū,
ne in violenta validaque dorſi, atque capitis muſculorum, quos ſimiliter continent,
contractione exſiliant. Ex quo patet, eos munere fungi proriuſ eodem, quo ligamen-
ta annularia, quæ circa carpum ac digitos cernuntur. Prohibent enim tendines muſ-
culorum digitos fleſtentium, ne dum contrahuntur, ex ſuis ſedibus labantur. Sic
primus humerum circumagentium muſculus, vt in hiſtoria ipſius dicitur, & potiſſi-
mum ſupra capite ſexto libri tertij jam dictum eſt, ligamento ſecundo humeri in ſuo
loco retinetur. Nam quod aliqui hoſ thoracem dilatare credant, nullo vnquam tem-
pore, quo pacto fieri id queat, animo colligere potui. Sunt enim ita imbecilles, cum
nihil ferè carnei obtineant, ſed toti quanti ex membrana conſtent, vt nulla ratione
tam validæ actioni, qualis hæc proſecto eſt, præeſſe poſſint. Taceo, quod ipſis coſtis nō
inferantur, ſed tantum muſculis, at certe vt ineptum fuiſſet, tam valido motui tam
imbecilles muſculos, vt pote membranofos deſtinare: ita ineptius proſecto etiam, in
carnes & muſculos inferere, vt Thorax moueretur. Et quomodo, ſodes, dilatabitur ca-
uitas thoracis, trahentibus hiſ muſculis coſtas ad ſpinas, & quidē ſuperiores, cum po-
tius in dilatatione Thoracis, inferiores ipſius partes extendantur, ſuperiores conſtrin-
gantur, vt demonſtratum eſt, ſed nec dubitari à quōquam poteſt? Cæterum duo ſunt,
quorum alter *Serratus poſticus ſuperior*, alter *inferior* dicitur. *Serrati* quidem vocan-
tur, ob ſerratum ſinem, hoc eſt, ſerræ in modum denticulatum: at *Poſtici* ad differen-
tiam

Cur eiuf-
modi an-
ſula facta.

Vſus.

Serrati
poſtici.

Vſus ex o-
pinione
Authoris.

Refuta-
tur Vſus,
quem a-
ſcribunt
Anato-
mici.

1.
2.
3.

Superior.

e. 4. 6. K.
L. M.

f, 4.3.C. [†]D. -
^g. A.
^h. E.
ⁱ. d.d.
^l. e.e.e.
^m. E. + F.
ⁿ. f.f.
^o. K.K.H.
^H.
^p. g.g.g.
^q. 4. 10.
^D. D.
^r. 4.9.E.E
[&] 4.10.
^L. L.

tiam aliorum, qui in anteriore corporis sede locati sunt, ut duo illi ultimi scapulâ mouentes, quartus inquam & quintus. Vocantur deinde *superiores*, aut *inferiores*, ratione loci quem inter se in dorso occupant. ^f *Superior* ergo supra ^g musculorum capitis primum par, siue Triangulare situm est, minor ^h inferiore. Oritur ⁱ à spinis vertebrarum trium inferiorum colli, & primæ thoracis, membranofus ac tenuis, obliquo deinde progressu descendens, carneas fibras assumit, ac ^l quatuor superiorum costarum tribus interuallis tripartito sine ac serrato, inseritur. ^m *Inferior*, similiter membranofus, *Inferior*. ⁿ ex spinis vertebrarum duarum, quandoq; trium inferiorum dorfi enatus, transuersim ^o supra dorsum extendentes defertur, & fibris carneis adauctus, ^p ad costarum inferiorum quatuor interualla inseritur.

FLECTITVR Thorax, cum versus terram antrorsum incuruamur. Huic motui nullum assignarunt Anatomici musculum: Ego vero ^q *Rectos* ipsi *abdominis*, si quidem flexio recta fiat: sin ad latera, ^r *Ascendentes obliquos*, tribuo. De his capite proprio dicetur, cum de Abdominis musculis sermonem auspicabimur, quos malè sic Veteres vocabant, cum abdominis tantum vsui destinatos crederent, nec scirent quo pacto Thoracis motibus inservirent. Quamuis autem huc proprie illi referendi sint, quod hæc actio illa longè sit nobilior, quia tamen (dummodo error agnoscatur) haud multum interest, quemcunque in locum reijciantur, & ea quæ à maioribus nostris sunt tradita, aut longo vsu communia facta, si quo modo tolerari possint, non temere deferenda sint, sub nomine musculorum abdominis, quod à secundo vsu acceperunt, de ijs postea agemus.

Superest tandem *circularis motus*, quo ad latera Thorax ducitur. Hunc in nobismet ipsis sedentibus, aut stantibus, dum inferiores partes quiescunt, nos autem ad latera superiores, puta thoracem, & ipsi incumbens caput, trahimus, leui negotio licebit advertere. Absolvitur autem à ^t *Transuersis abdominis musculis*, de quibus & mox acturi sumus, cum in ipsorum actione multa egregia Naturæ secreta, nec ab alijs vsque adeò bene aduersa, abstrusa lateant.

CAPV T IX.

De musculo Subclauio.

^z. 4.18.F.
^u. c.
^x. F.
^y. d.

Subclavius ^t musculus vocatur ille, qui sub Clavicula situs est, & spatium illud, quod inter ipsam, & primam thoracis costam interiacet, totum occupat. Habet hic principium carnosum à primæ costæ elatiore parte, ea sede, ubi sterno jungitur, deinde ^x obliquissimo, ac quasi transuerso ductu ascendens, ^y in claviculæ partem humiliorem, qua costam respicit, prope acromium, carneo sine, eoque lato implantatur. Huic munus assignant Anatomici, in coacta respiratione primam costam sursum, & extrorsum trahere, ut thoracis cauitas non nihil amplior fiat, quo nomine & principium eius in clavicula, finem vero in prima costa reponunt. At vero cum Galeni autoritate, in dilatatione inferiores potius partes, quam superiores extendantur, imo superiores constringantur, non video quamobrem sic dilatari debeant superiora. Accedit, quod

Circum-
agentes
thoracè.

Subcla-
uius mus-
culus.

Vsus exa-
liorum o-
pinione re-
futatur.

1.

2.

S

quod

3.
*vsus ex
 opinione
 authoris
 proponi-
 tur &
 cōfirma-
 tur.*

quod obscurum adhuc sit, quem vsū præstare valeat eiusmodi vnus saltem costæ dilatatio: vt taceam, quam male ponatur principium ad clauiculam, cum nervus circa costam inferatur, consentientibus vnanimi omnibus consensu, exortum cuiusque musculi ad nerui implantationem esse. Quamobrem alium nos assignabimus *vsū*, nempe detrahendi Clauiculam, cum: sursum vna cum scapula mota est. Reuocandū enim hic in memoriam erit, quod supra secundo libro propositum est, Clauiculas scapularum gratia, quas sustineant, conditas esse. Cū ergo scapulæ sursum eleuantur (vt quilibet vel in seipso explorare potest) simul clauicula tollitur, quæ vt postea in locum redeat, musculo detrahente subclauio indiguit. Nec enim benignissima Parens, vt cūq; suo pondere in locum redire posse videri poterat, quod omne graue deorsum sua natura feratur, musculo destitutam esse voluit, cum nonnunquam, vt decumbentes, eo beneficio careremus. Quare motus voluntarij instrumentum ipsi impertiit, non secus ac humero quoque detrahentem musculum concessit, quem Rotundum appellabimus. Accedit, hoc ipso non tam clauiculæ, quam scapulæ ipsi prospectum fuisse, cum ea alioquin, nisi clauiculæ beneficio propter hunc musculum vna detraheretur, detrahente musculo (at quanto malo) & loci situsque sui iniuria caruisset. Cæterum hunc verum esse vsū haud multa industria edoceri possumus, solis clauicularū fracturis vel leuiter consideratis. Ecce enim si frangantur hæ juxta sternum, humerus subito cum scapula decedit: & illa pars, quæ sterno proxima est, ascendit, sursumque erigitur, vt testatur Chirurgorum maximus Hippocrates, lib. de fracturis: sin contra juxta acromium rumpantur, neutram partem ascendere conspicias: Huius sane rei causam inuestigans doctissimus Hippocrates dicto loco, ingeniosam quidem rationem adducit, non tamen, si recte rem expendas, cum difficultates patiatur plurimas, veram: vera autem hæc est, quam ex Anatomicis fontibus deducimus. Cum musculus inferatur illi parti, quæ juxta acromium est, dum bifariam frangitur Clauicula, statim contrahitur musculus Subclauius, (vt solent musculi fractura facta subito in se coire) sicque humerum, ac humero appensam scapulam vna secum detrahit; altera autem pars, vt quæ vi musculi detinebatur in loco, ab ipso sic libera facta recta ascendit: quod si rumpatur juxta acromium, non ascendit, quia musculus detinet adhuc Clauiculam. Quæ sane res manifeste etiam nobis, vt cætera taceam, ostendit, principium in costâ, finem autem in clauicula ponendum esse, contra ac cæteri Anatomici hætenus omnes ad-
 num fecerunt.

C A P V T X.

De infimi Ventris, & primum, de musculis Abdominis appellatis.

INFINI
 VENTRIS
 musculi.
 Motus
 infimi
 ventris.

VIDIMVS supremi medique Ventris musculos: restat nunc vt INFINI quoque inspiciamus. Hi vel totum infimum Ventrem mouent, vel aliquas tantum eius partes. Totum mouent, qui Lumbos flectunt, aut extendunt: at partes, qui vel externas mouent, & quidem anteriorem duntaxat, quam proprie Abdomen vocant: vel internas, vt testes, vesicam, anum, & penem. De his ordine nunc agemus, initium capientes ab iis musculis, qui abdominis motui dicati sunt, quod in sectione prius occurrant.

Musculi

Musculi ergo Abdominis vocantur, antiqua appellatione, quod abdominis, hoc Nume-
est, anterioris in imo ventre partis motui inferuiant, qui vsus primis huius nominis rus mus-
impositoribus solus erat cognitus, cum potius Thoracē flectentes, vel circumagentes culorū.
re, cap. 8. rectius dicerentur, inuenta appellatione ab vsu primario, ^a vt supra diximus. Horum à
Galeno quatuor recensentur paria, quæ vtrumq; abdominis latus integrum, & obue-
lant & comprimunt: nostro tamen sæculo studio industriaque diligentissimi Gabrielis
Falloppij quantum par accessit, quod ab ipso quoque nomen accepit, vt Falloppianum
dicatur. Hoc, non nego, cum totum abdomen non comprimat, sed leuem tantum i-
psius partem, haud ita bene cum cæteris abdominis par dicitur, ne tamen in vocabu-
lis nimium curiosi videamur, cum aliis hoc nomine dignabimur. Maioris momenti
illa quæstio est, quam multi agitarunt, sitne distinctum à cæteris par, an iisdem tantum
veluti particula connexum: at reuera peculiare propriumq; esse, ab inuentore sic pro-
batum est, & probabitur paulo postea à nobis, vt iam dubitationi nullus sit amplius
locus, nisi potius sensibus nostris, & rationi ipsi, quam authoritati Veterum aliquid
derogare velimus. Sed vt, nos hodie multa adhuc latere, modestiæ cuiusdam est inge-
nuæ confiteri: sic plurima Veteres olim latuisse, prudentiæ.

Sunt ergo quinque in vniuersum musculorum abdominis paria, ex quibus duo obli-
qua dicuntur, vt *primum*, & *secundum*, vnum *rectum*, vt *tertium*, & *transuersum*, vt quantū:
tandemque *Falloppianum*, siue vt à figura vocant, *Pyramidale*. Ex his duo priora primum
locum occupant, statimque sublatis quatuor communibus corporis integumentis oc-
currunt, & quia illius fibræ descendunt, huius ascendunt, illud oblique descendens,
hoc ascendens dicitur: inde Rectum se profert, cui infima sede pyramidale incumbit,
vtrique autem transuersum subiacet. Vocantur autem hi musculi Obliqui, Recti, aut
Transuersi, à fibrarum ductu simili, non quidem considerato ratione ipsius corporis
musculi, cum superius probatum sit, huius respectu fibras musculorum perpetuo recta
ferri, rectasque in omnibus esse: sed ratione situs musculi in illo corpore.

^z OBLIQVI ergo DESCENDENTES, *originem primum carnosam ducunt* ex par- Obliqui
te inferna costæ sextæ, septimæ, octauæ, & nonæ ^b principiis pluribus ferratis, siue descen-
ad similitudinē dentium ferræ pestinatim stipatis, quibus, cum ^c quinto scapulæ mus- dentes.
culo similiter ferrato, (vnde & ferratus major dicitur,) nectitur: interdū etiam ^c ner-
uosa exilitate pectorali junguntur. Nascuntur autem ex costis, antequam in cartilagi-
nes desinant, vt fundamentum habeant robustius, nec, si flexibile sit, facile cedat.
Oriuntur deinde ^d *membranoso etiā principio*, à tenui membranæ in modū ligamēto, è trans-
uersis vertebrarum lumborum processibus, ^e dimidiaq; ossis ilium appendice, siue spi-
na, enato. Hinc progressi ^f latum neruofumq; tendinem, ac quasi membraneum effor-
mant, quo vna ad anteriora feruntur, & *partim* in medio ipsius abdominis, ad ^g lineam
candidam *membranosi*, *partim carnosi* ^h in ossis ilium summitate, *partim neruosi*: ⁱ in pubis
ossium superiorum regionem inferuntur. Incipit autem tendo ipse membranofus,
circa ^l *lineam semilunarem* à me vocatam, (cum semilunæ respondeat,) quæ sit à concur-
su tendinum musculorum, cum obliquo, tum transuersorum ibi incipientium. *Linea Se-*
miluna-
ris.
Linea cæ-
dida.
At ^m *Candidam lineam* Anatomici illam appellant partem, quæ à mucronata cartilagi-
ne, per medium abdominis & vmbilicum ad os vsque pubis excurrit. Est autem mem-
brana

brana tendinea, ex concursu finium tendinum ipforum enata, (vnde & candicat,) quæ supra vmbilicum latior, infra angustior est. Tendo tandem hic, vbi ad musculos rectos peruenit, validissime cum subiecti oblique ascendentis tendine, vsque ad lineam candidam jungitur ac sic miscetur, vt separari à se inuicem citra dilacerationem haud possint.

Oblique
ascendē-
tes.

ⁿ **OBLIQVI ASCENDENTES** sub prioribus immediate siti sunt, propterea-
que *obliqui interni* ab Anatomicis recentioribus vocantur. Hi ^o carnosum initium ab
ossis ilij appendice, & membranofum à membrana lumborum prædicta, tum ossis sacri
spinis desumunt, mox carnosâ origine ascendentes, q̄ fibris suis contraria serie atq;
descendentis musculi, quas crucis in modum diffecant, positis, ^r inferioribus duabus
costis vndecimâ inquam, & duodecimâ annectuntur, paulatimque ^s in latum tendi-
nem, eumque nerveum ac membranofum, vt Descendentes circa lineam semiluna-
rem transmutati, decimâ, nonâ, atque octauâ costis, qua parte cartilagineâ fiunt, im-
plantantur. Cum primum autem semilunarem lineam superarunt, & jam rectos atti-
gere musculos, ^t bifariam (visu pulchrum & admirabile) tendo ipse scinditur, sicque
in duos quasi abit, ex quibus ^u superior, cum portione obliqui descendentis validissi-
me, vt diximus, coniungitur, quousque in lineam candidam vterque terminetur: ^x in-
ferior autem, sub musculis rectis progreditur, quos vbi superauit, superiori adnecti-
tur, sicque simul in lineam dictam desinunt, & veluti vagina quadam rectos musculos
includunt. Caterum superior ille tendo impense robustis nexibus, tribus illis recto-
rum musculorum intersectionibus, de quibus postea loquemur, sic valide alligatur, vt
non nisi magna quadam difficultate diuelli ab ijsdem possit.

Recti.

^y **RECTI MUSCVLI**, carnosi sunt, & robusti: figuram fasciarum latam & ob-
longam exprimentes. Longitudine enim totum abdomē adæquant, at latitudine qua-
tuor transversos digitos, crassitie minimum. Hi sub ^z obliquorum tendinibus in me-
dio laterum abdominis locati, *duo habent extrema*, ex quibus ^a alterum, & *infernum ner-*

*Duo ex-
trema re-
clorum.*

vosum est, ab anteriore elatioreque ossis pubis parte exortum, quod sub pyramidalibus
dimidia sui parte latitat: ^b alterum & *superius carneum*, ad ossis pectoris latera, ab vlti-
marum costarum verarum cartilaginibus enatum. ^c Reliqua pars, quæ inter hæc me-
dia est, tota carnea est, præterquam quod intersectionibus quibusdam nervosis distin-

*Interse-
ctiones.*

cta. Vocantur autem ^d *Intersectiones* ab Anatomicis, neruæ quædam fibræ horum
musculorum, oppido quam densæ, & carnibus mutuo intertextæ, internodia quædam
referentes. Græci *αερεξ πας*, & *circumscriptiones* vocant, quia musculum distinguere vi-

*Numerus
interse-
ctionum.*

dentur, & partes ipsius circumscribere. Harum vt plurimum semper tres obseruantur,
ex quibus *vna* sub vmbilico est, *due* vero supra: nonnunquam etiam tres supra consi-
stunt, & tum tertia directe vmbilico opponitur. Interdum etiam quatuor, si abdomen
sit longiusculum; sed rarum id est, multoque adhuc rarius, omnes deesse. Illud autem
silentio neutiquam prætereundum est, musculos rectos circa pubis ossa coniunctos,
paulatim versus vmbilicum, & superiores vmbilico partes disungi, vsque eo, vt circa
sternum digiti fere latitudine, & quod excurrit paulo, separati videantur. Multo au-
tem memorabilior, magisque digna spectatu est illa in ^e facie interiore vasorum infer-
tio, ex quibus alia descendunt, alia ascendunt. ^f *Descendunt* à superiore parte, Venæ &

Vasa.

ⁿ, 4. 9. E.
E. & 4. 10
L. L. † 4.
1. 1. A. A.
0, 4. 9. F. F
p, G. C.
q, a. a.
r, 11. & 12.
s, 4. 11. B.
B.
t, C. C. D.
D.
u, C. C.
x, D.

^y, 4. 10.
D. D. † 4.
11. & su-
perior
quidem
pars. K.
K. K. K.
inferior
1. 1. 1. 1.
z, 4. 9. 1. 1.
1. 1.
a, 4. 10.
a. a.
b, b. b.
c, D. E. D.
d, E. E.
e, 4. 11. 1.
1. 1.
f, G. H.

Arte-

g, L.M. Arteriæ Mammariæ; & *ascendunt* contra ab inferioribus sursum Epigastricæ, tandemq; *Anastomosis vascorum.*
 b, N. per^h anastomoses circa regionem vmbilico adjacentem inuicem junguntur. Hæc Vasa consensum illum insignem inter vterum ac mammas inferre, tradunt Anatomici; sed cum in maribus similiter cernantur, pro nutritione quoque & vita condita esse, credibile est. Anastomosis etiam illa in maribus raro, aut nunquā observatur, quod necessaria non fuerit: at in gravidis atque puerperis, in quibus hæc vasa, vt vteri quoque, impendio tument, maxime sensui obiiicitur. *Nervos* etiam habent, qui tum in v-
 trumq; extremum, tum in singulas intersectiones tam frequentes inferuntur, vt nonnulli ex ipsis nervis intersectiones contextas esse sibi persuaserint. *In superius extremum inferuntur*, orti ab extremis thoracis vertebris ab intercostalib. prodeuntes, qui peritonæū perforant: *in inferius* (alij id non observarunt) à primo lumborū pari exporriguntur. *Nerui.*
 i, 4. 12. F. Rectisⁱ TRANSVERSI substernuntur, qui infimi sunt inter musculos abdominis. *Observatio.*
 F.F. + L.I. Hi initium primo sumunt^l *nerveum membranofum*^g, à ligamento prædicto ex transuersis vertebrarum lumborū processibus enato, deinde aliud^m *carneum*, ab interioribus costarum notharum finibus, quibus sat longo ductu, in interna thoracis parte junguntur, mox carnosī redditi,ⁿ latum tendinem circa semilunarem lineam, vt obliqui, eiusdem etiam cum illis substantiæ efformant, & sic versus^o lineam candidam properant, cui tandem, vt priores inferuntur. Tendo hic cum tendine obliqui ascendentis superioris valide jungitur; sed multo adhuc validius inferne cum peritonæo, cui incumbit, cum ita contumaciter sibi id nectat, vt in homine integre ac citra dilacerationem à se mutuo separari vix possint. Hic tamen tendo iuxta pubem peritonæum deserit, vt sic nudum sese offerat visui. *Foramina tendinum.*
 p, 4. 8. O. *Ceterum in his musculis*, quemadmodum & in obliquis, diligenter observandum est, tendines binis in locis perforatos esse, *p vno* scilicet iuxta vmbilicū, *altero* vero, *in q descenditibus* quidem, iuxta ossis ilium spinam inferiorē; *at in reliquis*, prope os pubis. Et circa vmbilicum quidem, vno foramine, vt vasa vmbilicalia prodeant; at circa ilium & pubis ossa duobus, vtrinque vno, per quod *in maribus*, ad testes & scrotum, vasa seminaria præparantia ex abdomine egrediuntur, rursūque à testibus ex scroto deferentia per eadem abdomen ingrediuntur, vt postea in parastatas desinant: at *in feminis*, ligamenta rotunda ab vtero ad summam pudendi partem transeunt. *Hernia.*
 q, S. Quod si foramina hæc laxentur, quæcunque causa sit, siue extrinsecus adueniens, siue interne nata, herniæ oriuntur, quæ vel vmbilici esse dicuntur, vel inferiorum foraminum. Et tunc vel omentum, vel intestina excidunt, & vel in inguina tantum, aut etiam in scrotum, vnde variæ species herniarum oriuntur. Fæminis tamen hernia non nisi ad inguina fieri potest, cum scroto careant.

r, 4. 10. Ceterum, his quatuor paribus Galeno cognitis, vt diximus, Gabriel Falloppius præclare de anatomico studio meritis,^r quintum par adiunxit, quod ipse PYRAMIDALE *Pyramidalis.*
 I.I. vocauit, & *sucenturiatum*. Pyramidale quidem à figura: *sucenturiatum* autem ab usu, quia cæteris abdominis musculis in compressione vesicæ, dum vrinam reddimus, subsidio venire, creditur. Hoc nonnulli inter musculos referendum pernegant, sed portionem tantum esse carneam, & rectis musculis adnatam contendunt. Sed reuera musculus distinctus, tum quia à musculorum rectorum extremo inferiori, propria membrana separantur: tum quia proprias habent fibras, à fibris rectorum distinctas. Modice enim

hæ obliquæ sunt, cum illæ recta prorsus secundū abdominis longitudinem excurrant. Quod si quis neget musculos separatos vocādos esse, propterea quod in omnibus hominibus non reperiuntur, id quod & Falloppius ante me, & ego quoq; sæpissime notauimus, cum in quibusdam ambo, in nonnullis alteruter desit huic respondeo, eundem doctissimum Falloppium hoc quoq; obseruasse, nemini defuisse, nisi illis, in quibus musculorum obliq; ascendentium principium non incepit primum à spina, siue appendice ossis ilium, sed inferius à ligamento illo valido, quod ab eadem spina, vsq; ad pubis os excurrit. Tum .n. ascendentium principium horū munere fungitur, sicq; ipsi merito deesse possunt. *Oriuntur* autem principio carnosio, nec admodum lato, ab externo pubis osse, & inferius rectorum extrema conscendunt, hinc obliquis fibris carnosius vesti, in tendinem abeunt nerueum, ac teretem, quo in lineam albam desinunt. Interdum minor est tendo, & qui ad dimidium tantum longitudinis spatij, quod infra vmbilicum est, alligatur: quandoq; longior, & qui vsque ad * vmbilicum pertingit.

Nunc ut *vsus* quoq; horum musculorum intueamur, sciendum, siue agant ipsi, siue quiescant, *vsus* eos præstare multiplicem. Dum enim quiescunt, primo quidem propugnaculi cuiusdam munere funguntur, sicque viscera & partes in infimo ventre contentas, ab externis iniurijs defendunt: deinde & tegumenti locum subeunt, quod calorem viscerum foueant, sicq; concoctioni ipsius alimenti plurimum vtilitatis afferunt. Dum agunt, vel vna omnes in idem officium conspirant, vel singuli peculiarem *vsus* præstant, ut ita duplex actio prodeat, communis inquam, & propria: ac communis iterū, vel primaria, vel secundaria. *Primariam* vocamus æquabilem illam abdominis compressionem, in qua musculi omnes eodem tempore ad sua principia singulari quadā concordia trahuntur: *secundariam* contra, quæ hanc immediate sequitur, qualis in fæmineo quidem sexu fœtus est exclusio, in vtroq; autem fœcum, & vrinæ. De hac Galeanus expressè scripsit lib. de muscul. dissect. cum portionem horum musculorum infernam, præcipue illorum, qui vesicæ ipsi incumbunt, mictioni apprime conducere ait: illā facili negotio demonstrare licuerit, cum abdomine omni ex parte æqualiter compresso, quicquid in intestinis continetur, aut sursum, aut deorsum necessario tendere cogatur. At superius cum egredi nequeat, pressis similiter à Diaphragmate (dum spiritus cohibetur) intestinis: nec in lateribus consistere possit, iisdem similiter ab obliquis & transfuersis musculis cohibitis, necessario profecto per inferiora & anum egredi cogetur. Eodem modo in partu vterus à musculis vndiq; vrgetur, vnde onus suum quā primum deponere omnibus modis conatur. Cæterum hæc compressio, & alium *vsus* largitur, qui non minus scitu dignissimus est. Cum enim erigentibus nobis subito corpus, aut celeriter currentibus, intestina visceraq; nisi impidentur, ad infima imi ventris necessario corruerent, quod alligata ita non sint, quin delabi (nisi sustentaculo impedianur) queant: Abdominis musculi, ut pote ad contractionem promptissimi, omni ex parte, tum à lateribus, tum etiam anteriore se de protinus subueniunt, & in loco naturali, vnanimi ac æquabili compressione detinent. Ex quo humanæ vitæ duo maxime salutaria emergunt commoda: tum ne viscera locum mutant, & confundantur: tum ne peritonæum tam valido lapsu rumpatur, & herniæ obtingant.

Circa propriam cuiusq; horum musculorum actionem, & *vsus* maximas difficultates in-

tes inuenio: sed nec mirari satis queo, quomodo tot præclarissima ingenia, quæ hæc-
 nus tot seculis floruerunt, & in hoc ipso negotio tanta industria infudarunt, tam alieni
 tamen, siue à veritate, siue ab aliqua solidiore cognitione fuerint. Quamobrè quæ ad-
 huc vsq; nostra industria assequi potuimus, tanto maiore nunc fide ac diligentia, quã-
 to obscuriora alijs fuere, proponemus. Cæterum ipse proprius vsus, vt ipsi muscoli,
 quintuplex est: ex quibus, vt ab his exordiamur, **OBLIQVI DESCENDENTES**, non
 vt vulgo creditur, Thoracis constrictioni inserviunt, quando quidem superius jam
 demonstratum est, erroneam fuisse Realdi Columbi, & Andrea Laurentij de ortu
 horum musculorum ab inferioribus partibus sententiam: veram contra Galeni, qui
 initium circa superiores locauit. Si ergo à thorace hi muscoli originem suam capiunt,
 finem autè in linea candida, ac ilij, tum pubis ossium summitate ponunt; quotiescunq;
 contrahuntur, plures præstabunt vsus. *Primo* enim, propter insertionem in lineam can-
 didam, mediam abdominis regionem, obliq; sursum trahunt, ex quo fit, vt latera vtrin-
 que comprimantur, & tum facies ex lateribus pellantur, nec in validis respirationibus,
 vel saltibus, vel in forti spiritus cohibitione, vbi thorax admodum dilatatur, intestina,
 & viscera in lateribus posita deorsum cadant, vnde & plurima, & maxima pericula na-
 scerentur. Absq; his enim musculis foret, in dictis modo casibus, viscera aut maxime
 confunderentur, aut peritonæum rumperetur, quæ mala impediuntur, dum statim se
 contrahunt, visceraq; inclusa, quasi manibus, excipiunt. Sic videmus, siue venter turgat
 cibo, siue inanis in se coeat, musculos hos semper æqualiter abdomini inferni, atq; sic
 in suo situ omnia retineri. Accedit ad hunc vsum alius, isq; propter implantationem in
 ilij pubisq; ossium summitatem, cum innominatum os oblique attollant, quemad-
 modum **Recti** muscoli contra, recta thoraci admovent. Cæterum quia huiusmodi
 motus ab omnibus Anatomicis negatus est, paulo post, vbi de **Rectorum** vsu loque-
 mur, reuera hunc dari, multisque nominibus concedendum esse, demonstrabimus.

Obliquo
rū descen-
dentium
actiopro-
pria.

DE OBLIQUE ASCENDENTIBVS Columbus sic statuit, non tantum inte-
 stina his comprimere, qui communis est omnium abdominis musculorum vsus: sed
 & costas quoque thoracis detrahi, atque hoc pacto ad eiusdem dilatationem confer-
 re. Huius opinionis, vt de se ipso fatetur, occasio inde ipsi primum nata est, quod costis
 inferioribus finem horum musculorum implantari aduerterit. At ego potius nequaquã
 eo nomine thoraci inservire posse crediderim, quod vnanimis sit Anatomicorum om-
 nium consensus, dilatationem thoracis, non nisi inferioribus costis extorsum motis fi-
 eri; quod si jam detrahant comprimantque ipsas, profecto musculis dilatationi inser-
 uientibus contrarium potius, quam socium motum præstabunt. Quamobrem & de
 alio ego vsu cogitavi, & cum thoraci iuxta, ac lineæ candidæ inferi videam, hinc du-
 plicem quoque vsum distinctum emergere mihi persuadeo. Quatenus enim *thoraci*
implantantur, oblique eundem flectere videntur, quemadmodum **Recti**, (vt dicetur
 modo) recta: at quatenus *linea alba inseruntur*, oblique abdominis mediam regionem
 detrahere, simulque latera comprimere. Ex his manifestum fit, eosdem cum oblique
 descendentes vsus ab ascendentes, quantumvis à contrariis motibus, proficisci.
 Voluit enim sagax in omnibus Natura eidem muneri contrarias præficere fibras, vt
 validior esset compressio, cum & communiter id obseruamus, positis decussatim ma-
 nibus,

Oblique
ascenden-
tium actio
& vsus
proprius.

nibus,impendio maiore robore, quam æqualiter sibi incumbentibus,quamcunque rem à nobis metipsis premi.Præter hos vsus,& alius est,ille videlicet, quo Rectis musculis auxilio veniunt, quæ res tum in extensione Thoracis,tum flexione eiusdem maxime erat utilis,& necessaria. In *extensione* quidem versus posteriora, cum prohibeant, ne Recti musculi nimium extensi, ruptionis periculum incurrant: in *flexione* vero ad anteriora, (quî motus longè validissimus est, & insigne robur ac conatum requirit,) vt minore labore difficultateve,contrahant. Quo nomine si quis sit,qui obliquos hos musculos, ob maxime necessarias,& robustissimas Reſtorum musculorum actiones, conditos à Natura professus fuerit,non vtique à veritate, meo quidem iudicio, longè aberrauerit: Sed & quam bene id statuere liceat, fusius à nobis postmodum demonstrabitur,vbi prius vsum Reſtorum plenius explicuerimus.Interim,vt,quidquid hoc muneris fuit,commodius exsequerentur,sapientissimus rerum Opifex, gemino tendine vtrumque sic inuoluit,vt quasi in vagina quadam coercitus & conclusus videatur.De quo sane si breuiter hoc loco quid dicere & perspicue voluerimus,non rectius licebit,quam si ligamentis annularibus, quæ circa carpum in manu, tarsumve in extremo pede occurrunt,tendinem hunc contenderimus.Vt enim illa tendines musculorum qui flexioni extensionive digitorum dicati sunt,in sua sede validè inter contrahendum flexinent:eadem ratione hi quoque tendines,ne fortè Recti,in corporis,siue Thoracis flexione exorbitent, quam optime præpediunt. Atque hæc quidem de vsu Obliquorum nunc breuiter dixisse sufficiat.

Reſtorū
musculo-
rū actio,
& vsus
proprius.

In RECTORVM musculorum vsu proprio indicando, tanto diligentius laborandum nobis est,quāto verius est illud,quod modo diximus, obliquos abdominis musculos propter hos ipsos(etsi non primario,)conditos esse.Quoad Galenum tamen videtur is horum musculorum vsum statuisse, compressionem tantum anterioris partis abdominis.Libro enim 5.de vsu part.cap. 14.rectos musculos, ἀπὸ τοῦ στήθους ἀρχὴν τῆς ἥλης ὅσῳ ἐκτεταμένους, hoc est, à pectore vsque ad pubis ossa extensos ait: & paulò post: Secundum, inquit, abdominis longitudinem extensi, propè vtramque-è cartilaginis ensiformis partem, τὴν ἀνωθεν ἐκφυσιν ἔχουσι, καὶ ὅτι τὰ τῆς ἥλης ὅσα κατὰ φέρονται, hoc est, superiorem enascentiam habent, & ad pubis ossa feruntur. Ex quibus verbis concluditur,horum musculorum principium ex Galeni mente,à cartilagine ensiformi prodire; finem autem in ossibus pubis constitui. Quin & quod hic obscurius dictum est,expressius alibi scripsit. Et de principio quidem, 5.de vsu part.cap. 15.testatus est, quo loci à mucronata cartilagine capita reſtorum pendere tradit:& lib.5.de Anat. administ. c. 7. partem musculi recti, quæ ad cartilaginis ensiformis latera adnectitur, τὴν ἀνωθεν ἀρχὴν, hoc est, superius principium appellat: paulo autem post, κεφαλὴν & caput vocat. De fine autem eorundem, ibidem capite 6. loquens, in ossa pubis, carnis interuentu, implantari ait.Quod si ergo secundum Galenum, in pubis ossibus finis,at in pectore principium est,dum sese contrahent versus principium,anteriora abdominis compriment, immotis etiam ossibus pubis. Quæ contractio eosdè sane vsus circa anteriorem imi ventris regionē obtinet, quos antea obliquos,circa laterales eiusdem sedes,præstare diximus.Dum enim Venter turget cibo,aut in validis respirationibus viscera descendunt, vel fæces excernendæ sunt;retinet ibi,ne viscera rumpant ventrē,aut excipit hic, ne inter se confundantur, vel

vel comprimit, vt facies facile expellantur. Cæterum contra Galeni sententiam *Recentiores* quasi ad vnum omnes insurgunt, inter quos & doctissimus est Andreas Vesalius, & Gabriel Fallopius, qui Rectos musculos à pubis ossè enasci, & ad sternum deinde ferri, ad cuius latera costis inferantur, contendunt. In quam opinionem delapsi sunt, quod pubis & ilium ossa immobilia esse crediderunt. Cum ergo muscoli, non nisi in mobilem partem inferantur, quod voluntarij motus sint organum, non nisi in thoracem inferi, & à pubis ossè enasci possunt. Posito autem sine circa thoracem, in alium lapsi sunt errorem, credentes horum musculorum id esse muneris, vt respirationi inferuissent, thorace deorsum tracto, quo superius dilatetur. Ego vero, vt ab his maxime dissentio, ita Galeni sententiam tanquam veram lubenter amplector: aliam tamen adhuc actionem, & multo quam illa quæ à Galeno inuenta est, nobiliorem addo. Vt enim de obliquis dixi, eos non tantum propugnaculi esse loco, nec solum tegumenti, *dum quiescunt*: ita non tantum, *dum agunt*, abdomen comprimere; sed & thoracem oblique flectere: sic idem de Rectis quoque nunc inquam, eos præter cætera hæc enumerata officia, pectus etiam ad pubis ossa, & pubis ossa contra ad pectus trahere, sicque Thoracem flectere. Mirabile sane auditu est, ex contractione eorundem musculorum, duos diuersos motus cieri; at si quis tantum velit animum aduertere, re ipsa se, vt dico, hæc habere, facillimo negotio cognouerit. In lecto enim decumbens, manum abdomini admoueat, qua parte recti sunt muscoli, percipiet manifestè, dum inter surgendum thoracem erigit, contractionem horum musculorum fieri, & ab his pectus ad ossa pubis flecti. Contra, si supinus in lecto decumbens, & capite decliui, pedibus vero extra lectum terræ insitens, inferiores partes ad supernas velit contrahere, sicque in lectum se voluere, eosdem rectos musculos contrahi animaduertet, pubisque ossa cum utroque innominato, versus pectus flecti. Et quamuis hoc ipsum satis esse possit, vt dubitandi de motu illorum ossium, nullus amplius relinquatur locus: ne quis tamen anceps hærere vlla ratione valeat, duobus adhuc alijs motibus probare idem conabor. *Primo* enim si quis utroque crure terræ, pedibus coniunctis, insistat, alterum deinde totum crus perpendiculariter eleuet, obseruabit à terra transuersæ manus interuallo crus tolli, id quod neutiquam posset contingere, nisi innominatis ossibus motis, aut femoris ossè, ex acetabulo suo exsiliante. At enim, vt hic ratione & animo hunc motum assequimur, ita tactu quoque facile percipiemus, si manum lateri ipsorum ossium imponamus. *Quin imo* adhuc manifestus patebit idem, si quis leuiter ad latus scabelli alterutro clune insidens, alterius cruris valide digitis innitatur terræ, & clunem, quo non insidet, eleuet, tunc enim hæc innominata ossa moueri sursum parebit, quam parat vere digitos moru præditos esse, dum manū in pugnū contrahimus, cum innominata ossa, ad ipsas vsque costas spurias attolli comperiet. *Concludamus ergo*, ossa ilium & pubis moueri; sed ossa ilium per se, propter articulationem cum ossè sacro, ossa autem pubis per accidens, quatenus ilium ossibus per *συνχρῆσις* junguntur, vnde illis motis & ipsa cientur. *Motus autem vtriusque vel obliquus est, vel rectus*: & obliquus quidem ab Obliquis descendens oritur: *rectus* autem, à Rectis. Atque hæc quidem nostra est de rectis musculis opinio; in quam sane non temere, neque fortuito incidimus, sed primum his experientijs, & deinde ratione ducti,

Recti thoracem flectunt.

Ossis innominata moueri probatur.

Conclusio

Quales sint motus ossium innominatorum.

T

quam

quam maxime quidem necessariam esse nobis persuaseramus. Cum enim omnes corporis musculos intuiti, dorsum & thoracem extendi videremus, necessario alios quoque qui eundem flecterent, dari collegimus. Ut enim præclare Galenus, de mot. muscul. docet, nulla omnino est particula, quæ vno duntaxat musculo moueatur: sed si quidem desuper aliquis enascatur, omnino alius inferna parte contra adnascetur; & si ex dextris aliquis, omnino alius ex sinistris. Vnaquæque enim particularum, quæ à musculis mouentur, veluti à quibusdam habenis in contrarium distracta, vicissim habet alterum ipsum intentum, alterum laxatum. Cum ergo Thorax antrorsum flectatur, musculo à quo flectatur indigebit, nec vero præter rectos alius ullus erit, qui id officij præstet. Quin imo id clarissime vel inde licet colligere, quod musculis his per transversum fectis, flexio thoracis protinus tollatur. At enim cum ex hac opinione, maximum incommodum sequi videatur, & quod in Anatomicis merito inter absurdissima reponi possit, antequam hinc discedamus, ipsi satisfaciendum est. Si enim pectus ad ossa pubis, & hæc ad pectus moueantur, idque beneficio rectorum musculorum, sequetur inde, rectos musculos duo habere principia, duosque fines, principium, inquam, vnum, & vnum finem in pectore, alterum vero in ossibus pubis. Dum ergo trahentur pubis ossa thoracem versus, principium horum musculorum in thorace erit, finis ad pubis ossa: contra, dum Thorax versus pubem, principium ad pubem, finis iuxta pectus. At omnium Anatomicorum consensu principium cum fine in vno musculo, eodem loco esse nequit. Sed enim ego principium vnum, & vnum finem pono. Dum enim contrahuntur, vnum os quiescit, alterum mouetur; sic pectore quiescente, mouentur pubis ossa; his quiescentibus, cietur pectus. Itaque ratione vnius temporis, quo agunt, vnum principium est, vnumque finis; at respectu diuersi, quo vel partes superiores deorsum, vel inferiores sursum trahuntur, duo principia, & duo fines erunt. Quod si quis neutiquam sibi satisfactum esse hac responsione putauerit, sed instet adhuc, nihilominus duo principia, duosque fines futuros esse, ego id neutiquam absurdum esse dixero, sed potius anatomicis demonstrationibus facili negotio confirmari posse. Si enim verum est, quod apud Galenum passim legimus, neruum in musculis inseri, vel in principio, vel circa principium usque ad medium, nulli ultra medium: profecto concludendum erit vel ex hoc ipso, duo esse horum musculorum principia, vnum superius, alterum inferius, cum utriusque extremo nerui, ut in historia ostendimus, inferantur, nec vero nerui solum sic, sed & Venæ, & Arteriæ implantantur. Et cum vasa hæc non minus tantum in principium, & circa medium musculorum inferantur, nunquam in finem, utraq; hic per utrumque extremum dispergi, videmus, & per superius quidem, vasa mammaria descendencia; per inferius epigastrica ascendencia. Sed videamus nunc quanto artificio Natura hos musculos ad edendos modo dictos

*Artificiū
Naturæ
in fabrica
musculo-
rum re-
ctorum.*

motus conformarit. Primum *bimem* fecit, ut ceteros abdominis musculos, quod, ut optime Galenus prodidit, corpus nostrum sit geminum, dextrum & sinistrum: deinde ut fortior sit motus. Fibre autem rectæ per corporis longitudinem excurrunt, si quidem rectæ corporis flexioni sint destinatae. Sunt etiam *toti quasi carnei*, nullo manifesto tendine, nisi paruo admodum & exiguo ad pubis ossa apparente, ut magis contrahi in se possint, & incuruari, cum carnea portio in musculo, non tendo vnitus contrahatur, propterea ut facilius, & citra dilacerationem, in validis dorso extensionibus cederent.

Tendines

Tendines enim vniti distendi se vltra modum, cum rigidi fere semper maneant & tensi, non facile patiuntur. Cæterum Natura hos musculos, *non vti in simis, & canibus, ad iugulum vsque traduxit*, sed circa cartilaginem mucronatam terminari voluit, quod homini corpus, vt hisce animalibus, sic incuruandum non fuit, cum ipsa dum quiescunt, ita corpus inflectant, vt nasum ipsi quasi flexuræ genu imponant.

Sed enim cum hi muscoli, dum mouentur, facile exsiliere è loco suo possent, tum in validis quoque dorsifensionibus lacerari, Natura hic quoque sedulo prospexit, & vtrumque veluti vaginæ, ita tendini gemino oblique ascendentis musculi inferuit, *tendineas quoque intersectiones largita est*, quibus plurimum robur his musculis accessit.

De TRANSVERSIS musculis nemo dubitauit, quin versus interiora abdomen trahant. Quæ sane actio in ventris contractione maxime erat necessaria, sed imprimis inflexione thoracis, quâ à musculis rectis peragi diximus. Nec enim Recti dum agunt, versus interiora flectentur, nisi tendo transuersorum, qui lineæ candidæ alligatus est, validissime cum inferiore parte tendinis oblique ascendentis, qui rectos inuoluit & coercet, coniunctus foret, quemadmodum superior eiusdem pars, cum tendine obliquo descendente, vnde fit, vt muscoli recti versus interiora trahantur. Sed præter hunc vsum, actionem quoque insignem habent, quod thoracem, vel potius truncum ad latera circulariter mouent, quemadmodum supra capite nono indicauimus.

Actio tandem propria musculorum PYRAMIDALIVM, Falloppio teste, est, vt quoties obliqui ascendentes circa pubem operam suam non locant, ipsi oblique partem illam deprimant. Obseruatur enim interdum abesse, vel vterque, aut alteruter, quod euenire solet, eodem Falloppio teste, in iis, quibus musculorum obliqui ascendentium principium, non à spina, seu appendice ossis ilium, sed inferius, à ligamento illo valido, quod ab eadem spina vsque ad pubis ossa percurrit, incipere solet. Tunc enim, inquit idem, oblique ascendentes muscoli, ea quæ sub pube sunt, oblique deorsum trahunt. Contra, *Excellentissimus Aquapendens*, quod tendinem vsque ad vmbilicum porrigi videret, vmbilicum deorsum mouere, credidit. Trahendo autem vmbilicum, vesicam leuiter ad meliorem vrinæ excretionem comprimi. At Ego, præter hæc totam lineam candidam, à mucronata cartilagine, versus pubis ossa leuiter deorsum trahere existimo, vt muscoli obliqui tam ascendentes, quam descendentes, firmitus ad se traherent, ac rectis musculis in magna corporis extensione auxiliarentur.

Transuersorum musculorum actio & vsum proprium.

Pyramidalium musculorum actio & vsum proprium. Ex sententia

1. Falloppij.

2. Aquapendens.

3. Authoris.

C A P V T XI.

De musculis Lumborum.

LVMBI tribus ciuntur motibus, quos duo musculorum paria perficiunt. *Flectuntur* enim ante, *extenduntur* retro, & *ad latera mouentur*, dextrorsum aut sinistrorsum. Flectuntur Quadratis vulgo dictis: sed extenduntur Sacro. Ex his, sitotum par agat, rectus motus sequitur: sin alteruter, obliquus, ad illud scilicet latus, in quo musculus situs est. Quod si flectentium alteruter cum alterutro extendentiū vna agat, ad latus mouent, eo prorsus modo, quo supra quoq; Ceuicæ moueri diximus.

LVMBORVM musculi. Lumborum motus.

mus: recta quidem, si paribus concurrant in opere viribus, at antrosum magis, vel retrorsum, prout flectens, aut extendens magis contrahitur.

*Flectens
lumbos.*

^a FLECTENS ergo *par*, siue Lumborum quadratum, (à figura sic dictum) in abdominis interna regione situm est, & ^b ab ossis ilium ^{b^b} posteriore superioreque cavitate; tum ossis sacri superiore, latum, crassum, ac carnosum enascitur, supra lumborum vertebrae ascendit, processibus earum transuersis adhærens, sicque sensim angustius redditum, tandem ^c duodecimæ costæ inferna parte carnosum ^d implantatur.

*Extendē-
tes lūbos.*

^e EXTENDENS *par*, siue *Sacrum*, sic ab exortu vocatum, quod ab ^f ossis sacri externa parte, vbi ipsi spina cum ilium ossē connectitur, genascatur, mox ascendens carnosius redditum, ^h triplici tendinum genere, veluti ansulis donatur: quorum *primum* ⁱ elatius, in singulos transuersorum vertebrarum lumborum processus inferitur: *alterum* ^j inferius, in eorundem processuum radices: *tertium*, in spinas singularum vertebrarum. Hinc sensim latius redditur, posteaque angustius, & in ⁱ duodecimæ thoracis vertebræ spinam, acuto fine terminatur. Huius fibræ oblique versus interiora ascendunt. ^l totus autem musculus sub principio longissimæ dorsi, quem supra descripsimus, occultatur.

C A P V T XII.

De musculis Testium, Vesicæ, Ani, & Penis.

*Testium
musculi.*

*Num-
erus.*

TESTES cum natura penduli essent, vasa spermatica, quibus alligantur, pondere suo nonnunquam nimium distraxissent, nisi provida in omnibus Natura musculos largita foret, qui à Græcis κρεμαστήρες, hoc est, *Suspensorij* vocati, quod eorum beneficio suspendantur. Sunt ergo ^m duo musculi, vt duo testes, vtrinque vnus, oblongi, graciles, ex fibris rubicundis, carnosus, ac rectis conflati, qui à ligamento illo valido, quod à spina ossis ilium, ad ossa vsque pubis excurrit, originem suam ea in parte ducunt, vbi transuersi abdominis musculi desinere consueuerunt: hinc per ⁿ foramina tendinum (quæ à nobis in historia illorum musculorum exposita sunt) vna cum vasis spermaticis, quibus valide adnectuntur, transeunt, donec tandem ^o in testem desinant.

*VESICÆ
muscu-
lus.*

P VESICA duos habet musculos, *ymum*, qui vrinam retinet: *alterum*, qui pellit. Quam fœda enim foret humana vita, si vrinæ stillicidio continuo corpus contaminaretur? at quam infelix contra, nisi in nostra foret potestate, & cum volumus, vrinam reddere, aut eandem retinere? Quare Natura musculum quidem dedit *alium*, cuius beneficio clausum teneri vesicæ os posset, & cum opus, aperiri: *alium*, quo mediante pro nostro arbitrio, vrina detrudi. Vocatur ille ab officio σφιγκτηρ, *Vesicæ constrictor*: hic, nomine caret, cum nec ab alijs in musculorum ordinem relatus sit, sed pro prima vesicæ propria membrana habitus. Primus autem Excellentissimus Hieronymus ab Aquapendente Præceptor noster hunc vsam tribuit, cuius auctoritatem nos sequentes, *Vrina detruforem* appellabimus. ^q *Constrictor* ergo in ^r collo vesicæ situs est, à cuius substantia distingui, vt ani sphincter, haud potest, cum, si rem recte æstimare volueris, ipsius cervicis substantia sit carnosior, transuersis orbicularibus fibris intertexta. Hic dum in media figura situs est, vsque adeo exacte Vesicam occludit,

*Vesicæ cō-
strictor.*

a, 4. 13. N.
N. partē
anteriorē
monstrat,
at 4. 5.
R. R. &
4. 6. P. P.
posteriorē.
b, 4. 6.
N. N.
b b, c. c.
c, 12. 12.
d, d. d.
e, 4. 5. L.
M. N. in-
tegre cō-
spiciunt.
& 4. 6. K.
L. M. nō-
nihil enuo-
lutus + 4.
7. G. G.
f. Q.
g, 4. 6.
K. L.
h, x. x.
i, M.
l, 4. 5.
L. M. N.
sub mus-
culob. b.
extra sitū
leuato,
collocatus.
m, 8. 2.
Q. Q. ex
quibus
dexter in
suo fere
sitū est. si-
nister ex-
tra situm
cernitur.
n, 8. 11.
c. c.
o, Z. Z.
p, 8. 13. 1.
M. M. M.
q. O. O.
r, N.

vt ne

ad anteriora properantes, tandem adⁱ medij canalis latera inferuntur. Inferiorem s.s.
ⁱ canalis, siue vrethræ partem trahunt, vt aperiatur, cum alias tumentibus penis ner-
 uosis corporibus à spiritu affluxu, constringerentur.

e, I.
 f, a.
 g, b. b.
 h, D D.
 i, c.
 l, E.

CAPVT XIII.

De musculis Scapulæ.

SCAPV-
 LÆ mus-
 culi.

EX PEDIVIMVS adhuc vsque omnes, qui ad tres Ventres pertinebant musculos:
 nunc breuiter eos quoq; aggrediemur describendos, qui ad ARTVS, & primum
 quidem ad MANVM spectare videntur. Hi à me in musculos scapulæ, ossis humeri,
 cubiti, radij, carpi, & digitorum diuidentur. Agemus autem in præsentia de scapula-
 rum musculis, quæ quadruplici ciuntur motu, *antrorsum, retrorsum, sursum, & deorsum*.
 Non tamen singulis motibus singuli destinantur muscoli, quemadmodum in enarra-
 tis quamplurimis, vt nec ideo nostro more appellationes ab vsu deductæ imponendæ
 sint, sed à figura potius appellationes commodæ donandæ.

Scapulæ
 motus.

Primum
 par.

^m Primum ergo *Cucullaris* dicitur, quod cum coniuge suo cucullos monachorum non
 inepte exprimat. Hic primo ^a transuersum ab inferiore parte ossis occipitij versus au-
 rem, vbi ^o finem eius gratia exsculptum diximus, principio carnosum oritur, deinde p-
 recta secundum corporis longitudinem ex processibus posterioribus vertebrarum
 colli, & octo superiorum thoracis, principio membranoso & lato, junctus suo coniugi
 alterius lateris. ^q Hinc versus scapulam ad externum corporis latus procedens, semper
 angustior redditur, donec tandem in totam scapulæ ^r spinam, & ^s summum humerum,
^t basinque fere mediam, & clauiculæ partem, quæ lata est, neruoso simul & carnosum
^u fine inferatur. A Galeno *Trapezius* dicitur, quo nomine Geometræ figuram quadri-
 lateram inæqualibus lineis circumscriptam appellant. Habet enim *quatuor latera*, quo-
 rum ^x primum in osse occipitij transuersum est, carnosum, & primum principium: à no-
 bis constitutum est. ^y Alterum, per spinam vertebrarum ceruicis, & octo superiorum
 thoracis descendit, membranoso, quod secundum initium posuimus, & quo, cum
 suo compari jungitur. *Tertium*, ab externa primi lateris sede incipit, & ad summum hu-
 merum oblique descendit. ^a *Quartum*, à ceruice scapulæ, quæ ad clauiculam est, ad o-
 ctauam vsque thoracis vertebram procedit, circa quam secundum latus desinebat.
 Cæterum cum latissimum habeat principium, & angustum satis tendinem ac finem,
 ipsius fibræ vario quoq; ductu feruntur, ex quibus quædam rectæ sunt, quædam obli-
 quæ. ^b *Rectæ*, quæ medium quasi ipsius occupant: ^c *obliquæ* autem, tum quæ versus hu-
 merum ab occipite ad scapulam *descendunt*, tum quæ à vertebra inferioribus thoracis
ascendunt. Cum ergo versus dorsum scapulam retrorsum moueat, patet omnibus se
 contrahentibus, recta quidem moueri: at oblique sursum, aut deorsum, si vel illæ, vel
 hæ cieantur magis.

Secundū.

^d Secundus, *scapulam attollens*, & *leuator* dictus, à me vero per *jocum patientiæ musculus*,
 quod ægrè ferentes, quæ nobis forte aduersa accidere, scapulam huius ope, cum hu-
 mero, patientiæ amarum ingeminantes nomen, eleuamus. Hic à vertebrarum cerui-
 cis, primæ, tertiæ, quartæ, & quintæ transuersis processibus, ^e quatuor quasi separa-

m, 4. 14. A.
 A. A. 4.
 16. A. A.
 A. B. 4.
 14. B. B.
 m, a. b.
 o, 2. 6. f.
 D. D.
 p, 4. 14. b. d.
 q, a. c. &
 d. c.
 r, L.
 s, M.
 t, N. i
 u, c.
 x, a. b.
 y, b. d.
 z, a. c.
 a, c. d.
 b, x.
 c, æ. æ.

e, 4. 17. m.
 tis in- 1. 2. 3. 4.

et initijs exoritur : secundæ autem processibus non alligatur, tametsi & ab his quandoque proficiscatur. Cæterum hæc mutuo coeuntia postmodum descendunt, totique superiori rhomboidis lateri junguntur, validum carnosumque constituentia musculum, donec ^felatori tandem scapulæ angulo, & lato ac carneo tendine inferantur. Scapulam versus anteriora & colli latera : sed cum humerus scapulæ jungatur, per accidens hunc quoque attollit.

f. 4. 14. O.
g. & ch.

b. 4. 14. D
D. melius
4. 17. B. B.

i. in 4. 14.
conspiciū
B. B.

l. 4. 17. C.
C. C. C.
m. D. D.

n. 4. 15. A.
† 4. 18. E.

q. 4. 19. V
o. B.
p. x x.
q. P. P. P.
r. x x.

f. α.

^h *Tertius, Rhomboides*, à rhombo, quem exprimit, vocatus est. Dicitur Rhombus a *Tertium*.
pud Mathematicos figura quadrilatera, lineis quidem: at non angulis, æqualibus constans. Hic sub ⁱ cucullari immediate situs est, & ^l à posterioribus processibus, siue spinis trium inferiorum colli, triumq; superiorum thoracis, carnosus exoritur, obliquis postea fibris tenuis ad scapulæ ^m basin descendit, cui toti carneus tam lato sine, quam principio ortus est, inferitur. Scapulam ergo sursum nonnihil ad posteriora trahit, dorsoque applicat.
ⁿ *Quartus, serratus est minor*, qui totus sub ^o pectorali musculo in anteriore thoracis *Quartū*.
fede latitat, sic appellatus à ^p principio serræ in modum varijs fibris carnosis acuminatis constipato. Minor autem ad differentiam maioris, cuius historiam sub finem huius capitis trademus, quod ab eo magnitudine superetur. Hic à ^q secunda, tertia, quarta, & quinta, (interdum & à sexta) quatuor puta costis superioribus, dummodo primam demeris, antequam in cartilagine abeant, ^t principio lato, sed in quatuor quasi ferrarum dentes, singulis costis adnexos, diuiso oritur, mox oblique versus scapulam descendens, simulque sensim angustior redditus, in ^c latum tendinem, partim carneum, partim nerveum abit, quo iuxta processum ancoriformem scapulæ implantatur. Huius fibræ oblatum principium inuicem diductæ sunt: si tamen omnes simul agant, recta pectori scapulam admouent: sin superiores duntaxat, sursum magis: at si inferiores, deorsum ducunt.

^z 4. 18. D.
D. His quatuor paribus, quæ communiter ab Anatomicis sic recensentur, ^t *quintum par* *Quintū*.
cum doctissimo Syluio adiungimus, quod vulgo secundum Thoracis par cum Vela-

lio faciunt, & *serratum maiorem* appellant. Nam & insertio neruorum circa serratas compages, me in thorace, non scapula principium habere docuit, & quiuis vel in seipso experiri potest, ab hoc musculo scapulam moueri, si deorsum illam vehementer versus pectus duxerit, & thoraci manum imposuerit circa latera, simul etiam scapulæ circa basin. Nec vero intelligere vlla quiui vnquam ratione, qua musculus hic thoraci mouendo sit, si in mobili scapula principium musculi constituatur, cum tam validæ actioni destinatus sit. Non ergo à scapula, sed à thorace originem nanciscitur, & quidem à ^u costis octo superioribus, nonnunquam etiam nona, antequam in ^x cartilagine desinunt, ^y serratis, & acutis principijs, quibus cum principijs similiter serratis ^z

In thorace non scapula principium habet.

oblique descendens abdominis musculi necitur. Hinc carnosus iuxta costas

ad latera thoracis ascendens, in ^a scapulæ basin interiorem totam am-

plo carneoque sine implantatur. Hic dum ad suum principium

contrahitur, scapulam ad anteriora quidem, vt

ferratus minor, sed versus in-

feriora ducit.

u. HHH.
& c.
x. I. I. I.
& c.

y. a. a. a.
x. 4. 8. a. a.
a. a. elegā-

ter con-

spicua.
o. 4. 18.
b. b.

CAPVT XIV.

De musculis ossis humeri.

HVMERI
ossis
musculi.

Numerus
musculorum.
Primus.

HVMERI OS quinq; cietur motibus. Ducitur *antrorsum*, mouetur *retrorsum*, eleuatur *sursum*, trahitur *deorsum*, deniq; *ingyrum circumuertitur*. Musculi, qui hos motus absoluunt, septem sunt numero, quibus ab vsu nomen largiemur.

^b *Adducens humerum* primus est, *Pectoralis* vulgo à situ vocatus, cum thoracis anteriorem partem occupet. Hic principium habet latissimum à diuersis partibus enatum, etsi vnicum sit & continuum. Nam *in superiore* sui parte à ^c clauicula media, qua parte teres est, & pectori proxima, oritur: *in media*, ^d à tota longitudine sterni, & ipsi annexis cartilaginibus: *in infima*, à sextæ, septimæ, & octauæ costæ cartilaginibus. *Prima pars* carnosæ, *secunda & tertia* membranosa, & neruosa est: vnde & Galenus in tres diuidi posse non male statuit. Carnosus autem statim, & crassus redditur, sensimque angustior versus humerum, & externam corporis partem prope- rans, donec tandem ad latus thoracis in ^e tendinem breuem, sed latum, nerueum, ac robustum desinat, qui ossi humeri secundum longitudinem, non multo sub ipsius capite inter ^f deltoidem attollentem, & ^g cubiti primum flectentem, siue Bicipitem, inseritur. Principium autem, vt triplex quasi est, ita fibræ quoque triplices sunt. Quæ enim ^h à primo principio oriuntur, descendunt: quæ ⁱ à secundo, recta feruntur, at quæ ^l à tertio, ascendunt. Vt ergo cum omnes contrahuntur, recta humerum adducunt pectori: ita, cum primi principij solius, paulo versus superiora: cum tertij, ad inferiora pectoris admovent.

Secundus.

^m *Elevator*, vel *Attollens humerum*, secundus est, *Δελτοειδής*, *Deltiformis*, à figura, quæ Δ Græcorum maiusculum refert dictus, cum sit triangularis, & ferè æquilaterus. Nonnullis à situ etiam *ἐπωμὴς*, quod capiti humeri, ad scapulæ articulum, quem *ὤμων* vocat, insertatur. Hic similiter vt pectoralis, cuius modo historiam retulimus, principium habet latissimum, quod triplex esse videtur, pro triplici parte ex qua enascitur, etsi continuum reuera sit, & vnicum duntaxat. *Anterius* enim ex media clauicula, qua parte lata est, & humero vicina nascitur: *in medio*, à summo humero, qua clauiculæ iungitur: *posterius* vero, ex tota scapulæ spina, non quidem sic, vt tota ossium amplitudo ipsius principijs tribuatur, sed prominentior tantum sedes, & ita veluti ex crassiore linea educantur. Sunt autem hæc principia omnia neruea, ita tamen, vt statim carnea crassaque reddantur, totusque musculus carnosus descendens, paulatim angustetur, donec in validum tendinem, carnosum foris, intus nerueum desinat, qui transuersim in humeri medio sub ipsius ceruice implantatur. Cum ergo triangularis sit, *primum* eius latus erit, quod à media clauicula: per summum humerum, ad scapulæ spinam, ac basin producit: *secundum* quod à clauicula, ab interna parte, qua cum externo pectoralis dicti latere iungitur, ad humeri eam sedem, cui implantatur, deorsum trahitur: *tertium*, quod à basi scapulæ, vbi spina incipit, ad eam vsque partem humeri, cui inseritur, perducitur. Ex his lateribus primum maximum est, duo reliqua mino-

ra, &

ra, & inter se æqualia. Vt autem principia diuersum situm habent, ita quoque fibræ diuersæ sunt. *Primi* principii, oblique ad posteriora: *secundi*, recta deorsum: *tertijs*, oblique ad anteriora, feruntur. His omnibus simul agentibus, recta humerus attollitur: at *primo* principio solo contracto, versus priorem corporis partem & faciem; *tertio* autem, versus posteriora.

ⁿ *Abducens*, tertius est, qui & *Latissimus*, à magnitudine, cum totum fere dorsum cum *Tertius*. suo coniuge tegat, à sædo vsu, quem interdum præstat, scalpendo vel tergendò nates, *aniscalptor*, vel *aniterfor* dicitur: absq; eo enim foret, id officii haud exhiberetur. Oritur hic principio ° membranoso, latissimo, à posterioribus processibus vertebrarum thoracis, qui à sexta eiusdem vertebra ad ossis sacri medium pertinent: tum vero & à superiore ossis ilium parte: mox superiora petens, ubi ad eam sedem dorsi peruenit, qua costæ incuruantur, membraneus esse desinit, carnosusque redditur, ac p̄ scapulæ angulum inferiorem superuehitur, ubi angustatus, valido breuique ꝑ tendine, at lato, infra humeri caput superius, inter pectoralem dictum, & rotundum detrahentem, inseritur. Huius tendo, cum tendine pectoralis, cavitatem quæ in ala est, constituit: cum ille internum, hic externum ipsius latus conficiat. Cæterum, quia latissimum habet principium, alias quidem fibras sublimiores, alias humiliores nactus est, ex quo fit, vt omnibus licet retro trahatur humerus, illis tamen solis agentibus, magis versus superiorem, his contra ad inferiora deprimatur.

ⁿ *Deprimens humerum*, quartus est, qui *Rotundus* quoque dicitur, & à parte posteriore *Quartus*. situm habet, oblique sub ala. Carnosus est, crassiusque, ac si cum alijs humeri musculis conferatur teres: vnde *teres* potius, quam rotundus ab iis vocaretur, qui latinæ linguæ proprietatem sanctius obseruandam censent. Rotundum enim dicitur, quod sphericum est; at teres quod longum, nec angulosum, vt hic musculus. Quicquid sit, oritur hic musculus carnosus initio, ex ^t inferiore angulo scapulæ, sicque carnosus inferiori ipsius costæ adhærens, progreditur, ad cuius medium ubi peruenit, eam deserit, & modice sursum delatus, tendine nerueo breui, sed lato validoque, humero, eadem ipsa regione, qua primus humeri musculus adducens pectoralis inferebatur, infigitur, cum ipsi contrarium motum perficiat. Vtunque autem brachium suo pondere deorsum moueatur, indiguit tamen hoc musculo, tum vt nostro pro arbitrio motum hunc obiremus, tum vt versus inferiora duceretur tunc etiam, quoties à suo pondere auxilium non habet, vt quando in lecto, aut stragulis recumbimus. Est autem multo minor deltoide, suo contrario; quod maior vis requiratur ad eleuandum aliquod pondus, quam ad deprimendum. Hinc videre licebit, omnes depressores, attollentibus sibi contrariis minores esse. Sic validissimus est maxillam inferiorem attollens, Temporalis: longe infirmior deprimens, Biuenter.

ⁿ *Circumagentium humerum* tres sunt, ex quibus ^t *primus*, si *per scapularis superior*, carnosus *Quintus*. & oblongus, inter scapulum superius totum occupat. Oritur enim à scapulæ basi, quæ supra spinam est, & antrosum recta procedit. at ubi ad superiorem ceruicis scapulæ partem peruenit, sub secundo humeri (ab alijs vocato) ligamento, huius gratia (vt ^u supra demonstraui) instructo delatus, tendine lato, & valido articulum superuectus, ad ^x *Circumagentium secundus*, & *super scapula* *Sextus*. articuli ligamentum, oblique ceruici inseritur.

ris inferior, infernum inter scapulum integit. Hic à scapulæ basi, quæ infra spinam est, carnosio principio, enatus, antrorsum fertur, & angustior factus, tendine lato breuique, humeri ligamento quarto, quod sui causa conditum, inferitur. y Circumagentium tertium, y, 4. 12. C. subscapularis, in cavitare scapulæ situs est, quam totam occupat. Oritur ex basi tota interiore parte carnosus, talisque permanens, anteriora petit: sed in progressu sensim ad ceruicem scapulæ angustatus, tendinem tandem acquirit latiusculum, quo in humeri ligamentum alterum implantatur. Musculi hi postremi humerum, & per consequens, totum brachium circumagunt, vnde & nomen habent: sed subscapularis ad interiora; super-scapularis inferior, ad exteriora, quemadmodum & superior, sed hic simul modice eleuat. Horum vsus commodissime demonstrari potest, si brachium totum in media figura ponatur, & postea, neque humero à pectore abducto, neque mutata figura media humeri cum cubito, cubitus ad exteriora ducatur, rursusq; ad interiora.

CAPVT XV.

De musculis ossis Cubiti.

OSSIS CUBITI duobus agitur motibus. Flectitur enim, & extenditur recta. Vterque motus duos habet musculos, vt in vniversum quatuor sint, qui ad cubitum pertinent; illi, in anteriore; hi, posteriore humeri sede siti sunt.

² FLECTENTIVM ergo *primus*, nobilis apud Italos, quibus *Pisetto* dicitur, siue *Pisciculus*: vel, quia piscis figuram refert: vel, quia piscis instar sub cute velociter agitur. Authoribus communiter *Biceps* vocatur, quod capite, siue principio gemino, eoque distincto à scapula prodeat. ^a Alterum enim, quod exterius est, tendineum, acteres, à superiore supercilio acetabuli scapulæ pronascitur, & sub ligamenti articuli, supra caput humeri, per ^b fissuram in hoc osse, eius gratia constructum, defertur, vbi ^c ligamento ex illo canali pronato, inuoluitur: ^d alterum, priore latius, partim extendine, partim ex carne constans, à ^e processu scapulæ ancoriformi enatum, internum humeri caput superuectum, descendit, tandemq; infra ipsius caput cum priori ^f coiens, ^g validum ac carneum musculum constituit. Inferitur autem hoc loco ^h carnosa quædam portio, in humeri medium, vbi priuatam asperitatem habet, pro eius eleuatione, quam ⁱ nonnulli peculiarem musculum facientes, ad humerum referre conati sunt, credentes cum pectorali conspirare, & humerum pectori adducere. Verum Biceps ipse musculus, mox ab humero abscedens, ^l subiectum sibi alterum flectentem conscendit, & partim teres, partim carnosus factus, paulatim angustatur, donec in robustum ^m tendinem, crassum, teretem, ac neruosum finiat, qui in ⁿ tuberculum oblongum, sub capite superiore radii, huius gratia exsculptum, inferitur. Atque hic est ille tendo, qui in Venæ sectione ab imperitis Chirurgis sæpenumero lædi, magno cum ægrotorum periculo solet. Quin imo vulnera ipsi etiam musculo infligta, grauissima sunt, tum quia tendines habet in duobus initiis, tum quia Nervi sub ipso, Venæ, ac Arteriæ insignes incedunt. Occupat autem in situ suo internum potius ossis humeri, quam externum latus. ^o Flectentiū *secundus*, *Brachienus* vocatus, primo subiacet, quo etiam breuior est, penitus carnosus. Hic externum anterioris ossis humeri latus, & mediam inferiorem ipsius longitudinis sedem, cui etiam proxime,

OSSIS
Cubiti
musculi.
Motus
cubiti.
Flecten-
tes.
Primus.

Secundus

z, 4. 19. C.
† P. & 4.
20. G. H. I.
a, H.
b, 2. 9. 8 &
9. e.
c, 4. 19. b.
b.
d, I.
e, F.
f, K.
g, G.
h, N.
i, vide
explica-
tionem
tabula-
rum, lite-
ra N.
l, L.
m, c.
n, 2. 9. 14.
& 15. o.
o, 4. 19. R.
& 4. 20. I.
M. N. O.
me,

p. 4. 20. I. me, ac immediate adnatus est, occupat. P Nascitur enim circa medium ipsius, vbi hume-
M. rum attollens deltoides, & pectoralis adducens inferitur, principio carnosio, lato, ac du-
plici, partim versus externum, partim versus internum latus: illud, paulo sublimius est;
hoc, paulo inferius. Inter vtrumque autem nudum spatium in osse intermedium relin-
quitur, mox tamen in vnum coeunt, & humeri ossi validissime adnata, musculum carno-
sum, & quo magis descendit, & ampliores redditum, constituunt, donec ^t lato & carno-
so fine, tandem in ligamentum articuli, cum cubiti ac radii appendicem, anteriore sede,
implanteretur. Hi duo muscoli, cum rectas habeant fibras, recta cubitum flectunt, nec vn-
quam in latus declinant.

f. 4. 19. S. S. EXTENDENTIUM primus, in posteriore humeri facie, sed interna sede situs, duplici Exten-
& 4. 20. I. constat principio, ^t vno valido latoque, quod partim carneum, partim nerveum, ex-
R. R. S. S. inferiore scapulæ costa, paulo sub cervice, vbi sinus peculiaris eius gratia exsculptus est, dentes.
nonnihil enascitur, carnosumque deinde factum, recta descendit, & humero iuxta internum la- Primus.
extra sitū tus connascitur, procul ab ipsius cervice, iuxta insertionem musculi tertii humeri, vbi
lenatus. cum ipso ^u alterum principium carnosum, ibi enatum, commiscetur, ita vt vnus fiat mus-
t. B. culus, qui per medium humeri, inter externum & internum latus, partim carnosus in-
u. R. tus, partim nerveus foris, defertur, donec tandem ad internum latus posterioris olecra-
ni processus, implanteretur.

z. 4. 19. T. EXTENDENTIUM secundus, externam sedem occupat, & à cervice humeri, ac proprie, ab Secundus
eius capitis radice, principio nervoso, enascitur: mox carnosus redditus, descendit, ac vbi
ad dimidium longitudinis humeri peruenit, cum prædicto ita commiscetur, vt à se nullo
modo separari queant, sicque vnus quasi musculus ex vtroq; fiat. Hic tandem in exter-
num olecrani latus, præsertim parte illa, cui innititur, partim carneus intus, partim ner-
ueus foris, inferitur. Hi duo muscoli, similiter vt flectentes, rectas fibras à principio ad fi-
nem vsque habent, quamobrem & recta cubitum extendunt.

CAPVT XVI.

De musculis Radii.

RADIUS duobus motibus agitur; vno, per accidens, cubiti osse moto, cum quo vna RADI
flectitur, & extēditur; altero, per se, quando immoto cubito, vel intro, vel extrorsum musculi.
ducitur, & sic manum pronam reddit, aut supinam. Duo ergo erunt musculorum Radio Motus
inferuentium genera: quorum illi, ab vsu Pronatores; hi Supinatores, vocantur. Illi, internum radii.
cubiti latus: hi, externum occupant.

y. 4. 24. I. Y PRONATORVM primus, siue Quadratus, totus carnosus, ab ^z inferiore & inter- Pronato-
R. nacubiti parte, prope ^a carpum duorum digitorum latitudine enascitur, transuersim rum
z. e. e. ^b supra ligamentum, quod radium cubito iungit, ^c ad radium progreditur, & interio- Primus.
a. S. ri ipsius lateri, ^d sine iuxta cum principio æquè lato implanatur, sicque Quadratum
b. I. Mathematicorum exprimit, cum quatuor latera, & fere æqualia habeat. ^e Pronato
c. H. H. rum secundus, siue Teres, à radice ^f interioris humeri tuberculi, & ab interno latere of- Secundus
d. f. f. sis cubiti, siue vlnæ, qua humero iungitur, prodit, ibique cum radio, valido & carno-
e. C. C. so principio nectitur, hinc obliquo ductu per internū s radii latus progreditur, ^h cui pau-
f. B. lo ante
g. H. H.
h. b.

lò ante medium longitudinis, carnea insertione implantatur, à qua aliud mox caput neruofum enascitur, quod versus medium radii pergens, eiusdem radii externo lateri adnectitur, ea parte, vbi huius gratia asperitatem obtinet. Hi duo muscoli dum ad principia sua contrahuntur, Radium antrorsum mouent, & sic manum, quæ radii inferiori parti, beneficio carpi, connectitur, vna pronam reddunt, illo, inferiorem: hoc, superiorem partem commouendo.

Supinatorum
Primus.

Secundus

Supinatorum ⁱ primus, siue Longior, quod omnium, qui cubitum perreptant, musculorum, longissimum ventrem obtineat. Hic ¹ ab externi humeri tuberculi acie carnosus enatus, ^m radio oblique insternitur, & vbi ad imam radii partem peruenit, ⁿ intendinem membraneum degenerat, qui ^o superiori parti appendicis imæ radii illigatur, non nihil in partem internam vergens. P ^{Supinatorum secundus}, siue tenuior, aut brevis, secundo pronatorum, figura, & situ non dissimilis, ab ^q externa parte ligamenti articuli inferioris humeri capitis: & à cubiti posteriore processu carnosus enascens, oblique, foris membranofus, intus carneus, progreditur, & ^r in radium fere medium valide implantatur. Hi duo muscoli, sese ad principia contrahentes, versus exteriora radium ducunt, sicque manum resupinant, sed ille, inferiorem; hic, superiorem partem trahit.

i, 4. 28. 1.
C. + 4. 28
2. D.
l, a.
m, E.
n, b.
o, d.
p, 4. 28. 2.
E. perfecte
4. 28. 1.
D. non nihil, in situ tamen cernitur
4. 28. 3. D
q, a.
r, b.

C A P V T XVII.

De musculis Carpi, vel potius toti manui dicatis.

CARPI
musculi.
Motus
Carpi.

CARPO, siue Brachiali, tres motus competunt. Flectitur enim, extenditur, & in latera mouetur. Ex his moribus flexio & extensio, proprios habet musculos: at motus, qui in latera fit, à flectente & extendente illius lateris, ad quod mouetur, si simul agant, perficitur. Vtrique autem motui, duo dicati sunt muscoli, ex quibus alter internum, alter externum cubiti latus occupat, vnde vel externos, vel internos vocabimus. Qui flectunt, anteriore sedem tenent, & ab interno humeri tuberculo oriuntur: qui extendunt, posteriorem, & ab externo tuberculo enascuntur. Cæterum cum Manus, beneficio Carpi, Radio iungatur, fit, vt flexo, vel extenso brachiali, Manus simul flectatur, extendatur, & in latera trahatur.

Flectentium
interior.

Exterior.

P FLECTENTIVM ergo interior, carneo nerueoque principio, acuto, q ab ossis humeri tuberculo interiore exoritur, ^r carnosus deinde per totam cubiti longitudinem, cui immediate adnatus est, progreditur, & ad carpum in tendinem, partim ^r nerueum, partim ^t carneum degenerat, qui in carpi os quartum primi ordinis inseritur. Hic sub ligamento transuerso non transit: sed tantum communi omnium musculorum membrana inuoluitur. ⁿ Flectentium exterior, ^x ab eodem tuberculo, nec longe à prædicto enascitur: hinc transuersim non nihil iuxta latus externum primi digitos flectentium, qui ipsi magna ex parte subiicitur, radio adhærens, incedit. Antequam autem carpum attingat, circa ipsius radicem in ^z tendinem teretem degenerat, qui illic tamen non desinit, sed transuerso ligamento adnatus, vltra ipsum per internam partem progreditur, & latior redditus, in radicem ossis metacarpi, indici præposito, inseritur. His duobus simul agentibus, Carpus, & cum ipso Manus recta flectitur: at alterutro agente, oblique non nihil in latus illius, qui contrahitur, mouetur.

p, 4. 22. 1.
K.K. 4
21. 1. 2.
R.R. 4
23. 2. O.
+ 4. 24. 1.
D.D.
q, B.
r, K.K.
s, c.
t, d.
u, 4. 22. 1.
L.L. 4
21. 1. 2.
V.V. + 4.
24. 1. G.
x, B.
y, D.D.
z, f, f.

EXTEN-

a, 4. 27. 2

C. C.

b, E. E.

c, A.

d, K.

e, f. f.

f, g.

g, h.

h, N.

i, a. B. B.

l, a.

m, B. B.

n, F. F.

o, b.

p, circa

superius

c. & d.

q, circa

inferius

c. & d.

r, K.

f, d.

z, L.

u, M.

x, 4. 21. 1.

y, 2. b.

z, fig. 1. D.

a, V. & R.

b, 4. 21. 1.

C. + 4. 22

1. C. C. C.

c, a.

d, D.

e, E.

f, b.

g, N. & O.

O. O.

h, G. G. G.

G.

EXTENDENTIUM^a interior,^b cubito incumbens, à radice^c externi humeri tuberculi, & à summo cubito initium sumens, per illius longitudinem fertur, qui cum ad^d carpum accesserit, in^e tendinem teretem, ac validum abit, quo supra^f cubiti inferiorem appendicem, in sinum, iuxta^g styloidem processum, & in^h ossis metacarpii, quod minimo digito subtenditur, partem superiorem, non procul à carpo implantatur. ⁱ Extendentium Exterior. exterior, ab acie illa ossea, quæ in humero est, supra tuberculum exterius, ^l latiusculo principio exoritur, ^m inde carnosior factus, perⁿ radium progreditur vsque ad dimidium longitudinis, quo cum peruenit, in validum^o tendinem degenerat, qui statim in^p duos fere rotundos diuiditur, latiores tamen, quàm crassiores, sicq; ambo per radium descendunt, non nihil à se inuicem^q discedentes, sub ligamentum transeunt, magis inter se diducti, & vbi supra^r carpum progressi sunt, ^f alter in metacarpii^t os primum, indicem sustinens: alter, in^u secundum, medio substratum, inseritur.

CAPUT XVIII.

De musculo cuius latus tendo media vola subnascitur, quem Palmarem vocant.

SVB cute in manu^{*} latus quidã tendo visitur, qui ortum habet, interdum^y à musculo, vt cæteri tendines: interdum^z musculo caret, & solus sic expanditur. Vtriusque historiam nunc trademus, exordientes ab illo, qui à musculo carneaque substantia oritur, quod plerumque huiusmodi inueniatur. Vocatur autem hic musculus palmaris, à tendine, qui palmæ manus subtenditur, totamque fere inuestit. Hic in cubiti anteriore, vel (si mauis dicere) interna regione, inter^a duos carpum flectentes quibus vtrunque adnascitur, situs est, cæteris sibi sitis musculis omnibus superstratus. Oritur autem ab^b interno tuberculo ossis humeri, rotundo nerueoq; ^c principio, mox carnosus redditus, dētre tamen angusto, antequam ad dimidium longitudinis cubiti peruenit, non nihil oblique defertur, & attenuatus, in^e tendinem teretem & longum degenerat, quo vltius progressus, carpi ligamentum internum transcendit, & vbi volam attigit, in^f membranam latissimam expanditur, quæ cuti valide adnascitur, per totam volam fertur, demptis^g duabus partibus, quarum illa minimo, hæc maximo digito subiacet, donec ad digitorum radices, & prima internodia peruenierit, vbi in^h internum cuiusque eorum latus terminatur.

Musculum hunc interdum geminum in vtroq; brachio, & ab eodem loco exortum fuisse, doctissimus Fallopius obseruauit. Vnus tamen duntaxat in tendinem latum definebat, qualis descriptus à nobis est: alter, in ligamentum illud transuersum carpi inferebatur.

Quod sitendo hicⁱ sine musculo reperiatur, quemadmodum non semel inueniri solet; tum ipse vel à tendinibus duorum musculorum carpum flectentium, qui iuncti inter se, antequam ad carpum perueniant, lateſcunt; vel ab^l interno carpi ligamento, exoritur. Huius vsus est, non, vt sine pilis palma seruetur, aut sensus esset acrioris, cum è regione pollicis & minimi digiti, quibus partibus non subtenditur, non minus & pili ab-

sint, & ad sit sensus: sed potius, ut cutim volæ in apprehensione validius attrahat & corruget, ne cutis mobilitas, firmam rerum comprehensionem impediat.

Caro quædam quadrata. Solent autem ad externum huius tendinis latus, ^m caro quadam quadrata reperiri, quam ^m, P. nonnulli pro peculiari musculo habent, quamvis effigiem musculorum tenuium ac brevium modo duorum; modo etiam trium, referat. Oritur autem à membrana carnosa, tegente illam regionem, ubi situm est octavum carpi os, & supra ⁿ abducentem minimum digitum incedens, in ^o latus externum huius tendinis inferitur, ut ipsum, cum manum aperimus, extendat. ⁿ, N. ^o, c.

C A P V T XIX.

De musculis manus digitos flectentibus.

DIGITI manus flectuntur, extenduntur, aut in latera moventur. Quare tria erunt musculorum genera, qui digitis operam locant, Flectentes, Extendentes, & Oblique moventes. At cum Pollex à cæteris plurimum variet, in singulis generibus, alii erunt qui digitos, alii qui pollicem flectent, extendent, vel ad latera ducent. Agemus primum de flectentibus digitos, propterea quod ipsi in cubito positi sint, à quo discedere nobis religio sit, non diligenter prius omnibus in ipso perspectis.

Digitorum flexores. Musculi igitur digitos flectentes à nobis vocantur, qui quatuor digitorum phalanges, excepto pollice, incurvant. Horum sex sunt, ex quibus primus, secundum digitorum os flectit, unde ab usu, (nostro more) Flexorem secundi digitorum internodii vocabimus: alter, tertium os flectit, unde Flexor tertii internodii dicitur: reliqui quatuor, primum articulum curvant. Quamvis autem non ignorem, tertium os circa secundum flecti haudquaquam posse, quia tamen ille secundo, hic tertio inseritur, ab usu primario nomen hoc ipsis remanebit.

Flexor secundi internodii. DIGITORVM ergo p secundi internodii flexor ille est, qui ab q humeri tuberculo interno, principio tereti, aliquantulum nervoso, sub ^r principiis musculi palmaris, & f duorum carpi flectentium enascitur: hinc ^r carnosus latiorque redditus, versus medium radii, & cubiti, utriusque, nonnihil in hærens, descendit: inde ulterius progrediens, ex toto carnosus ac rotundus prope carpum redditur, ad quem antequam perveniat, in ^u quatuor carnosas partes dividitur, quarum quælibet in ^x tendinem exquisitè rotundum, nervæum, ac pellucidum abit, qui omnes simul membrana quadam communi, tenui ac mucosa involuuntur, quo tutius iter faciant, sicque sub interno carpi ligamento transeunt, & ad digitos per velam properantes, in quatuor digitorum secundum os, latiores & tenuiores facti, minores tendines, in minora ossa, & maiores, in maiora implantantur, cum tendinum magnitudo ossium magnitudini respondeat. Cæterum dum digitorum prima ossa perreptant, ligamento transverso, quod ab vno ossis latere ad alterum pertinet, & per quod etiam subsequenter musculi tendines transeunt, tanquam fornicibus subiciuntur. Prohibet autem hoc ligamentum, quo minus sua ex sede, & à digito declinent tendines, vel contracti eleventur nimis, præsertim ubi secundum, aut tertium digitorum articulum flectimus, ex quo rum cutis attolleretur, tum vola nimium impleretur. Prius autem, quam secundum digitorum os attingant, ^z singuli longa se-

ctione

p. 4. 21. 1.
& 2. in suo
situ, at nō
totus 4.
22. 1. D. D
fere totus
4. 22. 2.
totus sed
extra sitū
nonnihil.
B. B. † 4.
23. 1. C. C
C.
9. 4. 22. 1.
B.
r, x.
f. K. & L.
t, D. D. I.
u, 4. 22. 2.
a. a. a. 2.
x, b. b. b.
y, C. C. C
C.
7. c. c. c. c.

etione finduntur, rimamq; efficiunt, per quam transeunt tendines sequentis, qui tertium digitorum os flectit.

^a *Flexor ergo tertii digitorum internodii*, b dicto totus substernitur, siue principium eius, seu ventrem, aut tendines consideres. Adnectitur autem interno sui latere cubito: externo, primo pollicis flexori. Originem ergo ducit parte, & quidem exigua, ab ^c interno humeri tuberculo, reliqua tota ab anterioris olecrani processus radice. Hoc initio facto, exacte ^d carnosus & teres efficitur, non secus ac dictus, sicque ad ^e cubiti latus descendit, cuius mediam partem ubi superauerit, angustior redditur, & in ^f quatuor carnosas partes, perinde ac primus, dividitur, quæ antequam ad carpum pertingant, in quatuor tendines degenerant, eo crassiores prædicti musculi tendinibus, quo ipse totus toto crassior est. Inuoluuntur autem hi tendines membrana nervosa, lubrica, ac humida, magisque quam aliæ membranæ rubra. Transeunt autem sic recti annulare capilamentum, quemadmodum prioris tendines, quibus ubique subiiciuntur. Ab hac ubi recesserint æqualiter inter se diducuntur, teretesq; facti, ad digitos tendunt, horum ligamenta, & fissuras tendinum primi transeuntes, tandem in tertium internodium, latiores redditæ implantantur.

*Flexor
terti digi-
torum
interno-
dii.*

^h *Flectentes primum internodium*, teretes sunt, oblongi, ac graciles, vnde à similitudine, quam nonnihil cum lumbricis habent, *lumbricales* sunt dicti. Hi ⁱ initium suum ducunt à membranæ, quæ quatuor tertium digitorum internodium flectentis tendines inuoluunt, carnosæ postea progredientes, tandem in primum internodium tendine tereti, ac nervoso, inferuntur.

*Flexores
primi in-
ternodii.*

Pollex flectitur, sed flectitur tribus internodiis, variisq; modis: quare pollicis flexorum alios primi, alios secundi, alios tertii internodii, doctrinæ gratia, vocabimus.

*POLLICIS
flexores.*

¹ *Primi internodii pollicis flexor primus*, à ^m ligamenti annularis, quod in carpo est, sede superiore, qua parte pollicis substat, carneus exoritur, ascendensq; pollicis ossis primi toti internæ regioni adnectitur, carnosusq; in superius ipsius capitulum inferitur. *Secundus*, partim ex eodem loco, partim ab osse carpi, pollicis substrato, enatus, in radicem primi ossis pollicis, vsq; ad mediam longitudinis implantatur. Dicto totus subiicitur, à quo magnitudine etiā plurimum superatur. Hi duo pollicis os flectunt, ac manui adducunt.

*Primi in-
ternodii
pollicis
flexor
primus.
Secundus*

ⁿ *Secundi internodii pollicis flexor primus*, ab osse metacarpii indicem fulciente exoritur, paulo sub ipsius capitulo, principio carnosus, lato, sed tenui, sicque progrediens versus pollicem, sensim angustior redditur, ut triangulū perquam referat, in capitulum inferius secundi ossis pollicis tendine membraneo, qua parte indicem spectat, inferitur.

*Secundi
interno-
dii polli-
cis flexor
primus
Secundus*

^o *Secundus*, prædicto ab inferiore parte contiguus, ex media sede ossis metacarpii, medio digito præposito, lato principio enascitur, sicque ad pollicem progrediens, in medium secundi ossis pollicis, parte interna implantatur. ^p *Tertius*, secundo contiguus, à metacarpii osse annularem sustinente, similiter latiusculus exoritur, & eodem loco, ubi secundus, desinit. Quinque hi musculi omnes carnosæ sunt: ex quibus duo primum internodium flectentes, una cum abducente pollicem, pollicis monticulum sic vocatum à Chiromantis: at tres secundi internodii, quicquid inter lineam vitalem & monticulum dictum, carnosum interiaceret, constituunt. Flectunt autem secundum os versus reliquos digitos, sic quidem, ut *simul agentes*, pollicem indicis lateri apponant; at *singulis*, ad vo-
lam

Tertius.

Quartus

lam vsque perducant, & *primo* quidem, ad partem, quæ sub indice est; *secundo*, quæ sub medio: at *tertio*, quæ sub annulari. *Quartus* autem, his tribus substratus, perinde ac ipsi carnosus, ab osse metacarpii indici subdito, infra medium, vsque ad articulum cum carpo, enascitur, ac eodem, quo dicti modo, ossi secundo pollicis iungitur. Hic pollicem indici admo-
uet, & superponit.

*Tertii
internodii polli-
cis flexor.*

¶ *Tertii internodii pollicis flexor vnus* est, qui non in manu, vt prædicti: sed in cubito carnea sui parte situs, totoque ductu secundo digitos flectenti musculo, latere externo adiacet, cui ad exortum aliquantulum est cõtinuus. Principium habet carnosum, ac teres, ab osse cubiti prope sinum in quo radii caput suscipit, deinde per radii totam longitudinem progreditur, à quo, eidem firmiter adnatus, vbique principium aliquod ducit, quemadmodum etiam à ligamento illo membraneo, quod radium cubito iungit. hic vbisic progressus ad carpum peruenit, in tendinem teretem, & nerueum propria membrana mucosa inuolutus, degenerat, qui per ligamentum transuersum carpi, cum tendinibus duorum digitos flectentium transiens, & per sinum ossis carpi pollicem fulcipientis huius tendinis gratia insculptum, inter musculos, primum, & secundum pollicis os flectentes, occultatur: hinc ligamento transuerso, quod in secundo pollicis osse est, exceptus, in eius tertium os, tendine nonnihil dilatato, valide inseritur. Flectit tertium pollicis internodium, cui infigitur.

q, 4. 22. H
H. & 4. 23
fi. 1. G. G.
nonnihil
extra si-
tum. at t
ib fig. 2.
M. M.

CAPVT XX.

De musculis manus digitos extendentibus.

EXTEN-
SORES DI-
GITO-
RYM.

¶ **Q**uemadmodum alii erant musculi, qui digitos flectebant, alii qui pollicem: ita qui extendunt eosdem, diuersi sunt ab iis, qui pollicis extensioni destinantur. Extenduntur autem in digitis, tertium, & secundum os, ab iisdem & simul, (cum alterum absq; altero extendi nequeat) primum vero peculiare musculos habet.

*Secundi
ac tertii
internodii exten-
sores.*

Primus.

¶ *DIGITORVM* ergò *extensor primus* ^f trium interiorum digitorum ^t *tertium* & *secundum os extendit*, & ab ^u humeri tuberculo exteriore oritur, initio partim carneo, partim nerueo, statimque carnosior factus, inter ^x duos carpum extendentes descendit, ac iuxta carpum angustior redditus, in ^y tres carnosas partes finditur, quemadmodum flectentes longi, qui mox degenerant in ^z tendines nerueos pellucidos, exacte teretes, & ligamento membraneo, à radii appendice pronato, colligati, sicque vna per sinum in externa radii parte exsculptum, ad carpum deferuntur, vbi transeunt ^{yy} ligamentum annulare, mox à se diducuntur, latioresque fiunt, ac primus indicem, alter medium, tertius annularem digitum petit, ac in ^{zz} secundum & tertium internodium inferantur. Tendines autem hi vsque ad extremum tertii ossis apicem pertingunt, ac sub ipsis vnguibus recumbunt. Ex quo causa petenda est, tam sæui doloris, quem experimur, si quando dolorifici quid circa illas partes fuerit. ^a *Extendentium secundus*, ab ^{aa} eodem tuberculo, acuto principio, & nerueo nascitur, à quo prior, cui ad ^b medium ventrem etiam sic commiscetur, vt ad exortum prorsus vnus esse videatur. Hic iuxta cubitum pro-
grediens, vbi ^c ligamentum transuersum superauerit, in ^d tendinem nerueum, ac te-
retem

7, 4. 24. 2.
D. D. + 4.
27. 1. c. c.
f, nu. 1. 2.
3.
2, III. & II
u, B.
x, L. & M.
y, b. b. b.
3, F. F. F.
yy, E.
zz, II. &
III.
a, 4. 24. 2.
N. N.
aa, B.
b, c. & d.
c, E.
d, e.

Secundus

retem abit, qui ad minimum digitum, latior factus progreditur, ac secundo, & tertio eius internodio implantatur.

Primum verò internodium extendunt, octo illi musculi, quos *Interosseos* vocabimus, tum scilicet, cum duo simul agunt, ut capite sequenti dicemus, cum ad eum potius, quam ad hunc locum referendi videantur.

e. 4. 27. f. g. 1. G. f. g. 2. H. *e* **POLLICIS tertium os extendens**, à cubiti exteriori sede, ad eius lineam asperam, carnosus exoritur, ubi ligamentum est membraneum, quod cubitum radio iungit, ad radium oblique defertur, cuius appendicem priusquam attingit, in tendinem teretem degenerat, ac sub ligamento transverso ad manum abit, ac totius pollicis longitudini, quæ indicem spectat, ad eius tertium os usque inseritur. *f. H. + f. g. 2. I.* *f* **Secundus, secundi & tertii pollicis internodii extensor**, ab eadem cubiti linea iuxta ipsius longitudinem carneus enatus, oblique supra radium conscendit, & in duas impares partes sibi mutuo hærentes diuiditur, sinuque proprio in radii appendice inciso, insidet, ac ligamento peculiari obducitur. *Superior* portio aliquandiu carnea remanet, at postea in tendinem teretem degenerat, qui in os carpi, pollicis subiectum, inseritur: at *inferior*, statim ac paululum processit, in portiones duas carneas subdiuiditur, quæ singulæ in tendinem finiunt, quorum alter radici primi pollicis internodii, alter membranoso nexu, secundo & tertio pollicis ossi validissime adnascitur.

Primi internodii extensores.

POLLICIS tertium os oblique extendens.

Secundus tertii & secundi pollicis internodii tensor

C A P V T XXI.

De musculis manus digitos oblique ad latera trahentibus.

DIGITI præter flexionem, & extensionem etiam ad latera mouentur, sicque adducuntur, vel abducuntur. Dico *adduci*, cum versus pollicem trahuntur: *abduci*, cum contra ab ipso retrahuntur. Eodem autem pacto, & *pollex* ipse *adduci* dicetur, aut *abduci*, cum vel digitis admouetur, aut ab ipsis remouetur. Musculi qui hos motus perficiunt, plures sunt, ex quibus quidam, ut octo priores, *communes* quasi sunt, & in genere quatuor digitis destinantur, (excepto pollice,) duo alii *proprii* sunt, alter indicis, alter minimi. Pollex deinde suos quoque habet peculiare.

g. 4. 26. I. F. G. H. + 4. 26. 3. E. E. F. h. a. a. a. 2. G. H. G. H. G. H. I. F. II. 4. 23. 2. H. *Communes* ergo octo sunt, qui vulgo & *Interossei* à situ vocantur, quod inter ossa metacarpi positi sunt. *Sunt* autem octo, carnei, ac teretes, ab iisdem quibus connascentur ossibus exorti, secundum quorum longitudinem totam, recta feruntur. Hi ubi ad digitorum radices perueniunt, in *h* tendines abeunt, qui lateribus digitorum, quibus connati erant, attensi, usque ad secundum internodium tendine suo feruntur. *Sunt* autem *i* sex in tribus internodiis ossium metacarpi locati, adeo ut bini in singulis, ex quibus vnus ad anteriorem, alter ad posteriorem digitum defertur. *1* *Alius* deinde primo ossi metacarpi eiusdem, quod *Indicem* sustinet, incumbit ea parte, qua pollicem respicit: *11* *Alius* ultimo ossi metacarpi parte manus externa, siue in dorso, adhæret. Musculi hi *quatenus* reliqua quoque præter primum internodium suis tendinibus attingunt, secundum etiam, ac tertium os extendunt, quod primum à Galeno obseruatum est, I. Vsu part. 18. Et hæc causa est, cur digitorum extensore abscisso, digitorum extensio tamen non aboleatur, quia scilicet interossei simul agentes, extensionem perficiant. *Quatenus* autem primo ossi implantan-

Digitos abducentes.

Interossei.

tur, si contrahatur vterque vnus digiti, primum internodium extendunt: at si alteruter, tum abducit, aut adducit.

Indicem abducēs. ^m *INDICEM abducens*, duobus extendentibus digitorum inferiores duos articulos, secundum scilicet & tertium, subiicitur. Oritur hic à cubito medio, qua parte oblongam & asperam lineam pro eius exortu os habet, principio exacte carnoso; hinc oblique ad radium descendit, & carpi appendicem conscendens, in tendines duos dissecitur, qui postea per sinum proprium, in radii appendice exsculptum, sub ligamento annulari versus manum deferuntur. Horum superior ad indicis, inferior ad medii digiti radicem oblique implantatur, vt inuicem à pollice abducatur. m, 4. 27. 2 F.

Minimi abducēs. ⁿ *Minimum digitum abducens*, in vola manus positus est sub minimo digito, brevis, at validus, ab osse quarto carpi, carnosus enatus, postea per metacarpium delatus, ossi primo minimi digiti, latere externo, gracilis, & nerueus inferitur. Hic minimum digitum à cæteris abducit; & præcipuum vsum habet, dum sphericas figuras appræhendimus, eū eo tempore maxime à cæteris digitis minimus sit abducendus. n, 4. 26. 2 D. & 4. 24 1. O. † 4. 26. 1. E.

Pollicis abductor. *POLLEX ad latera dum mouetur*, vel abducitur à cæteris digitis, vel adducitur. ^o *Abducens*, à carpi ossis pollicem sustinentis interiore parte, neruoso principio, iuxta primum flexorem primi pollicis internodii, nascitur: mox carnosus factus, deorsum fertur, & in primum pollicis internodium, tendine membranaceo inferitur. hic ab indice abducit. o, 4. 23. 1. Q. & 4. 25 1. A. E. † ib. ff. 2. A. p. 4. 27. 2 O.

Pollicis adductor. *Adducens*, spatium quod inter pollicem & indicem visitur, in externa manus sede, occupat. Hic ab ossis metacarpii, quod indicem sustinet, partis posterioris latere externo carneus oritur, & in pollicis internodii primi totum latus internum carnosus inferitur. Adducit pollicem ad indicem.

C A P V T XXII.

De musculis Femoris.

CRURIS musculi. **E**X artibus Manum vidimus: sequitur nunc, vt Cruris quoque musculos videamus, qui pro partibus cruris varii sunt, adeoque alii femoris, tibiæ, pedis, alii digitorum.

Femoris morus. *FEMUR*, triplicem motum habet: extenditur enim, flectitur, & in gyrum mouetur. *Extenditur*, cum femur versus exteriora ducimus, quemadmodum cum diuaticatis admodum cruribus stamus. Extendimus autem vel *recta*, cum recta ab altero abducimus; vel *oblique*, versus anteriora corporis, aut posteriora, cum ad easdem partes trahimus. *Flectitur* autem, cum attollimus, quemadmodum sedentes flexo femore sedemus. *Flectitur* autē similiter *recta*, vel *oblique. recta*, cum versus corpus tollitur, vt ad neutrum latus inclinet, & quando cum spina rectum angulum facimus; at *oblique*, cum versus latus parum mouemus, vbi vere flectitur, similiter & cum femur femori imponimus. *Circumagitur* autem, cum femur circumuertitur, quod solet euenire, dum stantes pede recto, & terræ affixo, oblique crus mouemus. Hic motus duplex est, & vel ad interiora, vel exteriora corporis. *Ad interiora* quidem, cum genu ad poplitem ducitur, & calcaneus foras fertur. *Ad exteriora*, quando genu foras, & calcaneus intro mouetur. *Extensio trium*: Flexio quatuor, Circumolutio totidem musculorum beneficio peragitur. Extendentes partem posteriorem occupant, & ossis innominati, siue coxæ dorso incumbunt. Flectentium duo priores, in ventris

Num-
rus mus-
culorum
Situs.

ventris cavitare sunt siti: duo posteriores femori insident. Circumagentes coxendicis sedem occupant, vnus internam, tres externam. *Extendit recta, tertius*: at versus anteriora, *secundus*, ad posteriora. *primus*, si toti agant. *Flectunt recta flectentium primus*, & *secundus*: oblique, *tertius*, & *quartus*. *Circumagitur* versus superiora *primus*, intorsum *secundus*, ad exteriora *tertius*, ad posteriora *quartus*.

g. 4. 19. C
C. C. + i. b.
H. I. K.
r. a. a.
f. 2. b.
r. b. c.
u. G.
x. d.
y. 2. 10. 2.
& 3. nu. 1.
z. F.
a. 4. 29.
L. L. & 4.
30. B. B. +
D. E. F.
b. e. e.
c. 2. 10. 2.
& 3. nu. 2.
d. 4. 30. G.
G. + 33. a.
a. b. b.
e. a. a. &
2. y. 5. &
5. nu. 3.
f. 2. 10. 2.
g. 3. nu. 3.
g. 4. 31. D.
D. + G. G.
G.
h. A. A.
i. C. C. C.
l. b. b.
m. N. N.
n. H.
o. E.
p. 2. 9. fig.
5. 6. & 7.
R.
q. 2. 10. 2.
E.
r. 4. 31. I. I.
I. + L. L.
f. N. N.
z. K. K.
u. M. M.
M.
x. I. I.
y. e.
z. 2. 9. 6R

1 EXTENDENTIVM ergo *primus*, quem cum duobus sequentibus *Gluteum* appellant, quod natium carnosam molem conficiant, discriminis vero gratia *maiores*, quod maximus sit omnium, & fere alterius lateris natem totum efformet. Statim detracta cute occurrat, & principium habet latissimum, à diuersis ossibus enatum. Nam ^r *superior* eius pars ab ossis ilium spinæ circumferentia tota: at ^f *lateralis* ab ossis sacri parte humilior: ^t *inferior* autem à coccyge prodit. Ex omnibus ergo his initiis, vt semicirculo carnosus exortus, oblique nonnihil descendit, ac ^u coxendicis articulum superuehitur, vbi mox gracilior, & angustior totus redditur, & in ^r tendinem validum ac latum definit, qui partim ^y in primam rotatoris maioris impressionem, partim in ^z asperam lineam, quæ sub quarta impressione deorsum ducitur, implantatur. ^a *Secundus*, siue *Gluteus medius*, ab ossis ilium spinæ anteriore sede, paulò humilior, quàm *primus*, sub quo totus fere latet, quemadmodum & ab illi ossis dorso, ^b principio carnosio, lato similiter, ac semicirculari exoritur, oblique in partem exteriorem descendens, sensim angustatur, & supra coxendicis articulum, quem contegit, vectus, in tendinem membranæ in modum latum validumq; finit, qui in ^c secundam maioris rotatoris impressionem, transuersum implantatur. ^d *Tertius*, siue *Gluteus minor*, liuidus in omnib. hominibus, præsertim in robustis, in quibus etià ea secundi pars, quæ tertio superiecta est, liuida apparet, totus sub medio latitat, quo tanto minor est, quanto ille primo. ^e Nascitur hic à posteriore, & inferiore sede dorsi ossis ilium, vbi coxendicis os incipit circa acetabulū, principio lato, crasso, carnosio, ac semicirculari. Hinc obliq; descendit versus anteriora, inhærens fibrosis nexibus ligamento illi, quo femoris caput coxendicis sinui coniungitur, paulatimq; angustatus, in latum ac validum tendinem abit, qui in ^f tertiam impressionem maioris rotatoris inseritur.

Extendentes femur. *Primus*.

Secundus

Tertius.

2 FLECTENTIVM *primus*, Græcis *ψῶς* dicitur, vel, vt nonnullis placet, *ψῶα*, Latine *lumbalis musculus*. Oritur hic à latere corporum ^h duarum vltimarum thoracis vertebrarum, & ⁱ trium superiorum lumborum, tum à transuersis processibus eorundem, ^l principio carneo, & liuido. Figura vero quodammodo teres est; ex acuto initio paulatim crassescens, sicque per interiora ^m ossis ilium deferretur, qui vbi ad ⁿ ossa pubis peruenit, in teretem & validum ^o tendinem mutatur, & per ^p sinum ossis pubis, eo nomine exsculptum, prope os coxendicis deferretur, & in superiorem partem ^q minoris rotatoris implantatur. Transiit autem per sinum huiusmodi, tum ne, si quando contrahatur, à loco suo recedat; tum ne tendo musculi ab acuto ossis processu lædatur. Situs ergo est in abdomine nonnihil oblique, & statim in lumbis remotis visceribus imi ventris, ac intestinis, occurrit conspiciendus. ^r *Secundus*, *Iliacus internus* ab aliis communiter dictus, quod in ^f ossis ilii interna parte, quam totam occupat, sub priore situs sit. Nascitur hic ab vniuersa ^t spina, siue appendice interna ossis ilium, ^u principio carnosio semicirculari, sed mox ex lato initio ^x angustior, contra ex tenui crassior factus, in priora fertur, & in ^y tendinem degenerans, per ^z sinum ossis pubis prædictum deferretur, ac

Flectentium *Primus*.

Secundus

- tur, ac tendini prædicti muscoli connatus, in ^a minorem rotatorem quoque inferitur, sed ^a, 2. 10. 2. E.
- Tertius.* sede paulum, quam prior, humiliore. ^b *Tertius*, cognomine *Triceps*, omnium femoris, imò ^b, 4. 37. X X. X & vniuersi corporis maximus. Videtur enim hic musculus ^c tria habere capita, quæ in mus- 4. 35. Q Q culi vnius finem congregiuntur. Horum *primum*, à coxendicis appendice nerueum, deinde 4. 34. V. V. carneum principium sumit, quod postea in ventriculosam carnem degenerat, quæ per 4. 36. P. P. femoris posteriora delata, gracilescit, & in teretem tendinem, cuius terminus est in in- 4. 32. A. A. A. terno femoris capite prope poplitem abit. *Secundum* caput, anterius ab ea coxendicis se- D. D. D. de, quæ cum ossè pubis committitur, carneum enascitur, & obliquis, ac fere transuersis 4. 3. C. fibris, ad radicem minoris rotatoris, & superiorem partem lineæ asperæ femoris termi- natur. *Tertium*, carneum, ab inferiore coxendice incipit, & partim obliquis, partim rectis fere fibris inferiori parti lineæ asperæ implantatur. Hunc communiter pro quarto extendentium habent; sed reuera quicumque recte ipsum considerauerit, nobis cum in
- Quartus.* classẽ eorum, qui flexioni præsumt, ascribet. ^d *Quartus*, liuidus est, & cum priorẽ ^d, 4. 33. A. nime confundendus, etsi eius portio quoquo pacto esse videatur. Oritur ab ^e ossis pu- A. A. A. & bis parte anteriore, prope cartilaginẽ, qua duo ossa sibi inuicem committuntur, prin- 4. 31. O. cipio lato, ac carneo, quo postea oblique descendit, donec in tendinem amplum, sed 4. 3. B. breuem degeneret, qui femoris lateri interno, è regione minoris rotatoris, vsq; ad dimidium longitudinis femoris implantatur.
- ^f *CIRCVMAGENTIVM primum*, qui *Iliacus externus* dicitur, & *Pyriformis*, ^g à tribus hu- 4. 30. f. milioribus ossis sacri vertebris, tereti & crasso principio exoritur, sic, vt non modo à la- H. + K. teribus externis ipsius enascatur. sed etiam in interiore eiusdem ossis parte, vbi à sui cõ- 4. 3. C. & 4. 33. C. iugis principio haut multum distat. Hinc transuersim excurrẽs, in teretẽ ^h tendinem 4. 3. b. mutatur, & ⁱ maioris rotatoris quartæ impressiõni, quæ in apice huius processus est, im- 4. 2. 10. f. plantatur. Musculum hunc Anatomici inter extendentes referunt, & quartum nume- 4. 3. m. 4. ro faciunt: sed quàm bene diligentior consideratio, quæ me docuit, & ipsos facile, si ad- uertant, edocebit. ^l *Secundus*, qui cum sequente *Obturator* dicitur, propterea quod ^m fo- 4. 33. C. ramẽ ossium pubis, principiis suis obturent. Et quia hic ab externa foraminis parte ori- C. & 4. 32. tur, *externus obturator* dici consuevit, quemadmodum tertius, internus dicitur, quod ab H. + I. K. interna regione, qua hypogastrium respicit, pronascatur. Oritur ergo à membrana fora- & 4. 37. V. men succingente, & ab ossium pubis ac coxendicis oris, carneus & amplus; deinde trans- 4. 2. 9. 6. uersim ad posteriora femoris procedens, angustior fit, validum producens tendinem, N.
- Tertius.* qui in sinum magni rotatoris inferitur. ⁿ *Tertius*, siue *obturator internus*, ab interno am- 4. 33. D. bitu foraminis eiusdem pariter carnosus enatus, & amplus, ac validior prædicto, totam D. E. + G. internam ossium coxendicis & pubis sedem occupat, sensim angustior euadit, & ^o tres, G. quatuor vetendines porrigit, qui ad externam coxendicis partem, trochleæ modo, su- 4. 3. E. pra ^p sinum coxendici in hunc finem exsculptum, ac crasso validoque ligamento ob- 4. 2. 9. 7. K. ductum, reflexe feruntur, & carneq; marsupio, (quod visu certe est pulcherrimum) vt 4. 33. F. robustior fiat, & minus in suis motibus ab ossẽ offenderetur, inuestiti, tendinem vnum + H. constituunt, qui in sinum magni rotatoris, in quem & prior inferitur. ^r *Quartus*, partim 4. 33. I. ab externo tuberculo ossis ilium, partim ab appendice coxendicis exoritur, sub sinu tro- chleæ, circa quem prior circumuoluebatur, & cui propterea etiã subicitur. Breuis post- ea ac carnosus, ad posteriorem partem maioris rotatoris procedit, ibiq; in illud spatium, quod

quod inter utrumq; rotatorem est, inferitur. Quare hic musculus cum Vesalio fortasse non incommode in duos diuidetur.

CAPUT XXIII.

De musculis Tibiæ.

TIBIÆ tribus motibus cietur. Flectitur enim, extenditur, & nonnihil oblique versus exteriora ducitur. *Flectunt* quinque, *extendunt* quatuor, vnus *oblique mouet*. Primus, & secundus flectentium in anteriore femoris parte iacent, ille externa; hic, interna; at reliqui in posteriore. Extendentes omnes in anteriore sede femoris: Oblique autem mouens in posteriore, ac superna tibiæ. Flectentes omnes simul contracti recta tibiæ flectunt: at primis quatuor solum agentibus, nonnihil ad interiora; quinto autem, modice ad exteriora circumagitur. Per hunc enim motum, pedis extremitas in qua digiti sunt, nonnihil extrorsum ducitur. Extendentes simul agentes, similiter recta extendunt, quemadmodum & primo, & secundo, seorsim moto: at tertio solum, ad exteriora; quarto, versus interiora mouetur.

TIBIÆ
musculi.
Num-
rus.
Situs.
Motus.

f. 4. 34. A. ^f FLECTENTIVM primus, quem ego *Sartorium musculum* vocare soleo, quod sarto- *Flecten-*
A. & 4. 31 eo maxime vtantur, dum crus cruri inter consuevum imponunt. Alii *fascialem* appel- *tes.*
T. T. lant, nonnulli etiam *fasciam*, quod hanc referat, cum longus admodum sit, & æquali fere *Primus.*
t. B. latitudine decurrat, si caput & caudam demeris. Omnium musculorum nostri corporis
u. C. pæne longissimus est. Ducit enim principium acutum, carnosum, & nerueum, ab ^t ante-
x. 4. 34. riore parte appendicis, siue spinæ ossis ilium, deinde statim totus carneus factus, & la-
F. F. tiusculus, oblique per femoris interiora descendit, vt deussatim reliquos musculos su-
y. G. peruehatur. Tandem ad caput internum imæ femoris appendicis delatus, in tendinem
z. H. neruosum, latum, vel (vt Vesalio placet) teretem mutatur, qui statim infra genu, in ^u os-
a. 4. 33 K sis tibiæ lineam acutam, parte anteriore & interna implantatur. ^x Secundus, quem Gra- *Secundus*
t. O. cilem vocant, nerueo amploq; principio, ab ^y ossæ pubis, iuxta longitudinem cartilagini-
b. N & 2. nis, qua sibi inuicem committuntur, oritur. Carnosus postea redditus, per femoris inte-
9. 6. L. riora carneus descendit, donec ad femoris internum caput peruenerit, vbi ex ætate te-
c. K. rem tendinem assumit, qui ^z in primam tibiæ lineam, iuxta primum, paulò tamen infe-
cc. e. rius, illigatur, ad quam nonnihil latiusculus euadit. ^a Tertius, *femineruosus* nuncupatur, *Tertius.*
d. L. +. R. quod eius substantia, partim neruea, partim carnea sit. Oritur enim neruosus, ac gracilis,
e. N. ab elatiore, & maxime posteriore sede ^b appendicis ossis coxendicis, neruosusque diu
f. e. permanens, tandem in medio ^c carnosus factus, multiplicibus fibris per posteriora fe-
moris, ad ^c poplitem fertur, prope quem in tendinem teretem degenerat, qui ad ante-
riora tibiæ reflexus, (vbi & prædicti duo) sub genu in eam terminatur. Habet tamen
hoc peculiare huius tendo præ reliquis, quod ad tibiæ vsq; medium longitudinis per-
uenit, reliquorum tendinibus tibiæ implantatis, haut æquè descendencibus. ^d Quartus, *Quartus.*
f. e. *femimembraneus* dictus, ex ^e eodem loco, quo commemoratus prodit, gracili, & nerueo
principio, rectisq; fibris per posteriora femoris deorsum excurrens, toto ductu, vsque
ad medium femoris nerueus remanet, vbi primum carnosior redditur, & crassior, sicque
ad ^f poplitem in tendinem teretem desinit, quo in tibiæ lacus internum inferitur. Primi

enim quatuor flectentes, in latus internum tibiæ illigantur; at quintus, in fibulam. Illi, *Quintus*, internam illam duritiem in poplite efficiunt; iste, externam. & *Quintus*, biceps vocatus, ex h. g. M. + V. eadem ossis coxendicis appendice ac tertius & quartus, initium ducit nerueum, & acutum, sed gracilius non nihil; mox carnosus redditus, per femoris posteriora sensim deorsum versus exteriora decurrit. At ubi medium iter absoluit, & iam dimidium quoque longitudinis ipsius femoris superavit, attenuatur, & externa sui sede nerueus admodum videtur, quasi iam iam intendinem abiturus: at interna sede, ex femore i alia i, z. quædam pars accedit, atque ita adnascitur, ac si duplici principio musculus constaret. Sic ergo ex duobus *initis* in vnum musculum degenerantibus, crassescit, ac descendens, foris admodum neruosus, in tendinem robustum abit. Tandem per sinum externum externi capitis femoris (in hunc finem exculptum) repens, externo lateri superioris appendicis fibulæ pertinaciter inferitur.

Extendentes. ¹ *EXTENDENTIVM* primus, *Membranofus* dicitur ab Anatomicis, & *musculus latitendinis*. Huius enim m principium acutum, intus carneum, exterius nerueum, originem ducit ab eo n latere ossis ilium, & ipsius spina quod antè proximum est initio musculi primi tibiæ flectentium, siue sartorii: postea forma lacertæ descendit, & maiori rotatori adnectitur, ubi mox carneam substantiam deponit, & in o tendinem degenerat latum, membranofum, ac nerueum, quo latiore in vniuerso corpore reperire non est, cum omnes musculos totius femoris inuestiat. Duplici hic fibrarum genere donatus est, rectis nempe in externa femoris sede, at transuersis in interna. Sitamen, quid sentiam, dicendum est, existimem eam huius tendinis portionem, quæ rectis fibris prædita est, tendinem reuera huius musculi esse; at quæ transuersis, ligamentum potius & G. G. & peculiare, musculis interois in contractione cohibendis, destinatum. P Tandem patellam in genu amplexus, tibiæ fibulæque, cruris puta anteriori, exteriorique sedi, statim u, a. sub genu implantatur. x, C. *Secundus*, *Rectus* cognominatus à recto progressu, figuram y, b. b. veri musculi habet, flectentium tibiæ primo extiorum adiacens. Oritur enim principio acuto ac nerueo, ab f ossis ilium tuberculo interno: inde in ventrem carnosum, ac teretem faciens, recta per femoris longitudinem & anteriora, inter t duos Vastos, siue tertium & quartum tibiæ extendentium, medius descendit: at ubi u patellam attingit, in latum validumq; x tendinem definit, quo patellæ, tanquam in eam terminaturus, valide adnascitur: vterius autem progrediens ad y anticnemium, siue anteriorem tibiæ sedem, in eius medium, statim ac patellam superauit, eo loco inferitur, ubi z tuberculum in hunc vsum peculiariter creatum, euidenter admodum prominet. a Tertius, quem à mole insigni *Vastum externum* appellant, b principio lato, ac nerueo, à radice c maioris rotatoris femoris, quam vndiq; amplectitur, enatus, femoris parti superiori exterioriq; valide adhærens, sensim crassescit, ac carne liuida fibris rectis prædita, vsq; ad d patellam descendens, in latum ac membranofum e tendinem abit, qui cum exteriore parte f tendinis prædicti musculi secundi commixtus, patella superata, in idem c. c. cum ipso tuberculum, inferitur. & *Quartus*, *Vastus internus* appellatus, h principio nerueo, partim à i ceruice femoris, partim à magno rotatore prodit, statimq; carnosus redditus, femoris anteriori & internæ sedi perpetuo adhærens, & diuersis fibrarum generibus auctus, descendit, qui ubi iam ad genu fere appulit, in tendinem membranofum terminat. i, dextrū M. l. sinistru M.

m, N.F.I. minatur, qui cum tendine secundi & tertii cōmixtus, validè patellæ adnascitur: mox sed impri hac iterū deserta, in tuberculum superius anterioris tibiæ sedis, ubi & illi, implantatur. Oblique
mis 4.37. n OBLIQUE MOVENS, suppopliteus Galeni, in poplite situs est, sub initio gasterocnemii interni, siue secundi pedem extendentium, unde nec nisi illo remoto in conspectum
e. e. e. n, 4.38.2. prodit. o Initium eius latum ac nerueum est, à capite femoris externo, siue, vt nonnullis
G.H. + 4 visum, à ligamento articuli genu posteriori: hinc carnosus factus, oblique incedit ad
4.1.1.F.G. posteriorem ac anteriorem superioris tibiæ appendicis radicem insertus.
o, G.

CAPUT XXIV.

De musculis Tarfi, siue Pedis.

PES triplicem habet motum. Extenditur, flectitur, & ad latera mouetur. *Extendunt* musculi duo: *flectunt* totidem; totidem etiam *ad latera trahunt*.

PEDIS
musculi.
Exten-
dentes.
Primus.

p, 4.38.1 P EXTENDENTIVM primus, Gasterocnemius externus, quod suram constituat, Græcis
D.E.F.G γαστροκνήμιον dictam, vocatur. Idem Gemellus externus ab iis dicitur, qui nobiscum pro
H.I.+f.2 vno musculo habent, etsi duo nonnullis esse videantur, quod distinctis originibus pro-
O.O.PQ deant, qui tamen & vna membrana connecti sunt, & in vnam tendinem vna cum subie-
q, D. cto Gasterocnemio, aut gemello interno transeunt. q Primum ergo ipsius principium,
r, F. sub poplite, ab interno femoris capite enascitur, carnosum, latumq;, & per tibiæ poste-
rora interioraque descendens, latius ac crassius, r cum altero mox iunctum, euadit,
s, H. quod cum primum ad medium longitudinis eiusdem peruenerit, in s tendinem cessat,
t, E. alterius principii rendini similiter cōmixtum. t Alterum autem pariter sub poplite, sed
ab externo femoris capite, carneum incipit, sensimque per posteriora similiter, sed exte-
riora cruris, descendens vt prius, cum quo coit, latescit, & prope eundem locum, quo pri-
mum etiam, paulo tamen superiorem, in tendinem transit, qui cum priore ira commisce-
tur, vt vnus ex vtroque tendo fiat, isque validus, latus, ac nerueus, qui paulò post cum
tendine Gasterocnemii interni u coiens, in x calcis posterius latus inseritur. Huius mas-
culi duobus capitibus, quemadmodum id Vesalius notat, non procul ab exortu y sesa-
moidea officula tributa sunt.

u, f. 2. N.
x, R.
y, S.S.

z, 4.38.2. z Secundus, Gasterocnemius internus, quorundam soleus, externo subiacens, colore liui-
L.M.N. dus, à posteriore fibulæ appendice, nerueo validoque a initio enatus, inde b ventricosus
a, L. factus, fibulæ ac tibiæ adhærens, amplitudine sua vltra hæc duo ossa sese extendit in pro-
b, M.M. gressu, at vbi medium fere tibiæ superauit, angustior factus, in c tendinem abit, qui non
c, N. procul à calcaneo ita valide externi gasterocnemii tendini connascitur, vt vnus in deten-
d, R. do fiat, qui in d calcis posterius latus inseritur. Hic ille est tendo, quo Hectorem Achilles
circa Troiæ mænia traxisse Poetarum maximus canit, quem Hippocrates tendinem ma-
gnum vocauit, & quo hodierno tempore macellarii boues suos suspendunt. Cæterum
diligenter memoriæ mandandus est, quod obortæ circa hunc inflammationes misere v-
niuersum corpus in consensum trahant.

Secundus

e, 4.39.1. e FLECTENTIVM primus, ab aliis tibiæ anticus, à me catenæ musculus vocatus, Flecten-
C.C.+f. quod dissecto per transuersum huius tendine, aut amputato, catenam ægri, cuius be-
3, G.G. neficio ambulantes pedem flectant eleuentque, portare cogantur. Hic exacte muscu-
lorum

tes.
Primus.

lorum figuram illam obseruans, qua laceratam exprimunt, antèrius à ^f tibia & fibulæque ^f. F. superioribus appendicibus, quo loco sibi inuicem coartculantur, quemadmodum & à ^g. D. communi ligamento, quod vtrumque hoc os connectit, acuto carneoque principio exoritur. Cæterum illico dilatatur, sed vbi ad medium fere longitudinis tibiæ peruenit, iterum coarctatur, & sensim in ^h tendinem nerueum, robustum, ac teretem finit, qui ^h. b. b. (in viuus quoque sub cute admodum, si pedem flexas quantum pote ad acutum angulum, conspicuus fit,) nonnihil oblique inferius anticnemium superuectus, prope pedis articulum, in internum latus ossis tarsi, quod pollicis ossi præponitur, implantatur. Tendo autem hic prope articulum antequam vltèrius vehatur, sub ligamento transuerso, siue annulari, quod ab inferiore tibiæ fibulæque appendice nascitur, transit. ⁱ Secundus, al-

Secundus

teri oblique pedem mouentium substratus, *peroneus secundus* quibusdam, mihi *semifibularis* dictus, ^l originem ducit oblongam, carnosam, ^m fibulæ adhærentem: at cum medium longitudinis fibulæ superauit, in ⁿ tendinem degenerat teretem, qui ad fibulæ posteriora, sub ^o externo malleolo, reflectitur, & in os tarsi paruum digitum sustinens duplici ^p infertione implantatur, vnde à ^m *bicornis* dici consuevit.

Oblique
mouētes
Primus.

^q OBLIQUE MOVENTIVM *primus*, siue *adducens pedem*, quod ad interiora pedem trahat, hic à ^m *nauticus* vocari solet, quod eo nautæ potissimum vtantur, dum malum scandunt; ab aliis *tibialis posticus* dicitur. ^r Originem habet carnosam, à tibia, fibulaque, & ligamento, quod vtrumque hoc os necit, cui attensus, inter posteriores musculos iacens, ^s tendinem teretem prope internum malleolum profert, quem vbi superauit, ligamento valido inuestitus, ad plantam pedis transit, & in tarsi ossis, quod cubiformi vicinum est, ^t sedem inferiorem implatur.

Secundus

^u *Secundus*, siue *abducens*, quod ad exteriora trahat, *Peroneus primus* aliorum, siue *fibularis*. Oritur valido neruo siue ^v principio à ^x superiori fibulæ appendice, externoque fibulæ toti lateri adhærens, descendit teres, carnosus, externa parte liuidus, interna qua musculos spectat, rubicundus. Hic vbi vltra medium longitudinis fibulæ progressus est, carneam substantiam deponit, sicq; in ^y tendinem degenerat, qui oblique retro sub ^z malleolo externo transit sinum, ^a ligamento inuolutum transuerso, qui à fibula ad calcaneum & latum sub planta pedis admodum reflexus, in radicem ossis pedis, quod pollicis prostat, inferitur.

CAPVT XXV.

De musculo, cuius latus tendo, mediæ plantæ subnascitur, & Plantaris propterea vocatur.

INTE eos musculos, qui in Tibia situm habent, occurrit nonnullus, qui in omnibus propemodum conuenit cum alio quodam, cuius historiam ^b superius complexi sumus. Vt enim ille longissimo primo ac impense tereti tendine, per vniuersum cubitem interiorem excurrerat, inde ad carpi ligamentum annulare appellens, in latissimam expandebatur membranam, totam manus volam succingentem, vnde & *Palmaris* dictus: sic ite per totam posteriorem tibiæ sedem tendine tereti descendens, postea in plantam expanditur, ideoque *Plantaris* vocatur. ^c Situs enim est sub externo Gasterocnemio, & ab ex-

d, I. ab exteriori femoris capite sub poplite,^d principio terete carneo, ac gracili exoritur, postea nonnihil dilatus, oblique à parte externa internam versus descendit, ac statim in gracilem & longissimum^e tendinem, quo maior inter teretes in humano corpore non datur, degenerans, ad latus interius cruris, inter duos gasterocnemios, & horum tendines repit. Tandem prope calcaneum à latere tendini gasterocnemiorum adnexus, ad^f internum calcanei latus, & ab hoc ulterius ad plantam pedis pervadit, ubi in eadem latitudine diu incedens, sensum postea trianguli ritu latefcit, & prope digitorum primos articulos totam plantam obtegens,^g ad singulos quinque digitos inferitur. Non ergo secius in totam plantæ sedem, ac palmaris in volam totam absimitur. Quod si desit hic musculus, tum huius tendolatus, ut & palmaris, à digitorum flexore altero surrogatur. Videtur autem cum figura eadem, eundem quoque usum habere in planta, quem habet palmaris in vola manus: nequaquam autem, ut vulgo statuitur, pedis, vel tarfi extensioni ancillari.

CAPUT XXVI.

De musculis pedis digitos flectentibus.

DIGITI PEDIS flectuntur, extenduntur, aut in latera mouentur. Quare tria jam erunt musculorum genera, qui digitis dicati sunt, flectentes scilicet, extendentes, & oblique mouentes. Ex his quatuor in tibia siti sunt, flexor scilicet tertij digitorum internodij, flexor pollicis, extensor tertij digitorum articuli, & pollicis tensor: reliqui, in pede.

h, 4.41.2. **D. E. E. E.** *i, B. B.* **I. A.** *m, D.* **n, F.** *o, N.* **p, G. G. G.** **G.** *q, a. a. a.* *r, 4.42.2.* **C. C. C.†** *3. N.* *f, A. A.* *d, D. D. D.* *u, b. b. b.* *x, 4.42.3.* **F. F. F. F. &** *2, K. K. K.* *K.† 4.40.* *1. T. T.* *y, B.* *z, G. G.* *G. G.* *a, c. c. c. c.* *b, D. D. D.* *† 4.43.1.* **M.**

^h DIGITORVM tertij internodij flexor, siue perforans, gasterocnemio interno subjacet, & àⁱ tibiæ posteriore sede, sub^l poplite, ^m initio longo carnosoque oritur, per longitudinem tibiæ, cui adnascitur, excurrens, ac ultra eiusdem medium vectus, inⁿ tendinem desinit, qui prope^o malleolum internum fit nerueus, ac teres, & sub ipso à ligamento, quod ab inferiore tibiæ appendice ad calcaneum procedit, vinctus, ad plantam pedis progreditur, ac in^p quatuor tendines secatur, qui singuli tandem ad^q tertium internodium, siue vltimum os quatuor digitorum, ut id flectant, inferuntur.

^r Flexor secundi internodij, Perforatus dictus, carnosus nervosusque à^f calcaneo interiore oritur, ac ubi medium pedis superauit, in^t quatuor teretes tendines secatur, qui in^u secundum digitorum internodium, quod flectunt, inserti, perforati sunt, ut per eos musculi prioris tendines ad tertium internodium transire queant.

^x Flexores quatuor primi internodij, Lumbricales dicti, vfu, figura, atque exortu lumbricalibus in manu positis, similes sunt. Oriuntur enim eodem pacto à tendinibus perforantibus musculi, & tertium articulum flectentis, parui teretesque, & paruo^z tendine in¹ latus^a primi digitorum internodij, inferuntur. Horum actioni plurimum opitulari videtur^b carnea quædam portio, quæ ab anteriore parte lateris inferioris calcis duobus acutis initijs enata, non admodum crassa, recta antrosum progreditur, ad diuisuram tendinis tertium digitorum internodium flectentis, ibique principiis quatuor musculorum lumbricalium interitur.

DIGITORUM pedis musculi.

Numerus & situs. Digitorum flexores. Flexor tertij internodij,

Flexor secundi internodij.

Flexores primi internodij.

POLLI-
CIS fle-
xor.

bb POLLICIS flexor, à^e fibulæ posteriore sede, longè sub appendice superna, pro-
pè medium longitudinis fibulæ, carnosus acutusq; prodit, deinde ventricosior factus,
propè^d malleolum internum in^e tendinem teretem mutatur, qui obliq; sub malleo-
lo, eodem, quo^f flexor tertij internodij, munitus ligamento, ad^g tertium pollicis in-
ternodium accedit. Hic tendo sæpe cum tendine flectentis tertium articulum ad in-
dicem excurrentis connascitur, & antequam attingat secundum pollicis internodiũ,
os sesamoides grandius, quam in cæteris digitorum internodijs est, acquirit.

bb, 4. 40. 2.
II. 4. 40.
I. N.
C. C.
d. N.
e. K. K.
f. D. E. E.
g. a.

C A P V T XXVII.

De musculis pedis digitos extendentibus.

DIGITO-
rum Ten-
sores.
Tensores
tertij in-
ternodij.

DIGITORVM^h tertium internodium extendens, neruo & acuto principio à superiore
& anteriore tibiæ appendice oritur, statimq; factus carneus, & adnatusⁱ ligamē-
to, quod tibiæ os fibulæ annectit, recta descendit ad pedem, vbi in^l quatuor tendines
diuiditur, qui sub^m transuerso ligamento, & annulari, quod à tibiæ fibulæq; appen-
dice exit, vniti perreptantes, sese expandunt in quatuor digitorum, tertium & secun-
dum internodium, vt ipsa extendant. Cæterum ipsi tendinesⁿ ligamento quodam
membraneo inter se alligati sunt, vbi per pedis dorsum excurrunt.

Tensor se-
cundi in-
ternodij.

o Extendens digitorum secundum articulum, in^p pedis dorso situs est, & originem suam
accipit à transuerso ligamento, carneam, & latam, ex qua quatuor veluti separati mus-
culi prodeunt in progressu, quem ad digitos moliantur, & ex his quatuor, aliquando
etiam quinq;^q tendines, qui singulorum digitorum tria internodia, sed præcipuè se-
cundum, adeunt, vt hæc etiam extendant, ligamento, ex digitorum articulorum late-
ribus prodeunte, adnexi.

h, 4. 40. 2.
G. 4. 39.
I. I. I. K.
i, X.
l, H. H.
H. H.
m, P.
n, K. K. K.
K.
o, 4. 39. 2.
L. 4. 3. H.
p, Q.
q, M. M.
M. M.

Tensores
primi in-
ternodij.
POLLI-
CIS ten-
sor.

Primum autem internodium, extendunt^r interossei, de quibus in sequenti, & vltimo hu-
ius libri capite dicemus.

f POLLICIS tensor, t^r principium carnosum à medio fibulæ, vel (vti Vesalio pla-
cet) à tibiæ externo latere, quo à fibula dehiscit, desumens, quemadmodum & à^u liga-
mento, quod tibiæ fibulæ coniungit, cui pertinaciter adnascitur, dein^x tendinem
generans, super anticnemium inferius fertur, & sub^y transuerso ligamento, ad tria
pollicis internodia, quibus inseritur, vadit, vt ea recta extendant. Aliquando hic tendo
bifariam in duos dirimitur, quorum alter in pollicis internodium vltimum, alter in
os pedij inferitur.

r, 4. 39. 3. I.
I. I. I.
f, 4. 40. 2.
L. 4. 39. 3.
N. N.
z, a.
u, X.
x, b.
y, P.

C A P V T XXVIII.

De musculis pedis digitos ad latera oblique mouentibus.

DIGITO-
rum obli-
q; mo-
tores.

DIGITORVM obliqui motores, z Interossei dicuntur, quod inter ossa habitent. Horum
in manu octo duntaxat habentur, at in pede decem, quod metacarpium, à meta-
tarso ossè vno superetur, vnde quatuor emergunt ossium intercapedines, in quibus
octo existunt musculi, quibus si duo alij adnumerentur, a vnus nempe ad pollicis, b al-
ter ad parui digiti externum latus, numerus denarius complebitur. Singuli autem à
sui b, ib, Q.

z, 4. 39. 3.
I. I. I. I. I. I.
4. 43. 2.
C. C. C.
& c. & D.
D. D. & c.
& 3. G. F.
a. 4. 40. 1.
M.
fui b, ib, Q.

6. 4. 39. 3. fui lateris^c osse pedij, carnosif enascuntur, ibiq; secundum ossis longitudinem ducti, K.K.K. spatia illa intercostalia replent, & carnosiferè inferuntur in quinq; digitorum^d radices, siue ossa prima, breuib; & aliquantulum latis tendinibus. Horum *si vterq;* simul K. K. agat, qui vni digito inseritur, primum internodium extenditur: at *si alteruter*, oblique L.L. mouetur. Quod *si internus* contrahatur, adducitur digitus; *si externus*, abducitur.
6. 4. 42. 2. ^c POLLICEM adducens (scilicet ad internum pedis latus) interno pedis lateri ex- POLLI-
E.F.F.†3. porrectus, ab^f interna calcis parte, vel (vti Vesalius voluit) à ligamento calcem cum CEM ad-
Q. Q. talo connectente, & originem trahit nerueam, qui^h carne crascescens, & teres factus, ducens.
g. c. cum osse pedij, cui pollex superstat, coharet, rectaq; fertur ad externum latus primi
b. E. pollicis internodij, ei teretemⁱ tendinem porrigens, vt pollicem à reliquis digitis ab-
i. F. F. ducat, siue ad interna trahat.
- l. 4. 42. 2. ⁱ MINIMUM abducens, externum pedis latus oecupat, ab externa^m calcis parte, vbi MINI-
G. G.†3. tuberculo donatur, prodiens nerueus, sed statim carnosus redditus, musculi forma MINIM-
I. I. procedit, & ⁿ processui ossis metatarsi cui minimus digitus superstat, annexus tendine abducens.
m. A. A. carneo breui, mox in P teretem tendinem abit, qui lateri externo^q primi internodij
n. 4. 42. 3. minimi digiti, vt ipsum à cæteris abducatur, implantatur.
S.
- o. L.
p. M. M.
q. G.

CAPVT XXIX.

Breuis omnium totius corporis musculorum enumeratio, memoria gratia, instituitur.

CVM jam vniuersa musculorum historia à nobis ad finem feliciter perducta sit, operæ pretium fecisse videmur, si breuem omnium enumerationem hic instituerimus, & in tabula quadam sub vno aspectu oculis proposuerimus, vt quotiescunq; visum est, facillima omnium repetitio instituatur. Musculi ergo, vel ad Ventres, vel ad Artus pertinent. Qui ad Ventres, vel Caput, Thoracem, aut Imum Ventrem concernunt, & vel totum mouent, vel aliquam eius partem. Qui Artus respiciunt, vel Brachia, vel Crura trahunt.

(Frontem, (aut potius supercilia) quam attollit musculus Frontalis.

Palpebras { Superiorem { Attollit, *Aperiens oculum rectus.*
 { Deprimat, *Claudens oculum superior.*
 { Inferiorem, Attollit, *Claudens oculum inferior.*

Oculum hunc movet { recta { Sursum, *Attollens.*
 { Deorsum, *Deprimens.*
 { Ad interiora, *Adducens.*
 { Ad exteriora, *Abducens.*
 { oblique { deorsum ad exteriora, *Circumagens exterior.*
 { sursum ad interiora, *Circumagens interior.*

Nasalia { abducunt { *Primus nares aperiens.*
 { *Secundus nares aperiens.*
 { adducunt { *Primus nares constringens.*
 { *Secundus nares constringens.*

CAPITIS
 musculi referuntur
 vel ad

Genas { Deorsum trahit, *Detrahens quadratus, Galeno πλάτυσμα μυῶδε dictus.*
 { Intro movet, *Contrahens genas, male vulgo Buccinator dictus.*

Labia { Attollit, *Primum par attollens labium superius.*
 { Ad latera movet, *Secundum par, labia abducens.*
 { Deorsum trahit, *Tertium par, deprimens inferius labium.*
 { Constringit, *Quartum par, labia constringens.*

Maxillam inferiorem hanc trahit { Sursum, *Primum par, Attollens, Temporale.*
 { Deorsum, *Secundum par, Deprimens biventre.*

{ Dextrorsum, { *Tertium par, ad latera trahens.*
 { Sinistrorsum, { *Quartum par, abducens, Pterygoideum.*
 { Antrorsum, *Quintum par, adducens maxillam.*
 { Retrorsum,

Aurem { externam, { Sursum, *Primum par, Attollens.*
 { Deorsum, *Secundum par, Deprimens.*
 { Antrorsum, *Tertium par, Adducens.*
 { Retrorsum, *Quartum par, Abducens.*

{ internam { *Externus.*
 { *Internus.*

Linguam movet { Stringendo, { *Primum par, Linguale dictum.*
 { Dilatando, { *Secundum par, Exerens, Geneoglossum.*
 { Antrorsum, *Tertium par, Retrahens, Hypsiloglossum,*
 { Retrorsum, *Quartum par, Attollens, Myloglossum.*
 { Sursum, *Quintum par, Deprimens, Ceratoglossum.*
 { Deorsum, { *Sextum par, Oblique trahens, Styloglossum.*
 { Dextrorsum,
 { Sinistrorsum,

Os hyoides, movent,	{ Recta Oblique	{ Sursum, Deorsum,	{ Primum, Secundum par, Tertium par, Quartum par,	{ Attollens Geniohyoideum. Depriemens Sternohyoideum. Oblique attollens, Styloceratohyoideum. Oblique detrahens, Coracohyoideum.
Fauces	{ Dilatat Constringunt	{	{ Primum par, Secundum par, Tertium par,	{ Sphanopharyngeum. Secundum par dilatans. Oesophagicum. Cephalopharyngeum. Stylopharyngeum.
Laryngem, qui	{ Dilatur Constringitur Clauditur Aperitur	{	{ dum eius car- tilaginē thy- roidem dum aryte- noidem	{ extendit flectit, flectit extendit
Caput	{ Flectit, Flectens par Extendit, ex- tendentium par	{	{ Flectit, Flectens par mastoideum. hoc flectit Primum, Triangulare, vel Splenium dictum. Secundum, Trigeminum, vel Complexum. Tertium, Recti maiores. Quartum, Recti minores.	{ recta, si totum agat. ad latus, si alteruter contrahatur.
Cervicem	{ Circumagit flectit extendit	{	{ Primum par circumagentium. Secundum par circumagentium. Primum par flectentium, sive Longum. Secundum par flectentium, sive Triangulare. Primum par extendentium, Secundum par,	{ Obliqui superiores. Obliqui inferiores. Transversi. Spinatun.

Thorax move- tur	Primario, à musculis pro- priis, qui vel	Dilatant in respiratione	{ libera, Diaphragma solum se contrahens. coacta, Diaphragma, & Intercostales externi.
		Cōstringunt in respiratione	{ libera, Diaphragma solum relaxatum. coacta, Diaphragma, & Intercostales interni.
		Extendunt	{ Primum par thoracem extendentium, Dorsi longissimus. Secundum par, Semispinatum. Tertium par, Sacrolumbum.
		Flectunt	{ recta, Recti abdominis musculi. oblique ad latera, Oblique ascendentes abdominis.
		Circumducunt,	Duo transversi abdominis musculi.
	Secundario, lumbis motis, sicque	flectitur, à flectente lumbos, Quadrato. extenditur, ab extensore lumborum, Sacro.	

INFIMI VENTRIS musculorum, alij pertinent ad	Abdomen, quod comprimunt parte	Laterali,	{ Obliqui descendentes. Obliqui ascendentes. Transversi.
		Anteriore,	Recti.
		Inferiore,	Pyramidales.
	Lumbos	{ flectit, extendit,	Lumborum flexor Quadratum Lumborum tensor Sacer.
	Testes,	elevant,	Cremaſteres.
	Vescam,	constringit,	Sphincter.
	Anum,	{ constringit, elevant,	Sphincter. Ani levatores.
	Penem,	{ erigunt, urethram trahunt,	Collaterales, penem erigentes. interiores penis musculi.

MANVS musculi pertinēt vel ad	Scapulam	Diversimode movet,			Primum par,	Cucullare.
		Sursum trahit,			Secundum par,	Attollens.
		Retrorsum ducit,			Tertium par,	Rhomboides.
		Antrorsum, versus superiora,			Quartum par,	Serratum minus.
		Antrorsum versus inferiora,			Quintum par,	Serratum maius.
	Humerum movet	Antrorsum, Adducens,			Pectoralis.	
		Sursum, Attollens,			Deltoides.	
		Retrorsum, Abducens,			Latissimus.	
		Deorsum, Deprimens,			Rotundus.	
		Circum- agit, ver- sus	exteriora	Circumagentium primus, five Superscapularis superior.		
	interiora,		Circumagentium secundus, five Superscapularis inferior.			
	Cubitum	flectunt	flectentium	primus,	five Biceps.	
			flectentium	secundus,	five Brachialis.	
		extendunt	extendentium	primus,	Gemellus, vel Maior.	
			extendentium	secundus,	five Minor.	
	Radius	pronant	Pronatorum	primus,	five Quadratus.	
			Pronatorum	secundus,	five Teres.	
		supinant	Supinatorum	primus,	five Longus.	
			Supinatorum	secundus,	five Brevis.	
	Carpum	flectunt.	flectentium	interior,	Cubitus.	
			flectentium	exterior,	Radius.	
		extendunt	extendentium	interior,	Cubitus.	
			extendentium	exterior,	Radius.	
	Cutim manus	{ Palmaris musculus.				
		{ Caro musculoſa quadrata.				
Digitos	Flectunt in- ternodium	Tertium,	Flexor tertii internodii.			
		Secundum,	Flexor secundi internodii.			
		Primum,	Flexores quatuor primi internodii, Lumbricales.			
	Extendunt, internodium	Tertium, & Secundum		{ primus extendentium digitos.		
				{ secundus extendentium digitos.		
	Ad latera movent	Primum,	Oſto musculi interosſei.			
		Digitos quatuor,	Interosſei musculi.			
		Indicem,	Abductor indicis.			
		Minimum,	Abductor minimi.			
	Pollicem	flectunt, in- ternodium	Primum	{ Primi internodii pollicis flexor prim		
Secundum			{ Eiusdem internodii flexor secundus.			
			{ Flexor primus,			
extendunt		Secundum	{ flexor secundus,			
		{ flexor tertius,				
ad latus movent.		Tertium,	Tertii internodii pollicis flexor.			
		Primus pollicem	extendentium,			
		Secundus pollicem	extendentium,			

C A P I -
T I S
muscu-
li perti-
nent vel
ad

Femur	extendit	{ oblique	{ retrorsum, Primus femur extendentium, <i>Gluteus maior.</i>			
			{ antrosum, Secundus femur extendentium, <i>Gluteus medius.</i>			
	Flectit	{ recta,	{ Tertius femur extendentium, <i>Gluteus minor.</i>			
			{ Primus femur flectentium, <i>Iliacus.</i>			
		{ oblique	{ Secundus femur flectentium, <i>Iliacus internus.</i>			
{ Tertius femur flectentium, <i>Triceps.</i>						
Circumagit			{ Quartus femur flectentium, <i>Liuidus.</i>			
			{ (versus superiora, Primus femur circumagentium, <i>Pyrisformis.</i>			
			{ introrsum, Secundus femur circumagentium, <i>Obturator externus.</i>			
			{ extrorsum, Tertius femur circumagentium, <i>Obturator internus.</i>			
			{ ad posteriora, Quartus femur circumagentium, <i>Quadrigeminus.</i>			
			{ Primus, <i>Sartorius</i> , vel <i>fascialis.</i>			
			{ Secundus, <i>Gracilis.</i>			
			Tibiam	Flectunt	{ Tertius, <i>Seminervosus.</i>	
{ Quartus, <i>Semimembranosus.</i>						
	{ Quintus, <i>Biceps.</i>					
		{ Primus, <i>Membranosus.</i>				
		extendunt		{ Secundus, <i>Rectus.</i>		
{ Tertius, <i>Vastus externus.</i>						
		{ Quartus, <i>Vastus internus.</i>				
			oblique mouet, <i>Suppliteus.</i>			
				Tarsum	extendunt	{ Primus tarsi extensor, <i>Gasterocnemius externus.</i>
flectunt	{ Primus flectentium tarsum, <i>Tibialis anticus.</i>					
		{ Secundus flectentium tarsum, <i>Peroneus secundus.</i>				
	{ oblique mo- uent ad latus	{ internum, Primus, siue <i>Adducens</i> , <i>Tibialis posticus dictus.</i>				
			{ externum, Secundus, siue <i>Abducens</i> , <i>Peroneus primus vocatus.</i>			
<i>Cutis planta, Plantaris musculus.</i>						
Digitos	flectunt in- ternodium	{ Tertium, <i>Perforans.</i>				
			{ Secundum, <i>Perforatus.</i>			
	extendunt internodiū	{ Primum, <i>Quatuor lumbicales.</i>				
			{ Tertium, <i>Tertij internodij tenfor.</i>			
		{ Secundum, <i>Secundi internodij tenfor.</i>				
{ Primum, <i>Interossei.</i>						
oblique ad latera.	{ <i>Interossei.</i>					
		{ <i>Minimum digitum abducens.</i>				
Pollicem	flectit, <i>Pollicis flexor.</i>					
		extendit, <i>Pollicis tenfor.</i>				
	oblique mouet, <i>Pollicem abducens.</i>					

Finis Libri Quarti.

ADRIA-



ADRIANI SPIGELII

BRUXELLENSIS,

DE HUMANI CORPORIS FABRICA,

Liber Quintus.

Quo Venarum natura, earumque per vniuersum corpus series describitur.

CAPVT PRIMVM.

Venarum naturam, actionem, & vsus explicat.



SSI VM, cartilaginum, & musculorum historiam hætenus Ratio ordinis. persequuti sumus. Sed quemadmodum ad hanc methodum, qua primo omnium de his egimus, ipsa quasi Natura nos impulit, quæ velut fundamenta quædam nostri corporis hæc efformauit: ita, vt nunc, omis- sis Visceribus, historiaq; trium Ventrium, quæ necessario sequi videbantur, Vasorum, siue Venarum, Arteriarum, & Nervorum tractationem aggrediamur, eadem nos cogit. Horum enim fundamentum ipsi muscoli sunt, secundum quorum ductus, ipsorum series distribuitur. Et quanquam nec viscera ab his immunia, liberaq; sint, quia tamen musculorum tanta moles & copia est, vt vniuersum pæne corpus conficiant, merito videmur post horum explicationem vasorum doctrinam aggredi. Caterum ex vasis omnibus de Venis primo agendum videtur, quod ipsæ, & notiores cæteris sint, & simpliciores. Vnicam enim tantum habent tunicam, cum Arteria duas, Nervi multiplicem. Vehunt præterea ipsæ sanguinem, arteriæ calorem, nervi spiritum, ex quibus sanguis omnium est notissimus. Cur de venis primo agendum.

Est autem *Vena* vox, quæ Græcis φλέψ, dicitur, ambigua admodum, cum lata significatione, pro quocunq; vase sanguinem in se continente, siue arteria foret, siue vena com- Vena vox ambigua.

munitur nunc dicta, Veteribus accepta fuerit. Hac significatione sumpserunt prius illi Medici, qui ante Galenum floruerunt, ut pluribus in locis ipse testatur. Hoc etiam pacto intelligendus est locus ille apud Hippocratem lib. de aere, locis, & aquis, ubi Scythas inquit, sibi ipsis sterilitatem inducere, sectis circa aures venis. Loquitur enim de arteriis, ex quibus sibi tantam sanguinis copiam detrahebant, ut in somnum, & quandoque animi deliquium caderent, unde vniuersum corpus impendio refrigerabatur. Et hinc factum est, ut utrumque vas, tam vena, quam arteria, Eudoxo ἐπακχομας, Hesiychio autem, antiquo Grammatico, non ineleganter δεξαμένη dictum sit, quod canalis esset, qui sanguinem recipiat. *Strictiore significatione* cepit sumi circa Galeni tempora, pro eo vase, quod sanguinem quidem continet, paulo tamen crassiorē, quam ille est, qui in arteriis coarctetur, quique perpetuo quiescit, nec mouetur. Ne tamen ambiguus sermo obscuritatem pareret, posteriores illis antiquissimis Græcis distinguere ceperunt, & alias quidem venas ἀσφυκτὲς, *pulsu carentes*, alias σφυκτὲς, siue *Pulsatiles* vocabant, quomodo & M. Tullius Arteriam, *Micantē venarum*, quod modo se attollat, modo deprimat, per quam eleganter vocauit. Micare enim, ut proprie, per intervalla resplendere, aut coruscare, micarum instar, significat: ita postea, pro eo, quod certis interpositis intervallis mouetur, ac se in conspectum profert, furripitque, accipitur. Sic ergo 2. de nat. Deor. iam vero, inquit, Venę & Arterię micare non desinunt, quasi igneo quodam motu. Nos, quia de Venis nunc acturi sumus, cum Galeno eas tantum intelligemus, quæ motu destituuntur, & quas Hippocrates, siue quicumque author sit libri de morbo sacro, αἱματίνιδας, *sanguinarias* vocauit, ut ab arteriis distingueret, quę calorē, & spiritus vitales per corpus diffundunt.

Distingue Distingueda autem merito est Vena ab Arteria, cum inter utramque differentia, insignis que discrimen reperiatur. *Substantia* enim primo diuersa est, cum Vena sit membranosa, Arteriis nervosa, unde Arist. 3. hist. animalium, cap. 5. ἀσφυκτὴν, inquit, νευρώδης ὅτι φλέψ. Vena Aorta appellata, nervosa est. *Crassitie* quoque differunt, cum Vena ex membrana admodum tenui & molli consistat: Arteria vero ex tunica quintuplo crassiore. Tum vero & color utramque ad visum confestim distinguit, cum illa cærulea fere sit: hæc est diuerso, alba, & candida. Iam sanguis quem vehit illa, quam differens est, ut modo dicemus: & cum Venę extimas quoque partes subeant, arterię intus hærent, nec nisi tribus fere in locis ad superficiem corporis accedunt, puta circa tempora, carpum, & penem, ut taceam nunc vsum, & alia complura, in quibus notabile discrimen aduertitur.

Definitio Est autem VENA, si definitionem ipsius requiras, *vas membranosum, simplex, triplici fibrarum genere intertextum, sanguinem fibrosum, & crassiorē, pro nutritione totius corporis, omniumque partium conficiens, & deferens*. Dico esse Vas, siue αἷμα, ut formam genusque ipsius assignem. Tria enim vasorum sunt genera in nostro corpore, Venę scilicet, Arterię, & Nerui. Qui ergo Vasorum naturam norit, naturam quoque Venarum vniuersalem perspectā habuerit. Vasa enim omnia, similes partes sunt, non in illa tantum significatione, qua similes respectu organicarum dicuntur, ad quarum compositionem veniunt, quemadmodum musculi interdum similes partes vocantur: sed etiam, quatenus opponuntur parti compositæ, & simplicem naturam habent, ita ut qualibet pars venę, vena & sit, & dici possit. Vasa quoque omnia oblonga sunt, & teretia corpora, quęque vniuerso corporali quid deferunt, ac deportant, quę sane conditio Venis non minus ac arteriis, & nervis competit. Ut tamen à cæteris vasis distinguamus, in definitione, *Venas sanguinem deferre* addidimus.

mus, qua quidē in re à Neruis maxime differūt, cum hi spiritus animales purissimos, & ab omni terrestriore materia liberos vehant, hūc autē sanguinē, fibrosum, & crassiorē dicimus, vt & ab arteriis in quib. liquidior tenuiorq; fluit, distinguantur. His n. duab. vocibus vtriusq; sanguinis discrimē exprimere hic volumus, nō quod aliā differentie nō sint, quā hæ duæ, sed quia istæ præcipuæ sint, & quæ familiā ducunt, maximeq; formalē distinctionē insinuare videntur. *Primo* enim Venarū sanguis fibrosior est, id est, plures habet fibras. Quid autē fibræ sanguinis sint, præclare explicat Arist. 1. de part. anim. c. 4. & 3. hist. anim. 6. vbi *αἵ δὲ ἴσες*, inquit, *γῆς εἶσι, fibræ autē sunt, quicquid in sanguine terrenū est*: sed de his postea pluribus, cum de sanguinis natura agemus. *Secundo* idem quoq; crassior est, cū contra arteriarū sanguis attenuatus sit magis, per concoctionē; eam sc. quæ in Corde fit, vnde eleganter Philosophus, 2. de gener. anim. 6. *hunc περιέχον, ἢ καὶ διαπερνάτω, ἢ περιέχων τροφῶν*, concoctū, purissimū, & primū: illū, deterius nutrimentum, appellat. *Color* quoq; vtriusq; sanguinis discrimē ē vestigio exprimit, cū ille nigrior sit, hic rubicundus: ille, spiritū expers, hic pragnans: ille, quiete fruens, hic perpetuo, & indefinente motu agitur. *Ultima differentia* in definitione quoq; attacta est, per quā simul & actio. & vsus Venarū explicatur. *Actio* quidē, quia sanguinē conficit concoquēdo; *Vsus*, quia defert per totū corpus confectū jam, & inde distribuit propter nutritionem corporis. Sanguis ergo Venarū fibris & crassitie sua nutrit: at arteriarū, spiritibus & calore viuificat. Cæterū substantia venarū *mēbranosa* est, tenuis, & rara, & propterea *simplex*, vt per eam sanguis hic ad nutritionē facilius trāsfludet: *triplici autem fibrarū genere intertexta*, rectis, obliquis, & transuersis, nō tantū propter vsum, quē priuatū habet, sed etiā propter actionē, quæ publica est. *Rectis* enim attrahit: *obliquis*, retinet: *transuersis* expellit. *Rectæ*, secundū longitudinē ipsarū expanduntur; *obliquæ*, & *transuersæ*, secundū latitudinē: sed illę, obliquę; hæ, rectæ feruntur. Has qui velit cernere, truncos oportet insignes venarū maiorum animalīū vti elixet: q̄ si similes his quid intueri libeat, fibras in ventriculi interna tunica, vel vesica contempletur. Est autē hæc substantia *omnis sensus expers*, quia & vti, & scindi possunt venæ citra dolorē, idq; magna sanē Naturæ providentia, cū venæ hoc pacto, modo sanguine deficiente, in se sublidere: modo abundāte, turgere, & extēdi cōmode queāt, Homoq; ab illa molestissima, *ἀεὶ μαθητὴς* vēdiceretur, quā necessario alias incurreret, si sensum aliquē fuissent noctę. Non minus enim à sanguine copioso, sensu præditæ, dolore nos afficerent, ac partes carnosę cum inflammata, solēt. Cæterū hæc *tunica simplex* est, nō vbiq; tamē, sed vbi musculis defenditur, aut alia quāpiam parte ambiente. Quæ enim cuti proximæ, vel suspensæ sunt, duplici tunica constant, accedente à vicinis partibus alio inuolucro. Sic enim tutius vena deducitur, cum partibus cōterminis alligatur. nec sanguis frustra exsudat, quādo per partes, quę multum nutrimenti non requirūt, vena progreditur: in illis autem quę vnica tunica inuestiuntur, facile transsudat. Hoc tamen *notandum* est, illis vna cū membranis adnatis sensum accedere, vt dolores oriātur sepe circa dorsum in febris, & lūbos, vbi mēses insistant, turgente ibi sanguine. *Figura* venis est caua, canaliū in morē. Sic. n. & plurimū capit alimēti, & tutior est vena aduersus externas iniurias. Quoad *magnitudinē*, tāta cuius parti est vena, quāta requirebatur. Magnis ergo magnę quoq; venę sunt; paruis cōtra, paruę. Sed & magnę illis sunt, quę plurimo alimēto indigebant, q̄ id absumat facile,

Venarum
sanguis
in quibus
ab arteriarum
sanguine
differat.

1.
2.

3.

Substantia.
Fibra.

Vena carente sensu.

Sunt simplices non tamen v-bique.

Figura.
Magnitudo.

& vel ob raritatē substantiæ, vel calorem abundantiorē, vel motus continuitatem. Sic pulmones, & muscoli magnas habent venas: ossa contra minores, quia densiora sunt, frigidiora, & motus expertia. *Numerus* venarū tantus est, ut numero exprimi nō possit. Infiniti enim sunt ramuli, qui cum separati non sint, sed ab aliis atque aliis dependant, qui tandem in magnos truncos desinunt, aut potius à truncis oriuntur, venarum numerum ut plurimum definire solemus, dum truncorum, ex quibus descendunt, numerum exprimimus. Quamobrem si vulgatam intueamur opinionē, quatuor erunt Venæ, ex quibus reliquæ omnes nascuntur. *Prima* vena, Umbilicalis est: *Secunda*, Arteriosa: *Tertia*, Vena portæ: *Quarta*, Caua. Cæterum cum umbilicalis primo quidem reuera peculiaris truncus non sit: sed ^a ramus tantum Venæ portæ, ut cuius clare patebit, qui persequi cum industria venam hanc in hepatis parenchymate conabitur: deinde, cum in lucem prodeunte fœtu venæ officio amplius nō fungatur, sed ligamenti loco hepati inferuiat: tres duntaxat videntur esse venæ, à quibus cæteræ omnes enascuntur. Sed enim cum Vena arteriosa ad pulmones solos abeat, nec præter hos alteri alicui parti nutrimentum deferat, duas tantū ponemus primarias Venas, Portæ. sc. vocatā, & cauam. Est autem maxime necessaria futuro medico perfecta distributionis omnium Venarū cognitio, non solum ut in morbis ex fluxione humorū dependentibus, quales frequentissimi esse cōsueuerūt, utrumq; fluxionis terminū, mediaq; vias exacte cognoscat: sed & pro reuellendis, aut diuertendis iisdem, locū venæ sectionib. aptum, apte possit discernere. Quamobrem autem duæ venę sint, nec ut arteria, vna continua, in sequentib. cū res scitu maxime digna sit, quanta fieri poterit, summa diligentia, explicabimus. *Situs* venarum connexionē; & sedem earundē indicat. *Sedes* quæ sit unicuiq; ramo ex historia patebit, in qua omniū ductus describemus: ad *connexionem* autem origo pertinet. De hac cum controuersia sint inter Philosophos & Medicos, quod illi quidem cor, at hi lecur principium venarum constituent, totum tertium huius libri caput huic negotio assignabimus. Dignissime autem sunt, quatum mentio hic fiat, ^b membranulę quędam exiguæ quæ in nonnullis maioribus venarum ramis reperiuntur, sed in primis in illis, qui in artus, brachia, in quā, & pedes disseminantur. *OSTIOLA* & venarum *VALVULAS* appellant, quod sanguini impetuose in motibus harum partium irruenti, viā valvularum in morem intercipient. Hæ ^c exterius si quando validius brachium fascia stringatur, manifeste nodis per venas apparentibus, aduertuntur. Earum primus inuētor nostra ætate fuit, *Hier. Fabric. ab Aquapendente*, Vir de Anatomico studio, & Medicina oppido quam bene meritus. Is in Theatro, princeps magnum hoc Naturæ mysterium humanis oculis, sed postea elegantiore tractatu animis quoque obiecit. Constant hæc Valvulę ex membrana quadam tenuiore, quam est ipsa vena, valvulis illis figura prorsus similes, quæ in corde reperiuntur. Cavitare sua Venæ cauæ truncum spectant, at conuexa sede exteriores artuum partes.

Neq; vero hoc loco prætereūdæ sunt ^d *GLANDULÆ*, (Græci *ἀδένες* vocāt) substantiæ quādā laxæ, & molles, quæ Venis, & Arteriis appositæ sunt, non tamen ubiq; , sed tantum circa vasorū diuarcationes: neq; in his omnibus, sed in iis tantum, quæ ruptioni opportunę perquam essent, vel, quia suspensæ sint, & remotæ ab aliis partibus; vel, quia circa articulationes laxas, quæ in angulum admodum acutum flectuntur, consistunt;

vel, T.T.T.

Num-
rus.

Necessi-
tas histo-
ria Venarum.

Situs.

VALV-
ULÆ.

Inuentor
valvularum.

GLAN-
DULÆ.

a, hoc cla-
re demō-
stratum
in hepate
excarni,
B. 8. 2.
D.D.

b, 5. 3 +

c, 5. 1 +

d, 4. 1. 4.
R. & in
mesente-
rio fre-
quentif-
sime 8. 7.

vel , quia partibus adiacent , quæ motibus aut validis , aut continuis agitantur,

ACTIO Venis nulla vulgo communis tribuitur: ostendam tamen capite tertio, reuera venis *αἱμάτωσιν*, quam Aristoteles Cordi, Galenus Hepati tribuit, competere: hep-
par autem, & cor, longe aliam actionem obire. Interim concludamus, *Venarum actionem* sanguinis confectionem esse: *Vsum* autem, eiusdem confecti per corpus distribu-
tionem. Hanc ut perficiant, quatuor facultates habent ministrantes. *Attrahunt* enim
chylum ex intestinis, per fibras rectas; attractum *retinent*, per obliquas; *concoquunt*, per
calorem partim proprium, partim influentem à Corde, quam ab arteriis per anasto-
moses hauriunt: *expellunt* tandem, quæ generata sunt excrementa. *Ceterum* cum Venæ
per vniuersum corpus sanguinem deferant, dubitatum est ab Antiquis, an eadem san-
guinem quoque pronutritione ad singulas partes expellant. Fuit enim *Erasistratus*, qui
ex venis sanguinem effundi statuit, & sic non deferri tantum per venas, sed etiam tru-
di credidit. At ego contra existimem, postquam chylus in sanguinem versus sit, à carni-
bus potius, cæterisque partibus trahi. Fauentem habemus in hac opinione ipsum Hip-
pocratem, quem vnum omnium Anatomicorum doctissimum existimo, qui 6. Epid.
sect. 6. eleganti sententia, *σάρκας* inquit *ὀλαὺς* & *ὀκ κοιλίης*, & *ἐξωθεν εἶναι*. *Ἰσχυρὸν ἢ ἡ ἀδυναμία* αἷς
» *ἐκπνοὸν* & *εἰσπνοὸν ὅλον τὸ σῶμα*. Carnes attractrices & ex vêtre & extrinsecus sunt. Indicio
» est sensus ipse, quod expirabile, & inspirabile est totum corpus. Carnes ergo sunt quæ
» attrahunt: non tamen carnes tantum, quæ proprie sic dicuntur, cuiusmodi est muscu-
lorum substantia, sed quæuis pars nostri corporis, quæ sanguine nutritur.

ACTIO.

Questio.

CAPVT II.

Differentias Venarum breuiter enumerat.

Differentiæ Venarum diligenter tradendæ sunt, tum quia ad historiam particula-
rem plurimum momenti conferunt, tum quia nonnullæ earum sunt, quæ Medi-
cinæ Candidatis sæpe in arte occurrunt. Ratione ergo *substantiæ* Venæ inter se diffe-
runt, quia crassiores sunt, vel tenuiores; simplicē tunicā habent, aut duplicem, eamque
sensu carentem, aut sensu præditā, ut diximus. Ratione *Magnitudinis* discriminē est notatu
dignissimū, propter febriū doctrinā, in qua frequens eius occurrit mentio. Sunt enim
Venæ quædam magnæ, aliæ mediæ, nonnullæ paruæ, aliquæ etiam minimæ. *Magnæ*
sunt, ut Truncus, Venæ cauæ ^e ascendens, & ^f descendens, rami giliaci, ^h subclauii, ⁱ ju-
gulares, & ^l emulgentes. *Mediæ*, illæ in quas rami ^m iliaci, & ⁿ subclauii diuiduntur, Ve-
na iugularis externa, P rami maiores Venæ cauæ, per jecoris substantiam transeuntēs.
Paruæ vero, quæ in habitu corporis consistunt, & per musculos dispersæ sunt, aut per
viscera, ut per lecur, Lienem, Renes, Intestina, Mesenterium, Vterum, Pudēda. *Minimæ*
tandem vocantur illæ, quas *τειχιόμυες* Græci, quasi Capillares, appellant, quia pilorum
crassitiem non multum superant. Hæ perquam bene in q hepate, aut ^r liene à sua car-
ne liberato, sed & in alba oculi tunica in homine viuo conspicuæ sunt, cum ophthal-
mia laboramus, alias visum ob tenuitatem effugiunt. Quoad *figuram*, quædam rectæ
sunt, ut venæ cauæ ^f truncus, & ^t emulgentes, quædam curuæ, ut ^u capreolares, præ-
parantes scilicet dictæ, vbi cum ^x arteriis similiter præparantibus multis vasorū oscu-
lis implicantur. A *sede* multiplex differentia peti potest. Aliæ enim per Ventres excur-
runt,

Differē-
tiæ vena-
rum.A *substā-
tia*.A *magni-
tudine*.A *figura*.A *sede*.

runt, alia per Artus, & ab hac nonnulla nomen habent proprium, vnde y Phrenicæ y, c. dicuntur, quæ diaphragma perreptant; z Iugulares, quæ per iugulum feruntur; a Re- z, 4.1.O. nales, quæ per renem: nonnulla nomine tali destituuntur. *Connexionis* ratione etiam a, 8.10.C. discrimen est. Quædam enim cum carne neſtuntur, vt quæ in muſculis ſunt: quædam cum Neruo, vt Baſilica in brachio; quædam cum Arteria, vt pleraq; omnes maiores. Vt plurimum enim quævis vena arteriam ſibi ſociam habet, & fere vena arteria incumbit: ſape tamen duntaxat & lateri adiacet. Hac enim ratione ſanguis per vniuerſum corpus ad partes iuxta ſuperiores, quam inferiores facile propellitur, & ſimul ventilatur motu, atq; à putredine conſeruatur. Cæterum vt raro admodum venam ſine comite arteria reperire eſt, imo nunquam, ſi diſcedas ab ijs, quæ *Cutaneæ* dicuntur, qualis eſt ramus Cephalicus: ita contra, nunquam videre licet arteriam, quæ abſque ſocia vena incedat. Vbiq; enim arteria eſt, ibi quoque vena cernitur. Ratione *uſus* denique, maxima eſt differentia. Nam etſi, vt ſtatuiſmus, primarius venarum uſus ſit ſanguinis per vniuerſum corpus diſtributio: ſunt tamen & alij quidam particulares. Sic nonnulla chylum ad ſanguinis generationem attrahunt, vt ſunt b meſaraicæ; quædam excrementa purgant, & euacuant, quemadmodum c Vteri venæ, & Hæmorrhoides, per quarum illas menſtruatur, per has vero nonnunquam, quicquid in corpore excrementoſi eſt humoris, expurgatur. d Emulgentes etiam ſanguinem à ſero liberant. Sed & ſunt quæ materiam deferunt pro ſemine, vt e præparantes dicta; & quæ ſemen jam conſectum deportant ad glandulas ſeminales, vt f Deferentia vaſa.

b, 8.7.P.
P. P.
c, 8.21.2.
N. N. N.
d, 8.13.E.
E.
e, T. T.
f, X. X.

CAPVT III.

Diſceptationem Medicorum, & Philoſophorum de principio Venarum continet: tum Authoris ſententiam in medium adducit, & probat.

DE Venarum principio inter Peripateticos & Medicos maxima liſ eſt. Illi enim Cor, hi Iecur principium faciunt, vtriſq; ſuum ducem Ariſtotelem, aut Galenum ſequentibus. Ego vero fruſtra quæri exiſtimo quod nam ſit Venarum principium, cum prius quærendum ſit an illud derur. Habemus enim authoritatē doctiſſimi Hippocratis, lib. de oſſibus, minime proſecto ſpernendam, vbi Venæ, inquit, per corpus diſfuſæ, ſpiratum & fluxum, ac motum exhibent, ab vna multæ germinantes, atq; hæc vna, vnde oriatur, & vbi deſinat, non ſcio. Circulo enim factō, principium non inuenitur. Hæc ſententia, vt à ſummo in re Anatomica viro proſecta eſt, ſic optime rationibus ſtabiliri poſſe videtur. Nam vti hinc incipiamus, probat ipſa ocularis inſpectio, Venas omnes per ſe ſubſiſtere. Cum autē nemo ſic abſurdus adhuc fuerit, vt parti, quæ per ſe exiſtat, principium adſcribere voluerit, quemadmodum haud quisquam fuit, qui cordis, cerebri, aut Iecoris originē ad aliam vllam partē reuocauerit, cur Venarū principium quæramus? Vt cunq; autē & anxie aliquod inueſtigauerimus, nullū reuera eſt, ad quod reduci, ſi quod ſtatutum fuerit, poſſit. Cum .n. tria vulgo ponantur principiorum genera; vnū, γενέσθαι, Originis, quod ipſi rei (vt loquuntur) dat eſſe; alterum, ἐκείσθαι, ſiue Radicationis, à qua velut à radice res exoritur: tertium tandem, διακρίσθαι, Diſpenſationis,

A conne-
xtione.

Ab uſu.

Hippocra-
tis de Ve-
narū prin-
cipio ſen-
tentia.

Probatur
argumētis
duobus.

1.

2.

fationis; vnde facultas ac virtus influit; nullum commodè venis assignari potest. Nec enim *Originis principium* ab alia parte habere possunt, cum nulla pars sit, quæ ante venas generetur. Partes. n. omnes, quæcunq; ad nutritionem faciunt, vt Cor, Iecur, Venæ, Arteriæ, ac si quæ sunt aliæ, simul formantur in vtero, sequiturq; Natura in hac reperti pictoris consuetudinem, qui vt primum lineamenta quædam rudi minerua ducit, quæ postea coloribus & alijs ornamentis perficiat; sic ipsa primum, rude omnibus partibus simul stamen, vt sic dicam, largitur, postea subtegmen inijcit.

Vena non habent principii originis.

At neq; *Radicatōis principium* in venis statuendum est. Cum enim similitudo hæc ab arboribus desumpta sit, in quibus Radix est, Truncus, & Rami: eandem similitudinem in venis accommodari, nisi vnico in casu, quoad propagines scilicet, & diuisiones docendas non posse, hinc demonstrari facillimo potest negotio, quod radicationis principium inepte ponatur in ijs, in quibus radix nulla est. Radicem. n. quis est, qui in venis velit statuere, cum nulla sit venarum pars, quæ radicis gerat officium? Radix enim alimentum trahit à terra, pro trunco, & ramis: at ex venis nullæ sunt, quæ pro alijs trahant alimentum. Quod si videantur forte esse, quemadmodum Venæ Mesaraicæ, jam non sanguinem illæ, sed chylum tantum, & materiam ex qua sanguis, & vltimum alimentum tandem generatur, attrahunt. Atq; vt largiamur quoq; dari aliquod venarum radicationis principium, non video, quæ venæ mesaraicis rectius statui possint, cum aliæ non sint in corpore, quarum actio propius ad radicis officium, quam earum, accedat, & tamen hæ ab omnibus repudiantur. Taceo, si quod ponendum fuerit dari Radicationis principium, non vnum, sed plura potius, vt pote tria, aut minimū duo ponenda esse, cum portæ vena vnum, alterum caua, tertium arterialis sibi vendiceret: at tot principia non nisi absurde omnino statuentur. Nam si duæ, vel tres essent venarum radices, illæ vel in vnica aliqua parte forent, vel in pluribus; sed neq; in vna esse possunt, neq; in pluribus. Ergo non possunt esse duæ, aut tres radices. Non possunt esse in pluribus, quia plura venarum principia radicationis constituenda essent, cum tamen & à Galeno, & ab Aristotele vnum tantum ponatur. Non in vna, quia vna illa pars contineret in se necessario partes contrarij officij. Cum ergo neq; vnum principium radicationis, neq; plura statui possint, quin protinus nascantur incommoda varia, sequitur, nullum prorsus radicationis principium ponendum esse.

Neq; radicationis.

1.

2.

3.

Sed nec tandem *Distributionis*, siue vt loquuntur, *dispensationis principium*, à quo facultas, aut sanguis emanet, admittendum est. Ostendemus enim, nec sanguinem alibi, quam in venis confici, nec facultatē in venas aliunde influere. Ac jam omittamus Galeni auctoritatem, qui lib. 3. de natur. facult. cap. 9. vbi in Venis sanguificam facultatē ponit, sic tandem inquit: Cæterum potentia illa, vel facultas in Venis, quam sanguificam appellant, atq; etiam alia quæuis facultas, in relatione ad aliquid intelligitur. Et paulo post: Ac quod agentis causæ substantiam ignoramus, facultatem eam, siue potentiam appellamus, in Venis quidem potentiam quandam sanguinis factricem dicentes. Sufficit in medium attulisse rationem vnicam, quā diligentius postea pluribus confirmemus, & explicemus. Sanguificatio enim, vel in corde constitui debet, vel in iecore, vel in Venis, propterea quod animalia omnia, quæ sanguinē habent, omnes hæc partes habeant: quæ vero sanguine destituuntur, ijsdem quoque careant. Sed neq; in corde, neque

Neq; distributionis.

*Quodin
Corde, &
iecore san-
guificatio
non fiat.*

1.
2.

3.

de, neque in jecore constitui potest: relinquitur ergo ut in Venis ponatur. *Quod autem* neq³ in corde, neq³ iecore fiat, ex eo manifestum esse potest, quod antequam cordis, aut Hepatis parenchyma exstructum est, sanguis in venis generetur. Nam dum pullus in ovo delineatur duobus primis diebus, sanguis jam fit in venis umbilicalibus, antequam vel jecoris vel cordis parenchyma factum est, in quo alij sanguificationis facultatem consistere affirmant. *Quod autem nec in Hepate tantum fiat sanguis*, speciatim ex actione ipsius lesa probari potest. Si enim ipsum sanguinis officina foret, scirrho affectu, paucos certe dierum spatio, in mortem quosuis conijceret, cum fame & tabe pereundum esset, omni sanguinis generatione intercepta. Sed enim videmus esse quam plurimos, qui multo tempore, & per annos etiam, cum scirrho jecoris vitam traxerunt. *Quin* imò, si à Iecore sanguis conficeretur, utique ab ipso parenchymate Iecoris, non à venis per ipsum dispersis fieret. Sed non fit à parenchymate. Quod enim non tangit nutrimentum, ab eo sanguificatio procedere non potest, cum omnis actio naturalis, qualis alimenti est concoctio, per contactum fieri debeat. Sed jecoris parenchyma non tangit nutrimentum, quia venæ potius sunt, quæ ipsum proxime tangunt, ut pote in quorum conceptaculis continetur.

Quare recte concludimus, Venarum nullum omnino esse principium, cum à nulla parte, neque oriantur velut à materia componente; neque ab vlla, tanquam radices emergant; neque tandem ab vlla facultatem sanguificam mutantur. Venæ ergo sanguinem generant, sed cum per totum corpus possint præparare, in hepate tamen potissimum conficiunt. Cæterum quia non sufficit probasse tantum opinionem nostram: sed necessarium omnino sit, argumentis etiam aduersariorum satisfacere, ne cui scrupulos iniiciant: nunc quidem ad ea paulo propius accedemus, primum quidem Aristotelis, deinde & Galeni rationes expendentes. Cæterum cum duplex vterque principium statuatur, vnum Radicationis, alterum Distributionis, vtrumque tamen ab vna parte deriuatur, & ille quidem à Corde, hic vero à Iecore, argumenta sic ordine proponemus, ut primo quidem ea in medium afferamus refutanda, quæ dispensationis, deinde & illa, quæ radicationis principium dari confirmant, quod ex illis, tanquam à fundamentis, argumenta hæc ut plurimum dependant.

*Refutatur
argumenta
Aristotelis,
quibus
probat
cor esse
principiū
dispensa-
tionis.*

1.

Sit ergo principium ab ARISTOTELE, qui his rationibus probat cor esse venarum dispensationis principium *Primo*; ubi est fons caloris, ibi est sanguinis officina: at in corde est fons caloris. Ergo ibi quoque sanguinis officina, & per consequens, inde in venas & caloris & sanguinis distributio. Atenim non valet consequentia, quod cordis calor etiam extra cor in venis sanguinem generare possit: neque calor hic primario ad sanguinis generationem concurrat, sed secundo, quatenus scilicet harum calorem innatum, qui primarius opifex est, fouet suscitaturque. Hinc factum, ut maioribus venis, vel procul à corde distitis, arterias Natura vbique sociarit, quo idem calor in venis etiam longinquis, custodiretur. *Secunda ratio est.* Quæcunque pars sanguinis cisterna est extra venas, illa sanguinis officina merito æstimanda venit. atqui cor est talis cisterna. Ergo & sanguinis officina merito appellanda erit. Respondeo, consequentiam non bene inferri. Non enim in cordis ventriculos alimentum fluit, ut ibi in sanguinem elaboretur, sed ut sanguis crassior & frigidior, partim attenuetur, partim calidior

calidior euadat, inde per arterias in vniuersum corpus pellatur, pulmonibus quoque, & partibus supra cor positis suppeditetur. *Tertia ratio.* Si sanguis aliunde non venit, quam à corde, necessario cor sanguinis officina statuitur. Verum id foret, si probari posset non aliunde venire. Quod si probe Aristoteles per partium generationem, & animi passionem, falsam dico esse probationem. Non enim verum est, cor prius fieri, ac sanguinolentum est, cum omnes partes in prima seminis delineatione simul formantur. Nam, ut ante diximus, quemadmodum pictor animal depicturus, primum ipse delineat, mox coloribus perficit, ita Natura omnes partes prius delineat, postea absoluit. Simul ergo cavitates, tum in corde, tum venis, & arterijs, aliaque quauis parte, quod opus, efformat. Hinc facultatem nutritiuam, maxime omnium necessariam suscitatur, per quam maximum fit desiderium omnibus partibus alimentum debitum attrahendi. Ex quo fit, ut quamprimum partes formatae sunt, omnibus modis trahatur ab ipsis alimentum, quod est sanguis. Prius ergo sanguinem adesse necesse est, antequam cor generetur, ut genitum statim alimentum inueniat. Patet ergo per generationem male probari ex corde sanguinem omnem promanare: sed nec ex passionibus animi id conuincet, dum dicit, ibi fluxum & refluxum sanguinis esse, ubi animi & sensuum motus oriuntur, & propterea ex corde, quia ibi sedes passionum. Probandum enim est assumptum. Quod si dicat, Iram quae una est ex passionibus animi, ab omnibus vulgo definitur, accentionem esse sanguinis circa cor, id quidem male fieri responderim. Sequeretur enim, animal quod sanguineum non est, irasci non posse, & ea quae ex sanguine sunt, animi affectiones non pati, quod tamen ipsum vel commune illud, & tralatitium pro uerbum, quod vulgo fertur coarguit, ἔχει & μύια σπλήνα & μύρια ἔχει ἢ χολή, habet & musca splenem, & formicis sua bilis inest. Locusta certe, quae ex crustaceis est, & metuit, & irascitur, cum polypo congressa. Testatur hoc Aristoteles, lib. 8. hist. anim. 2. vbi, Locustae, inquit, vel pisces maiores conuincere possunt. Euenit usu, ut locustis polypi superiores sint, & adeo ut si in retibus eisdem senserit locusta polypum, praeter metu emoriatur. Pauet & locustam congrus, & rursus polypum congrus lacerant. Sed quid de apibus dicendum, quam non in hostes suos, & fures sui dulcis illius liquoris furibundae, ut in eos inuolant, ut aculeis pungunt: Vesparum nidos aggredere, quibus ad vlciscendum ἀλκίμων ἦτορ, non κελεύει doctissimus Poëtarum Homerus tribuit. Constat ergo animalibus quoque, quae sanguinem non habent, animi affectiones esse.

Sed neque Radicationis principium in Venis constituitur. Cor potest, quamquam multis id demonstrare rationibus conetur Aristoteles. Venarum enim, inquit, primo principium, aut Iecur est, aut Cor, aut Cerebrum. Sed neque Iecur, nec Cerebrum. Ergo Cor. At enim negatur maior, cum prius probandum foret, an sint principia venarum, antequam quod sit conemur ostendere. Deinde, ubi unum est principium, ibi in medio collocari debet: at in animalibus unum est principium. Negari debet & maior, & minor. Maior, quia non semper aptissimus locus est principio medius, cum modo cernamus magis in superiore parte positum esse cor, quemadmodum in piscibus, serpentibus, & lacertis modo in medio, ut homini, alijsque nonnullis animalibus. Minor quoque negatur, quia plura sunt praeter cor principia animali, ut cerebrum, quod neruorum principium est, & motui inferuit, & sensibus. *Tertio*, si tria vasa oriuntur à corde, Arteria,

Aa

inquam,

Refutatur argumenta, quibus probatur cor esse principium Radicationis.

1.

2.

3.

inquam, magna, Vena arterialis, & Arteria venalis, cur non Vena quoque caua? Ex hoc argumento non sequitur, omnes venas ex corde prouenire, quemadmodum certe nullatenus vena portæ hinc oritur, quæ cor ne attingit quidem, sed tantum eas, quæ basi cordis infixæ sunt. Quamobrem hæc ratio, Aristotelis opinionem destruet potius, quam probabit, cum demonstrare manifesto liceat, Portæ Venam à corde longissime distare, tantum abesse, vt ab ipso nascatur.

Renellatur ratio- nes G A- LENI, quibus probat Iecur esse princip. Dispensationis
 1. Iam ad argumenta GALENI deueniamus, quibus duo probare conatur. Primo, Iecur esse principium Venarum Dispensationis, deinde & Radicationis. *Primum* probat similiter vt Aristoteles, quia scilicet Iecur sit sanguinis officina. Cum ergo Venæ sanguinis sint canales, ipsum necessario ex officina petent & per consequens ex Iecore, quare Iecur erit principium distributionis venarum. Quod autem sit sanguinis officina Iecur, probat hoc primū argumento. Cuius substantia est conuenientior ad sanguinis generationem, quam cordis, in eo debet constitui sanguinis officina: at in Iecore parenchyma est talis substantiæ, quod vel cuiusvis oculi probant, cum sanguinis instar rubeat. At non probant, inquam ego. Verum quidem est, vt hoc largiar, animalibus nonnullis rubrum esse parenchyma, vt homini, & quadrupedibus: pluribus tamen etiam viride est, vt Lampretæ, & nonnullis album, vt piscibus. Si ergo verum illud foret commune Galeni axioma, quod mutatur in mutantis speciem abit, sequeretur, viride & album hepatis parenchyma, sanguinem eiusdem coloris generare: at sanguis tamen lampretæ, & piscium ruber est. Quin imo nec in homine quidem ipso rubrum est parenchyma per se, sed tantum à sanguine colorem habet. Id inde patet, quod maceratum paululum in aqua, aut leuiter coctum, albedinem protinus, sanguine scilicet eloto, contrahit. *Secundo*, si sanguinis officina ponatur in corde, Iecur frustra esset conditum. Non sequitur. Habet enim vsum admodum in animali nobilem, vt scilicet eam, quæ in ventriculo sit, chyli concoctionem adiuuet, tuendo fouendoque ipsius calorem, id quod & ipse Aristoteles, & Galenus quoque agnouit, sed & à nobis inferius, vbi de hepate sermo erit, prolixius postea demonstrabitur. Et hinc est, quod animalia, quibus Ventriculus est oblongus, & secundum longitudinem corporis positus, eadem & Iecur oblongum, & ventriculo adnatum habeant. Cætera argumenta quæ ad Aristotelis opinionem demoliendam faciunt, non opus est, vt hic multis refutentur, cum tantum nostram adstruere, quantum illam destruunt, videantur. Similitudo autem quam ab officina ferraria in medium affert, prope quam recrementa ferri inueniuntur: vnde concludit Iecur sanguinis officinam necessario esse, quod & circa ipsam sint excrementorum receptacula, puta vesicula felle, inualidior illa est, quam vt mereatur refutari. Non enim probat parenchyma hepatis sanguinem conficere, sed tantum venas in hepate, ex reliquis venis potissimum sanguinem generare, quia & ex ipsis ad vesiculam felle canales transmittuntur, non à parenchymate. Nos autem & ipsi largimur hoc lubenter, & eiusdem sumus sententiæ, venas in Iecore præ aliis vniuersi corporis ad sanguinis concoctionem facere.

Renellatur ratio- nes, quibus probatur
 Radicationis principium esse iecur, sic probat Galenus. *Primo*, Quemadmodum in arboribus sunt radices, truncus, & rami: ita & in Venis. Vt ergo radices arborum ex terra nascuntur: ita etiam radices venarum ex aliquo viscere prodire necesse est. Tale autem erit

erit Iecur, cum circa illud radices videantur, non circa Cor, neque circa Cerebrum. *Iecur esse*
 Respondeo, hanc similitudinem nihil probare de officio venarum, ut alia scilicet sint *principiū*
 tanquam radices, alia velut truncus, rami, aut surculi: sed tantum formam, & modum *Radica-*
 distributionis, prout nobis per corpus sparsa apparere solent, insinuare potest. Quod si *tionis.*
 Iecur Radicationis principium poni debeat, probandum erit, Venas quæ per ipsum *1.*
 disperguntur, Radicum officio fungi. *Secundo*, Minora maiorum non sunt principia. at *2.*
 Caua circa cor minor est, quam circa hepar. Ergo circa Cor principium esse non po-
 test, sed potius circa Iecur. Vtraque propositio falsa est, & vel experientia prompte re-
 futari potest. Nam si de falsitate maioris dubitas, aspice sodes, fluuiorum ortus, quo-
 modo ex paruis sepe fonticulis nascantur. Si de minoris falsitate ambigis, profecto aut
 oculorum hebetudine laboras, aut, si quidem recte hæc intuearis in homine, & ceteris
 animalibus sanguineis, nihilominus autem tuis ipsius oculis fidem detrectes, laboras
ἀπὸ πῶς καὶ διὰ τοιαύτας, ut loquitur Aristoteles.

Cæterum sub finem huius capitis, postquam & nostram opinionem stabiliuimus, & *Refutan-*
 aduersariorum argumentis, quibus suam adstruunt sententiam, satis fecimus, restat ut *tur argu-*
 illis etiam argumētis respondeamus, quibus nostram impugnant. Quod ergo à Venis *menta,*
 sanguificatio haut fiat, sic argumentantur. *Primo*, Pars frigida & alba inepta est ad san- *qua cōtra*
 guificationem. Venæ sunt tales, quia membranæ. Ergo, ineptæ sunt ad sanguinis ge- *sententiā*
 nerationem. Respondeo, Venarum substantiam frigidam quidem esse per se, calefieri *Authoris*
 tamē abunde, tum à partibus vicinis, & imprimis à parenchymate hepatis, in quo ma- *asserun-*
 xime ipsa sanguificatio celebratur, tum etiam ab influente ex Corde calore, qui potis- *tur.*
 simum per arterias communicatur, & quæ ipsæ sua vicinitate mutuisq; osculis pluri- *1.*
 mum caloris aspergunt. Cæterum si Venæ ob membranæ substantiam ad sanguinis
 generationem ineptæ sunt, non video profecto quomodo ventriculus ita aptus ad
 chyli confectiōem esse queat, qui & ipse ex membranis, paucis carnosis fibris inter-
 textis, exstructus est. *Secundo*, Quod mutatur in mutantis speciem mutatur. Ergo, si Vē- *2.*
 næ generant, quin albæ sunt, humorem quoque candidum generabunt: at sanguis ru-
 ber est. Ergo, à rubra aliqua fit substantia. Falsa est maior. Id enim expresse discēs ex
 pluribus animalibus, sed iis præcipue, quæ virides adhuc plantas, & gramina come-
 dunt, qualia sunt oues, bouesque, quæ viridem quoque chylum conficiūt, cum tamen
 ventriculi tunica interior sit alba, quin imo & inter homines, qui vinum bibunt ru-
 brum, cæterum parum comedunt, iis ruber quoque fit chylus, à quo vsq; adeo tingun-
 tur sæpe intestina, ut ignaris possint illudere in dissectionibus, quo ab inflammatione
 horū, hominem mortuum esse, sibi persuadeant. Atq; id non semel, sed toties totiesq;
 hic Patavi in suspensis, & aliis vidimus, cum alias Patavini rubris vinis delectentur.
 Cæterum quod chylus alias plerumque albus sit, si quis carnibus vescatur, id contin-
 git propterea, quia quemadmodum de hepate ante diximus, colorem ipsum rubicun-
 dum non habere per se, sed à sanguine, qui coctione propterea postea facile amit-
 titur: ita & carnes dum in stomacho concoquuntur, amittunt
 colorem illum carneum, & in album chylum
 transmutantur.

CAPVT IV.

Cur dua vena, Porta nempe dicta, & Caua facta sit, tum qua ipsarum inter se differentia sit, & connexio.

*Cur dua,
non vna
Vena facta
sit.*

NATVRA prouida & solers, non vnā Venam condidit, quemadmodum vnā Arteriam: sed duas, vnā, quā Portæ vocant; alterā, quam Cauam: quod duplicem oportuerit esse eum sanguinē, qui corporis nutritioni dicatus est, illum quidem crassiores, qualis in Vena portæ continetur: hunc tenuiorem, ut est ille, qui in vena Cava. Partes enim, quas naturales vocant, & alimentum concoquunt, crassiore indigebant alimento: at carnosæ & musculosæ, tenuiore, magisq; elaborato. In crassiore enim materia & solidiore, & diutius calor conseruatur, & fortior quoque est: calore autem omnis cōcoctio absolvitur. Quod si vnus jam esset continuusq; ductus in venis, quemadmodum in arteriis, prohiberi certe non poterat, quo minus hic duplex sanguis confunderetur. Duæ ergo factæ sunt, quæ ne consortio mutuo carerent, ecce quam ingeniosum Natura effinxit commentum, ut vtrinque prospiceret. Si enim vnā fecisset duntaxat, ut demonstraui, confusio orta foret: si duas, non esset communio facta. Sic ergo cōformauit, ut nec vna esset reuera, nec duæ, sed & duæ viderentur, & vna. Hanc rem consequuta est, duarum venarum ramos mutuis quibusdam oscillis, quæ anastomoses vocant, inter se coniungendo, vnde & sanguis diuersus est in vtraque, & transire simul potest ab vna ad alteram, nec tamen confunditur, quia in cauam tenuior tantum pars abit, faculentior vero remanet in vena portæ. Cum ergo duæ sint, altera quidem Portæ vena dicitur, altera vero Caua.

*Vena Porta
vnde
dicatur,
Porta Hepatis.*

Dicitur **VENA PORTÆ**, non **PORTA**, (ut quidam barbare & inepte loquuntur) quia ad portas, puta hepatis, enascitur. Sunt autem **Portæ**, siue *πύλαι*, ab Hippocrate nominatæ, eminentiæ duæ in caua iecoris sede, quo loci hæc vena erumpit, cumque chylus ad hepar per hanc ipsam ascendat, tanquam per ianuam & portam per has eminentias hepar ingredi videtur. De his loquens Hippocrates, libr. de diffect. *ὑπερκαρυσίας*, inquit, *ἔχων δύο, αἷς καλέουσι πύλας ἐν Ἀξίῳις τόποις κειμένας*, hoc est, duos apices, siue eminentias habens, quas portas appellant, in dextris sitas. hinc 2. Epid. mentionem iniiciens huius venæ, ipsam *φλέβα ἐπὶ πύλας*, & *λόβον ἥπατος* appellat, venam quæ ad portas, & lobum hepatis est sita. Dicitur quoque *σελεχιαία*, ἀπὸ τοῦ σελεχῆος, à caudice, quia similis arboris trunco videtur. Ut enim hic ex multis radicibus assurgit, ita quoque & hæc vena ex multis ramis, per Mesenterium, Ventriculum, & Lienem sparsis. Fuerunt etiam qui hanc eandem venam *Iecoris manum* indigitarunt, quod ea tanquam manu hepar alimentum ex ventre & intestinis attrahat. Arabes, *Venam lacteam* appellant, non, quod lacteo, hoc est, albidiore magis colore sit prædita, quam reliquæ Venæ, sed quod lacteus succus, chylus puta, ex intestinis per eam in Iecur intret. Vulgo à Medicis *Vena porta* dicitur.

Vena Cava.

Altera **CAVA** vocatur, ob insignem ipsius cavitatem, vnde *κοιλὴ*, & *μεγάλη*, *Caua*, & Magna Galeno, 14. vsu part. 7. appellatur. Interdum etiam *μεγίστη*, *maxima*, 4. vsu part. 5. ab Hippocrate, *ἡπατίν*, *iecoraria* vocatur.

De ha-

De harum propaginibus antequam dicamus, operæ pretium facturos nos esse duximus, si nonnulla afferamus in medium, quæ de vtraque in vniuersum dici possunt, & imprimis si collatione mutua instituta, vtriusque differentias explicemus. Ratione enim *substantiæ*, ingens discrimen aduertitur, cum Vena Portæ (et si vtraque sit membranea) multo sit crassior Caua, ac fusca magis. Caua contra candidior est, & tenuior. Euenire id, opinor, cum quia illa crassiore nutritur sanguine, tum quia magis nigro: hæc vero tenuiore, ac rubicundiore. Durior quoque est substantiæ Venæ portæ, mollior cauæ, quia illam aptiorem ad dilatationem & constrictionem, quam hanc conueniebat esse, propterea quod Caua in se sanguinem complectatur mobiliorem, tum per se, quatenus tenuior est, tum per accidens, quatenus semper cum arteria coniungitur, quod venis portæ haud ita contingit. nam cæteræ quidem soboles, si Splenicum ramum excipias, non admodum arterias comitatur. Porro tenuitatis causa, copiosum serum est, quod in Venæ cauæ sanguine continetur. Id enim cum modo abundare debeat, modo deficere, vt vena modo magis, modo minus dilatetur, necesse est. Ratione *magnitudinis* vtriusque venæ per Iecur dispersæ, magna est differentia. Nam ^a truncus Cauæ qui in hepate est, multo amplior est, quam ^b venæ Portæ truncus, cum illa pluribus partibus nutriendis quam hæc, dicata sit. Nec enim portæ vena aliam nutrit, quam iecoris partem cauam, intestina, mesenterium, pancreas, lienem, ventriculum, & omentum: at Caua reliquas omnes corporis partes, omnes musculos, omnia ossa, caput cum cerebro, cor, pulmones, diaphragma, renes, vterum, vesicam, & pudenda. Notatum autem dignissimum videtur, plures ^c ramos venæ Portæ per iecoris substantiā sparsos, pauciores ^d venæ Cauæ. Iam quoad *connexionem*, coniunguntur hæ venæ inuicem per ^e *αναστομωσις*. Est autem *Anastomosis*, coniunctio vasorum per oscula, seu paruos quosdam meatus. Cæterum, cum anastomosis duplici fiat ratione, vno cum extrema vasorum extremis aliorum iunguntur, vt epigastrica vasa cum mammariis, in facie interna Rectorum abdominis musculorum nectuntur, quemadmodum libro præcedente ostendimus: altero, cum rami ramis incumbentes, in medio pertusi foramine, sibi adnascuntur: anastomoses Venæ cauæ, & portæ, posteriore in hepate modo contingunt. Circa has *primum* notatu dignum est, non omnes propagines per iecoris substantiam dispersas, per anastomosin hoc pacto coniungi; quin imo ^f plurimas esse venæ portæ, quæ ne pertingant quidem ad cauam, plurimas etiam ^g cauæ, quæ ad venam portæ non accedant. Cuius quidem rei causa adhuc dignior notatu est, cum ex ea pateat, has anastomoses non esse factas, vt omnis sanguis ex porta deferretur ad cauam, sed quidam tantum, isque tenuior. Si enim omnis traducendus foret, quæ ratio esse possit, cur non omnes furculi portæ, omnibus venæ cauæ ramulis coniungerentur, quemadmodum videmus contingere in vtero, vbi furculi per placentam sparsi, cum iis, quæ per fundum vteri disseminantur, pares numero facti sunt, singuliq; singulis per anastomosin nectuntur. Alterum obseruatu dignum est, anastomoses has exiles admodum esse, vt Veteres propterea inconspicuas censuerint: quanquam certe oculos non vsque adeo subterfugiant, si quis animum quoque velit aduertere. Laxiores enim non requirebatur, siquidem cum tenui sanguine portio etiam crassioris & sæculenti sanguinis transiisset. Nec vero propterea tantum hæ anastomoses factæ sunt, vt scilicet ex portæ vena,

*Vtriusq;
Venæ differētia exponuntur.
A substantia.*

A magnitudine.

A connexionē.

*Notanda.
1.*

2.

Vsus anastomoseos.

na, sanguis ad superiora tranſcoletur, ſed &, vt ruſſus ex caua etiam in ipſam inedia tempore nonnihil cederet, dum venæ Meſaraicæ ſunt inanitæ. Quin nec alimēto tantum viam præbent, ſed & prauis quoque humoribus, & excrementis, quæ interdum ab vniuerſo corpore per cauam ad inteſtina, nonnunquam contra à portæ venæ, ad cauam transferuntur. Verum id eſſe aptenos docet aphoriſmus apud Hippocratem decimus quartus, ſectionis ſextæ, vbi, Ab Hydrope detento, ſi aqua à venis ad ventrem confluerit, ſolutionem fieri, docet. Ecce quomodo Venæ ad ventrem, per portæ venam, aquam illam tranſcolant.

*Ex carne
Hepar.*

Cæterum ſi quis, quæ diximus hætenus, oculis ipſis uſurpare velit, ille hepar ex carne, & ab omni parenchymate nudum ac liberum intueatur. Faciet autem ex carne hepar, ſi prius nonnihil in aqua coctum, eoſque donec caro mollitiem contraxerit, inde in vaſe aqua pleno ſiniſtra manu ſubmergat, & dextra interim cultello ligneo, aut lapideo, vel certe ferreo, non valde acuto, leuiter fricet. Sic enim ſenſim caro ſeparabitur, & quæ ſeparata eſt, ab aqua ſubito eluetur. Eſt & alius modus non minus elegans, & facilior, ſi formicarum aceruo impoſitum relinquatur, donec (quod breui ſpatio fit) exederint. Apparebit ſic poſtea ſubſtantia vtriuſque venæ, ſi in frigidam projicias per quam bene, vt differentiam vtriuſque, & viſu, & tactu uſurpare queas: tum anatoſomofes eleganter contempleris. Cæterum, quia ſupra à nobis ſub principium capitis dictum eſt, ob duplicem ſanguinem, duplices eſſe factas venas, duplicem autem ſanguinem ob partes diuerſæ naturæ nutriendas, vt veritas huius rei comprobetur, ecce tibi hepar in cuius gibba parte vbi vena Caua eſt, diuerſam intueberis ſubſtantiam ab ea, quæ eſt in ſima, vbi Vena portæ ſtabulatur. Illa enim multo eſt mollior, & quæ à lecore nullo negotio diſcedit: hæc contra durior, & validius adhærens. Nec vero temere id accidiſſe credendum eſt, ſed Naturæ ſingulari quadam prouidentia, quæ ſemper finis gratia optime & prudenter agit. Nam Venæ portæ radices duriore ſubſtantia fulciri debebant, vt eſſent magis patulæ: at Cauæ molliori, vt impleri, diſtendi & ſubſidere poſſent, quemadmodum antea demonſtratum eſt.

C A P V T V

Ramos, ſiue propagines Venæ portæ recitat, & Hippocratis aphoriſmum huc maxime facientem, explicat.

*Per quas
partes Ve-
næ Portæ
diſperga-
tur.*

ACCEDAMVS ergo jam paulo propius ad ipſam Venarum hiftoriam, in qua à Vena portæ initium faciemus, tanquam ab ea, quæ non ita late patet, aut diffunditur, vt Caua. Solet enim per inſimū duntaxat ventrem diſtribui, nec extra hunc propagines vllas, imo nec per huius omnes partes, ſed illas tantum, quæ nutritiue facultati dicatæ ſunt, vt puta lecur, Veſiculam fellis, Ventriculum, Lienem, Pancreas, Omentum, Inteſtina, & Meſenterium, ramos diſpergere: nam ad reliquas, vt Renes, Veſicam, & eas quæ generationi inferuiunt, Caua propagines ſuas tranſmittit. Cæterum, vt facilius, quæ eius ſit diſtributionis ratio, intelligatur, doctrinæ gratia, totam venam aſſimilantes arbori, in quatuor diuidemus partes, ex quibus aliam Radices vocabimus, vt quæ

*NOTA.
Diuiſio
Vena*

vt quæ in hepate est; aliam *Truncum*, quæ indiuisa progreditur; tertiam Ramos, ubi truncus diuiditur: quartam, *Propagines*, aut *Surculos*, venas quæ ad latera, non diuisus truncus diffundit. Quæ certe appellationes diligenter obseruandæ sunt, quod proprietate harum vocum obscuræ huic de venis tractationi lucem adferre conati sumus. Vt autem tum memoriæ facilius commendari, tum breuius perscribi à nobis cuncta queant, ab insertione (sequenti doctissimos quosdam Recentiores) appellationem omnibus tribuimus.

a, 3.8.2. *H.H.H.* Ex ambitu ergo Iecoris ^a venæ quædam perexiguæ & capillares, sensim versus in- *RADI-*
b, E.E.E. ternam eiusdem regionem exporriguntur, ac paulatim in maiores ramos abeunt, ita *CES.*
E. circa vt tandem ^b quinque producantur, quæ iterum veluti radices collectæ circa medium
truncum ipsius cauæ partis, paulo tamen versus posteriora iuxta dorsum concurrentes, ^c caudicem ac truncum insignem constituunt, qui tandem iuxta ^d eminentias illas hepatis
B.B. (quas *πύλας* à Græcis appellari diximus) ^e erumpens, Vena portæ dicitur, & jam trunci
c, B.B. nomen meretur.
d, 8.8.1.N

N. ^f Truncus autem hic ab ^g hepate jam secedens, obliq; non nihil descendit versus le- *TRVN-*
e, B. uam sub ^h duodeno, ubi supra vertebrae stabilem locum nanciscitur. Antequam tamen *CVS.*
f, 5.1.K. in ramos diuidatur, duas propagines siue surculos de se spargit, quorum ^{hh} *primus*, tenuis *Surculi*
g, F. admodum, ex antica & suprema parte trunci, simul ac ex jecore prodiit, enatus, in vesti- *ante diui-*
h, H. cæ biliaria ceruicem & corpus, siue in exteriorem ipsius tunicam, multiplici ramorum *sionem*
hh, 8.7.L. subtilissimorum serie, cuiusmodi superius Capillares venas vocari diximus, diffunditur. *Trunci*
 Appellatur hic surculus Græce *κυστικός*, si latine velis dicere, *vesicalem* appelles. Vesalius *enati.*
 duos esse ramos ait, qui per vesicam felleam excurrunt, vnde & Cysticæ gemellæ quibus- *1.*
 dam dicuntur, sed parū hoc interest. *Secundus* priore insignior, sed tamen inferior, *Cysticus.*
 ex eadem anteriore sede, dextraq; magis enatus, pyloro inferitur, in cuius posticā par- *2.*
 tem, quæ dorsum respicit, plures ramulos spargit, vnde *Gastricus* vulgo dicitur, sed for- *Gastri-*
 tasse memoriæ gratia rectius *Pyloricus*, cum & alij sint rami, qui gastrici vocantur. *cus.*

i, 5.1.L. His duobus surculis sic propagatis, inferiora Truncus perit, & sinistrorsum semper *RAMI*
b, M. nonnihil inclinans, in duos ramos insignes dispecitur, quorum alter ⁱ sinister, est, al- *duo.*
 ter ^l dexter. *Sinister* elatior paulum dextro, sed minor: *Dexter*, humilior, sed maior. *Sini-*
ster, per Ventericulum, Omentum, quandam Coli intestini partem, & Lienem spargitur: *Dexter*, per intestina, & Mesenterium. Illæ, Vena splenica, siue linearis: hic, Me- *I.*
 senterica dicitur. *Splenicus*
Qui sur-
culi à sple-
nico ramo
orianitur,
antequā
in Lienē
absumi-
tur.
A superio-
re parte
qui orian-
tur.
Gastricus
Corona-
& ca-
ria.

m, L. ^m SPLENICA ergo vena postquam sic prodijt ex Trunco, versus ⁿ Lienem, ^o omenti
n, Q. mēbrana suffulta, transuersum fertur, in q̄ antequam absumatur, surculos quosdā pro-
o, C. ducit, partim à superiore sui sede, partim ab inferiore. *A superiore* quidē ^p surculum qui
p, N. ad læuā Vētriculi partē, qua dorsum respicit obliq; ascendens, in tres diuiditur propa-
 gines, ex quibus vtrinq; extremarum vna in ventriculum porrigitur, & in plures mox
 surculos diffunditur. Media vero per eandē posticā sedem ascendens, per superiorē
 Ventericuli regionē se diffundit, & sinistrum orificium vndiq; coronæ in modum cin-
 git, à quo & *σφρανιά*, siue *Coronaria* dicitur. Hæc rursus ramulos semper quosdam sur-
 sum ad œsophagi finem, alios deorsum per ventriculū effundit. Totus hic ramus *Ga-*
stricus dicitur, quasi Ventericularis, quia omnium quæ ventriculum ad eunt maximus est

Ab inferiore parte procedentes. 1. *Epiplois dextra*. 2. *Epiplois postica*. Diuisio rami splenici. *Superioris rami propago*. Inferioris rami propago. 1. 2. *Hæmorrhoidalis interna*.

& capacissimus. Ab inferiore duo furculi enascuntur, vnus gracilis, deorsum ad inferioris membranæ Omenti dextram partem, & ad Colon ei annexum alios ramulos transmittens, dicitur *Epiplois dextra* vulgo, Latine *Omentalem* dixeris. Alter, respondens ramo qui ab elatiore parte oritur, & coronarium furculum producit, in inferiorem omenti membranam inseritur, ac post exortum statim in duos ramos diuiditur, qui magno à sese interuallo diducti, quamplurimos alios furculos generant, qui in inferiorem omenti membranam, quæ colon instar mesenterij dorso alligat, quemadmodum & in Coli partem, quam alligat, absumuntur. Vocatur *Epiplois*, vel *Omentalis postica*. Postquam sic Splenicus ramus plures furculos dispersit, jam 9 Lieni approximans, in duos finditur ramos, ¹superiorem, & ²inferiorem, qui in alios, in ipso parenchymate Lienis dissipantur. Ex superiore, modo antequam Lienem ingreditur, modo quando jam ingressus est, & jam vel geminus, aut triplex furculus egreditur, celeberrimus apud rei medicæ scriptores, quem ¹*Vas breue* vulgo, sed nos venosum (ad discrimen arteriosi sibi respondentis,) appellamus. Hic in sinistram fundi ventriculi partem, aliquando altius etiam, & circa orificium sinistrum inseritur. Quæ causa est cur Medici nonnulli, & vulgo quoque Anatomici, inepte censuerint, ex Liene melancholicum humorem per hunc refundi in stomachum ad excitandam famem. Sæpe tamen cadauera inuenias, in quibus prorsus desideretur. Ex inferiore ramo, qui humiliorem Lienis partem petit, vna oritur propago, quæ satis ampla, & insignis, dextrorsum reflectitur, vt præcedens, & Ventriculi fundum sinistra parte cingit, elatiori quoque Omenti membranæ à læua frequentes ramulos transmittit, & *Gastroepiplois sinistra* dicitur. ¹ Est & alius ramus insignis, qui in plerisque reperitur à ramo splenico inferiore, rarissime à Liene ipso enasci. Hic deorsum fertur, & toti sinistræ coli parti furculos aspergens, vterius secundum totam intestini recti longitudinem progreditur, ac tandem in eius substantiam membranofam, & podicem, plurimis exiguis furculis terminatur. Frequentissima huius mentio fit apud Medicos, quibus *hæmorrhoidalis interna*, ad differentiam externæ, à Caua vena productæ, vere, ac proprie hæmorrhoids dicitur. Dico proprie, ac vere, quia hæmorrhoides interdum venas quoque narium, gingiuarum, & oris, sanguinem, & sine dolore quidem, fundentes, appellant. In hac ampla significatione Philosophus accepit 3. de part. animal. vbi menstruam etiam purgationem speciem hæmorrhoidum facit. Proprie tamen dictæ Hæmorrhoides Medicis sunt, venæ huius in ano dilataciones, à bile, tum atra, tum flaua, tam falsa pituita, quam melancholico humore excitatæ. Et hæ duorum sunt generum, *Caca*, quæ nullum sanguinem fundunt, sed instar acini vix protuberant, in, vel extra anum: alia *aperta*, quæ sanguinem, quem continent, fundunt. De harum curatione peculiarem libellum, vere aureum, doctissimus Hippocrates scriptum nobis reliquit. Reliqua pars rami splenici in ^x Lienem totum absumitur, ibidemque in varias, & minutissimas propagines diffunditur, circa ^y cauam, & mediam lineam ipsum parenchyma ingressa. Atque hi quidem sunt furculi, quos splenicus ramus producit.

² MESENTERICA vena, siue *dexter venæ portæ ramus*, quam primum ^a mesenterio, atque à dorso prodit, committitur, & in duos præcipuos ramos diuiditur, qui mesenterium inter duas tunicas pertranseunt, singuli in ramulos finduntur infinitos, & hi in ^a, 8. 7. b.

q, Q vide
& 8. 9. 1. 4.

7, 2.
f. b.

1, R.

u, 8. 9. 1. E.

x, vide 8.
9 f. 4.

y, 8. 9. 1. A.
A.

z, 5 1. M.
sed im-
mis 8. 7.

quæ huius
demon-
strationi
tota dica-
ta est.

hi in tenues iterum furculos, qui intestina adeuntes, Venas illas, adeo celebres apud Medicos, quæ *Mesaraica* vocantur, constituunt. Ex his primus, *Mesenterica dextra* dicitur, à dextra, quam occupat parte, & similiter duplex est, vnde factum vt Vesalius, & qui hunc sequuti sunt, alij fere omnes, tres Mesentericas enumerent. Hæc in Ieiunum, Ileum, Cæcum, & Coli intestini dextram partem, quâ renibus & jecori adiacet, inseritur, & quamvis vtraque plurimas de se soboles spargat, vt perquam arduum sit numero aliquo ipsas exprimere, tum quia variant admodum pro ratione subiectorum, tum quia non eundem omnino ordinem seriemq; obseruant, notatum tamen fuit, vt plurimum quatuordecim esse, quæ postea iterum in infinitos furculos alios disperguntur. Hi vbi ad intestina peruenerunt, ad ipsorum tunicam tantum osculis hiant, nec cavitatem ipsam ingrediuntur, cum crista quadam interius succingatur. Quemadmodum autem, vt diximus supra, in pluribus nostri corporis partibus, vasorum diuersiones Glandulis quibusdam attenduntur, partim vt tutiores sint in progressu, partim ne concidant, & vna sanguinis fluxus refluxusq; maxime necessarius impediatur: ita hic quoq; vasorum, quæ per mesenterium diffunduntur, diuisiones, b *glandulæ* quædam suffulciunt, proportionem cum propaginibus suis vbiq; obseruantes, adeo vt maiores ramos maiores glandulæ, minores, exiliores quoq; sustentent. Hæc vbi scirrhus laborant, compressis vasis, & impedita chyli per venas, ac consequenter, sanguinis per corpus distributione, tabes & totius corporis maror nascitur. *Mesenterica sinistra* in mediam mesenterij partem, quemadmodum & eam Coli sedem, quæ à laua Ventriculi regione, ad rectum vsq; intestinum excurrit, dissecitur. Ab hac interdum hæmorrhoidalis interna, de qua modo diximus, quemadmodum id Vesalius annotauit, exoritur, quæ Colo furculos quosdam largiens, tandem per totam longitudinem Recti intestini progrediens, in podicem definit. Cæterum antequam in hos ramos Truncus mesentericus diuidatur, duas prius propagines emittit, quarum *altera Gastroepiplois sinistra dicta*, quæ Ventriculi fundum dextrum antierius posteriùsq; perrepat, quemadmodum & omenti membranam superiorem: *altera*, alijs *Intestinalis*, nobis *duodena* dicta, ad Duodeni medium, & Ieiuni principium pertingit, & per eorum longitudinem descendit.

Vfus Venæ portæ *præcipuus* est, partes quæ in imo Ventre sitæ sunt, & crassiore sanguine, ac sæculentiore indigent, vt sunt omnes, quæ nutritioni dicatæ, nutrire. Debit enim crassior esse sanguis, vt esset calidior, cum calor semper in crassiore corpore sit potentior. Sic ergo RADICES Iecur nutriunt: TRUNCVS Pancreas: ex SVRCVLIS Vesiculam quidem fellis, cysticus. RAMVS SPLENICVS omnia nutritioni dicata viscera, præter mesenterium, & intestina, ac Ventriculum, eius furculus pyloricus, gastricus, vtraq; gastroepiplois, & Vas breue. Nec enim expellendi ad ventriculum humorem melancholicum, sed nutritionis præcipue gratia, Vas breue factum esse à Natura existimo, cū sanguis, qui in Liene generatur, non melancholia sit, & humor excrementitius, sed optimus potius, quamvis paulo crassior, quam alius sanguis, quia scilicet & partes per splenicum ramum crassiore, quam per mesentericum alendæ, indigebant. Omenti superiorem membranam vtraque gastroepiplois, inferiorem epiplois dextra, & postica. Lienem duo rami, in quos Splenica vena dirimitur, & qui per eius lineam mediam parenchyma ingrediuntur. DVO RAMI MESENTERICI, *Mesenterium, & intestina*

IA
Mesentericus ramus.
Dexter,

Glandulæ.

Sinister.

Propagines ante mesenterici diuisionem enatæ.

Gastroepiplois sinistra.

Intestinalis.

Vfus.

Primus.

fere omnia. Et intestinum quidem *Duodenum*, propago duodena: *ieinum* autem, *ileum*, *Cecum*, & *Coli dextram partem*, dextra mēfenterica. *Sinistram* autem *Coli* sedem, & *totum Rectum*, hēmorrhoidalis, at *mediam partem*, quæ sub ventriculo est, *Epi-*
Secūdus. *plois postica*. *Secundus* vsus est, attrahere chylum, eumque ad hepar deferre, in cuius Venis præcipue sanguificatio celebratur. Eadem autem Venæ, quæ mēfentericum nutriunt, chylum etiam attrahunt, vt infra, cum eius historiam persequemur, dicemus. *Tertius* vsus est, excrementa è corpore euacuare per intestina. Sic videmus
Tertius. per *ramum mēfentericum*, ex lecore interdum refundi biliosum humorem in dysentēria, & diarrhæa biliosa: per *Hæmorrhoidalem venam*, fecem melancholicam. *Quartus*
Quartus. vsus, adiuuare coctionem hepatis. Sic videmus per *splenicum ramum* attrahi crassio rem partem chyli, quæ melancholia dicitur, non, quia ibi sedes melancholiæ sit, sed vt beneficio arteriarum, quæ copiosissimæ sunt in Liene, attenuetur & concoquatur, nec coctionem, quæ in hepatis venis celebratur, inturbet & impediat, quemadmodum consuevit fieri, quotiescunque Lien aliquo morbo laborat, vt sanguificationis opera statim lædatur.

Explicatio aphorismi cuiusdam Hippocratis. CÆTERVM quoniam Hæmorrhoidaliū Venarum mentio hic facta est, visum fuit non inopportunum fore, si huc explicationē pulcherrimi aphorismi, qui duodecimus est sectionis sextæ, cū sine anatomica historia intelligi nequeat, & ab aliis ita fideliter enodatus nō sit, vt erat necessariū, coniiciam. Scribit in eo Hippocr. αἱμορροΐδας
in Σεντι χρονίας, ἢν μὴ μία φυλαχθῇ κινδυνος ὁδρωπὰ ὀππρὲν ἐσθ, ἢ φθίσιν, hoc est, à diuturnis sanato hæmorrhoidibus, si vna omnino non seruetur, periculum est, aquam inter cutem, aut tabem supervenire. In huius explicatione, de veritate ipsius aphorismi primum dubitabimus, deinde de modo, quo ex sanatis diuturnis hæmorrhoidibus hydrops, aut tabes fiat, disputationem instituemus. Dubitare autem merito possumus de veritate, quod idem Hippocrates, in libro de hæmorrhoidibus, quem ego maxime genuinum esse statuo, (quidquid etiam dicat doctissimus alioquin Mercurialis) hæmorrhoidas nos vrere iubet, vetatque vllam citra vstionem relinquere, sed omnes vrere. Et sane *Aetius*, libro 14. conciliare cupiens hæc duo loca, ad illa verba, ἢν μὴ μία φυλαχθῇ, hoc est, nisi vna seruetur, victus rationem, non hæmorrhoidem subintelligendam censet, quasi diceret Hippocrates, non sanabis diuturnas hæmorrhoidas habentem, nisi æger conuenientē victus rationem à te præscriptam diligenter seruauerit, alioquin enim periculum est, ne in tabem, aut hydropem incidat. Cæterum *Galenus*, in commento illius aphorismi, expresse scribit, docere Hippocratem, nisi vna hæmorrhoidis seruetur, periculum illud fore, nec vllam omnino diætæ mentionem iniicit. Quin & ipsa quoque cottidiana experientia, cum victu quoque exacto hæc mala insequi satis testatur; & ratio desumpta à modo, quo id potest contingere, quemque mox explicabimus, vberime declarat. Ex quo sane patet, duo hæc Hippocratis loca controuersa adhuc & sibi inuicem repugnancia, ex hac Aetii responsione relinqui. Vera autem responsio erit, si dicamus, Hippocratem, dum in libr. de hæmorrhoidibus scribit, vrendas esse omnes ad perfectam sanationem, non loqui de diuturnis hæmorrhoidibus: sed de iis tantum quæ recentiores sunt, aut in quibus iam alio Natura tentauit expulsionem humoris illius, qui alioquin per hæmorrhoidas expurgari solebat, siue id per fonticulos factum sit, siue per fistulam

stulam, seu vlcus aliquod in crure. Hæ enim sanari citra periculum tabis, vel hydropis quam optime possunt, maxime integris adhuc & saluis visceribus, ac imprimis omnium, succedente bona victus ratione. Nec vero omnes diuturnæ hæmorrhoides sanatæ necessario hydropem, vel tabem inducunt, sed vt plurimū tantum horū maiorū periculum intentant. Interdum enim repente materia melancholica in Cerebrum raptā, Mania oritur, vt Alcippo contigit apud Hippocratem, 4. Epidem. Hic enim, inquit, hæmorrhoidas habens curari vetabatur. nam curatus insaniuit, sed acuta febre superueniente sanatus est. *Pro secundo quasito explicando*, primum Galenum audiamus. Is enim in commentario huius aphorismi, hæmorrhoides ob sæculentum sanguinem, & melancholicum, quem ad ora quarundam venarum Iecur propellit, fieri inquit, adeoque interclusa hac via, multitudinem crassi humoris aggrauare hepar, & eius calorem nativum suffocare. hoc extincto non generari amplius sanguinem, sed a- quam tantum, quam postea natura propellens in abdomen, hydropem facit. Quod si multitudinem humoris melancholici Iecur ad pulmones deferat, rupto aliquo vase, fieri tabem. Hæc interpretatio præter quod admodum obscura nobis videtur, nec veritati prorsus est consentanea. Primum enim falsum esse iudico quod Galenus in commento statuit, impossibile esse, vt absque multitudine sæculenti & crassi sanguinis hæmorrhoides fiant, cum & rationibus, & autoritate probari possit, à bile quoque, & pituita prouenire. *Autoritate quidem Hippocratis*, qui initio libri de hæmorrhoidibus, hæmorrhoidum morbum hoc modo fieri testatur, cum bilis scilicet, aut pituita ad venas recti intestini decubuerit, sanguinem qui in venis est calefacit. Calefactæ autem venæ ex vicinis venulis sanguinem attrahunt, & vbi replentur, interna sedis pars intumescit, & capita venarum supereminent. *Ratione vero* sic probatur: cum enim insanix fiant à pituita, & bile, vt testatur Hippocrates, lib. de morbo sacro, idem 6. aphorism. 21. insanientibus si varices, aut hæmorrhoides superuenerint, insanix solutionem fieri proficitur. Non solueretur infania, si tantum melancholicus humor per hæmorrhoidas prodiret, nec enim causa morbifica excerneretur. Sed & nos ipsi in Germania olim vidimus, à falso catarrho molestatos fuisse Viros nobiles, sanatos tamen postea ex hæmorrhoidum larga fluxione, vt propterea existimem, non modo melancholiam, sed falsam etiam pituitā & bilem per hæmorrhoidas purgari consueuisse. Quare si contingat iam diu hæmorrhoidibus conflictatum postea sanari, bilis illa, & pituita, vel obstructions in Iecore aut Liene parit, vel in aliqua copia coaceruata, distendendo, vasa in abdomine contenta perrumpit, vel sua qualitate exedit, & in abdomine hydropem facit, vel in Iecore obstructions parando, nativumque calorem extinguendo, plurimum aquæ, & ferosi humoris, loco sanguinis generat, qui per venas transiēs Leucophlegmatiam efficit. Quod si hic humor ad pectus, aut pulmones retrocedat, vasa eorum perrumpit, aut exedit: hinc sputū sanguinis, deinde puris, sequitur, ex quo tandem tabes, vt in aphorismo docet Hippocrates. *Ceterū* hoc loco imprimis notandum est, duplices esse Venarū propagines, quæ Hæmorrhoidas constituunt. Aliæ enim sunt propagines Venæ portæ, de quibus iam egimus; aliæ vero Caux, quæ à ramis Iliacis pronascuntur, de quibus postea dicendum. Quod si per Venæ portæ propagines dicti humores melancholici, biliosi, aut pituitosi, & salii fluant,

*Secundū
quasitū.*

1.

2.

3.

*Duplices
Hæmor-
rhoides.*

hæmorrhoides internæ fiunt, quibus sanatis, refluit materia in ramos venæ portæ per inferiorem ventrem dispersos, in cuius spatium venæ humoribus his aggrauatæ, sarcinam suam deponunt, & ascitum hydrops speciem faciunt. At si per ramos Venæ Cauæ fluxerint, hæmorrhoides externæ fiunt, & his, præter Hippocratis præceptū, sanatis, tabis periculum imminet, quod hinc per venam cauā ad pulmones propter cor facilis sit materiæ peccantis transitus. Et hoc est quod jamdudum obseruauimus, plurimos fistulis ani diu afflictos, postea vero Medicorū imprudentia sanatos, in sputum sanguinis, & inde in tabem incidisse. Quin imo meminimus, curatam aliquando in Germania à nobis fuisse puellam, quæ in media coxa fistulā habuit & per tres annos frustra multorum auxilium implorauerat, sed curatam tandem, post tres quatuorve menses, in sanguinis copiosum sputum incidisse. Ego, etsi vix decimum attigerat annum, ex pede ægro, in quo fistula laborauerat, sanguinem illico detraxi, corporeq; purgato, & inusto, prope locum, in quo fistula fuerat, cauterio, ipsam à tabe præsentissima, facile sic vendicaui. Sputum hoc sanguinis non aliunde contingebat, quam ab acri illa, & biliosa materia, quæ cum nullum per fistulam amplius exitum inueniret, ad pulmones, per ramos venæ cauæ postmodum ascendit. Signate autem Hippocrates inquit, periculum esse ne fiat hydrops, aut tabes, quia nonnunquā euenit, vt neutrum horum accidat, sed alius potius morbus subsequatur, quemadmodum euenit Alcippo, qui in insaniam, & hinc in febrem acutam incidit. Interdum etiam dysenteria oritur, aliaque mala: quandoque etiam accidit, vt copiosis mictionibus, sudoribus, remediis, & bona victus ratione præseruentur.

CAPVT IV.

Superiorem, siue ascendentem Venæ cauæ truncum, tum ramos per caput dispersos, enarrat.

ALTERA jam vena, quam ^a *Cauam* vocari diximus, considerata est, quæ latius ^{a, 5.3. quæ} multo quam Portæ vena patet, cum per vniuersum corpus distribuatur. Eius ^{integram} enim munus est, omnes nostri corporis partes, quæ ad alimenti concoctionem non faciunt, enutrire, quæ cum longe lateque pateant, venam quoque Cauam maximam esse longeque diffusam necesse est. Et quia tenuiore quodam magisque elaborato sanguine alias conueniebat, nec ita crasso, aut sæculento, quemadmodum Ventriculum, Lienem, Omentum, sanguis quem conficit, & vehit Caua, purior, tenuior, atque ^{et ab omnibus partibus liberam} syncerior quoque est. ^{vena caua delinationē exhibet.}

Ratio ordinis quæ in historia eius seruandus.

In huius historia tradenda, etsi minime cum iis sentiamus, qui vel à Iecore deducūt ipsius principium, vel à Corde, quia tamen alicubi principium tractationis quærendū nobis est, communem Anatomicorum consuetudinem sequendum duximus, adeoque, quasi à Iecore originē capiat, doctrinæ facilius gratia, sic de ea perpetuo loquemur. Accedit, quod in Iecore quasdam veluti radices spargit, haud secus ac vena Porta, in cuius historia cum propterea initium ab ipsis ceperimus, merito hic quoque exordium in caua quærendum erit. Cæterum Caua, quanquam per vniuersum corporis truncum, recto progressu excurrat, & insignem caudicem ^b constituat, per medium infimumq; ^{b, D.} Ventrem,

Ventrem, rectæ instar lineæ continuæ, vel canalis potius ritu digestum. solet tamen ratione hepatis bifariam diuidi, & sic alius ejus truncus Ascendens, alius Descendens vocari. Reuera enim verum illud non est, quod multi persuasum sibi habent, Cauam suæ jecore egressu, quemadmodum Arteria magna, vbi ex corde prodit, in duos findi truncos: si tamen trunci dicentur post hæc à me, doctrinæ gratia duntaxat id fieri, credendum.^c Ascendens ergo, & Superior dicitur, qui supra hepar consistit, & circa jugulum terminatur;^d descendens vero, qui infra hepar est, & ad crura vsque pertingit. Vterque enim postea in ramos dissepiscitur, quorum^e illi ad caput sursum feruntur, vt jugulares; & brachia, vt^f brachiales; hi ad crura, & scruales vocantur. De his ergo omnibus nunc ordine sic dicemus, vt prius trunci ascendentes historiam, deinde ramos ejus, partim ad caput, partim ad brachia progredientes enarremus: hinc descendentes truncum, & usque ramos ad crura digestos, aggrediemur.

VT ERGO EX CAUA HEPATIS parte venulas complures, veluti radices enasci^h diximus, quæ semper in majores sensim insertæ, tandem circa medium omnibus simul coeuntibus Truncum constituebant; ita non diuerso modo, ex ambitu conuexæ eiusdem partis, numerosa venarum soboles erumpit, quæ postea in vnū^l truncum conspirat. Truncus hic^m Diaphragmatis nervosam partem in dextro latere perforat, quam transiens, indiuisus vsque ad iugulum progreditur, & quia versus superiora ascendit, ASCENDENS TRUNCVS communiter ab iis, qui Cauam ex Hepate prodire censent, vocatur. Amplior est multo Descendente, quod partes superiores solo hoc nutriatur: inferiores autem pleræq; omnes in ventre imo contentæ, Vena portæ. Quamuis autem in ramos nullatenus findatur, vsq; dum jugulum attigerit, propagines tamen quasdam ad latera spargit, & quidem tres insigniores. ⁿ Prima est, quæ *vena Phrenica* dicitur, vtrinque vna, & per diaphragmatis (quod *phrēnes* vocatur) vniuersam sedem numerosa sobole distribuitur, ramulos ad pericardium vicinum, & mediastinū transmittens, quod vbi iam superauit, & thoracē ingressa est, modice sinistrorsum inclinat, pericardium ingreditur, & è regione octauæ thoracis vertebræ admodum latefcens, in^o dextrum cordis ventriculum validissime inseritur, vt non immerito hinc Aristoteles oriri censuerit. Antequam tamen sic implantetur, *alteram* propaginem educit, quæ insignis est, & secundum cordis posteriora, ac latus sinistrum, versus anteriora porrigitur, cordis basin coronæ instar succingens, vnde & *Coronaria* dicitur. Hæc plurimos ramos per exteriorem cordis superficiem totam dispergens, potissimum vero per partē læuam, vt quæ copiosiore alimēto ob continuum & maiore motum, quā dextra pars, indiguit. Quia vero parenchyma cordis durum est, ac solidum, propterea & crassiore quoque sanguine nutriendum erat, ex quo factum, vt hic ramus, antequam cor ingressa sit vena, exoriat, quando scilicet adhuc sanguis paulo crassior est, nec dū in cordis sinibus attenuatus fuit. Prope huius originem *Valvula* est, quæ sanguinis ad cauam, refluxum, propter continuū cordis motum facillimum, prohibet. Vbi iam cor superauit Caua, gracilior redditur, & pericardium denuo perforat, à vertebra dorsi discedit, & superuecta œsophagum, asperam arteriam, atque aortam, (sibi mutuo sic incumbētia, vt vertebrarum corpora œsophagus occupet, huic internatur arteria aspera, cui iterum incumbit aorta,) per mediam pulmonū diuisionē, quod loci dextra pars

TRVN-
CVS A-
SCEN-
DENS.

Propagi-
nes trūci
ascendē-
tis.

1.
Phrenica.

2.
Coronaria.

à læua diducitur, sursum contendit. Cæterum quia hoc pacto dorsum attingere ne-
 quam poterat, ramuli autem, si quos eduxisset, periculo ræptionis, (suspensi scilicet,) i. C.
 admodum fuissent opportuni, ^{3.} *tertiam* propaginem simul atque pericardium egressa
 est, constituit. Hanc venam ἀρὸν Græci, Latini *sine pari*, aut *coniuge carentem* appellant,
 quod in homine vna tantum sit, nec parem, aut conjugem in sinistro latere, ut aliæ ve-
 næ, habeat: in ruminantibus tamen animalibus gemina est, & vtrinque conspicua. E-
 greditur vero circa quintam thoracis vertebra, & quidē ex Cauæ posteriore, & dex-
 tro latere, descendensq; non recto gradu procedit, sed versus dextram nonnihil incli-
 nans, retrorsum ad spinam quasi reflectitur. Cum primum autem octauam, vel nonā
 costam attigit, supra spinam in duos *ramos*, quorum alter *dexter*, alter *sinister* est, discin-
 ditur, qui descendentes, diaphragmatis diuisionem, quæ inter duas ipsius productio-
 nes est, transeunt, sicque in infimum ventrem expanduntur. Ex his sinister, qui quan-
 doq; maior est, circa transuersos vertebrarum processus, ac sub sinistra productione
 Diaphragmatis, & primi femur flectentis origine latens, in emulgentem sinistram, &
 vel juxta principium, vel (vti frequenter solet) in medium inferitur. *Dexter* vero, simi-
 liter sub membranis circa transuersos dextri lateris processus, dextraque productione
 septi, & eiusdem primi femur flectentis principio, qui dextrum latus occupat, progre-
 diens, aliquando ipsi trunco Cauæ, interdum primæ lumbari implantatur. Et hæc ob-
 seruatio doctissimo Falloppio debetur, qui huius sinistri rami beneficio, materias in
 thorace collectas, siue aqueæ sint, siue purulentiæ, aut sanguineæ euacuari voluit, de qua
 tamen re sequenti libro breuiter aliquid dicemus. Cæterum ab hac Vena, ab utroque
 latere, tam dextro, quā sinistro, in itinere versus inferiora, furculi egrediuntur, ex qui-
 bus tamen dextri insigniores, magisq; ampli sunt, quorum decem plerumq; semper,
 numerari solent, qui ad inferiorum costarum totidem interualla excurrunt, & *Interco-*
stales venas inferiores constituunt. Dico autem plerumque semper decem esse, quia raro
 valde euenit, ut ab hac vena omnia interualla ramis donentur, cum duo superiora,
 primum scilicet, & secundū spatium, à quarto ramo jam jam enarrando, furculos suos
 nanciscantur. Cæterum furculi hi recta progrediuntur, & quidem juxta inferiorem
 sedem costarum, vbi horum gratia sinus exsculptos esse, secundo libro docuimus. Et
 hic sane locus diligenter Chirurgiæ candidatis notandus est, propter Thoracis aper-
 tionem in empyemate, ut sciant in superiore costæ loco sectionem faciendam esse, cū
 ex inferiore magno vitæ periculo vasa laderentur. Non tamen *per costarum verarum* to-
 tam longitudinem excurrunt hæ venæ, sed cum ossæ parte vna terminantur. Intercar-
 tilaginea autem sex septem verarum costarum spatia, Venæ Mammariæ propagines
 nutriunt, quemadmodum mox dicemus. *In spuris* tamen costis, vltra cartilagineas et-
 iam versus abdomen pertingunt, in cuius musculos se insinuant. Propagantur autem
 & ab eadem vena alij quidam exigui ramuli, per quos alimentum Vertebrarum Me-
 dullæ, & Musculis, circa quos scilicet feruntur, deriuatur; nonnulli etiam in mediasti-
 num juxta dorsum implantantur. Hac ergo Vena sine pari sic constituta, Caua ad ^{l. D.} ju-
 gulum ascendit, suffulta Mediastino, mollique ac glanduloso quodam corpore, quod
 Græci θυμὸν appellant, & in elatissima Thoracis sede positum est, ut venarum diuaria-
 tiones hic suspensas, ob omni ræptionis periculo tutas præstaret.

Atque

m, E, E.

Atque hic primo Caua vena in ^m duos insignes ramos dirimitur, à quibus oriuntur venę omnes, quę tum ad caput, tum brachia, aut musculos quosdam abdominis excurrunt. Ex his alter ad dextram, alter ad læuam partem abit, qui quamdiu in Thorace adhuc sunt, *Subclauij* appellantur, quia sub clauiculis incedunt: at quam primum exciderint ex ipso, & axillam attigerint, ⁿ *Axillarium* nomine vocantur. Ex vtroq; complures emergunt propagines, quarum alię ex superiore parte, alię ex inferiore enascuntur. In harum enarratione hunc ordinem obseruabimus, vt quę propius à trunco absunt, prius à nobis proferantur; posterius, quę longius recedunt.

Venę Ca-
uginduos
ramos
subclau-
ios diuisio

n, F.

Prima ergo propago, iuxta radicem ipsius biuricationis emergit, & ^o *Intercostalis* superior dicitur, vtrinque; vna, quę exilis admodum, descendens secundum costarum radices vsq; ad tertiam, in duo superiorum costarum interualla, Venę sine pari instar, ^p furculos duos transuersum propagat. Quod si Vena sine pari omnibus (vt nonnunquam fit) spatijs propagines offerat, deesse ipsa tunc merito solet. Interdum tamen eadem vena à Trunco quoq; Caua, priusquam in subclauias bipartitur, originem ducit.

Propagi-
nes quę
ex inferio-
re parte
subclauio-
rum prode-
unt.

q, g.

^{1.} *Alter a vena*, modo ab anteriore bifurcationis sede; modo à subclauij rami radice gemina, vtrinque vna; modo etiam è medio trunco, antequam diuidatur, vnica enascitur, quę vbi sternū demum attingit, in dextrum & sinistrum ramum dirimitur. Solet. ⁿ Natura ludere, cum in alijs suis operibus nonnunquam, tum in primis in Venarū exortu, adeo vt non eodem modo in omnibus corporibus Venę spargantur. Vocatur autē

^{1.} *Intercosta-
lis superio-
rior.*

^{2.} *Mammaria*; quę, vndecunq; exoriatur, antrosum ducta, ad elatiorem pectoris ossis sedem contendit, secundum ipsius latera descendit, & vbi ad cartilaginem mucronatum peruenit, circa ipsius latera thoracē egreditur, sub rectis abdominis musculis recta procedit vsq; ad vmbilicum, iuxta quem per ^r anastomōsin cum ^r epigastrica ascēdente, & sibi occurrente, coniungitur, cuius beneficio insignis ille inter vterum atq; ^s *mammæ* consensus exoritur, de quo inferius, capite 8. vbi historiam venę Epigastricę persequemur, pluribus agemus. Caterum antequam Thoracem relinquat, in descensu, ad sex superiorum vtriusque lateris septem verarum costarum spatia intercartilaginea, singulos ramos transmittit, quę cum cartilaginibus iuxta finem partis ossę costarum terminantur, quo loco ramos Venę sine pari (quibus cum extremis junguntur) cessare monuimus. Ab his venis, quę cartilaginum interuallis hoc modo distribuuntur, alię nonnullę notatu dignissime emergūt, quę tum in musculos pectori incubentes, tum in mammæ disseminantur.

^{2.} *Mamma-
ria.*

r, 10. vide
c. 4. II N
s, 9.

^{3.} *Tertia* iuxta has enascitur quandoq; etiam à trunco prodit, quę *Mediastina* dicitur, quia in mediastinum, siue membranam thoracis cavitatem intersepientem, secundum totā huius longitudinē, cum neruo diaphragmatis sinistro exporrecta, propagatur. ^{4.} *Quarta, Cervicalis* vulgo dicta, vena vtrinque ampla est, quę sursum obliq; contendens versus posteriora, ad transuersos vertebrarum ceruicis processus abit, perq; earundem foramina conscendens, (vnde rectius fortasse *Vertebralis* cognominaretur,) musculis vertebris proxime incumbētib; soboles largitur. Hęc vbi processum transuersum septimę vertebrę superauit; insignem ramum ad sinum, qui in ceruice est, per foramen neruorum exortibus dicatum, deriuat, deinde alium, vbi supra sextę vertebrę processum venit, & alium rursus, vbi à quinta euasit, sicque porro, donec ad primę vertebrę (quam tamen non attingit, nedum in

^{3.} *Mediasti-
na.*

^{4.} *Cervicalis.*

cranium

cranium penetret, vt Vesalius voluit) processum peruenerit, iuxta quem partim ad eundem sinum fertur, partim in posteriores colli partes distribuitur. Sunt enim *duo sinus* oblongi, sanguine referti, qui ex dura cerebri membrana conficiuntur, vtrinque vnus, ad latera medullæ Cervicis consistentes. Ab his ramuli distribuuntur, qui spinæ medullam, conterminasque partes enutriunt: initium autem circa articulationē capitis cum prima vertebra, capiunt; finem iuxta septimam colli vertebra reponunt. Sinus hi duo, quorum alter dexter est, alter sinister, communionem quandā inter se habent, per tubulum, eumque breuem, qui ab vno ad alterum, circa eam fere colli regionem, quæ inter secundam, & tertiam vertebra est, transuersim deriuatur. Tandem ^x quinta ^z, l. vena est, quæ à posteriore parte nascitur, *Muscula inferior* vocata, quæ in musculos humiliorē cervicis, (adeoque caput & cervicem extendentes, vnde melius *Cervicalem* diceres,) itemque sublimiorem thoracis sedem iuxta vertebra occupantes, multis ramis distribuitur.

Propagines quæ ex superiore sede subclauio-
rum oriuntur.

A *sublimiore sede subclauiorum*, dum adhuc in thorace est vena Caua, cum tres prodeant, duæ sunt notatu dignissimæ propagines, quæ sub musculis caput flectentibus versus superiora viam intendunt. Prior internam magis partem spectat, & Iugularis interna dicitur: altera ad exteriora vergit, & Iugularis externa communiter vocatur. Vtraque enim iuxta jugulum oritur, & secundum hunc ad caput ascendit, ex quibus illa maior, hæc minor est in Homine, contra in Brutis. Cæteram cum appellationes pleræque omnes, & optime, non à loco, per quem transeunt, sed ab insertionē sint deriuatæ, rectius fortasse *Cephalici*, & *Capitales* dicerentur. ^y *Iugularis interna*, iuxta articu-

l. *Iugularis interna.* ^{m.}

Eius diuisionem exteriorē, & interiorē. ^z *Primus* enim maior ^z, n. est, & posterior, cum oblique retrorsum ducatur, qui vbi in musculos œsophago subiectos, & anteriorem cervicis vertebra sedem occupantes, furculos propagauit, per occipitij foramen secundum, cum arteriæ carotidis ramo minore cranium ingreditur, per quod idem foramen sextum par nervorum descendit, sicque membranæ crassæ sinum ^a primum ^b & secundum subit.

^c *Secundus* ramus, *gracilior*, & anterior, carotide arteria penitus relicta, anticam capitis partem petit, & postea quam in via auditus organo furculum, non admodum insignem, largitus est, caluariam per cuneiformis ossis foramen septimum ingreditur. ^d Hic per crassæ membranæ basin, & latera, multiplici ramorum serie dispergitur, quorum ^e vestigia in ossium sincipitis interna superficie obseruari, superius lib. 2. diximus. Hos duos ramos, cum ad Cerebrum vadant, *Encephalicos*, quasi dicas, *Cerebrales*, vocabimur, & illum quidem maiorem, hunc minorem. ^f *Iugularis externa* sub cute, & Quadrato genas detrahente musculo ascendens, per colli latera, vbi ad aurem peruenit, ^g in

2. *Iugularis externa.*

^a l. ^b, 2. vide & 10. 1. 1. f. L. ^c, p. ^d, 10. 1. 2. C D. E. ^e, 2. 6. 4. B. B. ^f, 5. 3. q.

8 in

g, r.
h, f.

in duos ramos scinditur, quorū alter à me profundus dicitur, quia musculos ingreditur, & ad intimiora penetrat; alter, cutaneus. ^h *Profundus*, in primis suis diuaticationibus glandulas obtinet, circa fauces consistentes, & notatu dignas propagines de se mittit ad Laryngem, glandulasq; ipsi adnatas, tum ad faucium, & ossis hyoidis musculos; ex quibus ille, qui sub lingua per totam longitudinem prorepat, insignis est, & in multiplices ramulos, qui eleuata lingua etiam ante sectionem cernuntur, dispergitur.

Diuisio.
Profundus.

i, t.

Ab hoc profundo ramo tres oriuntur, qui interiora capitis & caluariam subeunt. *Primus* quidem, postquam ad fauces, & os, ramulos sparsit, per quintum foramen ossi temporum insculptum, cranium ingreditur. ⁱ *Alter*, ex oculi sede anteriore per cuneiformis foramen secundum, vnde secundum neruorum par elabitur, transit, ac per crassam membranam, versus superiora, aliquot surculis excurrit. *Tertius*, ex narium amplitudine per ossis cribrosi foramen in eandem membranam disseminatur. Hæ duæ anteriorem hanc partem nutriunt, cum sinus tertius ad ipsam non pertingat, sed iuxta septum

Ranvires
caluariā
ingredientes.

1.

2.

3.

l, u.

processuum mammillarium desinat. Cæterum ^l *Cutaneus* ramus, cutim capitis perreptans, & sub aure glandulis, quas Parotides vocant, suffultus, in duos ramos dispescitur; quorum *alter* ^m *anterior*, obliq; per genas sursum fertur ad oculi angulum internū, in itinere naso ramulos impertiens, & procedens ad supercilium, junctusq; cum reliquo alterius lateris ramo in media fronte, rectam venam constituit, quam ⁿ *Frontis* appellant, & in infania maxima cū vtilitate inciditur. Huc alludit Satyricus, cū de inepto quodā loquens *mediā* (inquit) *pertundite venā*. *Alter* ramus, siue posterior, per posteriora fertur, & ad ^o tempora atq; ^p occipitis cutim ramos propagat. *Tertia*, quæ à superiore subclauiorū ramorum sede enascitur. *Muscula superior* vulgo dicitur, respectu illius, quæ eiusdē nominis ex humilibus prodit. Erumpit autē iuxta jugularem externā & in posteriores ceruicē occupantes musculos, ipsamq; huius regionis cutim dispergitur, quo

Cutaneus
qui venas
faciei con
stituit.

3.

Muscula
superior.o, z.
p, u.q, β.
r, F.
s, G.
t, I.

nomine ^q *Cervicalē superiorem*, non inepte vocabimus. Sed nunc ad eā vnde digressi sumus, venæ subclauicę distributionē, reuertamur. Hæc thoracis cavitatē egressa, ^r *Axillaris* vocatur, atq; vbi ad alas peruenit, in duos insignes ramos diuiditur, ^s *Cephalicā* scilicet, & *Basilicam*, qui postea per totum brachiū disseminantur. Antequam autem sic

Axillaris
diuisio in
duos ra-
mos.u, γ.
x, δ.

diuidatur, duos producit de se surculos, ^u *primum*, qui *Scapularis interna* dicitur, & per musculos internā scapulæ partem occupantes propagatur: ^x *alterum*, *Scapularem externā* vocatum, grandiusculum, musculis eiusdem scapulæ externam & gibbam partem ob-

Axillaris
surculi an-
te diuisio-
nem.*Basilica*
rami ante
ingressum
in Bra-
chium.y, I.
z, ε.

sidentibus, implantatum. ^y *Basilica* vero & ipsa, antequam brachium ingreditur, duas propagines profert: ^z *vnā*, *Thoracicam superiorem* dictam, quod ex elatiore, quam subsequa parte oriatur, & insignis admodum cum sit, per internam faciem musculi pectoralis humerum adducētis excurrat; alijs item musculis pectus occupantibus, quem admodum & mammarum cuti in fæminis, ramos distribuat. ^a *Alterā*, *Thoracicam inferiorem* dicitur, insignis similiter & grandis, quæ secundum thoracis latus descendens, per tertium humerum abducentem latissimum musculum imprimis distribuitur, plurimos de se ramulos spargens, qui postea cum ramis venæ sine pari extra thoracem procidentibus, per anastomosi junguntur. atque hæc nonnunquam etiam à priori, siue *Thoracica superiore* prodit. His sic ramulis constitutis, *Axillaris* in brachium por-

a, ζ.

CAPVT VII.

Axillaris Vena per brachium distributa a seriem proponit.

*Diuisio
Vena A-
xillaris.
Discrimen ra-
morum
vena A-
xillaris.*

1.
2.

VENA ergo^b AXILLARIS in duos finditur ramos, cum primum brachio appropinquat, sed ramos inæqualis amplitudinis.^c Superior enim quem Cephalicum vocant, ^{c, G.} gracilior est; at^d inferior, qui Basilica dicitur, triplo fere amplior. Cephalica etiam subcutanea quasi tota est, nec nisi vno ramo ad profundiores musculorum recessus penetrat, unde neq; Arteriam, nec Nervum intimioribus scilicet corporis recessibus adductos, comites habet. Basilica vero, partim sub cute prorepat, partim sub musculos sese recondit, unde & magnitudine illam merito superare debuit, ut quæ pluribus partibus alendis destinata erat. Habet eadē & Nervos & Arterias itineris sui comites, quæ causa esse solet, ut hac vena incisa, sanguis cum impetu profiliat: secta ecōtra cephalica effluat leniter, quod imperitos dissectionum Medicos, Venæ sectioni adstantes, ad animi & corporis robur, aut imbecillitatem imprudenter referre cernimus. De vtriusque per brachium distributionis ratione nunc breuiter dicturi sumus, initium capientes à superiore tanquam ramo minore.

VENA
CEPHALICA.

^e CEPHALICA ergo Vesalio *Humeraria vena* dicitur, quod per humerum ad manum propagetur; ab aliis *cubiti exterior* à situ, quia in cubito latus externum occupat: quemadmodum Basilica contra internum. A Recentioribus quibusdam communiter Cephalica appellatur, quod in capitis affectibus secari soleat, ob errorem Veterum, qui à jugulari externa eam pronasci, & propterea à capite immediate sanguinem evacuare, imperite credebant. Enascitur autē ab axillaris venæ superiore parte, tendinemque serrati minoris, qui scapulam pectori adducit, transcendens, inter deltoideum musculum, qui humerum elevat, ac principium pectoralis, qui eundem adducit, qua parte à clavicula exoritur, excurrit, sicq; ad externum latus primi cubitum flectentis (quem bicipitem vocant) per humerum descendit, cuius nomine inter bicipitem & deltoideum fonticulos inurere doctiores Chirurghi prudenter consueuerunt, cum semper ad locum venæ insignioris fonticuli fieri debeant, ut materia facilius evacuetur. Quanquā vero indiuisa sit, dum sic per humerum deducitur, graciles tamen nonnullos^f surculos vtrinque in musculos dictos, & cutem disseminat. Tandem ubi ad cubitum peruenit, sub membrana carnosa, ut decet subcutaneam venam reconditur, sicq; citra dissectionem oculis sese offert. At circa ipsum articulum cubiti ad externum humeri tuberculum, in tres fere ramos & diuidi consuevit, quorum alter exterior est, alter interior, tertius medius. Priores duo^{g, H.} subcutanei sunt; tertius, profundus. ^h Primus, siue medius, qui frequenter abesse solet, ^{b, c} gracillimus est, & profundior, in musculorum, imprimis vero duorum, secundum, & tertium digitorum articulum flectentium, quemadmodum & longi radii supinatoris, substantiam se penetrat. ⁱ Secundus & interior, ac præcipuus ex his tribus ramis, oblique sub cute deducitur, ac cum basilicæ ramo interno tribus digitis infra cubiti articulum coit, cum qua ¹ Medianam venam, Medicis sic dictam, constituit. Hæc oblique per mediam cubiti regionem descendens, ad radium complures surculos dispensat, tandemq; & ipsa in duos discinditur ramos minores, quorum ^m exterior ad carpi sedem interiorē ^{n, p} versus pollicem abit, alter ⁿ interior, ad indicem & medium excurrit. Ille exterior, nonnullis

*Rami
vena Cephalica.
1.
Medicus.
2.
Interior.*

^{m, p}
^{n, o}

nullis *Cephalica manus* dicitur, & magna cum vilitate in capitis, dentiumq; affectibus aperitur. ° *Tertius* tandem ramus, siue *exterior cephalica*, longum radij supinatore musculum conscendit, variis in cutim dispersis venulis, sicq; P oblique per radium fertur, cuius medium longitudinis vbi attingit, externam cubiti sedem ingreditur, ibidemque cum q basilicæ ramulo jungitur. Huic junctus ad externam carpi sedem procedit, & illi regioni, quæ ante minimum & annularem digitum est, quemadmodum & ipsis etiam digitis venas largitur. Hæc vena communiter, maxime quæ minimum digitum spectat, *Salvarella* dicitur, & in sinistra manu à Practicis incisa, in affectibus melancholicis admodum commendatur. De qua re cum nonnunquam disputeretur, egoq; experientiam Practicis favere obseruarem, causam indagare conatus sum, inveni q; complures anastomoses hic esse venæ huius cum arteriis, quemadmodum circa extremas partes anastomoses luculentiores esse solent, tanquam in partibus remotis à fonte caloris, & quæ propterea sanguine calidiore spirituosoq; indigebant. Secta ergo hac vena, quia proximæ anastomoses sūt, fieri nequit, quin sanguis arteriosus quoq; effundatur, id q in cubiti venis incisis non ita fieri pōt, ob anastomoses paulo remotiores à loco in quo vena aperitur. Et hinc fit, vt sanguis, qui ex manu evacuat, multo sit pulchrior & rubicundior, quā ille qui ex brachio, q semper arteriosus hic simul evacuetur. Cum autē in Liene sextuplo plures Arteriæ sint, quā Venæ, plurimū profecto adiumenti accidere ipsius affectionibus necesse est, quod ex iis vasis sanguis, in quibus peccavit, euacuetur.

Alter ramus axillaris, interior, & amplior, ° *BASILICA* est quæ pro situ brachij diuersi diuersa nomina apud Practicos Medicinæ scriptores inuenit. Dextri enim brachij *Hepatica* dicitur, at sinistri *Splenica*: illam in Hepatis, hanc in Lienis affectibus pro sectione eligunt. Erumpit autem sub ala, & propagininibus pluribus ad copiosius loci glandulas dispersis; per humerum, ad latus bicipitis, inter flectentes & extendentes cubitum musculos deferretur, nec procul ab egressu è thorace in duos ramos insignes ° diuiditur, quorum alter profundus, alter subcutaneus, à situ & progressu dicitur. ° *Profundus ramus*, qui fere crassior est, ad intimiores brachii partes toto ductu sese penetrat, vbi que arteriam brachialem comitem asciscens, quemadmodum & nervi tertii ramum quartum. Fertur autem inter duos cubitum flectentes musculos, cuius articulum vbi superavit, in duos ° scinditur ramos, quorum ° *exterior*, iuxta radium (vnde *Radiæ* dici posset) ad manum descendit, ac versus pollicem & indicem, quemadmodum & medium digitum, ramulos dispergit: ° *interior* autem iuxta os cubiti (à quo *Cubitei* appellationem meretur) incedens, digito medio, ac minimo ramulos, sed vt ille quidem, musculis in externa manus facie; sic hic, in interna sitis, largitur. ° *Subcutaneus ramus* alter est, qui per interiorem humeri regionem deferretur, variis de se ramulis ad cutem & adiacentes partes disseminatis; at vbi ad humeri tuberculum internum accesserit, in ramum anteriorem, & posteriorem, similiter vt *Cephalica*, ° diuiditur. ° *Interior* infra cubiti flexuram oblique deferretur, & cum ° interno *Cephalicæ* ramo connexus, ° *Medianam* venam, de qua diximus, constituit. ° *Exterior* vero, iuxta humeri tuberculum internum bifariam diuisus, maiore ramo secundum vlnæ regionem, ad carpum deorsum fertur, & ad digitum minimū sese dispergit: altero vero ad interiorē manus sedem deriuatur.

Cæterum hoc loco operæ pretium est, cum aliis doctissimis Anatomicis admonere, Cc 2 creden-

Salvarella

VENA
BASILICA.

Rami Basilica.

Profundus.

Subcutaneus

Diuiditur subcutaneus in anteriorem & posteriorem.

credendum non esse, eandem in omnibus hominibus Venarum seriem & ductum inueniri, cum sectio cadauerum demonstret, vix inter mille duos eandem Venarum distributionem accurate seruare. Quamobrem nec in eligendis locis pro Venæ sectionibus tam scrupulosos nos, vt solent quidam imperiti, esse decet, sed eam potissimum eligere, quæ tutissime secari possit, quod quam optime oculis sese offerat. Nonnunquam enim Cephalica sic gracilis est, vt vix conspectui pateat: interdum contra Basilica. Quare ille quam optime egerit, qui prudens potius consilium, quam scrupulosam imperitorum opinionem sequetur.

CAPVT VIII.

Inferiorem, siue Descendentem venæ Caudæ Truncum explicat.

Venæ Caudæ Trunci inferior.

SUPERIOREM Venæ caudæ Truncum, & Ramos persequuti sumus, restat ergo nunc, vt & de inferiore agamus. Nec tamen reuera, quod supra quoque monuimus, duo Trunci sunt, vt Gal. volebat; sed vnus qui à diuisione circa quintam lumborum vertebra, & ad vsque jugulum continuo ductu pertingit; at doctrinæ gratia sic à nobis ratione Hepatis distinguitur, quod quasi in medio consistens, in superiorem, & inferiorem scindere videtur. Vt ergo ^h superior est, qui ab hepate ad jugulum excurrit: sic ⁱ inferior, qui ab eodem inchoans, ad os vsque sacrum terminatur. Sed & quemadmodum Superior indiuisus per Thoracem excurrerebat, propaggines tantum nonnullas spargens ad latera; sic & Inferior per abdomen totum integer delabatur, non nisi furculis de se quibusdam dispensatis. Cæterum vbi quintam lumborum vertebra attigerit, in ^l duos insignes ramos Ilacos dictos, non secus ac superior in Subclauios scinditur, qui postea in crura se penetrantes, Crurales ramos constituunt, vt illi in brachia digesti, Brachiales. Dicamus ergo hoc capite de Trunco, eiusdemque propaginibus, quoad adhuc in Ventre inferiore est, deinde ad Crurales accedamus.

Propaggines quatuor à Trunco ante diuisionem enascentes.

1. Adiposa.

2. Emulgentes.

^m A TRUNCO ergo DESCENDENTE, antequam in ramos abeat, quatuor nascuntur venæ. Cum enim primum à posteriore hepatis sede prodiit, ad dextrum dorsum latus declinat, ac propaginem ex sinistro sui latere educit, quam ⁿ Adiposam sinistram appellant, quod ad adipem, & exteriorem renis membranam, quæ à peritonæo enascitur, excurrat, quemadmodum & ad glandulam reni incumbentem. Huic in ^o dextro latere restat alia, quæ tamen raro admodum à trunco emanat, sed potius à superiore & media sede emulgentis, & quia eodem, quo sinistra modo, distribuitur, Adiposa dextra nuncupatur. Interdum tamen videas contrarium quoque evenire, & dextram ex trunco, sinistram ex emulgente prodire. Naturæ enim in Venis varios lusus est cernere, nec facile in cadauer incidas, quin aliquid noui, & ab aliis diuersi, reperiās. Hinc progressa Cauda, vbi vltra medium dorsum peruenit circa primam lumborum vertebra, secundum par venarum perquam insignes educit, quod recta ad Renes properat, in quorum substantiam totum exhauritur. Hinc & Renale vocatur ab insertionem; ab usu autem ^{p. q. vide} Emulgens, quia quidquid ferofi est in sanguine, per hoc par renes emulgere, & ad se trahere videntur. Amplissimum ergo est, sed breue tamen, nec æquale, nec è directo sui conjugis enatum. Breue, quia longitudo nulla requirebatur, quæ fere ob præuiam quādam prapapam, ^{l. X. X.} ^{m, T. V.} ^{n, v in sinistro latere positum.} ^{o, v in dextro latere.} ^{p. q. vide} ^{Cap. 8. 10.}

præparationem à Natura vasis concedi solet. *Inaequale*, quia sinistram dextra longiorem esse conueniebat, quod ab ea spermaticam educere necessariū erat. Exordium aut in vtriusque è *directo sibi non respondet*, ne altera alterius actione impediretur. Sinistra tamē dextra altior est, quia & ren lævus præ dextro altiore locum est nactus. Cæterum emulgentes rami simularque ex trunco emersere, non subito ipsam renum cavitatem, adeunt, sed in duos prius maiores ramos diuiduntur, arteriisq; associati, sic concauam partem ingrediuntur, ac postea in minores dirempti, per substantiā renum vniuersam disperguntur, tandem extremis fibellis in processus quosdam carneos (quos Mammillares vocant) terminantur. Venæ hæ non tantum ad deferendum renibus alimentum, sed etiam ad serosos humores deducendos conferunt, cū eos ad mammillares carneos processus deponentes, in fistulas vreterū percolant, vnde in pelvi colligitur, sensimq; ad Vesicam (vt dicitur, cum renum historiam aperiemus) destillat. Atque hic locus notandus est, in quo calculi renales generari consueuerunt, cum non sit in vasis emulgentibus, Vena, inquam, aut Arteria: sed potius in cavitare ipsa renum, siue in pelvi, & tubulis illis vreterum. In his enim, si quando materia viscosa suscipitur, vel ob insignem calorem inibi exsiccat, vel propter frigiditatem in arenam, aut calculum concreuit. Materia autem hæc non tantum crudus sanguis est, qui mucī instar in massa sanguinea nonnunquā abundare solet: sed sæpe etiam pituita illa excrementitia, quæ à capite per venas, & arterias, tū in cavam, tum aortā, quandoq; & in Ventriculū, & Intestina, descendit. Cuius rei signum manifestissimum esse videtur, quod qui calculosis affectionibus obnoxii sunt, destillationibus & Colicis doloribus creberrime affligantur. Hos cum nonnulli à flatibus oriri sibi persuadeant, me cotidiana experientia docuit, à pituita esse, quod eos, qui renum calculo laborant, Colon intestinum copia huius semper refertum habuisse, obseruari, eadem que ablata, & calculi generationem cessasse. Quamobrem & Clysteres deterforios blandeque pituitam purgantes, non solum calculis præsentibus, sed & minitantibus sui generationem, frequenter maxima cum agrorum vtilitate iniicio. Vitanda autem perpetuo sunt omnia quæ calculos pellunt, dolore etiam non præsentē, cum quia plæraque huiusmodi calida sunt, tum quia materiam crudā copiose ad renes sunt propellendo. Hæc persequi propterea nobis visum est, vt anatomicum studium ad ipsum accommodemus Medicinæ vsum, præsertim cum videamus hunc generationis calculi locum vulgo ignorari, quod celeberrimus Fernelius, quem maxima fere Medicorū pars sequitur, lib. 6. patholog. c. 12. censuerit, arenularum generationem in propria renum substantia fieri, hinc fluentis vrinæ impetu rapi, & in cavum ferri, sicque per vretes in vesicam vrinam arenulis refertam prolabi. Quod si quis etiam quærat, quæ causa sit, quam propter sinister ren magis, quam dexter calculo sit obnoxius, id ideo euenire statuendū est, quod Colon intestinum reni sinistro magis incumbat, in cuius cellulis cum pituita hæc, de qua diximus, scatet, vel per poros ipsius transsudat, & in renes trahitur, vel ob viciniam eius, vehementer renes refrigerantur, cum sæpe experientia nos docuerit, materiam eiusmodi pituitosam reuera actu frigidissimam esse in corpore, quod perceperunt satis ii, qui per alvum copiose excreuerunt. Tertium hinc sequitur par, Vena spermatica, seu Seminales vocatæ, quod materiam pro conficiendo semine deferant. Hæc

Locus in quo calculi renū generantur.

Cur sinister ren magis, quā dexter calculo obnoxius.

3. Spermatica.

q. 8. & 9. vide & 8. 1. V. V.

origine inter se variant. ^r *Sinistra* enim ab inferiore sede, & media emulgentis exoritur, & peritonæo, qua parte musculos in lumbis jacentes integit, eidem surculis aliquot communicatis, adhærens incedit, ac oblique descendit: at vbi pubis os attingit, ipsum superequitans, peritonæum, ac foramina obliquorum & transuersorum abdominis musculorum transit, cuius processibus suffulta, in gyros quosdā varicosos abit, qui cum arteria spermatica per anastomoses junguntur, ac tandem in ^t testem sui lateris definit. ^u *Dextra* vero, non ex emulgente, sed ex ipso trunco, eiusque anteriore parte, paulo infra emulgentem nascitur, similemque postea progressum obseruat. Atque hoc quidem pacto in *maribus* se habent, in quibus tamen Naturæ lusus quamplurimos sæpius notare licebit: in *mulieribus* vero, et si eundem exortum habeant, & eundem vsq; ad os sacrum cum his progressum, non tamen peritonæo excidunt, neque ad pubis ossa pertingunt, sed priusquam ad testes perueniant, in duos finduntur ramos inæquales, quorum *minor* in vteri latera versus ipsius fundum disseminatur; *maior* arteriæ spermaticæ sociatus, & per anastomosen junctus, in sui lateris testē ingreditur. ^x *Quartum* tandem par, *Lumbares* sunt duæ, aut tres, quas vena caua à posteriore sui parte, qua corpora vertebrarum lumborum spectat producit, vnde nec nisi cauæ trunco eleuato in conspectum se proferunt. Hæ per vertebrarum foramina, per quæ nerui exeunt, ingrediuntur, sicque spinali medullæ alimentum deducunt. Ab his duæ medullæ lateri vtrinque attentæ, versus cerebrum ascendunt, quibus postea duæ venæ à jugulari interna descendentes per anastomosen junguntur.

4.
Lumbares.

Diuisio
Trunci in
duos ramos
Iliacos.
Propagines ante
diuisionē
hæc enata.

His propaginibus sic eductis, vbi fere sacrum os Caua attingit, circa quintam lumborum vertebram, arteriæ magnæ subternitur, ac in duos insignes ramos, ^y *Iliacos* vocatos discinditur, qui paululum progressi iterum finduntur in ^z duos inæqualis magnitudinis, ex quibus alter interior, alter exterior dicitur. Interior, gracilior, exterior, amplior est, & maior. *Antequam tamen sic diuidantur*, alias duas spargunt propagines, quarum ^a *prima*, *Muscula superior* communiter dicitur, quæ transuersim per lumborum & abdominis musculos disseminatur, vnde *Musculam lumbalem* vocarem: ^b *altera*, *Sacra*, quod ossis sacri foraminibus superioribus, aliquot exiles venulas ad spinalem medullam, & os sacrum nutriendum porrigit.

Prodeunt autem ab vtroq; ramo plures venæ, antequam extra peritonæum ad crura vadat, & ab interiore quidem duæ. ^c *Prima*, ab externo latere exoritur, *Muscula media* dicta, quod in omnes musculos natum, eorundemq; cutem dispergatur. Alimentum enim deferat omnibus ijs musculis, qui ossis ilium exteriorem partem, siue dorsum, occupant, quemadmodum & ipsi coxendicis articulo, vt propter hanc causam maxime aduertenda sit ab ijs, qui doloris coxendicis, siue Ischiadis causam paulo curiosius considerare velint. hanc ego *Gluteam* ab insertionē non male vocari posse censuerim, quod in glutæos musculos implantetur. ^d *Altera*, ab interno latere prodit, & vena insignis est, *Hypogastrica* dicta, à sua in omnes fere hypogastrii partes distributione. Ab hac ramus emergit, *Hæmorrhoidalis externa* dictus, quod, si quando sanguine feculentiore, aut feruido salsoue turgeat, hæmorrhoidas ani externas constituat. Hic sacri ossis foraminibus surculos dispensat, sed maiores ramos in recti intestini musculos, vsque ad ani externam cutim largitur. Est & *alius ramus*, qui ab eadem hypogastrica oritur,

Interioris
Iliaci propagines,
anteegressum ex
peritonæo.
1.
Glutea.

2.
Hypogastrica
Hæmorrhoidalis
externa.

f, 8.14.X.
X.

t, r.

u, 5.3.2.

x, 4.4.4.

y, X.X.

z, Y. & Z.

a, 5.

b, 6.

c, 7.

d, 8.

oritur, quem *Cysticum* vocamus, & notatu tam in Viris, quam Fæminis dignissimus est. *Cystica vena.*
in Viris quidem, quia in Vesicam absumitur: in *Mulieribus* vero, quia in his pinguedine suffultus, quibusdā furculis vesicam adit: sed frequentioribus vteri fundum, & euidētiōribus Ceruicem, per quas venas solas nonnulli Virginibus, quidam etiam Mulieribus menstruatim sanguineas purgationes fluere existimant. Sed enim menses, non modo per hosce ramos, sed & per eos, quos à ramo spermatico transmitti diximus, & qui fundum Vteri, non Ceruicem petunt, effluunt. Nec enim per ceruicem tantum siue virginibus, siue fæminis: sed per vteri imprimis cotylidones expurgari singulis mensibus sanguis menstruus consuevit. Id quod Patavij hic publice in Theatro, primo nostræ Professionis anno monstrauius in cadauere cuiusdam fæminæ menstruus laborantis. Vidimus enim hypogastricos ramos, & vasa spermatica, cum testibus sanguine refertos fuisse, ipsumq; vterum crassiorem sanguinem apertis interna vteri parte venarum osculis, & manifeste patentibus, fuisse. Vidi tamen bis in alijs, ex venis ceruicis tantum, non etiam ex vtero prodixisse: & in alia contra, ex solo vtero fluxisse. Frequentissimum tamen est, vt ex vtriusq; purgentur, nec non nisi præter naturam ex alterutro, cum obstructiones videantur, fluxum impedire.

Cæterum quo tempore menses instant, vteri os hiare, aliquoties dum vlcera putredidit, ac ceruicis vterinæ curauimus, obseruatum à nobis est, & visum. Vidi etiam tunc madore quodam fætido relaxari hæc partes, & ceruicem ampliorem multo, quā esse solebat alias, comparuisse. Quamobrem mirum nemini videatur, quod à nonnullis nostræ ætatis scriptoribus obseruatum est, tempore mensium vsque adeo laxatas nonnullis fuisse has partes, vt sponsæ, quantumuis Virgines reuera essent, propterea in ius vocatæ, ac pro defloratis habitæ fuerint. Quare si contingat, vt nouiter coniugium ingressi, de suarum virginitate dubitent, quod vuluam admodum laxam inuenerint, considerare oportebit num fortasse menses eo tempore institerint. Tandem quod reliquum est trunci interioris, ad pubis os contendit, & ab externo Iliaco sobolem, quæ cum iplo vnā venam effingit, asciscit, sicq; peritonæum, & ossis pubis foramē transiens, in crus spargitur, ac fere vltra femoris medium latere interno protenditur.

e, 9. vide etiam 4. 11. M. vbi hæc omnia eleganter demonstrantur.

Ab exteriori ramo similiter venæ quædam prodeunt. Et primo quidem *Epigastrica* *Exterioris Iliaci* dicta, quæ ab elatiore sede pronascitur, sic dicta, quod epigastrij musculos, nempe Rectos abdominis vocatos, accedat. Præcipuo enim sui ramo extra peritonæum progrediens, vtrinque sub recto musculo recta ascendit, donec prope umbilicum peruenit, vbi cum Mammarijs venis descendētib; per anastomosis coniungitur. Anastomosis autem hæc in maribus raro adesse solet: at in fæminis, eleganter conspicua est, vnde & Galenus libr. de dissect. Venar. & Arter. cap. 8. per hæc duo vasa maximum illum Vteri cum Mammis consensum fieri testatur. Consensum autem hunc pluribus aphorismis, quinta sectione doctissimus Hippocrates explicuit. *Aphorismo enim quinquagesimo*: Mulieri, inquit, menses si cohibere velis, Cucurbitam quem maximam ad mammas appone. *Trigesimo vero septimo*: Mulieri Vterum gestanti, si mammae repente graciles fiant, abortit. Et *trigesimo octauo*: Mulieri vterum gestanti, si altera mamma gracilis fiat, gemellos gestans, alteram abortit. Et si quidem dextera gracilis fiat, malculum: si sinistra, fæmellam. Sic vtero laborante, pallidæ fiunt papillæ, & in vteri hydropē,

Exterioris Iliaci propagines ante egressum ex peritoneo sparse Epigastrica. Consensus vteri cū mammis.

hydropes, eadem attolluntur. Est tamen consensus etiam non tantum ratione Venarum: sed & Nervi eorum à sexta coniugatione prodeuntium. Vnde si mulieri, aut virgini mamina tractentur manibus, libidinem accendi videmus, vt propter hanc quoque causam illæ feminæ libidinosiores habeantur, quæ mammosæ sunt, quemadmodum Afra apud Martialem. Notare autem, quoad originem huius venæ conuenit, sæpissime eam à Crurali ramo, jam jam describendo, exortum suum trahere, sæpius tamen ab Iliaco. ^f Altera vena, Pudenda est, quæ ab interna sede Iliaci externi jam peritonæum ^f, 11. egressi nascitur, & Pudenda dicitur, quod in pudenda vtriუსq; sexus absumatur. In viris enim in scrotum, & penis cutem distribuitur: in feminis autem ad cutim, & labra pudendi, ad nymphas, cæteraq; partes, tum vero vtriusq; in glandulas circa inguina jacentes propagatur, vnde tempore pestiferi, aut venerei bubonis materiæ in glandulas confluxio oritur. Tandem ^g musculus inferior est, quæ ad coxendicis articulum abit, & in ^g, 12. musculos ac cutim eo loci sitos disseminatur, quo nomine, meo iudicio, appellatione strictiore melius Coxendica vel Coxalis diceretur.

CAPVT IX.

Iliaci rami exterioris per crus disseminati propagines, & ramos, enumerat.

EXTERIOR ergo ^hiliacorum ramus, vbi dictas propagines emisit, è peritonæo ex- ^h, Z. cidit, & ad inguina fertur, per elatiorem, & interiorem ossis coxendicis regionem, per quam primus & secundus femur flectentium musculi, descendunt, atq; ⁱvenam ⁱ, 11. CRURALEM constituit. Huius historiam, vt facili methodo tradamus, in Truncum, & Ramos diuidemus.

TRUNCVS autem, antequam findatur in ramos, quatuor expandit propagines, ex quibus prima illa est, quam ^lsaphenam, & venam Malleoli interni appellant, propterea ^l, 13. quod iuxta hunc excurrat, dicitur & communiter à Medicis vena tali, sed improprie, vt monuimus superius libro primo. Oritur autem statim post egressum ex peritonæo, ab interiore latere Trunci, quæ arteria comite carens, per femoris & tibiæ interiora sub cute recta descendit, ac vbi jam ad malleolum internum peruenit, in pedis elatiorem sedem expanditur, vbi ramum per transuersum spargit, à quo postea alij complures oriuntur, qui ordine ad singulos digitos distribuuntur. Ab hac aliæ propagines sparguntur in iuinere, quæ tamen raro inuicem numero, aut magnitudine correspondere reperiuntur, quemadmodum Naturæ lusum in venis, cum primis autem Artuum aduertis, jam aliquoties monuimus. Inter has ^mprima non procul ab ipsius venæ exor- ^m, 17. tu, in superiorem cutem internæ femoris regionis duplici ramo spargitur, quorum exterior, qui crassior est, anteriorem, externamque femoris partem sub cute perrepat: interior vero, interiora petit, & in peritonæum spargitur. ⁿSecunda, cum jam ad medium ⁿ, 18. femoris peruenit, propagatur. ^oTertia, circa genu oritur, duasque producit soboles, ^o, 19. vnā, quæ in anterioris genu sedis cutem, secundum patellam, disseminatur; altera vero, in posterioris, vbi flexura est, seu poples, cui orbiculatim circumuoluitur.

2.
Pudenda.

3.
Musculus inferior.

Cruralis
vena diui-
sionem Trun-
cum &
ramos.
Quatuor
propagi-
nes Trun-
ci cruralis,
ante
diuisionē.

1.
Saphena.

Saphena
propagines
quatuor.

1.
2.
3.

- p, 20. rur. *P* *Quarta*, ad Tibiæ medium, antrosum, & retrorsum ducitur. E regione saphænæ 4.
- q, 14. *q* *aliæ vena*, ab exteriori sede Trunci educitur; at breuior, quam ipsa saphæna est, & extrorsum ac transuersim in cutim ossis coxendicis anteriori regioni obductam, tum in musculos eiusdem loci porrigitur, quam Recentiores *ischiam* vocant. Productus his *Ischia*.
- r, 15. propaginibus Truncus postea in musculos femoris os amplexantes reconditur, ac *tertiam* digerit propaginem, quam *Musculam* appellant, & *gemina* esse consuevit. Exterior *Muscula*.
- s, 16. enim, quæ minor est, tibiam extendentium musculis secundo & quarto, simul & cuti soboles offert; *interior*, & amplior, tibiam extendentium tertio, & fere omnibus femur circumstantibus musculis furculos largitur. Hinc truncus ad posteriora se flectens, sensimque descendens, alios quosdam in membranas musculorum dispergit, & mox quartam venam educit, quæ in femoris posteriora excurrit, & *Poplitea* dicitur, cele- *Poplitea*.
- bris apud Medicinæ scriptores, maxime vero eorum Principem Hippocratem, qui 6. Epidem. sect. 1. 5. ipsius apertionem in renum doloribus admodum commendauit. Quia tamen non raro profundius sita est, quam vt sine insigni difficultate secari possit, fonticulos in sura, ad quam ipsa spargitur, in ultos, plurimum adiumenti in pluribus morbis attulisse, frequenti experientia edoctus sum. Huic venæ, vbi propagata est, à musculæ interiore ramo soboles nonnunquam accedit; *sæpe etiam* duæ à trunco statim prodeunt propagines, quarum *altera* elatior est, *altera* humilior, quæ deinde in progressu vniuntur. Spargit autem statim ab exortu ramos quosdam in cutem femoris, circa elatiorem & posteriorem ipsius partem; deinde recta per medium poplitem, siue flexuram tibiam in suram descendit, cui plurimos furculos incerto ductu, cum alij recta, alij transuersim, nonnulli obliq; progrediantur, distribuit. His sic disseminatis ramulis, ad talum vsque progreditur, ibique tandem terminatur.
- Atque, hic est progressus Trunci cruralis, & hæc quas spargit, antequam diuidatur, propagines. Femoris enim ossi accumbens sic descendit, ac iuxta ipsum obliquatur, vt, vbi genu attingit, inter duo femoris infima & posteriora capita feratur, quo loci in duos ramos, interiorem, & anteriorem bifariam scinditur. Sunt autem inæqualis *Diuisio*
- amplitudinis, cum exterior tenuior sit, interior maior: vterque tamen per tibiam, & infimum pedem dispergitur. * *Interior* descendens aliquot propagines in musculos, *Trunci* in duos ramos.
- qui in posteriore tibiam parte siti sunt, ac præcipue in eos, qui suram constituunt, maxime vero *y* ad interiorem sedem gasterocnemij externi, transmittit, sicque postea deorsum progrediens, vbi ad Tibiam inferiorem appendicem peruenit, & aliquot soboles *Interior*.
- cuti impertiuit, *z* sub malleolo interno reflectitur, & ad pollicem vsq; excurrit. *a* *Exterior*, in duos statim scinditur ramos minores, similiter inæquales, quorum *b* *interior*, qui maior est, & in profundo latitat, in sura musculos totus exhauritur, recta inter duo capita gasterocnemij externi, siue primi pedem mouentis, tum inter gasterocnemium internum, & tibiam anticum, ac tandem inter digitorum flexores, secundum longitudinem excurrent, & in itinere musculis, per quos transit, vbiq; furculos quosdam distribuens. Hic vbi ad medium longitudinis Tibiam peruenit, in *interiorem* & *exteriorem* iterum subdividitur. Horum *interior* surculum iuxta tibiam, & tali articulum distribuit, cum musculorum tendinibus descendit, & in pollicem, indicem, ac medium distribuitur. *Exterior* iuxta fibulam progreditur; ac vbi ad ligamentum peruenit, quod

tibiæ os fibulamque colligat, ramum educit, qui ligamentum perforans, in pedem excurrit, dispersus in musculos, qui pedis digitos extrorsum reflectunt.

Cæterum *c. exterior, & minor ramus*, exterioris rami ex diuisione illa, quæ iuxta poplitem sit, *c. II.* ad elatiorem fibulæ appendicem abit, tum ad externam & posteriorem tibiæ partem, vbi plurimos spargens ramulos, ad externum malleolum proficiscitur, tandemque in pede finitur.

Conclusio historia Venarū. Vmbilicalis vena. Atq; hæc est historia vniuersa venarū Portæ, & Cauæ, in qua distributionis seriem omnem absoluiamus. Restare videtur, vt de Vmbilicali quoque, & Vena arteriosa verba faciamus. Sed quia *Vmbilicalis* nihil aliud est, quam propago quædam insignior à Vena Portæ emergens, & per vmbilicum excurrens; tum vero in adulto homine ligamenti potius, quam Venæ vicem obeat, quod hepar in suo situ contineat, vt testantur historia eorū, qui abscisso vmbilico aut vulnerato, subito interiere, impedita respiratione ob hepatis pondus decidētis è suo loco, & secum diaphragma detrahentis, operæpretium non duximus quidquam de ea pluribus hic agere. Quod si quis obstinate peculiarem venam esse rationibus ex cerebro suo natis, velit contendere, illi non melius consulere novimus, quam vt sensum accuratius consulat; aut, si amplius contendere velit, caput helleboro purget, vt oculorum illa hebetudo non nihil abstergatur. Cæterum de *Vena arteriosa* commodius sequenti libro, cum Arteriæ venosæ historiam explicabimus, quod magna inter vtramque similitudo sit, & propterea eadem opera vtraque tradenda, verba faciemus.

Vena arteriosa.

C A P V T X.

Sanguinis definitio proponitur, & declaratur.

Ratio tractationis. CVM de Venis hætenus egerimus, quas sanguinis, tanquam vltimi alimenti, receptacula esse diximus, reliquum esse videtur, vt quædam de sanguine breuiter subiiciamus. Neque veremur hic, ne forte nobis Aristarchus quispiam propterea dicam scribat, qui methodi leges violemus, dum ad historiam humani corporis, partes quas vocant contentas reuocamus, quod plurimorum animis alte insederit, Anatomiam non nisi continentium tantum partium contemplationem sibi vendicare. At enim pertinent ad Anatomiam omnia, quæcunque in corpore nostro sub oculos cadunt, siue partes sint solidæ, seu fluidæ, ab aliis comprehensæ, cum Anatomia perfecta sit totius corporis, omniumque partium ex artificiosa sectione acquisita cognitio. Cæterum cum breuitatis studium in omnibus nobis propositum sit, ea huc duntaxat, quæ maxime necessaria & scitu dignissima in hoc argumento videntur, in medium adducemus. Primum ergo quid sit sanguis, deinde, quæ animalia sanguine prædita sint, quæ eodem careant, dicturi sumus; tum cur alia sanguine, alia ichore nutrantur inuestigabimus, inde videbimus sanguis homogeneus sit, vniuscq; naturæ, an ex diuersis constet partibus, & vbi demonstrauerimus, ex pluribus conflatum esse, rationem huius compositionis proponemus, partesque omnes, & earum causas venabimur, tandem differentias trademus.

Ordo.

SANGVIS ergo olim & *sanguen* vocatus, in neutro genere, vnde Lucretius,
Visceribus viscus gigni, sanguenq; creati.

Græcis

Græcis *aîua* dicitur; & *synonymia*, quod ego quidem norim, omnino caret. Ex se- Sanguinis syno-
 ptem enim linguis, quas calleo, nulla est, quæ sanguinis synonymum habeat. Quæ nymia nulla.
 certe res mihi perquam mira sæpe accidit, cum fere ea omnia, quæ familiaria nobis ef- Homonymia.
 se consueuerunt, pluribus appellationibus nobilitari soleant. Contra, *homonymia* in om-
 nibus inuenitur linguis, & apud Græcos Latinosque rei Medicæ scriptores celebra-
 tissima est. Primo enim, sanguinis voce, integra illa humorum massa, quæ in Venis &
 Arteriis leuibis continetur, intelligitur: In qua significatione vulgo sumitur, cum di-
 cimus sanguinem mittere, elicere, purgare, deicere, mingere, & similia. Sic Poeta
 quoque sumpsit, dum canit:

*Sauus amor docuit natorum sanguine matrem
 Commaculare manus.*

Altera significatio minus communis est, & quæ locum habet tantum apud eruditiores,
 cum pro certo, & determinato humore accipitur, vnoque ex illis multis, qui in ve-
 nis continentur, nempe pro eo, qui omnium maxime rubicundus est, purus, dul-
 cis, calidus, & humidus. Sic apud Galenum sæpe sumitur, hodieque apud eos, qui ossa,
 non sanguine, sed melancholia nutrir dicunt. Sunt & aliæ acceptiones, quas libens
 prætereo, vt cum, Poetæ præsertim, pro genere accipiunt, siue familia, vt Virgilius, 2.
Æneid.

——hortamur fari, quo sanguine cretus,
Quidve ferat, memoret: quæ sit fiducia capto.

Item pro vi ac vigore, vt M. Tullius succum ac sanguinem Reipubl. vocat, quem alij
 præstantiam ac nobilitatem vocarent. Nos enim in prima hic significatione sumimus,
 & sic definimus:

SANGVIS est humor rubicundus, aspectu homogeneus, ex cibo potuque, viscerum & va- Definitio.
forum ope elaboratus, per Venas & Arterias animalium sanguineorum, pro alimento vltimo vi-
taque omnium partium fluens. Definitionem hanc, quia vniuersam sanguinis naturam
 nobis breuiter aperit, diligenter nostro more explicabimus. Primum ergo *humorem*
 esse dicimus, vt genus assignemus, simulque distinguamus ab omnibus aliis partibus
 corporis, quæ Contentæ dicentur, aut Impetum facientes: tum vero etiam à sangui-
 ne concreto, qui sanguis amplius dicendus nõ est, sed *θρόμβος* & potius, & Grumus. Ad-
 dimus autem humorem esse *rubicundum*, quæ vox à cæteris omnibus humoribus &
 contentis nostri corporis partibus separat, cum rubicundi non sint: tum à sangui-
 ne etiam non perfecte sano, qui omnis generis colores suscipere valet. Vt autem & ab
 illo sanguine distinguamus, qui quarta pars est massæ in venis arteriisque contentæ,
 & cui tum humorem, tum rubicundum esse competit, subiicitur sanguinem, quem
 definimus, *aspectu esse homogeneum*. Reuera enim vt demonstrabimus postea, homo-
 geneus non est, sed ex pluribus diuersis partibus conficitur: at alter ille, & aspectu iu-
 dicatur, & reuera quoque est homogeneus. Quia autem sanguis humor est, vt termi-
 netur, receptaculo indiget: receptaculum autem hoc, duplex nobis statuitur, dum Subiectū,
sive locus.
per Venas, & Arterias fluere indicamus. In nullo enim sanguineo, sanguis extra va-
 sa continetur, nisi in Corde solo, teste Aristotele, 3. hist. anim. 2. & de part. animal. 8.
 Competit autem sanguis animalibus tantum, nec tamen omnibus, sed iis duntaxat,

Anima- quæ sanguinea dicuntur. Animalia enim produplici nutrimento gemina sunt, quædam
lia dupli- scilicet, quæ sanguine nutriuntur, & *ἐναυμα* dicuntur ab Aristotele, à Latinis Sanguinea:
cia sunt. nonnulla, quæ ichore aluntur, *ἐναυμα* vocata, & Exsanguia.

Materia Generatur autem sanguis ex cibo potuque, & quidem opetum viscerum, scilicet Ven-
sanguini- triculi, tum vasorum, puta Venarum, quæ ex chylo in Hepate præcipue, & Liene elaborant.
nis. Nec vero frustra generatur, sed ut sit alimentum; nec quo dvis, sed vltimum. Triplex
Efficiens. enim est alimentum, ut docet Hippocr. lib. de alim. Et id quod hoc nutrit, & quod vel
Finis. ut nutrimentum est, & quod nutrimentum futurum est. Sanguis ergo est alimentum, quod hoc nutrit. Quamobrem quoties cibus non ingeritur, sanguis deficit, quoties ingeritur, augetur: tum si alimenta bona assumantur, sanguis integer est; si prava, vitiosus, ut loquitur Aristoteles 2. de part. animal. 3. Est autem alimentum omnium partium totius corporis, quæ verba propter eos tenenda sunt, qui negant Ossa, Cerebrum, Vngues, & Pilos sanguine nutriri. Et quo ad ossa quidem, quod Galenus demonstrasse videtur, ossa aut medulla ut magna, aut medullari humore, ut parua, nutriri. Quoad Cerebrum, quod Vesalius ostenderit, Venas in ipso nullas reperiri. Quoad Vngues, & Pilos, quia in mortuis crescere sunt visi, ut testis est Aristoteles, cum tamen in mortuis nutritio, quæ per sanguinem fit, cesset. *Primis* satisfecimus, opinor, superius libro secundo, cum de hac re ex professo egimus: *Vesalio*, experientia & inspectio anatomica contradicit: *Tertis*, qui vngues & pilos nutriri negant, nunc satisfaciamus. Non sequitur, vngues & pili post mortem augentur, non igitur nutriuntur sanguine, cum nulla pars sit, quæ post obitum augeatur. Hæ enim partes non ita perfectæ sunt, ut reliquæ, unde neque ita perfectæ nutritione aluntur, sed vivunt in nobis more plantarum, quæ abscissæ etiam à suo trunco, aliquamdiu nutriri solent. Sic ergo & in mortuis excrecere possunt, cum eorum attractrix facultas, quippe in solidior materia consistens, non ita facile post obitum euanelcat. Si quis dicat, vngues, & pilos partes non esse, & propterea non nutriri, partes autem non esse, quod ablata regenerentur, illi opponimus dentes, qui excidentes, eadem, qua ante erant, forma renascuntur, non secus ac vngues, imo, quod mireris forte magis, alveolum novum, (cum vna cum dente suo alveolus perpetuo pereat,) recondunt. Cum ergo dentes regenerentur, nemo tamen propterea nostri corporis partes esse, vnuquam negavit. Quamobrem iam concludimus, sanguinem partium, quotquot sunt in corpore, omnium alimentum esse vltimum: quin nec alimentum aliud, quod quidem vltimum sit, præter sanguinem reperiri. Quod si semen à quibusdam spermaticis partibus assignetur, bilis, felleæ vesiculæ; Chylus ventriculo, eos aut ignatos esse dissectionum oportet, qui venas has per partes digestas, sanguine plenas non viderint, aut Naturæ institutum, quæ vbivis (summæ id sapientiæ clarissimum signum) eandem rationem consiliumque sequitur, non capiunt. Et quæ ista esset tam insignis providentia, partes nutrire sanguine, ut certe hæc omnes nutriuntur, alimento in pluribus organis tam anxie elaborato: deinde & semine, quod ipsis transmitti non potest, & bile, excremento sævo, & chylo, alimento adhuc crudo: Additur deinde, & Vita: non enim alimentum tantum est, sed & vitam partibus largitur. Vita hæc spiritibus donatur, qui in sanguine sunt, estque illa facultas partium, nutriendi se sanguine, & (dum licet ætatis ratione) augendi.

Refu-
tantur
qui vn-
gues &
pilos nu-
triri ne-
gant.

gendi. Quanquam autem imprimis hæc vox Arteriarum gratia adiecta sit, vt antea alimenti vox, causa Venarum : non tamen ille vsus sic Venoso sanguini debet tribui, vt Arterioso prorsus dematur : nec hic sic Arterioso arrogari, vt venali nullatenus competere credatur. Nutrit enim venosus sanguis: sed & vitam tribuit. Vitam largitur arteriosus: sed & nutrit. Sic tamen ille alimentum copiose suggerit, vt solus nutrire: sic iste vitam infundit, vt solus vita donare videatur. Hinc Vena abscissa, tabescit fere pars, relicta arteria: Arteria dissecta, pæne emoritur, illæsa vtcunque vena: si tamen parua pars sit, tueri se alterutrius vi potest.

Definitio ergo hæc vera est: sed & perfecta, cum omnes sanguinis causas contineat. *Formam* enim exprimit, dum dicimus humorem esse rubicundum, aspectu homogeneum: *Subiectum*, dum dicimus animalibus competere sanguineis: contineri autem his in Venis & Arteriis, tanquam in proprio conceptaculo & loco. *Materia remota*, cibus & potus; *propinquior*, Chylus. *Efficiens*, calor tum viscerum, tum Venarum, partim innatus, partim influens. *Finis* alimentum, & vita omnium partium.

CAPVT XI.

Animalium quedam sanguinea, quedam exsanguia esse, & quamobrem.

DIXIMVS animalia quedam sanguine nutriri, quedam ichore: illaque sanguinea, hæc exsanguia vocari. Hac occasione moniti, in præsentiarum duo inuestigabimus, primum, quæ sint illa animalia, deinde quamobrem sic diuerso nutrimento alantur. *Sanguinea* ergo animalia, aut pedes habent, aut pedibus carent. *Quæ pedes habent*, vel bipeda sunt, vt homo, avis; vel quadrupeda, vt bos, asinus, canis, simia: *pedibus carēt*: vt serpentes, pisces, cete. *Exsanguium* alia *insecta*, *ἐντομα*, quæ incisuras parte sui, vel prona, vel supina habent, aut etiam vtraque, vt musca, vespa, papilio, scorpio: alia *molliā*, *μαλακία*, quæ sanguine carent, & foris molli carne obducta, intus solidum continent, more sanguineorum animalium, vt sepia, polypus, loligo: alia *testata*, *ὀσπράδιόδεσμα*, quibus pars mollis & carnea intus, solida foris est, fragilis ac rutilis, vt omne genus concharum; alia *crustata*, *μαλακόσπαρα*, quæ carnosam & mollem partem intus, foris solidam, sed collilem habent, vt astaci, squillæ, & omne cancerum genus. Hæc ergo omnia ichore nutriuntur, qui per carnes eorum partim ope canalium fertur, partim (vt in plarisque) per inconspicuos meatus transineat, non secus atque panni particula extrema madefacta, aqua per reliquum pannum paulatim penetrat.

De his iam quæritur, cur diuerso alimento nutrantur? Cui quæstioni duo habeo, *Cur alia* quæ reponam. Primo, animalia duplicis esse generis, quedam perfectiora, nonnulla *animalia* imperfecta. *Imperfecta* voco, non quæ simpliciter talia sunt, sed quæ pauciora organa respectu aliorum habent, cum nihil sit à sapientissimo rerum Opifice conditum, quin in suo genere summum perfectionis gradum attigerit. Perfectiora e contra, quæ plura habent organa, pluresque obeunt actiones, ac quadam sapientia instructa sunt. Hæc ergo cum instrumento sapientiæ indiguerint, sanguinem necessario, quod id ipsum sit, requirebant. Patet hoc ex pulcherrimo Hippocratis loco, qui libro de flatibus continetur, vbi eleganter, Opinor, inquit, inter omnia quæ in corpore sunt, nihil

» magis ad prudentiam conferre, quam sanguinem. Sed elegantius adhuc probat. Nam
 » cum in constanti, (sic pergit) habitu persistit, consistit etiam prudentia: sanguine vero
 » permutato, concidit & prudentia. Huic consentit doctissimus Aristoteles, qui secun-
 » do de part. animal. capitibus secundo, ex sanguinis differentiis iudicium de sapientia
 » colligit. Est certe, inquit, roboris efficacior sanguis, qui crassior & calidior est: vim
 » autem sentiendi intelligendique obtinet plenior, qui tenuior, frigidiorque est.
 » Secundo autem de partibus, capit. quarto: Naturam sanguinis causam esse, cur per-
 » multa animalibus accidant, tum per mores, tum etiam per sensum, quod sanguis ma-
 » teria sit totius corporis. Porro sanguinea omnia sapientiora esse longe ex sanguibus,
 » inductione facta per singula genera declarari sine negotio posset, cum sensibus aut
 » omnibus, aut certe quam pluribus sint prædita, ut taceam interim curam, quam de
 » victu, generatione, & futuris adhibent. Potest & alia ratio assignari, nempe quibusdam
 » in frigidioris aëre degendum fuisse, ut sanguineis, unde calore indigebant: quibusdam
 » in calido tantum, & propterea hyberno tempore in cauernis, ut ex sanguibus. Cæ-
 » terum cum & inter sanguinea nonnulla sint, quæ sese in latibulis abscondant frigi-
 » dioribus temporibus, quemadmodum serpentes & lacertæ faciunt, considerandum
 » est, magnam inter sanguinea latitudinem, & alia alijs calidiora esse, frigidioraque: &
 » propterea quæ paruo calore prædita sunt, jam ad exsanguium naturam accedere,
 » Sunt autem serpentes, & lacertæ, inter sanguinea maxime frigida, ex quo contingit,
 » ut quo magis ad septentrionem accedas, tanto pauciores inuenias, cum in calidiori-
 » bus locis commodius viuant.

C A P V T XII.

*Sanguinem heterogeneum esse probatur, inde quibus ex partibus constet, &
 quæ harum cause sint, inuestigatur.*

Partes sanguinis **S**ANGVINEM qui in venis coercetur, aspectu quidem homogeneum esse, & vnius naturæ, in definitione diximus: at si quis tamen vasculo exceptum concretumque inspiciat, non secus ac ipsum lac diuersis constare partibus animaduertet. Sed & quemadmodum lac ex butyro constat, quod supernatat; & caseo, quod in imo subsidet; ac sero tandem, inter vtrumque medio loco positum: sic sanguis è venis extractus, si alicubi in vase feruetur, in serum, & fibrosam massam concreuit. Sanguis ergo homogeneus non est & vni-
 Ex opinio- formis, sed ex diuersis constat partibus. Cæterum qui Medicinam nobis hactenus illu-
 ne aliorum. strare conati sunt, alias adhuc partes in sanguine ponunt, & minutius ista inquirunt. Cum sero. n. inquirunt, bilem flauam aut atram permisceri: cum fibris vero sanguinem strictè acceptum, pituitam, & melancholiam. Et ut confusa sunt, si mediocriter se habeant, ita si copiosior sit pituita, eam supernatare; si sanguis, in medio consistere; si melancholia, in fundo hæreret, ut adeo quinque sint humorum genera, quæ in sanguinea illa venarum massa continentur, serum scilicet, bilis, sanguis, pituita, & melancholia.

In hanc

In hanc sententiam inducti sunt potissimum, quod videntes diuerſas eſſe noſtri corporis partes, quamlibet earum ſibi ſimile alimentum expoſcere crediderunt. Partes enim *alia calidæ ſunt, & ſiccæ; alia frigidæ & humidæ: nonnullæ calidæ & humidæ; quadam etiam frigidæ & ſiccæ.* *Ex primis partibus eſt Veſicula fellis; ex ſecundis, Cerebrum, & Ventriculus; ex tertijs Carnes, Muſculi, Cor, Iecur, & Parenchymata vocata; ex quartis Oſſa, Cartilagineſ, & Ligamenta.* Primas ergo pro nutrimento bilem; Secundas, Pituitam: tertijs, Sanguinem ſtrictius acceptum; quartas denique, Melancholiam requirere. Alterum eſt quod eoſdem deluſit, cum in ægorum ſanguine, dum Venas aperuerunt, diuerſitatem eiufmodi partium plurimum animaduertent, quare & rationi (*iā adductæ*) & experientiæ omnino ſidendum eſſe ſunt arbitrati. At ego vt omnes partes ſanguine propriè dicto nutriri exiſtimo; ita in hominibus perfectè ſanis diuerſitatem eiufmodi dari, omnino pernego. Nec enim ita neceſſaria fuit, vt ipſi quidem ſibi perſuadent, tot humorum in ſanguine congeries, vt vnaquæque pars ſuo temperamento conueniens inueniat alimentum. Sanguis enim ab Omnipotente illo Opifice ſic temperatus eſt, vt vniciuiſi parti in legitimum nutrimentum facile concedat. Nec difficile eſt hoc oſtendere ad oculum ſi Plantas inſpicias, quæ cum diuerſis partibus conſtent, vno alimento reficiuntur. Nec vero partes vnus tantum plantæ, ſed & complures, naturam inter ſe diuerſiſſimam habentes, vna eademque pluuiali aqua nutriuntur, & ſæpe herba venenata pulcherrimo & ſuauolenti lilio adſtat, vtroq; luxuriante, etſi vno rore, eademque pluuiâ irrigentur. Quod ſi hanc diuerſitatem, in venâ inueniant ſectiõnibus, id huc neutiquam trahendum eſt, cum ab illo perfectò ſanitatis limite ij declinèt, & jam virioſi humores ſuperent, ac maſſa ſanguinea penitus ſit turbata. Ceterum nos in præſentia, nõ de morboſo, ſed quam ſaniſſimo ſanguine, eiufq; natura verba inſtituimus. Non ergo nutriuntur partes diuerſæ, diuerſis tota ſubſtantia humoribus, quia id opus non eſt: nec ita diuerſi humores reperiuntur. Illud tamen verum eſt, ſanguinem diuerſum reperiri, pro varietate partium quæ nutriuntur. Vena enim Portæ dicta, vt ſupra monuimus, ſanguinẽ ſeculentiorẽ vehit, ac Caua, quod partes nutritioni deſtinatas alat: ſanguis etiã qui pulmones nutrit, longe ſpirituoſior eſt ac purior, eo qui in Caua coërcetur. Nulla tamen hic eſt differentia eſſentialis, neq; etiam confuſus cum alijs fluit. Ex his jam concluditur, ſanguinem dupliciter conſiderari poſſe, tum in homine perfectè ſano, & qui intra Naturæ limites continetur, tum qui à perfectâ illa & conſummata valetudine ad minus proſperam declinat. Sani ergo hominis ſanguis, tribus tantum partibus conſtat, ſero ſcilicet aqueo, rubro liquore, & fibris ſanguineis. At eorum, qui minus ſani ſunt, diuerſis, pro exſuperatẽ vno, aut pluribus humoribus, bile, pituita, melancholia, vel ſero. Quia tamen plurimum refert noſſe, quæ cauſa huius diuerſitatis tam materialis, quam efficiens ſit, de vtraque nunc breuiter quædam ſubijciemus. Sanguinem ergo ex cibo & potu tanquam remotiore materia; ex chylo autẽ, vt propinquiore, fieri, ijdem Medici concedunt. Hunc enim in Ventriculo conſectum ad Hepar trahi per meſaraicas venas, ibiq; in ſanguinẽ mutari docent, qui ex diuerſis conſtat partibus, & heterogeneus eſt, quod in chylo totidẽ partes contineantur, bilis nempe, pituita, ſerum, melancholia, & ſanguis. In qua ſane ſententia omnium bonorũ

Quomodo deluſi ſint hi authores.

1.

2.

Sententia Authoris. Reſpondetur ad argum. primum.

Ad ſecundum.

Concluſio

Cauſa partium ſanguinis diuerſarum Materia ſanguinis.

auctorem

auctorem Hippocratem sequi videntur, qui libro 4. de morbis, In omnibus, ait, cibis & potibus, & biliosi quid est, & aquosi, & sanguinei & pituitosi; in alio plus, in alio minus. Quapropter & quæ eduntur, & quæ bibuntur, alia alijs præstant ad sanitatē. Quæ quidem Hippocratis sententia non ita intelligenda est, ac si in ipsis alimentis humores hi præexistent, ex quibus postea in venas trahantur; sed quod alimenta in hosce mutantur, cum quibus idē temperamentū obtinent, si calor noster accedat, qui causa est efficiens, separans has partes, ac distinguens, siue calorem hunc postea in Venis, siue in Iecore consistere dicamus. *Pars ergo chyli tenuior & calidior, in bilem abit; crudior, & frigidior in pituitam; frigidior & siccior, in melancholiam; temperata vero in sanguinem facit.* Ex hoc fit, vt alimenta quæ *temperata* quidem sunt, sanguinis plurimum generent: *calida, & sicca*, multum bilis; *frigida, & humida* plurimum pituitæ: *sicca autem & frigida* copiam melancholiæ: *humidus tandem victus, & plurimus potus*, plurimum feri generet. Cæterum vt alimenti ratione, humores varij generantur, etsi calor vnus, idemq; sit, & naturaliter se habeat: ita calore declinante ad statum, qui præter naturam est, tametsi alimenta sint optimi succi, & vniformia, humores nihilominus diuersi procreabuntur. Si enim feruens sit calor, alimentum quantumuis temperatum non in sanguinem, sed potius plurimam bilem vertetur: at si deficiat, contra in pituitam abibit. E diuerso, si calidi temperamenti sit cibus, à calido hepate, aut venis, in bilem prorsus absumetur; à frigido autem, in laudabilem sanguinem redigetur. Probari hoc potest quam optime exemplo mellis, quod cum facile in bilem vertatur à moderato calore, faciliusque ab immodico, tum vero in frigido corpore in sanguinem potius mutatur. Quamobrem & senibus pro sanguine suppeditando alimentum est aptissimum, iuuenibus autem pro bile: & si quis præcalidum jecur habenti carnes etiam boni succi dederit, animaduertet facile in bilem traduci. Ex quo constat, vt quis de alimentorum sano vsu sanum deferat iudicium, illi omnino necessarium esse, vt alimenti temperiem, cum moderato calore conferat & componat. Alimenta enim intemperata, in temperatis naturis praua sunt: in intemperatis eiusdem ordinis, pessima: at contrarij, optima & salubria.

C A P V T XIII.

Differentias sanguinis persequitur.

A copia. **D**IFFERENTIÆ sanguinis à varijs desumuntur, à copia, qualitate, consistentia, loco, & ijs quæ sanguini permiscuntur. Et *ratione copie* quidem, non modo animalia diuersa inter se plurimum differunt, cum quædam minimum fere habeant, vt serpentes, quædam plus, vt lacertæ; nonnulla multum, vt pennata ac quadrupeda: sed & Homines ipsi, qui inter omnia animalia maxime abundant sanguine, ratione ætatis, regionis, sexus, temperamenti, & temporum anni, mirifice inuicem discrepant. Pueri enim fere sanguinem copiosum habent, qui deficere videtur senioribus, plusque illis est, qui calidas & humidas regiones incolunt, quam qui frigidas siccasque; itemque mulieribus, quam viris, quod non se tantum, sed & (cum vtero gerunt) fœtum alere debeant. Temperamentum calidum vel humidum, vel ex utroq; compositum feracissimum est sanguinis: frigidum contra & siccum, sterile. Ex illo Plethora nascitur; morbus in

bus in quo supra vires, sanguinis copia in venis congeritur, quemadmodum in Athletis olim fieri solebat. Sic Vere turgent humores, & copiosissimi sunt, Æstate pauciores.

Ratione qualitatis quoque diuersitas sanguinis obseruatur. Sic sanguis alius calidior est, frigidior, humidior, aut siccior. Et hæc differentia similiter secundum ætates, sexum, regiones, temperamentum, & anni tempora maxime obseruatur. Calidior est, & humidior sanguis puero, quam seni, & iuueni calidior, quam puero. Vir calidiorem & siccio rem habet muliere. Æthiopibus, & qui Africam Asiamq; aut cæteras orientales, & meridiem spectantes incolunt regiones, calidior est multo, quam Europæis, aut ijs qui occidentem vel septentrionem inhabitant. Iam in temperamento diuersitatem esse tam clarum est, vt calidi, aut frigidi dicantur non alia de causa, quam quia calido aut frigido sanguine sint præditi. Æstate etiam sanguis plus feruet, quam Vere, Autumno, aut Hyeme. Ad qualitatem videtur pertinere etiam color, in quo differentia insignis aduertitur. alius enim alio est rubicundior, aut flauior.

Est & sanguis alius alio crassior, ex quo superior pars corporis cum inferiore, diffidet, & famina cum mare, & dextra pars cum sinistra eiusdem corporis, vti docet Aristoteles, 2. de part. animal. cap. 2. Alius sanguis nullo pacto concreuit, vt damarum, & Cernuorum, alius facile, vt taurinus, vnde fit, vt epotus venenorum instar homines enecet, intercepta voce, dolente stomacho, & retenta vrina; cum alij tamen sanguines, vt hirci, capri, cerui, & leporis in antidotorum numerum à Dioscoride referantur, lib. 2. cap. 97. Non enim reuera venenum est, sed concretione enecat, quod tum ipsa curatio euincit, quæ per ea expeditur, quæ sanguinem dissoluendi vires habent, tum quia coctus, à pauperculis in Italia citra noxam comeditur. Cæterum huiusmodi differentia, & inter homines maximè aduertitur, obseruatum autem à me id præcipuè est, eos qui rara & molli cute sunt præditi, vt plurimum sanguinem habere, non facile concrevibilem: contra, qui densa & dura pelle constant, ijs subito in grumos cogi. Illos timidos, sed prudentes esse notauit jam olim Aristoteles, loco citato. Omnibus tamen hominibus concreuit, & si quando in pestilenti febre emissus per Venæ sectionem, haud coëat, quemadmodum & nos sæpè vidimus, insignem semper putredinem denotauit.

Est & diuersitas sanguinis penes vasa, in quibus continetur. In venis enim propriè dictis, atrior est sanguis, crassior, ac terrestrior, copiosoque sero præditus; in arterijs autem rubicundior est, pulchrior & pauciore sero resperfus, ita vt qui per arterias diffunditur verè sanguis, contra qui per venas, fex potius sanguinis dici mereatur. Nec tamen vniformis est omnis Venarum sanguis, sed sæculentior, crassior, nigerq; magis in venæ Portæ propaginibus obseruatur, quam qui in Caua est; rursusq; qui in huius est propaginibus, crassior est eo qui in trunco, & maioribus ramis conspicitur, adeo, vt qui continetur in capillaribus venulis, maxime omnium rubedine clara efflorescat. Et hinc causam colligere licet, quæ multos sane latet Medicos, cur scilicet per cucurbitulas, & hirudines rubicundior sanguis, quam per Venæ brachij sectionem euacuetur. Est & notabilior rubedo in eo sanguine, qui cordis & Pulmonum substantiam, musculorum item carnem, quam alias partes nutrit.

Tandem differentia ab ijs deductæ, quæ sanguini permiscetur, maximæ obseruandæ sunt.

Ee

A permiscetur.

dæ sunt. Interdum enim sanguinea massa pura est, vt in ijs qui perfecta sanitate fruuntur: interdum permixtos habet diuersos humores, & vel vnum, vel plures, & vel intra Naturæ limites adhuc contentos, aut præter naturam se habentes, & hos vel putridos, vel putredine carentes. Sunt autem humores hi Bilis, Pituita, Melancholia.

Cæterum antequam huic libro extremam imponam manum, cum in dubium nostro seculo à doctissimis quoque Viris fuerit reuocatum, posset ne sanguis inclusus Venis putredine corripitur, quod crediderint, quascunq; res in suo loco saluas integrasque præstari, quid sæpenumero in tot dissectionibus, quæ à me administratæ fuerunt, obseruari, in medium afferam. Vidi enim non tantum in mortuis, sed sæpe etiam dum in abscessibus curandis occuparer, sanguinem illum qui in Venis est in merum candidumq; pus abiisse. Nec vero pus tantum offendimus, sed & vermes ex putredine generatos, & potissimum in trunco venæ Portæ, qua hepar egreditur, qui affectus Ombibus frequentissimus est, si in humidis & vdosiss locis pascantur. Sunt hi vermes lati, nigrique, sensim in apicem desinentes. Sed & in Cauæ trunco descendente, non longe ab emulgentibus venis Patauij, in frequentissimo Theatro, insignem alium duorum transuerforum longitudine inuenimus, similem prorsus erucæ, quem multi maxima cum admiratione inspexerunt. Nec refert, quod sanguis in Venis tanquam in proprio loco sit, cum locus non diutius rem à corruptione vendicet, quam omnia in ipso lege Naturæ dissipentur.

FINIS LIBRI QVINTI.

ADRIANI



ADRIANI SPIGELII

BRUXELLENSIS,

DE HUMANI CORPORIS FABRICA,

Liber Sextus.

Qui Arteriarum naturam, earumq; per vniuersum corpus distributionem persequitur.

CAPVT PRIMVM.

Arteriarum naturam, actionem, & vsus cum differentiis explicat.



VENAS merito Arteriæ excipiunt, ob affinitatem. Nam & *tunica Ratio or-*
 ex qua constant, non admodum dissimilis est, & *sanguis, quem dinis.*
 vehunt à sanguine illarum, nō nisi elaboratione exactiore dif-
 fert, & copia spirituum. Quod si Venarū diligentissima *Utilitas*
 cognitio digna est futuro Medico, vt certe est, quemadmodum dixi- *doctrina*
 mus, multo adhuc profecto dignior est hæc ipsa, q̃ nunc de Ar- *de Arte-*
 terijs instituimus tractatio. Hæc .n. nos in plurium abditarum *rys.*
 rerum cognitionem sic deducit, vt quæ alijs videntur inperue-
 stigabilia, aut certe, non nisi maximo ingenij acumine penetranda, facillimo negotio
 aperiat. Quamobrem etsi non ignoremus Anatomicam à nobis hic necti historiam,
 non videbimur tamen abs re facturi, si oblata occasione nonnulla asperferimus, quæ
 medicam potius spectabunt artem, vt ostendamus vel obiter, quantum vtilitatis in
 arte Anatomix cognitio afferat, & quo pacto eandem ad vsum deducere liceat.

Est autem *Arteria* vox Græca origine, Romanâ ciuitate donata, cum Latini proprio *Arteria*
 vocabulo quo designent, careant. Dicitur ergo ἀρτηρία vel ἄρτηρ ἡ ἀρτεῖν, quia continuo *etymolo-*
 motu attollatur semper, & deprimatur; vel, vt video placere pleriq; omnibus, ἄρτηρ ἡ ἀρτεῖν *gia.*
 ἀεὶ ἐξ ἀρτεῖν, quod ærem, siue spiritum conseruet. Arteria .n. ab Antiquis vocabatur fi- *Ambigui-*
 tas.

Ee 2

stula 1.

stula illa cartilaginea pulmonū, per quam aer externus attrahitur: vnde apud Hippocratem, lib. de dissect. legimus, Arteriam ex vtraq; faucium parte originem ducere. Sic Plato accepit, sic & Platonis discipulus Aristoteles. Inter Latinos consuetudinem Græcorum imitatus est Celsus, qui lib. 4. cap. 1. exiguam in arteriis, sub ipsis faucibus linguā esse asserit, intelligentes *ὀππλωτῆδα*, quæ in larynge est, siue capite asperæ arteriæ. Posteriore tamen, cum & hos de quibus nunc acturi sumus sanguinis tubulos, perpetuo motu distendi viderent, existimantes non ab alia causā, quam aere inflari, Arteriæ Appellationem ipsis tribuerunt. Ne tamen æqui uocatio obscuritatem pareret, illam quidem asperam arteriam; hos vero, laues dixere, tandemque circa Galeni tempora simpliciter Arterias appellarunt, adeo vt quoties vel Galenus, vel Medici Galeno posteriores Arteriarum mentionem iniiciant, de his ipsis nobis sint intelligendi. Inuenio tamen & *ἐπανθισμένην φλέβα*, Venam micantem, siue *pulsatilem* dictam, ad distinctionem reliquarum Venarum, quæ non pulsant, cum, vti superius monuimus, Venæ vox vtramque antiquitus complecteretur. Aristoteles plerumque *τὴν ἐλάττωνα φλέβα*, Minorem venam appellat, ratione Cavæ, quam maiorem vocat, siue ampliore: ab aliis tamen *ἀορτὴν* dici, 3. hist. animal. 3. testatur, & rationem etymologiæ adiiciens, *ὅτι τὴν περὶ αἷμα*, inquit, & ἐν τοῖς περὶ αἷμα τὸ νευρώδες αὐτῆς μέγεθος, eo quod nervosa ejus pars conspici vel in mortuis queat. Sed deesse mihi videtur vox aliqua, quæ obscuritatem magnam huic loco aspergit, quam si liceat suspitione addere, erit fortasse *τὸ αἰσέν*. Illud tamen non ignoro, Veteribus Græcis *ἀορτὴν* dictam fuisse vaginam cultroꝝ Macedonibus familiarium, quorum manubrium nonnihil incurvatum erat, ad quam sane figuram quam proxime accedere videtur arteriæ magnæ truncus, qua parte ex corde originem suam ducit.

Definitio. Est autem ARTERIA si definitionem ipsius requiras, *vas cavum, duplici membrana constans, distensione ac contractione pradi- tum, vt sanguis tenuior ac spirituosus à Corde pro vita omnibus partibus deferatur.* Dico esse *vas*, vt genus ipsius assignem, quod cum Venis, & Nervis commune habet. Differt autem à Neruo, quia est *cavum*; à Vena, quia *duplici membrana constat.* Membrana tamen non est, vt Vena, exacte, sed nonnihil ad Nervi naturam propius accedit, cum facile & in se contrahi, & extendi queat, vnde & ab Aristotele sæpe sæpius *νευρώδης φλέβα*, Vena Nervosa vocatur. Nec simplex etiam membrana est, sed *gemina duplex*, quarum altera exterior est, altera interior. Exterior, tenuis, rara, ac mollis, qualem in venis cernere est, quæ rectas quidem fibras complures, paucas obliquas, transuersas vero nullas obrinet. Quæ causā est, vt ab humorum acredine interiore exesa, aneuris- ma exoriat, extenta exterior, quæ facile cedit, cum transuersis fibris careat. Interior, crassa est, imo crassitie fere quintuplo venarum tunicas superans, densa, ac dura, quæ tota ex fibris transuersis constat, rectis & obliquis prorsus destituta. Hanc præter & tertia est, à Galeno 7. admin. anatom. 5. addita, quæ in superficie interiore hærens, telis aranearum persimilis est, in grandioribus sane arteriis imprimis conspicua, sed maxime eo in loco vbi arteria magna ex corde derivatur. Habent tamē nonnunquam & aliam forinsecus, quæ ipsas vel integit, vel vicinis partibus alligat, quod tamen non accidit, nisi vbi vel nudæ incedunt, aut quoquo pacto suspensæ sunt, quod idem & supra de Venis diximus. Hanc in infimo ventre à Peritonæo mutuatur; in medio, à Pleura. Sunt autem

autem membranæ hæc omnis sensus expertes, eadem de causa, quam de venis retuli-
 mus, ne scilicet in plethora extensæ, aut ab acribus humoribus in caco-chymia vellica-
 tæ, dolore hominem perpetuo affligerent. Reliquis verbis actio & usus designantur.
Actio quidem, quæ est *distensio*, & *contractio*, Græcis διαστολή, καὶ συστολή dicta. *Usus* autem,
 ut sanguis tenuior ac spirituosior, à Corde omnibus partibus distribuatur, cuius beneficio vita conser-
 uetur. Actio hæc *Pulsus* dicitur Latinis, quamvis apud antiquiores Græcos nullum
 obtinuerit nomen, vel quia animaduersa non fuerit, vel quia neglecta manserit. Po-
 sterioribus σπυγμὸν vocarunt, quod vocabulum apud Hippocratem non pulsus, qui na-
 turaliter arteriis inesse solet, denotat, sed dolorem potius illum, qui in inflammationi-
 bus insignioribus circa carnes, ab arteriarum pulsu excitatus, percipi consuevit, quo
 pacto 7. aphor. 21. legimus, à forti in vlcerebus pulsu malum esse sanguinis profluvium.
 Cæterum motus hic idem est, qui cordis, nec differt nisi in hoc, quod Arteriis secun-
 dario inest, Cordi primario. *Cordi enim immatus est*, cum à propria suæ carnis substantia dis-
 tendatur, contrahaturque, ut in animalium quorundam cordibus videre est, quæ dis-
 secta effusoque omni prorsus sanguine, diutissime nihilominus adhuc pulsant. *Arteriis*
contra à Corde, pulsandi facultas *influit*, ex quo fit, ut abscissis arteriis, aut ligatis, nullus
 omnino percipiatur motus, quod scilicet à Corde nihil accipiant, cuius vi & potentia
 moueantur. Contingit autem simul cum cordis motu motus arteriarum, adeo ut dila-
 tatio cordis arteriarum dilatationi, & contractio contractioni, temporis momento re-
 spondeat. De qua re si quis dubiter, experimentum in se ipso facere non magno nego-
 tio poterit, si manu ad cordis regionem applicita, altera pulsus qui circa carpum est ar-
 teriæ, obseruet. Manifestius autem & ipsis oculis usurpare poterit, in vivi animalis disse-
 ctione, præsertim quod vitam paulo longius protrahit, ut erinacei, in quo cordis arte-
 riarumque pulsationes simul fieri quam optime notabit. Ex hoc motu usus insignis ena-
 scitur, ut sanguis spirituosus per totum corpus digeratur. Dum enim dilatantur, à Cor-
 de accipiunt: dum constringuntur, ad partes pellunt. Est autem maxime necessaria hæc
 sanguinis pulsio, cum absque ea si foret, ad superiores partes, & transuersas sanguis nun-
 quam abiret. Quæ causa est, ut venis arteriæ semper coniungantur, quarum beneficio
 motus venosi sanguinis perficiatur. Imo vero hinc accidit, ut animalia quæcunque ve-
 nas obtinere, eadem quoque arterias sint nata, quod ad venosi sanguinis tum conser-
 uationem, tum usum, arteriarum præsentia, videatur esse maxime necessaria. Hoc ip-
 sum manifesto experimento discimus, cum venis valide ligatis, etsi pertusæ sint, sangui-
 nem nullatenus reddi, aut admodum tarde, & citra impetum fluere videmus, laxatis postea
 vinculis, vi quadam & impulsu sanguinem spargi. Id quod non alia profecto de
 causa evenit, quàm quia Arteriæ una cum Venis ligatæ, motu prorsus destituuntur, la-
 xatæ deinde motu suo impellunt, & vi quadam sanguinem effundunt. Et hæc quoque
 ratio est, cur Vena Cephalica semper sine impetu, at Basilica vi quadam sanguinem e-
 ciat, quia hæc arteriam comitem habet, illa comite caret. Atque hic verus usus est di-
 lationis & contractionis Arteriarum. Est & alius, ut scilicet per dilatationem calor ven-
 tiletur, & externus aer suscipiatur. Cæterum sanguis quem arteriæ vehunt, tenuior est,
 quam qui in vena Cava continetur, ut pote à calore in sinistro cordis ventriculo co-
 ctus magis, & elaboratus, ex quo fit, ut & spirituosior sit, cum spiritus ex αἵματι sangui-

arteriis
sensu ca-
rent.Actio.
Usus.

Pulsus.

Pulsus
cordi in-
natus.Pulsus
cordis ar-
teriarumque
fit simul.

nis generetur, vt tradit Galenus. *Spiritus* autem hi *Vitales* vocantur, quod vitam partibus omnibus largiantur, cum ligatis aut abscissis arteriis, partem ad quas sanguis arteriosus non vehitur, emori, & gangræna perire videamus. Cum enim satius foret, vt in vno loco caloris fons constitueretur, adeoque in Corde, totum autem corpus ex vno corde constare minime possit, ab ipso tanquam per tubulos naturalis omnibus partibus calor digeritur. Calor autem cum in tenuissima necessario substantia, qui spiritus sunt, stabuletur, vt diffundi per totum corpus temporis momento possit, nec in itinere longiore dissipetur, propterea sanguinem tanquam materiam crassiorē, in qua calor diutius, quam in spiritu conseruaretur, coniunxit. Adde, quod ex sanguine in singulis partibus, dum in vapores dissoluitur, alij continuo spiritus nascuntur, sicq; vita indefinente refectione protrahitur. Ex his ratio nunc reddi potest, cur Arteriarum substantia densior, crassiorque facta sit, quam Venarum. *Ratione enim actionis* suæ, vt in *diffusione* facilius aperiatur, & apta manere diutius possit: in *contractione* autem, non penitus subsideat. *Ratione vero vsus*, ne sanguis tenuior spiritusque subtilissimi, aut exsudent, aut evanescant. *Nervosa* autem est hæc substantia, quod in *dilatatione* arteria abbreviari semper soleat, & versus cor trahi: in *contractione* contra elongari, & versus extrema extendi, ad quam actionem non alia substantia, quam nervosa aptior est. *Fibræ* autem in *interiori tunica* transversæ sunt, in *exteriore* rectæ obliquis mixtæ, quod & accipere sanguinem debeant, & acceptum propellere. Non difficulter accipiunt à corde propulsū, at difficilius ad extimas partes distribuunt. *Transuersæ* ergo fibræ interioris positæ sunt, vt actionem adiuvarent operosiorē: *Rectæ* vero, & *Obliquæ* foris.

Differē-
tiæ.

Amagni-
tudine.

A progres-
su.

A situ.

D I F F E R E N T I A S *Arteriarum* quod spectat, quemadmodum & Venarum, quibus admodum respondent, complures sunt; primarias tamen duntaxat hic enumerabimus. *Ratione* ergo *magnitudinis* insignis est differentia, & magni momenti in Medicina. Sunt enim quædam *maximæ*, vt Truncus Aorta dictus, siue arteria magna per dorsum excurrentes: quædam *mediocres*, vt arteriæ carotides, emulgentes, & iliacæ: quædam *minores*, quæ per artus & caput repunt: *omnium minimæ* sunt, capillares, quæ in habitum corporis, viscerumq; substantiam disperguntur. *Quædam rectæ* incedunt, vt jugulares: *quædam tortuosæ* sunt, & capreolares, vt præparantes arteriæ ad testes accedentes. *Nonnulla* superficiem corporis accedunt, sed paucae admodum sunt, vt *Cutaneæ* vocatæ, quæ ad tempora, frontem, penem, scrotum, & digitos excurrunt, reliquæ omnes in penitioribus corporis partibus latent, & *Profundæ* vocantur. In qua re à Venis quamplurimum differunt, quæ per totum corpus sub cute sparguntur. Sed benignissimus Opifex, & ab externis iniuriis sic defendere voluit, quæ periculose læderentur, & muniis suis locum aptiorem destinavit, cum in profundo consistentes, Venarum sibi comitum sanguinem ad quasvis externas partes promptius impellant. Intrinseca autem omnia sic pervadunt Arteriæ, vt & in recessus ossium (nonnullorum opinione ipsis inaccessibiles) penetrent. Nec tantum cavitates illas quas medulla occupat, vna cum venis ingrediuntur: sed ipsam etiam ossium substantiam (res mirabilis) pertundunt, quemadmodum in vlceribus Tibiæ, iis qui Chirurgiæ operam navant sæpe licebit advertere, si vna ossium caries insignis occurrat. Differentiæ quæ *ratione connexionis* observantur, facile ex superiore libro desumentur, vbi de venarum connexione egimus.

A conne-
xione.

CAPVT II.

Superiorem, siue ascendentem Arteria magna Truncum, & propagines per caput distributas proponit.

DE numero Arteriarum & ortu, nulla est apud Authores rerum Anatomicarum controuersia, sed vnanimis consensus, vniuersas propagines, quæ per corpus disperguntur ab vna ortum ducere, quam Aortam vocant, hanc autem ex Corde derivari. Sed cum Cor duobus constet sinibus, dextro, & sinistro, ex ^a elatiore sede sinistro sinus, siue ventriculi educitur, vbi amplissima est, duriorque & cartilaginosa, quam alibi. Simul autem ac enata est, & priusquam pericardio excidat, ^b duos protinus graciles furculos, vtrinque vnum, propagat, quos *Coronarias arterias* appellant, quod cum Coronali vena, coronæ in modum cordis basin amplectantur, à quibus secundum cordis longitudinem multæ soboles deorsum sparguntur. Sunt autem plures & insigniores circa sinistrum, quam dextrum Ventriculum, quemadmodum & de Vena superius diximus, quod sanguine copiosiore cor ea parte indiguerit, cum perpetuo & violentiore, quam dexter sinus, motu agitetur, in quo plus sanguinis digeritur: amplior tamen longiorque est illa, quæ à dextro arteriæ latere enascitur. Interdum etiam vnica tantum est, cuius orificio exigua valvula adposita reperitur. His sic disseminatis propaginibus, sub Venæ arteriosæ trunco ascendit nonnihil, & pericardium perforat, quod vbi superauit, in duos ramos ^c scinditur, quos ob insignem magnitudinē Truncos, & quia ^d alter ascendit, ^e alter deorsum progreditur, illum Ascendentem, hunc Descendentem vocabimus. Insignis autem vtut sit vterque, Descendens tamen & inferior, ascendentem & superiorem multis partibus superat, quod pluribus ille, quam hic partibus sit dedicatus. *Ascendens* enim partes duntaxat quasdam Thoracis, Caput, & Brachia; at *inferior* Thoracis plurimas, Infimum ventrem vniuersum, & Crura adit. De arteria ergo magna, vt perspicue agamus, primo truncum ascendentem, eiusque per thoracem & caput progressum, postea ramos ad brachia digestos exponemus. Hinc descendentem aggrediemur, & eius per thoracem, ac infimum ventrem, tandemque per crura distributionem explicabimus.

^f **A**SCENDENS ergo, siue *superior Aorta* TRVNCVS, inter asperam arteriam, venamq; cavam, & mediastinum sursum contendit, œsophago attentus. Quem situm diligenter notare oportet eos, qui rationem desiderant aphorismi, qui est vigesimus quartus quintæ sectionis apud Hippocratem: Frigida enim, inquit, veluti nix, glacies, pectori inimica sunt, tussis movent, & sanguinis eruptiones, ac defluxiones inducunt. *Pectori quidem inimica sunt*, quia dum de glutuntur per œsophagum, asperam arteriam ipsi adiacentem vna cum gula refrigerant; quæ pars cum frigida per se sit, facile à frigido tam vehementi læditur noxamque trahit. hinc tussis, & alia pectoris mala, longo ordine se consequuntur. *Sanguinis autem profluvia* accidunt, arteria magna similiter refrigerata, vnde spiritus vitales, & sanguis ad cor repelluntur, indeq; ad caput cum impetu transmittuntur, quo repleto, tum ex naribus stillans, sanguinis eruptiones, tum

*Ortus
Arteria
magna.*

*Corona-
ria arte-
ria.*

*Diuisio
in duos
Truncos.*

*Quas par-
tes vter-
que alat.
Ordo di-
cendorū.*

*TRVN-
CVS A-
SCEN-
DENS.*

indige-

indigestus ad inferiores partes propulsus, catarrhos, & destillationes parit. Et hinc quoque ratio reddi potest, cur à potu frigida post vehementes corporis motus, & exercitia, nonnulli protinus suffocati fuerint, cardiaca & syncope grauissima superuenientibus. Arteria enim refrigerata valide, sanguis congelatus est, tam is qui in Aorta fuit, quam ille qui in Corde stabulatur, ex quo horrenda primum symptomata, deinde repentina mors euenit. Vidimus autem secta vena sanguinem his crassum ac frigidum, nec nisi maxima cum difficultate prodijisse, vnde & praesentius remedium ijs non inuenimus, quam ea sunt, quae ob tenuitatem partium grumos sanguinis dissoluendi vim habent. Hinc etiam ratio reddi potest, cur in ardentibus febribus lingua nigrescat, & difficulter aëri deglutiant. Etsi enim verum est, (quae causa vulgo affertur) ex vniuerso corpore vapores ad caput plurimos transmitti, non minimam tamen huius nigredinis culpam arteriae vicinitati licebit adscribere, quae accensa ac inflammata, Oesophago, & sic consequenter ipsi etiam linguae graua mala impertit.

Cæterum ascendens truncus in hoc versus superiora progressu, in duas subclauias arterias diuiditur, quarum altera ad dextram, altera ad sinistram excurrit. Vocantur autem quamdiu in thorace sunt *subclauiae*, eadem ratione, vt subclauiae Venae, quod sub clauiculis incedant: at cum primum è Thorace exciderint, nomen mutant & *axillares* vocantur. Ab vtraque subclauia, vbi primam costam attigere (nam ante nulla propago emittitur,) plures surculi, tam ab inferiore, quam superiore parte propagantur. Ab inferiore, ¹ *Intercostalis superior*, quae costarum radicibus attensa, quatuor superiorum costarum internallis singulos ramos largitur, sub costis vsque ad cartilagineas cum venis excurrentes, à quibus addorsum medullam, vicinosque musculos soboles sparguntur. Ab elatiore sede prodit primo ¹ *Cervicalis* vulgo dicta, sed rectius *Vertebris*, quae retro magis, & versus corpora vertebrarum enascitur, obliq; autem ascendens, iuxta septimam colli vertebram, per foramina transuerforū processuum, & superiorum vertebrarum colli, vt Cervicalis vena, transit, vbi complures propagines producit, quæ ad spinalem medullam per foramina communia, per quæ nervi exeunt, intrant. Aliquam multas etiam ad musculos in posteriore cervicis sede sitos exigit, ascendit ad occipitiū vna cum Vena, & per primū eius insigne foramen, per quod spinalis medulla ex capite descendit, cranium ingreditur. Hinc ^m sub medulla spinali, quae in calvaria adhuc est, cum socia oppositi lateris ⁿ vnitur, ^o sicque sub cerebri media basi versus anteriora recta excurrit: at vbi jam sellam ossis cuneiformis, cui glādula pituitaria incumbit, attigit; in P duos ramos diuiditur, alterum dextrum, alterum sinistram, quorum vterq; ad latus sellae, ad nervorum secundum par repit, vbi vtrinq; 9 in surculos infinitos dirempti, inter primum & secundum nervorum par disseminantur, ac tenui membrana complicati, ^t plexum choroidem constituunt. ^t Altera est *arteria mammaria*, quae reflexa sub sterno, (comite vena mammaria) secundum ipsius latera descendit, & vbi ad cartilagineam ensiformem peruenit, circa latera eius thoracem egreditur, & substructa rectis abdominis musculis, per ipsorum inferius latus recta descendit, tandemque circa umbilicum cum ^t epigastrica arteria ascendente per ⁿ anastomosin coniungitur. Prius vero ac thoracem relinquit, ad sex septem verarum costarum spatia intercartilaginea singulos ramos diffundit, qui vna cum cartilaginibus terminantur. ^x *Tertia,*

Muscula

Diuisio
Trunci a-
scendens
in duos
Ramos.
Arteriae
subclau-
iae.
Ramus ab
inferiore
subclauia
partitur.
Interco-
stalis su-
perior.
Rami à
superiore
parte ori-
untur.

1.
Mamma-
ria.

2.
Vertebra-
lis.

g. D. D.

h. E.

i. b.

l. c.

m, 10. 10

R. R.

n, S.

o, S. T.

p, g. g.

q, h. h.

r, P.

s, 6. 2. d.

vide & 4.

11.

12, 13]

14, x.

15, 6. 2. c.

Muscula alias, sed strictiore appellatione rectius *Cervicalis*, cum in musculos in cervicis regione positos ad occipitium vsq; disseminetur.

His ramis eductis, subclavia ex cauo thoracis exit, & primam costam superans, oblique vergit ad alam, sicque *Y* Axillarem arteriam constituit, quæ postea in brachium diffunditur. Ante tamen propagines aliquot spargit, & ab inferiore quidem parte tres, ex quibus prima ^z *Scapularis interna*, quæ in musculos scapulæ cavitatem occupantes, vadit. ^a Altera, *Thoracica superior*, quæ ad pectoralem musculum humerum adducentem abit, cæterosque pectori instratos, & satis ampla est. ^b Tertia, *Thoracica inferior*, quæ & ipsa insignis, secundum totum thoracis latus descendens, per musculum latissimum, humerum abducentem, potissimum dispergitur. Ab elatiore parte, vna nascitur ^c *Scapularis externa*, quæ summum humerum conscendens, in musculos gibbam scapulæ sedem obtegentes disseminatur. Reliqua pars arteria axillaris ad brachium, comite vena basilica, progreditur, in quod totum postea exhauritur, de cuius distributione sequenti capite dicemus.

Quod restat tandem de ascendente trunco, juxta superiorem sterni partem Thy-
mo suffultum in ^e duos ramos diuiditur, quos *Carotides* appellant, siue *Soporales*, quod his obstructis, aut quocunque modo occlusis, statim in somnum incidamus, cuius periculum in adolecente Realdum Columbum in magna hominum frequentia fecisse, testatur Valuerda in Anatome, lib. 6. c. 11. Inæquales sunt magnitudine, cum dexter multo sit sinistro crassior: tendunt autem recta versus superiora, secundum colli latera deducti, asperæ arteriæ, & venæ jugularibus internis, membranæ beneficio connexi, ac vbi ad fauces peruenerunt, in duos ramos ^f diuiduntur, quorum alter externus est, alter internus. Ille, minor; hic, maior. ^g *Exterior*, ^h ad buccas & faciei musculos soboles propagat, deinde vbi ad aurem peruenit, circa ipsius radicem bifariam ⁱ diuiditur: ^l alter enim ramus auris posteriora petit, à quo duæ arteriæ sub aure maxillam inferiorem per primum ipsius foramen ad processum situm ingrediuntur, & secundum eius longitudinem in omnium dentium inferiorum radices disseminantur, reliqua pars per foramen secundum, quod ad mentum positum est, egrediens, in labrum dispergitur. ^m Alter per tempora, & frontem repit, in musculos faciei absumptus. ⁿ *Interior* ramus Carotidis arteriæ, siue *arteria Encephalica*, in fauces defertur, ac vbi linguæ & laryngi propagines disseminauit, circa Caluaræ basin in duos inæquales ramos diuiditur, minorem scilicet & maiorem. ^o *Minor*, & *posterior*, cum venæ jugularis internæ encephalico ramo maiore, ad cranij posteriora fertur, per occipitij foramen secundum ingreditur, ac crassæ membranæ sinum subit. ^p *Maior*, & *anterior*, vbi per foramen proprium in osse temporum exsculptum cranij cavitatem ingressus est, atque ad ossis cuneiformis sedem peruenit, vbique sub dura membrana incedens, primum vtrinque ramum in latus crassæ membranæ propagat, deinde in brutis infinitos furculos dispergens, ^q Rete illud mirabile constituit, quod reuera quidem & in Homine inuenire est, at respectu brutorum exiguum, & non nisi umbra quædam videtur. His furculis sic constitutis, cerebri crassam membranam perforat, ex qua vbi emerfit, propaginem aliam per cuneiformis ossis foramen secundum ad oculum eiusque musculos, quemadmodum & ad

Ff

maxillæ

3.
Muscula.
Axillaris
arteria.

Eiusrami
antequã
in brachiũ
absumi-
tur.

Abinferio
re parte.

1.

2.

3.

Abela-
tiore sede

vna.

Caroti-
des.

Diuisio

Carotidũ

Exterior,

siue ra-

mus faciei

Interior,

siue ra-

mus Ence-

phalicus.

Diuisio e-

ius in mi-

nozem, &

maiorem.

maxillæ inferioris attollentem temporalem musculum extra Calvariā propagat: inde recta ascendens ad latus glandulæ pituitariæ in duos ramos diuiditur, quorum alter, interior, alter exterior est. ^{r, b. b.} Interior cum sua coniuge oppositi lateris ^{f, c.} vnitur, vnite- ^{t, d. d.} que in ^{u, c.} plurimas arteriolas absumuntur, quæ per tenuem membranā ipsiusq; Cerebri substantiam, ad principium neruorum opticorum disperguntur. ^{x, f. f.} Exterior, reflexus, & tenui membrana suffultus, in cerebri priorem ventriculum abit, diuisus in multos ^{y, h. h.} furculos, qui cum ^{z, R. R.} arterioliis illis à ^{a, P.} vertebrali enatis vniuntur, alij quidem cum illis, quas per basin capitis sub cerebro vertebralis spargit: alij vero cum illis, quos per tenuem membranā, & cerebri substantiam disseminat, cum quibus a plexum choroideum constituunt.

*Maiores
subdiuisio.*

C A P V T III.

Axillaris Arteriæ per brachium digestæ seriem enarrat.

*Trunci
arteria
axillaris.*

ARTERIA ergo ^{b, 6. 2 F.} Axillaris, vbi ad brachium peruenit, ^{c, F.} Brachialis trunci nomen acciscens, vnico ac indiuiso trunco vltra cubiti flexuram, per internam brachii partem fertur, vtrinque propagines quasdam graciles, ad musculos humeri internam sedem occupantes, disseminans. Incedit autem interno, siue profundo basilicæ venæ ramo, tanquam comes indiuiduus, cuius ductum quoque, & seriem vbique sequitur, at-
tensa. Statim autem secundū posteriorem humeri sedem, qua ipsi cubitum extendentes musculi adhærent, descendens, propagines ^{d, l. & m.} duas, quarum inferior insignis admodum, educit, sicque versus cubiti flexuram retorquetur, quam vbi attingit, ^{e, n. n.} c duos furculos, vtrinque vnum, in articulum exporrigit, adeo detectas, vt sæpe ibi pulsus satis evidenter percipiatur. Sub cubiti deinde flexura, per internā ipsius regionem incedēs, inter duos musculos, secundū & tertiu quatuor digitorum internodiū flectentes, demersa, in ^{f, G.} duos dissecatur ramos insignes, quorū alter exterior, alter interior est. ^{g, H.} Exterior, secundum radium fertur, (vnde *Radius à me dictus*,) & recta carpū petit, quo loci Pulsus ipsius à Medicis solet explorari, cum manifestus admodum sit, quod cuti ptoxi-
me arteria subiiciatur. Non longe autē à carpi radice ^{h, o.} ramulum emittit, qui sub tendinibus musculorum pollicem extendentium, in externā manus regionem excurrit, & in musculos, qui inter primum pollicis os, & metacarpi, quod indicē sustinet, siti sunt, absumitur. Hoc ramo propagato, sub annulari interno carpi ligamento, & palmaris musculi lato tendine incedens, ^{i, p. p. F.} in tres diuiditur ramos, haud secus ac Vena & Nervus ipsius comites. Ex his primus pollicis, alter indicis internam regionem petit, tertius internum latus interioris medij digiti sedis. Primus & secundus in duos quisque ramos dirimitur, tertius indiuisus est. ^{l, I.} Interior ramus, os cubiti, siue vnam rectā percurrit, (Cubitus eo nomine à me vocatus) & in manus volam dispergitur. Adeo autem abditus est in musculos, vt eius pulsatio difficulter percipiatur, nisi in macilentis, vnde Medici digitos in exteriorem ramum semper iniiciunt, dum pulsum in carpo tangunt. Progre-
ditur autem sub transuerso ligamento carpi, & sub tendine palmaris musculi, Vena & Nervo comitibus, ac duos quidem ramos in minimum digitum, totidemque in annularem, at vnum in externum medij latus dispergit.

*Diuisio
in duos
ramos.
Exterior.*

Interior.

CAPVT IV.

*Inferiorem, siue descendentem Arteriam magnam truncum, eiusque per medium
ac infimum ventrem propagationem
proponit.*

m, G. 2.
n, B.

ARTERIAM ^m magnam ⁿ cum primum pericardium superavit, in duos dividi-
ramos, quorum alter superiora petat, alter ad infernas partes descendat, supra dixi-
mus. De superiore iam egimus, reliquum est ut alterum quoque explicemus.

o, Q.

° DESCENDENS ergo TRUNCVS arboris caudici proportionem respondens, ad
quintam Thoracis vertebrae detorquetur, & nonnihil sinistrorsum declinans, ver-
tebrarum corporis sinistro lateri adhæret, sicque sensim descendit. Vbi iam Diaphra-
gma superavit, quod per diuisionem illam semicirculum referentem, quæ inter septi
transuersi productiones est, transit, mox per lumborum vertebrae excurrit, medio i-
psarum corpori innixus, donec ad ultimam peruenerit, ubi iuxta os sacrum P in duos
insignes ramos q diuiditur, quos à situ cum aliis Anatomicis Iliacos dicemus. In hoc
itinere complures de se spargit propagines, quæ diligenti obseruatione dignissimæ
sunt, quod plurimum in morbis accidentium rationem facillime hinc liceat redde-
re. Sunt autem, octo arteriæ Intercoştalæ, duæ Phrenicæ, vna Cæliaca, hinc mesen-
terica superior, duæ Emulgentes, totidem Spermaticæ, tandem Mesenterica inferior,
& Lumbares. Ex his intercoştalæ dum in Thorace adhuc Truncus est, sparguntur; re-
liquæ, dum per Infimum ventrem procedit. Alia autem vena Portaramos comitantur, ut
Cæliaca, & vtraque Mesenterica: alia Cava, quemadmodum cæteræ. De his ordine
nunc agemus, initio ducto ab Intercoştalibus, quæ supremum locum obtinent. Mox
ergo, ac Descendens truncus emerit, à posteriore sui sede ramulos vtrinque ad octo
inferiorum costarum interualla transmittit, quos Intercoştalæ inferiores appellant re-
spectu Intercoştalis superioris, de qua supra diximus. Hæ Venis, & Nervis eiusdem
nominis associatæ, recta secundum humiliorem costarum sedem, ubi ipsarum gra-
tia sinus peculiare exculpti sunt, progrediuntur. Sed quemadmodum venæ inter-
coştalæ in legitimis quidem costis, ad cartilagineas tantum vsque: at in spuris, vlti-
mus nonnihil provehuntur, ad latera inquam abdominis: ita & Arteriæ in illis cum
costarum ossea parte desinunt, in his paulo longius excurrunt. Cæterum hæ arteriæ
propagines quasdam per neruorum foramina ad spinalem medullam, & ad musculos
dorsi vertebrae incumbentes transmittunt, non secus atque in venis intercoştalibus
propagari diximus. Vfus autem est, vitalem spiritum & sanguinem musculis inter-
coştalibus diffundere, quem præter & alium insignem obtinent, aquam scilicet, & pus
in Thorace collectum in arteriam magnam, & hinc per ramos emulgentes ad vesicam
deportandi. Tametsi ne utiquam sum nescius doctissimum Falloppium, aliosque qui
ante me in nobilissimo hoc Patavino Gymnasio docuere, aliam monstraſſe Auditori-
bus suis

TRVN-
CVS DE-
SCEN-
DENS.
Eius pro-
greſſus.

Propagi-
res.

Interco-
ştalæ in-
feriores.

Vfus.
1.
2.
Per quas
vias ma-
teria in
Thorace
collecta,
ad vesicæ
pertine-
ntia.

Explica-
tio loci
Hippo-
cratici.

bus suis viam, per quam vel pus, vel aqua, renum auxilio, educeretur, venam nempe sine pari, cuius ramulus in sinistro latere in sinistri renis emulgentem progreditur. At enim hæc via, quam per Intercostrales arterias monstramus, breuior multo est: vt raceam, per arterias facilius, quam venas materiam quamcunque congestam rapi posse. Neque est quod aliquis hic vereatur, ne ab his excrementosis prauisque humoribus, vitales spiritus contaminentur, vnde Cor grauissima symptomata incurrat, cum lubentes id & æquo animo largiamur, (quod & experientia sæpenumero nos docuit) dum per vrinas pus evacuatur, ægros in syncopen aliaque mala incidisse, interdum etiam in repentinam mortem, vbi aut copia, aut malitia nimia humor peccauit, & Naturæ tantam vim intulerit, vt calor spiritusque succubuerint. Sed me huc vocat ad expositionem locus quidam apud Hippocratem, cum diu animum meum, sæpeque anxium tenuerit. Locus est in Coacis prænotionibus, vbi, Quibus inquit, totus pulmo inflammatus fuerit vna cum Corde, vt ad latus allabatur, hi toti resoluuntur, & jacet æger frigidus, sensus exors, moriturque secunda, aut tertia die. Si vero etiam sine corde contigerit, minus diu vivunt: quidam autem etiam servantur. Diu cogitavi mecum, quis Cordis & Pulmonum cum Cerebro nervisque consensus ille foret, vt æger ab harum partium inflammatione totus resoluatur, cum idem Hippocrates eodem in loco doceat, ea parte ægros resolui, & liuores foris circa costam apparere, qua Aortæ appellatæ (sic videtur vocasse pulmonum lobos) ad latus inflammatæ decidunt. Si vero non valde inflammatæ sint, vt ad latus non decendant, dolorem quidem fieri per totum, non tamen resolui, neque liuores habere. Multis tandem apud me deliberationibus habitis, in hanc deueni sententiam, non aliam esse causam, quam consensum, qui inter has arterias Intercostrales est, & spinalem medullam. Nascitur hic à propagininibus illis quas in spinam se penetrare per foramina vertebrarum thoracis diximus. Quamobrem si Pulmones & Cor sic valida inflammatione tententur, vt in arteriam magnam sanguinis copia affatim irruat, sicque ipsa postmodum tumeat, tumeant etiam hæc vala intercostalia, & consequenter furculi illi, qui spinalem medullam adeunt, fieri profecto nequit, quin & hæc, & Nervi ex ipsa progredientes comprimantur, vnde quid aliud quam resolutiones earum partium, in quas ii Nervi inferuntur, & mouendi facultatem impertiunt? Hanc sententiam mirifice mihi confirmare videtur elegans quædam observatio, quæ apud doctissimum *Cornelium Gemmam* habetur, libr. de hemirritæo pestilenti. Cuidam, is inquit, Iuveni studioso, per vniuersum morbi curriculum sinister oculus contractor fuit. Doluit sinistrum latus, præsertim per exasperationem totius circuitus; ac circa crisin inflata arteria cruris sinistri secundum longitudinem mouebatur, vt nobis conspicua, veluti retractus funis quispiam, verti sursum deorsumque videretur. Quis hic non libens confiteatur, materiam hanc in arteriis fuisse, cum crisis per arterias facta fuerit? Caterum ex his ipsis ratio quoque reddi potest, alterius cuiusdam observationis *Galenicæ*, quæ 4. de locis affect. capit. 4. est, vbi sic inquit: In quodam qui à vehementi peripneumonia infestabatur, brachij tam externæ, quam internæ partes, à cubito ad summos usque digitos sensus difficultate laborauerunt, atque motus quoque nonnihil læsus est. Huic præterea nerui, qui in primo ac secundo intercostali spatio inueniuntur, noxam subierunt.

subierunt. Et paulo post: Huic homini celeriter sanitas reddita est, adhibito scilicet medicamento eo loci, vnde nervi prodeunt, iuxta primum ac secundum intercostale spatium. Propter eosdem intercostales ramos, Ioannes Valeriola, Filius Medici illius cuius observationes habemus, puer adhuc in graui pleuritide convulsiones passus est.

- z, 6.3.X.X. ¹ *Phrenica arteria*, duæ sunt, vtrinque vna, quæ ex Trunco enatæ, statim atque è Thoracis cavo egressus est, in septum transuersum, præsertim vero in humiliorem ipsius sedem iuxta vertebrae dorsæ, in plures ramos sectæ, disseminantur. Nonnullos etiam furculos in superiorem partem spargunt, quæ postea ad pericardium abeunt, qua parte diaphragmati adnascitur. ^{2.} Phrenicæ.
- u, 6.I.N. ^u *Caliaca*, vna est, sic dicta, quod ad καλίαν, id est, Ventriculum ramos transmittat. Hæc Venæ Portæ Splenico ramo simillima, Ventriculo, Iecori, Vesiculae felleæ, Omento, Duodeno, Ieiuni initio, Coli intestini parti, Pancreati, & Lienis ramos plurimos largitur. ^x *Oritur* autem ex anteriore corpore ipsius Trunci, & à superiore parte inferioris membranæ omenti, toto ductu suffulta, in duos ramos, insignes quidem, sed amplitudine tamen inæquales diuiditur, quorum ¹ alter ad dextram, ² ad lævam abit. Ille minor est; hic, maior. ^a *Dexter* ergo in pancreate, sub posteriori ventriculi regione reposito, venæ portæ descendenti coniungitur, ac ibi omenti membranæ innixus, ad hepar vadit, cuius exilitas profecto notatu digna est, si hepatis intruere amplitudinem, quod Veteres olim, hodieque multi sanguinis officinam constituere. Inferitur autem parte cava, prope venæ portæ truncum, & tam parva est, quod maiori arteria, ea Iecoris pars, quæ Portæ radices suscipit, non indiguerit: reliqua autem pars, quæ Cavæ propagines habet, vitalem spiritum copiosissime per venam Cavam ex Corde transmissum suscipiat. Antequam tamen hepar ingrediatur, in itinere plures furculos, eosque partim ex elatione, partim ex humiliore sui sede disseminat. Et ex elatiore quidem duos, ^{primum}, quem Pyloricum voco, & ex medio ductu pronascitur, ac in posteriorem sedem dextri orificij ventriculi pluribus ramulis diuisus spargitur: ^{alterum}, ^b *Cysticas gemellas*, quæ duo sunt exiles rami, & in Vesicam felleam abeunt, ac protinus in multas propagines diuiduntur. Ex inferiore sede similiter duo oriuntur. ^{Primus}, *Epiplois dextra*, quæ in dextram sedem inferioris membranæ omenti, & in Coli partem ipsi adnexam inferitur. ^{Alter}, in duos scinditur ramos, quorum ^{unus}, *Intestinalis*, ad Duodenum, & Ieiuni principium progreditur: ^{alter} *Gastroepiplois dextra*, paulo insignior, ad dextrum fundi ventriculi latus deflectit, & superiore omenti membrana suffulta, ex superiore parte soboles quasdam in Ventriculi anteriorem & posteriorem sedem propagat: ex inferiore autem, in Omenti, cui innititur, membranæ. ^c *Sinister ramus*, & maior, *arteria Splenica* dicitur, inferiori omenti membranæ, glandulisque in ipsa repositis, adhærens, cum Splenica vena, cui attenditur, & cum qua pari ratione soboles digerit, ad Lienem progreditur. In itinere autem similiter ab utraque sui parte ramos digerit. Et ex superiore quidem, ^d *Gastricam*, quæ in medium posterioris Ventriculi partis, siue eius, qua dorso incumbit, porrigitur, inde ascendens, Ventriculi sinistrum orificium coronæ instar cingens, circumit, & furculos,
3. Caliaca.
- Rami duo. Dexter.
- Propagines ex elatiore sede prodeuntes.
1. 2. Ex inferiore.
1. 2. Sinister. Arteria Splenica. Propagines ex inferiore parte digestæ. Gastrica.

Ex infe-
riore.

culos, partim sursum, in œsophagi finem: partim deorsum, colque maiores & frequentiores, in ventriculum dispergit, sicque *Arteriam Coronariam* constituit, similem *Venæ coronariæ*, quam à *Portæ* vena oriri, superiori libro diximus. Ex inferiore autem sede, *Epiploin sinistram*, ea fere parte educit, qua jam Lienem attingit, quæ in inferioris omenti membranam, & quidem ipsius *sinistram* partem excurrit. Hæc protinus ab exortu in duos ramos scinditur, qui admodum à se mutuo diducuntur, ex quibus aliæ arteriæ plures oriuntur, quæ in dictam Omenti membranam, & colon intestinum ipsi adnexum omnes exhauriuntur. His venis constitutis, arteria splenica Lieni magis approximatur, & non secus ac Vena splenica, quam toto itinere comitem habuit, in duos ramos ad literæ Y similitudinem dirimitur, quorum alter superior, alter inferior dici queat, qui postea per cauam ipsius partem ingressæ, in infinitos furculos dirimuntur, ut Arteriarum quintuplo plures sint, quam Venarum. Ex quo fit, ut in inflammationibus Lienis, si manas sinistro hypochondrio apponatur, palpitare ipsum videatur. Ante tamen ingressum arteriæ, inferior ramus, cum inferiore ramo venæ anastomosis insignem facit, & furculum ad inferiorem omenti membranam propagat. Ex superiore autem, una *Gastroepiplois sinistra dicta*, quæ superiori omenti membranæ annexa, in sinistram fundi ventriculi sedem deriuatur, anteriori & posteriori parti, vel etiam superiori omento ramulos largiens. Altera, *Vas breue arteriosum* constituit, venæ eiusdem nominis in morem ad sinistrum ventriculi lata, & orificium adducta. Vfus dextri rami, qui ad Iecur vadit, præter communem quem habet, iste est, ut bilem quoties fellis vesicula obstructa est, ad intestina deponat, maxime vero ad Colon, in quod nonnulli ipsius rami inferuntur. Ex quo fit, ut ulcera in dysenterijs plerumque semper in crassius intestinis, ac præcipue Colo: rarissime in tenuibus inueniantur. Arteria enim hæc, ubi vel hepar calidius copiosam bilem generat, aut fellis vesica obstructa est, bilem in se copiosam suscipiens recta ad Colon transfert. Eodem pacto *sinistri rami*, siue *Splenica arteria* vsum, præter communem, is est, ut Bilem, Melancholiam, Serososque humores, si quando his Lien abundauerit, ad intestina deturbet. Quin & per eandem hanc viam hydropicorum aquæ, nonnunquam vel ad intestina, aut renes, & vesicam demandantur. Hic idem ramus ille est, per quem potus per vniuersum corpus tam subito penetrat, & per quem prauis humores vomitu educuntur. Hic idem in causa est, ut cibo repleti, parum: ubi vero concoctio in ventriculo facta sit, plus urinae reddamus. Plurimum enim distento Ventriculo, premitur: at vacuo, munere suo fungi potest. Hic idem ramus nos edocet, tenuem victus rationem præscribendam esse ijs, qui purgantia assumpturi sunt, ut parula medicamentis sit via, tum ea, per quam excrementa ad ventriculum, quam illa, per quam ad intestina transmittuntur. Hic idem quoque ramus, si duos mesentericos addas, Melancholiæ hypochondriacæ sedes est. Cum enim à Viscerum, quæ in imo ventre continentur, obstructione hoc malum nascatur, arterias plurimum hic pati necesse est, quod vel symptomata, quæ in hoc affectu contingunt, satis edocere queant.

Sinistri
rami.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
Mesenterica superior.

& *Mesenterica superior* paulo infra Cæliacam nascitur, venæ mesaraicæ in modum, (quæ

(quæ sociæ eius est) numerosis propaginibus, in Ieiunum & Ilium intestinum, tum eam Coli regionem, quæ à cauo hepatis, ad dextrum vsque renem pertingit, sicque ferè in superiorem mesenterij partem, distributa. Quo loci obseruandum est, arteriam modo venæ, modo contra venam arteriæ incumbere, sicq; inter vtramq; membranam mesenterij deferri. Habent autem hæ arteriæ in mesenterio multis in locis Glandulas, quæ ad vasorum, & maxime arteriarum liberam perspirationem factæ sunt, ex quo fit, vt schirrolaborantes, vasa comprimantur, & marcor vniuersi corporis insequatur.

Obseruatio.

h, z.

^h *Emulgentes arteria* duæ sunt, vna dextra, altera sinistra. Vtraque sub prædicta prodit, vbi prima secundaque lumborum vertebra ligamento copulatur. Prodeunt autem ab utroque trunci latere, quamquam non è directo, quemadmodum & Emulgentes venæ, cum dextra sinistra sit humilior. Hæ vbi ad renem accessere, in duos ramos finduntur, quibus in sinus cavitatis renum inferuntur, & non secus ac Venæ in ipsorum substantiam infinitis furculis absorbuntur. Harum vsus præter communem est, serum quod copiosissimum in arterijs reperitur, expurgare.

5. Emulgentes.

i, æ.

ⁱ *Spermatice*, siue *seminales* similiter duæ sunt, quæ ex Trunco arteriæ magnæ parte anteriore, sed contiguis principijs enascuntur: non enim, vt sinistra spermatica vena, sic læua arteria ab emulgente prodit. Descendentes postea venis sui lateris attenduntur, & in *Viris* quidem, per peritonæi processum ad testes deferuntur: in *feminis* autem, vbi testibus non nihil approximant, in duas partes scinduntur, quarum altera ad testes, altera ad vteri fundum deferuntur. Arteriæ autem ad vterum sic perueniunt, vt ipsum irrigent tantum ad latera, non etiam ad interiora penetrent. Quod quidem summa prouidentia Naturæ sapientissimæ contigit, quandoquidem haud ita tutum fuerit, ad internam vsque superficiem ipsas deducere, cum in egressu fœtus maximum sanguinis profluuium, non paruo puerperæ periculo fuisset excitatum, si interna superficie placentæ fuissent adnexæ. Hinc & fit, vt puerperia paulatim fluant, non cum impetu, aut confertim.

6. Spermatice.

l, ß.

Mesenterica inferior, paulo supra, quam arteriæ truncus in ramos Ilicos finditur, iuxta os sacrum enascitur, & in Coli sinistram partem, rectumque intestinum abit, cum venis hæmorrhoidalibus ad extremam vsque anum descendens, & Hæmorrhoidales arterias constituens. De vtriusque Mesentericæ vsu quæritur, an præter communem proprium obtineant. Galenus enim quarto de Vsus partium, alterius cuiusdam mentionem videtur injicere, cum velit nonnullam chyli portionem ab ipsis attrahi. Et libro, an sanguis in arterijs contineatur, capite quinto: Si ventrem imum, inquit, & interiorem membranam diuiserimus, arterias in mesenterio plane conspiciemus, in hædis quidem nuper natis, lacte refertas, in adultis autem animalibus alterius cuiusdā rei plenas. Quibus verbis experientia anatomica docet, non Venas tantum, sed & Arterias mesentericas chylum ad se manifesto trahere. Quod sanè cum reuera ita se habeat, credibile omnino est, chylum ab his postea vel in venas transferri, vel ab ipsis arterijs in sanguinem.

7. Mesenterica inferior. Hæmorrhoidales arteriæ. Vfus.

1.

sanguinem conuerti. Nec profecto mirabile id cuiuspiam videbitur, qui consideraue-
rit, & fœtui dum vtero adhuc concluditur, maternum sanguinem per arterias um-
bilicales transmitti. Quod si sanguis per venas receptus, elaborandus adhuc est, vt
certe quiuis Naturæ diligentior indagator elaborandum esse, statuet, profecto is qui
per arterias accipitur, tanto exactiori elaboratione indigebit, quanto venoso est
præstantior. Elaboratur autem in ipsis Arterijs, & Liene, raptus in Cæliacam, &
ad splenem deductus, vt libro 8. pluribus dicemus. Atque hic vsus mesenterici-
carum arteriarum præclarus est, dum Homo perfecta sanitate fungitur: præter
quem nos alium quoque addimus, quoties à sanitatis limite declinauerit. Susci-
piunt enim arteriæ hæ excrementa vniuersi corporis, vt ad intestina deponant, non
secus atque Venæ, per quas & attrahit Chylum Natura, & expellit similiter hu-
mores noxios è corpore, Bilem puta, Pituitam, & Melancholiam. Et bilem qui-
dem, frequenter in continuis & intermittentibus febribus biliosis, quarum crisis
per alui fluxus succedit. Pituitam, quoties Podagricis dysenteria accidunt, quæ
à doloribus liberant, si prudentis Medici auxilio, Naturæ institutum fuerit adiu-
tum. Melancholiam tandem, ab vtroque, sed in primis Hæmorrhoidali ramo, vn-
de Hippocrates, 6. Epidem. Qui Hæmorrhoidas innatas habet, neque dolo-
re lateris, neque pulmonum inflammatione, neque furunculis, aut terminthis, pari-
ter neque lepra, cancro, aut alijs morbis corripitur. Pectoris enim maximus
cum hæmorrhoidali arteria consensus est, quod truncus ex qua oritur, à corde de-
scendens, in primo statim exortu intercostales ramos propagat. Omnes porro
atrabilares humores ex toto corpore hinc expurgantur, vt inde cancri & lepræ nasci
nequeant. Ex his spontaneis purgationibus, quas Natura ipsa molitur, de ijs, quæ
ope Medici perficiuntur, & Artificiales dici possunt, iudicium jam ferre licet. Inua-
luit enim nostra ætate opinio quorundam, purgationes corporis per Clysteres insti-
tui non posse, sed per medicamenta tantum ea, quæ per os assumuntur. Atego, si
Clysteres medicamenta purgantia in se contineant, vniuersum corpus commodissi-
me euacuari, non tantum crediderim, sed etiam experientia edoctus attestari possum.
Totum namque Colon intestinum cum clysteris materiam suscipit, vis ipsa Medi-
camenti per arterias ex trunco Aortæ noxios humores trahit. Quo posito, rationem
licebit reddere (quod sæpissime vidimus,) cur ex helleboro albo facta suppositoria,
eadem symptomata inducant, quæ solent inferri ijs, qui helleborum album per os
sumserunt. Similiter hinc causam licebit petere, ob quam vinctio supra vmbilicalem
regionem facta medicamenti purgantibus, ventrem non instrenue purget. Per
arterias enim medicamenti vis attrahitur, & per arterias eadem postea purgat. Hæ
arteriæ sunt, per quas Colici dolores in Arthritidem, & contra Arthritici in Colicos
permutantur, vt apud Hippocratem habemus 6. Epidem. sect. 4. dicentem, Qui ar-
ticulari morbo detentus intestini dolore dextra parte vexabatur, leuius habebat: vbi
vero hic morbus curatus fuit, magis dolebat. Huius rei hæc erat causa, quod humor
ille qui arthritidem excitabat, ex articulis ad Colon intestinum deferebatur, vnde
Colici dolores aucti sunt. Laurentius huius rei rationem inquirens, ad occultos no-
bisque incognitos ductus refert, ad quos confugiendum mihi minime videtur, si
dicamus,

Observa-
tio.

Cur sup-
positorio
ex hellebo-
ro facta
symptoma-
ta indu-
cant.

Cur vn-
ctio um-
bilici fa-
cta pur-
gantibus
aluum
moueant.
Qui Coli-
ci dolores
in arthri-
tidem, &
contra,
vertantur.

dicamus, ex Arterijs cruralibus in Truncum, & ex hoc in mesentericos ramos, tandem ab his ad intestina humores translatos esse: hæc enim via breuissima est, & commodissima. Nec est ut vereamur illam, quam obijcient nobis spirituum vitalium contaminationem, si excrementitij humores per arterias vadant: hoc enim magnam ipsorum tum in Anatomicis, tum solida Medicina ignorantiam prodit, facillimumque foret, si velim excurrere, hoc loco probare, magnam quasi partem fluxionum in nostro corpore per arterias fieri. Nam & in Arteriis Naturæ vis eminent, & robustior est, ut quamprimum lacessitur, aptissima sit ad expulsionem: & sanguis continuo pulsu agitur, tum sua natura omnia ad fluxionem aptiora reddit. Et quis non credat per Arterias excrementa ferri, qui fluxiones à Liene considerat, in quo cum quintuplo plures arteriæ sint, quam venæ, necessarium certe est, ex Arterijs Lienis illam saburram per Arterias exportari?

Magna pars fluxionum per arterias fit.

m. 6. 2. y. y.

^m *Lumbares* quatuor, à posteriore sede trunci arteriæ magnæ, secundum ipsius longitudinem, dum circa lumborum regionem progreditur, exoriuntur. Hæ in lumborum vertebra, per communia foramina, & ad ipsorum medullam, nec non in musculos vicinos excurrunt. Quin & ad medullæ latus dum vertebra ingressæ sunt, utrinque ad Cerebrum, una cum venis lumbaribus ascendunt. Sunt autem omnes sibi æquales, si duas demeris, quæ juxta os sacrum prodeunt, cum non solum ad medullam in vertebra, & ad conterminos musculos deriuentur, sed etiam transversim per peritonæum, & abdominis musculos transmittantur. Ex his duæ posteriores *Muscula superiores* à nonnullis vocantur, & à Lumbaribus distinguuntur. Atque hæ arteriæ sunt, quas si obseruemus, multarum rerum, de quibus grauissime disputatum est hætenus inter Medicos, facillimo negotio rationes reddemus. Sed imprimis difficillimæ illius quæstionis, quæ inter Medicos agitata est, per quas vias & quomodo Colici dolores in Paralyfin, aut Epilepsiam terminentur. Habemus enim obseruationem apud Paulum Æginetam, lib. 3. c. 43. vbi, Colica, inquit, velut pestifera quadam contagione finiebat, plerisque ad morbum comitalem, alijs ad artuum resolutionem, seruato sensu: & qui ad Comitalem delapsi sunt, plerique perierunt: qui vero ad Resolutionem, plerique seruati sunt, velut in iudicatione causa translata. Ex Colo enim per mesentericas arterias humor morbificus regressus est, ex quo postea translatus in arteriæ magnæ truncum, ad lumbares quoque peruenit, quæ turgescerent sanguine, vicinos compresserunt nervos, ex quibus paralyfis crurum. Et hanc nos sæpe obseruauimus, cum in alijs, tum in nobismet ipsis, præsertim annis superioribus, quibus Patauij Epidemij erant. Neque tamen semper Paralyfis perfecta est, sed sæpè (ut ego vocare soleo) imperfecta, quod ambulandi potentia non prorsus ablata sit, sed summa quadam difficultate cruribus ægri insistant. Hanc multo ex tempore, hallucinantes circa morbi cognitionem, pro debilitate magna virium ex morbo contracta habentes, cibo & potu copiosiore, sed frustra, tollere conabantur. De qua re, lib. 4. de febre semitertiana, capit. 13. pluribus egimus. Hæc quoque causa est, cur post Colicos dolores Epilepsia fiant, imo etiam Lethargi, ut sæpe vidimus, quia materia à mesentericis arterijs transmissa ad Lumbares, ab his facile ad Cerebrum, ad quod ipsa vasa transmigrant, ire potest.

8. *Lumbares.*

Qui Colici dolores in Paralyfin, aut Epilepsia abeant.

Cæterum Truncus Arteriæ magnæ, vbi ad vltimam lumborum vertebram per-
 venit, cum toto ductu, quem enarravimus, sub vena cava ad latus sinistrum iter ha-
 buerit, hic venam conscendit, ne ab ossis sacri duritie in continuo illo motu attera-
 tur. ⁿ Diuiditur autem non secus ac ipsa Cava in ^o duos ramos insignes, quos Iliacas ^{n, 6.2.R.}
 arterias à situ Anatomia periti appellant, & oblique deorsum ad femur delatæ, Græ- ^{o, S.S.}
 corum Y inversum expriment. Proferunt autem & ipsæ antequam femori inferan-
 tur, non secus ac Iliacæ venæ, quibus exacte omnino respondent, ramos aliquam mul-
 tos. *Ex inferiore autem arteria sede, antequam Iliacæ diuidantur, p* Sacra^a prodeunt, quæ infi- ^{p, d.}
 gnes sunt, deorsumque sacro ossi innitentes delatæ, ipsius foramina ingrediuntur, &
 ad medullam ipsius, ac posteriora sacri ossis excurrunt. Et per has quoque via est ma-
 teriæ dolorem Colicum facientis, vt Paraly sin crurum efficiat. *Hinc paulo infra diuisionem*
trunci, Iliacæ in duos subdividuntur ramos, quorum alter interior est, & minor:
alter exterior, & maior. q Minor, vel interior Iliacæ, duas propagines educit, vnam ab ^{q, T.}
 externa; alteram, ab interna sede. ^{r, s.} Exterior Muscula vulgo dicta, à nobis strictiore ap-
 pellatione, Glutæa, quod cum vena eiusdem nominis, inter sacrum & coxendicis os,
 vbi inuicem abscedunt, descendat, pluresque furculos in musculos, ilium ossi incum-
 bentes, Glutæos dictos, quod natium sint authores, porrigat. ^f Interior, Hypogastrica ^{s, g.}
 dicitur, quæ insignis admodum est & ampla, rectaque deorsum ad ossis sacri infe-
 riorem sedem delata, in viris Vescicæ fundo, & Cervici, tum etiam recto intestino so-
 boles quasdam largitur, quæ etiam hæmorrhoidales arteriæ dici possunt. In Mulie-
 ribus vero, quibus paulo amplior hic ramus est, præter dictas partes, etiam in inferio-
 rem vteri fundi regionem, & pariter in illius ceruicem numerosam propaginem
 distribuit. *Hinc rationem licet petere*, ob quam si Vteri ad medium coxendicis processerint,
 convulsiones fiant, vt testatur Hippocrates, lib. de natura muliebri. Item, si
 Vterus ad coxam decubuerit, cur menses supprimantur, & dolor fiat in imo ven-
 tre, & in laterum mollitudine. Sanguis enim, qui ad Vterum à Natura pellitur,
 arteriis compressis à decubitu, in vterum deponi non potest, vnde necessario re-
 gurgitans, vicinas Venas & Arterias replet, quæ intumescences dolores hos effi-
 ciunt. Vidimus enim sæpenumero in dissectionibus sic turgidas fuisse has venas,
 vt septuplo sese ampliores fuerint. *Hinc etiam ratio reddi potest aphorismi illius,*
qui est trigessimus secundus quintæ sectionis, apud eundem Hippocratem, vbi Mu-
lieri sanguinem vomenti erumpentibus mensibus solutionem fieri testatur. Quod
sane, cum omnium consensu fiat per revulsionem, & vero Venarum beneficio
contingere nequeat, quod Venæ Ventriculi à Portæ vena, at Vteri, à Cava orian-
tur, non alius consensus quærendus est, quam ille, qui fit per Arterias, maxi-
me cum nec arteria hypogastrica procul à Cæliaca distet. Ex his similiter ratio red-
detur sequentis hunc aphorismi, vbi mensibus deficientibus hæmorrhagiam narium
salutarem censet. Reliqua pars Iliacæ minoris descendit, & arteriam Umbilicalem edu- ^{r, n. n.}
cit, quæ iuxta longitudinem arteriæ magnæ defertur, validisque membranis Vesi-
cæ vrinariæ lateribus connectitur. Cavitatem autem amittit in iis, qui in has iucun-
das vitæ auras prodire, quod quomodo fiat, postmodum libro nono pluribus osten-
furi sumus.

Arteria
 Umbili-
 calis.

u. l. ^u Cæterum hinc non fecus ac vena Iliaca, quæ ipsi iungitur, per foramen ossis pubi tendit, quod antequam transit, sobolem ab exteriore Iliaco ramo enatam accipit, sicque foramen exit, à quo ubi discessit, in musculos, partim quibus foramen obratur, partim qui ab ossè pubis nascuntur, perinde atque interna Iliaca Vena absuntur. Tandem ubi ad medium fere longitudinis femoris terminatur, ipsius extremum cum x ramis extremis Musculæ cruralis internæ, de qua sequenti capite, y coit, & vnitur.

z. V. ^z Maior, siue exterior similiter duas producit soboles, quarum ^a prima est Epigastrica Exterior, siue maior Iliaca. dicta, & paulo antequam peritonæum perforat, ab externa parte oritur, sursum reflectitur, ac per internum latus musculi recti ascendit, donec circa umbilicum cum inammaria arteria descendente per anastomofin coniungatur. b Altera, Pudenda, quæ Epigastrica interior. Statim autem, ut à peritonæo abiit, enascitur, & transuersum secundum commissuram ossium pubis delata, ad pudendas partes, in penis cutim exhauritur. Quod reliquum est huius Pudenda. Trunci c in crus abit, de quo nunc agemus.

CAP V T V.

Iliaci rami exterioris per crus propagati soboles.

d. 6.2.V. ^POST QVAM enarratos ramos d exterior truncus eduxit, è peritonæo discedit, & ad inguina in crus fertur, per eandem, quam Vena cruralis viam, cui substratus est, & ubique socius iungitur, sicque arteriæ e Cruralis Truncum (quem ita vocabimus semper) constituit. Statim autem ac peritonæum superavit, ab exteriori parte propaginem educit, quam f Musculam cruralem anteriorem vocant, quæ deorsum lata, in musculos femoris os, anteriore sede amplexantes, propagatur. Huic è regione interdum, sæpius paulo infra, sed sede interna tamen, alia educitur, g muscula cruralis interna vocata, quæ per tertium femur flectentium, siue Tricipitem, & per eos, qui interior rem femoris regionem tenent, vsque ad genu pluribus ramis distribuitur, quorum extrema cum extremis Iliacæ interioris, quam per foramen ossium pubis ad crus descendere diximus, junguntur. His propaginibus eductis, Cruralis truncus ab inguine, cum Vena crurali descendit, & iuxta femoris os ita reflectitur, ut ubi ad poplitem pervenit, inter duo femoris posteriora capita consistat. Semper enim hoc solers Natura obseruat, ut vasa circa eam articuli partem deducat, ubi flexura est, ne si ea parte irent, qua extenditur articulus, ipsa comprimerentur. In ipso autem medio quasi itinere, dum per femur descendit, h propaginem educit, quæ in plures surculos dirempta, per musculos in posteriore femoris regione sitos, vna cum Vena poplitea excurrit, tandemque per poplitem descendens (vnde Poplitea dicitur) frequenti sobole in suram digeritur. In poplite autem iam consistens, vtrunque i propaginem ad latera articuli genu educit, altius subinde demersam, quæ partim in articulo ipso, partim in duos musculos Gasterocnemios suram constituen-

res exhauriuntur, vnde & *Surales arteria* dicuntur. Postquam ^l in poplite Cruralis ^{l, r.} truncus consistit, ^m ab externo latere sobolem profert, quæ iuxta fibulam descendit, & ^{m, 6.} inter abducentem pedem, & secundum tarsum flectentium musculos reconditur, & in reliquos anteriorem tibiæ partem occupantes quousq; carnei sunt, & secundum anteriorem malleolum contorqueri incipiunt, distribuitur. Paulo sub hoc dicto ⁿ *alia* ^{n, T.} educitur, ex posteriore trunci sede, quæ vsque ad commixtionem tendinum Gastrocnemiorum descendit. ^o *Alia* deinde ex eadem posteriore trunci sede, sed sub secunda prodit, quæ descendens, & ligamentum transversum transiens, per pedis dorsum excurrit, in digitos abducentes musculos diffusa. ^p *Reliquum trunci* per tibiæ posteriora ^{p, r,} deorsum fertur, & circa malleolum internum pedi ^q surculum offert, qui pollicis musculum adit, & pedis dorsum perrepat. *Ipsæ autem truncus* inter tendines musculorum digitorum pedis latens, in duos ramos ^r dissecatur, quorum ^r interior pollicis duos, duos ^{r, x.} indici, vnum medio: ^s exterior vero duos minimo, duos huic proximis digitis, inferiore ^{s, y.} fedelargitur. *Caterum*, etsi arteriarum progressus magna ex parte talis sit, qualem descripsimus, quod tamen supra de Venis diximus, non solum pro indiuiduorum diversitate, sed etiam laterum in eodem homine, ipsorum distributionem plurimum variare, id etiam de arteriis tenendum est, quæ aliis hominibus alio modo se habent.

CAPVT VI.

Vena arterialis, & Arteria venalis historiam complectitur.

VT perfecta omnibusque suis numeris absoluta sit hæc de Venis & Arteriis tractatio, colophonis loco historiam tertiæ Venæ & secundæ arteriæ nobis apponere libuit. Vocatur ^a *Vena, arterialis*, & Vena quidem ab officio, quod Veteres sanguinem ^{a, Vid. p.} deferre ex dextro cordis ventriculo credidissent: at arterialis à tunica, arteriarum membrana simili, cum simplex non sit, vt Venarum, sed gemina. *Arteria* contra, *venalis* dicitur, & arteria quidem, quod aerem deuehere, attractum per pulmones Antiqui statuerint: Venalis autem, quod substantia corpori venarum respondeat, cum simplex sit tunica, nec admodum crassa. Reiecit autem vtriusq; tractationem in hunc præcipue locum, vt de vtraque simul ageremus, cum & ex eodem viscere nascantur, & in idem inferantur, prætereaque eadem distributione gaudeant. *Enascuntur* enim ex *Corde*, & Vena quidem ex editiore sede dextri ventriculi: Arteria autem ex sinistri. *Implantatur* autem & exhauritur vtraque in Pulmonum substantiam, & Vena quidem per dextrum asperæ arteriæ latus porrigitur, Arteria autem per sinistram. Mox in duos vtraque *secatur* ramos, quorum alter ad dextram, alter ad sinistram pulmonum partem abit, vtroque iterum bifariam secto, atque his in ramos alios, donec in minutissimos surculos dispergantur. Rami autem maiores sese inuicem comitantur, vt vena cum arteria perpetuo incedat, multis anastomosis iunctæ, in quarum medio asperæ arteriæ rami excurrunt. Insignia autem vasa sunt, maioraque longe, quam pulmonum magnitudo requirere videtur, cum partes illæ, vt diximus libro superiore, quæ plurimum dissipant alimentum, venas ampliores requirant, nulla autem sit, quæ pulmonibus ob perpetuum

petuum & indefinentem motum plus digerat. Harum *vsu* omnes fere, qui hactenus *vsu.* in Anatomicis aliquid scripserunt, vnanimi consensu prodiderunt esse, vt Vena quidem pulmonibus alimentum afferat, Arteria autem à pulmonibus haustum aerem ad Cor deducat. Quæ opinio absurdissimo fundamento nititur, sanguinem scilicet nulla ratione in hac arteria contineri, in quo confutando prolixiores essemus, nisi anatomicam inspectionem, & experientiam satis superque falsitatem demonstrare sciremus. Quare ab iis potius standum existimo, qui à dextro cordis ventriculo ad pulmones per Venam arterialem sanguinem transmitti credunt, & hinc in Arteriam venalem per anastomoses deduci, à qua postea ad Cor transportatur, vbi magis elaboratur sanguis ille dextri ventriculi, & fit spirituosus, sicque per Arteriam magnam in vniuersum corpus, pro vita singularum partium, pellitur. Nec verum est aerem in Arteriam venalem rapi, cum foramina ibi nulla sint, sed aer qui per Laryngem in asperam pulmonum arteriam raptus est, bronchia omnia refrigerat, quod frigus cum adiacentibus vasis communicetur (diximus enim vbique bronchia ferri in medio Venæ arteriosæ & Arteriæ venosæ) refrigerat simul sanguinem in ipsis contentum, qui Cor ingrediens calorem illum nimium attemperat, vt propterea opus non sit aerem in substantia ad Cor transferri.

FINIS LIBRI SEXTI.



ADRIANI SPIGELII

BRUXELLENSIS,

DE HUMANI CORPORA- RIS FABRICA,

Liber Septimus.

Qui vniuersam neruorum historiam complectitur.

CAPVT PRIMVM.

Neruorum naturam, actionem, & differentias explicat.

*Utilitas
huius do-
ctrinae.*



X vasis superest vt de NERVIS agamus, quos etsi in postre-
mum locum reiecimus, ob causas, quæ superius à nobis sunt
expositæ, primo tamen loco haberi ab ijs debent, qui vel ex
Philosophiæ studio delectationem, vel ex Medicinæ vsu fru-
ctum aliquem eximium & præclarum cupiunt percipere. Quis
enim est qui nesciat, animalium totam naturam in sensu motu-
que consistere, quarum facultatum vectores sunt Nerui? sed
multo minus quisquam ita ignarus est, quin sæpè sæpiusq; co-
gnouerit, maximam morborum partem, qui nostrum corpus infestant, has ipsas vires
lædere, quibus affectis, Homo omnium animalium præstantissimum, à trunco inutiles &
à stipite, non nisi sola, & quam misere etiam trahit, vita differre potest. Quare non so-
lum jucundissima est Neruorum cognitio: sed & ex omnibus maximè necessaria, vt ad
vnguem teneatur: at cum in ea haud leues sese difficultates offerant, conabimur quan-
tum in nobis est, summa omnia perspicuitate ac diligentia persequi. Exordiemur au-
tem à definitione, quam postea nobis consueti more breuiter enodabimus, cum pri-
mum vocis homonymiam, ne qua obscuritas nascatur, è medio tulerimus.

Nerui

Nerui ergo vox multiplici vulgo significatione sumitur. Primo *pro ligamentis*, de quibus libro tertio scripsimus, quò pacto accepit Hippocrates, lib. de arte, cum Nerui, inquit, ad ossa protensi, articulorum sunt vincula. Sic & Arist. 3. hist. anim. dum ossa omnia, siue foris vicissim tangantur, siue alterum inferatur alteri, neruis ligari proficitur. hinc natum est, vt apud Anatomicos *συνέυρωσις* ea articulationis ossium species dicatur, quæ ligamentorum inter se connexionem perficitur. Vocantur & nerui *tendines illi, qui in musculorum sine cernuntur*, ex quo factum deinde, vt illa musculi in tendinosam substantiam degeneratio, *συνέυρωσις* dicatur. Sed & *Venas* neruos fuisse nominatas ab Hippocrate author est in onomastico Erotianus, & exemplum eius rei habemus in lib. de vñ humidorum. *Arterias* quoq; eodem nomine antiquissimis venisse, Ruffi Ephesij testimonio constat. Propria tamen significatio illa est, qua nos vtremur, & cui ipsa quoque nominis ratio maxime conuenit, cum *νέυρος*, *ἀπὸ τῷ νέειν*, à nutando, seu flectendo: & *τὸ* (nam & sic vocatur) *ἀπὸ τῷ τέλειν*, à tendendo propria scilicet neruorum actione dicatur. Musculi enim neruorum potissimum beneficio, & flectere quancunque partem, & tendere consueuerunt.

Homonymia.

1.

2.

3.

4.

5.

Est autem NERVVS *Vas candidum, duplici constans membrana, ad omnem intensionem aptissima*, in qua substantia quadam alba, ac medullaris continetur, à Cerebro, vnde oritur, spiritum animalem, pro sensu & motu singularum partium voluntario, deferens. Dum *vas* dico, genus ipsius ex primo, eademq; volo intellecta, quæ in superioribus libris hoc nomine intelligenda diximus: puta, esse longos, teretes, canales, & si quæ sunt alia. Est autem *vas candidum*, qua voce statim à Vena, & Arteria, quæ & ipsæ vasa sunt distinguitur, cum alba quidē sint, præsertim Arteriæ: non tamen ad eum appulerint gradum, vt vasa candida dici mereantur. *Constat* vas hoc *duplici membrana*, vt vulgo tradunt, quarum vtraque à cerebri membranis oritur, cum neruus cerebrum compactum videatur. *Exterior* ergo crassa est, & à crassa meninge nasci dicitur, ad quam ex vicinis venulis furculi quidā impense exiles deriuantur, ijs, quæ per corneam oculorum tunicam disperguntur non dissimiles. Has in ijs neruis, quæ paulo crassiores sunt, euidenter conspicias: at maxime omnium comparebunt, si qua inflammatio circa neruos suborta fuerit, quemadmodum eadem venulæ, quæ corneam peruadūt, cum obtenuitate cerni alias non possint, in ophthalmijs egregiè in conspectum se proferunt. Vanū ergo est, quod Aristoteles obseruauit, 3. hist. anim. 5. humorem circa neruos mucori similem consistere, albidū, glutinosum, ex quo ipsi nerui, & nascantur, & nutriantur, cum alimentum suum ab his venulis habeant. *Interior membrana* tenuior est, & à tenui cerebri membrana profecta. Sed reuera, si accuratè aduertas animum, neruos potius ex infinitis quibusdam funiculis contextos, & operarum membranarum inuicem connexos obseruabis. Id. n. tibi, si per transversum neruum dissectueris, manifestè clarū reddetur. Vt cunq; sit, vtraq; membrana *ad intensionem aptissima* est, vt hoc solo nomine, quæcunq; in corpore tendi apta nata sunt, quemadmodum vniti musculorum tendines, & ligamenta ossium propterea neruorum appellationem sibi ascuerint. Tenduntur enim in longitudinem quam maximè, si trahantur: rursusq; relaxati, in priorem contrahuntur magnitudinē. Quod ipsum Aristoteles laudato loco nobis suggerere voluit, dum nerui naturā fissilem inquit, & in longitudinem tendi: scindi autē per latitudinem non citra difficultatem posse. *Continet autem in se gemina*

Definitio.

Vas genus nerui.

Duplex membrana nerui.

Venula ingreditur, & nutriunt neruorum tunicas.

Nerui ex innum. ris funiculis contexti.

Cerebrū
ut hic su-
mendum.

Facultas
quam ve-
hūt nerui.
Non esse
alios ner-
uos sen-
sorios, a-
lios moto-
rios.

Facultas
animalis,

Spiritus
in substā-
tia neruos
peruadūt.

1.

mina hæc membrana *substantiam albam, ac medullarem*, quam si alicubi, perquam optimè tibi certelicebit cernere, in neruo optico, membranis suis inuoluto, & nonnihil digitis compresso. Substantia hæc nihil aliud est, quam ipsissimum cerebrum, à quo nerui omnes exortum suum trahunt, si quidem cerebri vocabulo quis intelligat, non illud tantum, quod caluaria contineretur, sed etiam per spinam vniuersam producit. Exortus autem hic non tantum ratione ipsius productionis intelligitur; sed etiam facultatis, cum à Cerebro nerui & prodeant, & facultatem nanciscantur. Sunt enim, ut reliqua omnia vasa, canales quidam, in sese deducentes facultatem, ad obeundas actiones illas in singulis partibus, quibus destinatum est id viscus, à quo oriuntur, cum in singulis partibus ipsum esse nequeat. Ut ergo Cor, cum vniuersum corpus ex vno corde extrui neutiquam potuerit, facultatem vitalem per arterias vndique diffundit: ita Cerebrum, quod in solo capite sua substantia consistit, ut viribus sit vbique, neruos in omnes partes digerit. *Facultas hæc, sensus est, & motus*: non ita tamen, ut quæuis pars ad quæ neruus pertingit, sentiat, & moueatur: neque ut alius neruus sit sensus delationi, alius motui destinatus, quemadmodum censuerunt nonnulli: sed ut vnus idemque neruus, pro partis constitutione, vel vtrumque, vel alterutrum impertiat. Clarissimum hoc est in sexta neruorum coniugatione, quæ laryngis musculis vtrumque: Lien, renibusque, alterutrum tantum largitur. Et hunc esse neruorum vsum, ex eo licet satis concludere, quod neruo constricto, aut dissecto, protinus sensus motusque eius partis auferatur, in quem neruus ille inseritur. Hoc in canibus eleganter demonstrare licet: aut, quod melius est, in suis, dum nerui Recurrentes dicti, filo constringuntur. Si enim alterutrum ligaueris, mediam tantum vocem edi: at si vtrumque, protinus totam auferri obseruabis: redire autem iterum vocem confestim, si vinculum dissolueris. *Nerui ergo sentiendi, mouendi, facultatem deferunt*: & horum *quidam solum sensum*, ut qui in cutim inferuntur, & primum par Opticum vocatum: *nonnulli motum simul & sensum*, quemadmodum secundum par, in oculorum musculos digestum. Quin imo nec vnum tantum sensum, vtcunque ipse neruus vnicus sit, sed interdum plures dispensat vni organo, ut dictus Opticus, oculo non videndi tantum, sed & tangendi facultatem offert. Ita sextum par neruorum cerebri, laryngi motum & sensum: cordi sensum solum tactus, Ventrículo autem, præter hunc etiam famis & sitis sensum largitur. Repudianda ergo eorum est sententia, qui octo neruorum paria intra caluariam orta, sensorijs tantum dicata putant; reliqua vero extra nata motui, cum clarissimum cuius sit, secundum neruorum par, oculorum; sextum autem, laryngis musculis, motum tribuere. Cæterum *motus hic voluntarius est*, qui & sisti cum cupimus, & concitari potest: *facultas ipsa à Gale- no animalis dicitur*, quod solis animalibus inest, & per eam animalia à plantis distinguantur. Cum autem nulla facultas si propriè loquamur, ab anima separabilis sit, dicimus tamen ipsam ad hanc, aut ad illam partem deduci, quod anima immediatum illius facultatis organum eo transmittat, spiritum nempe animale in cerebro, ex vitali spiritu elaboratum. Reuera enim ipsius spiritus substantiam à Cerebro per neruos deduci, ex eo videtur perspicuum, quod partes compressæ, & stupentes, ubi motum recipiunt, aliquid formicarum instar repentium persentire videntur. Id enim profecto neutiquam contingeret, nisi pars affluxionem spirituum interceptam antea, redire ad se per-

se perciperet. Probare hoc conatur & alio modo, nec malè profecto Galenus, 7. placit. 4. exemplo oculorum, quorum vno clauso, alterius pupilla subito dilatari ob spirituum affluxum, (non certe alia de causa) conspicitur. *Neque vero est, vt quisquam* *Responde-*
tur ad-
uerjarijs.
 neruorum angustias accuset, quæ spiritum non admittat, cum cuius id notorium sit, spirituum animalium tantam esse subtilitatem, vt fulminis instar omnia peruat : & in viuo sanoque corpore, non omnia ita collapsa esse, dum calore vitali adhuc perfusa sunt, quin pori satis aperti vbique & euidentes, etiam ipsi in ossibus, reperiuntur. Qui enim de poris cuiusque partis, ac densitate, rectè iudicaturus est, eum modo mactatorum animalium carnes, neruos, visceraq; contemplari oportet, quem admodum sæpè nos conspicuos nostris oculis poros in pluribus inuenimus, qui in diu extinctis prorsus latebant. Frustra quoq; nonnulli propterea ambigunt, quod ægrè animo comprehendant, qui temporis momento à centro corporis ad extimas vsq; partes, hic spiritus diffundatur. Sed ego profecto etsi mirer & ipse, & in hac re immensam Conditoris nostri potentiam agnoscam, non possum tamen non propterea facile, qui fiat id, animo concipere, cum idem in sanguine videamus contingere, qui vno ictu oculi, modo à corde ad vultum effunditur, modo à facie ad cor iterum regurgitat. Quis enim non sæpè numero vidit, vultum cuiuspiam commissso aliquo scelere, temporis momento rubedine suffusum; rursus roseum vultum nunciata aliqua desideratissimi amici in sperato obitu in pallorem subito conuersum? Quod si sanguis, qui sua natura terrenus est, spirituum vitalium beneficio, indicibili quadam velocitate agitur, quid non speremus de animalibus spiritibus, quibus nescio an subtilius quid alicubi in tota hac rerum vniuersitate reperiatur? *Quamobrem jam concludamus, vsum neruorum* *Vfus.*
 non esse alium, quam *animalis spiritus à Cerebro transmissi, temporis momento, pro sensu motuq; voluntario partium, deductionem.*

Videamus nunc quæ differentiæ in neruis occurrant: quas vt ordine inuestigemus omnes, ea contēplabimur, quæ singulis instrumentis insunt, deducta à substantia, forma, magnitudine, numero, similibusq;. Prima ergo differentia est, quæ occurrit *ratione* *DIFFE-*
REN-
TIÆ.
A sub-
stantia.
stantia.
 substantiæ, cum ij, qui à cerebro proficiscuntur, dum adhuc in cranio est, molliores sint; qui vero, dum per spinam dorsi fertur prodeunt, duriores. Rursus, ex ijs, qui à cerebro nascuntur in cranio, molliores sunt illi, qui ab anteriore parte, quam qui à posteriore: & ex ijs, qui dum extra caluariam fertur, oriuntur, molliores sunt, qui à superiore, quā inferiore. Duri ergo erunt, qui ex ceruicis medulla emergunt: duriores, qui ex thoracis: omniū durissimi, qui ex medulla in vertebrae lumborum, & ossis sacri contenta, nascuntur. Omnes autem summatim loquendo, quanto breuiores sunt: tanto quoq; sunt molliores: & quanto longiores, tanto duriores, cum in ipso itinere magis magisq; indurescant. Cæterū Galenus 16. vlt. part. 2. existimat, molliores esse factos ad sensum, cū facilius obiectorum species admittat, quod molle est; duos, ad motum, cum sint robustiores. At ego longè aliud Naturæ consilium fuisse statuo, cum mollium neruorum quidam musculos moueant, vt secundum par: & durorum aliqui sensum impertiant, vt è ceruice prodeuntes nonnulli, alijq; sparsi ad cutem rami, adeoq; respexisse eo potius, vt quibus longum iter faciendum est, in ipso itinere saluos integrosq; præstaret. *In figura* hoc discrimen obseruatur, quod etsi omnes nerui teretes sint ac rotundi, circa *A figura.*

A caui- origines tamen nonnulli aliquantulum depressi videantur. In optico quoq; *sensibilem*
tate. *meatum* notauimus, cum Herophilo & Galeno; in reliquis vtcunq; magnis nunquam
A magni id observare licuit. Sed *magnitudo* cōplures suggerit differentias. Respondet enim vbi-
tudine. que (vt iusta solet esse Natura in omnibus) magnitudini earum partium, quibus distri-
 buuntur; inque primis illorum, qui motui inserviunt. Nam qui sensum deferunt, po-
 tius sentiendi magis minusve exquisitam facultatem respiciunt, vnde oculi insignem
 nervum obtinent, Hepar exiguum. Sunt ergo alij *crassissimi*, vt qui in brachia & crura
 distribuuntur; alij *mediocres*, qui ad sensuum organa digeruntur; alij *graciles*, qui in mus-
 culos exiguos propagantur. Notatu autem dignissimum illud est discrimen, quod ab
Ab exor- exortu petitur. Nonnulli enim vno continuoq; principio prodeunt, vt Optici; alij plu-
itur. ribus, & distinctis postea in se coeuntibus, vt tertium, quartum, & quintum par cere-
 bri, dum in cranio adhuc est. Vtcunq; autem prodeant, alij, *secundum Veteres*, à Cerebro
 proprie & stricte sic dicto; alij vero à spinali medulla exordiantur; & hi iterum, vel à
 principio ipsius medullæ, dum scilicet adhuc in cranio est, vel à progressu, dum in spi-
 na fertur. At *nobis* omnes ad vnū ex medulla cerebri oblongata prodire videntur, cum
 (quemadmodum vltimo libro docebimus) spinalem medullam, non vt vulgus, pro-
 cessum cerebelli oblongatum, sed tam cerebri, quam cerebelli productionem cum do-
 ctissimo Varolio credamus. Alii ergo dum hæc medulla calvariæ adhuc inclusa est, ena-
 scuntur, quorum cōmuniter cum Galeno septem paria vel coniugationes censentur,
 (vtrinque enim prodeunt) non incommode tamen octavum par addideris, quod ol-
 factui inservit: alij postquam cranium reliquit, & per dorsi vertebrarū foramina pro-
 cedit, iamque spinalis medulla proprie dicitur. Horum *triginta paria* sunt; *septem* medullæ
 cervicalis, *duodecim* dorsalis, *quinque* lumborum, tandemque *sex* medullæ ossis sacri. Hi
 omnes eadem serie, & modo, in vtroque latere disperguntur, excepto solo sexto pari,
 eius medullæ, quæ in cranio adhuc est, cuius dexter nervus, aliter paulo ac sinister dis-
 tribuitur. Ab illis omnibus sensuum vocisque instrumentis, tum visceribus rami trans-
 mittuntur: ab his, vniuersis musculis, qui sub capite sunt. Cæterum, vt breviter loqua-
 mur, nec obscuritatem tamen inferamus iis, quibus nostra de cerebro sententia non-
 dum cognita est, quam infra demum persequemur; illos nervos, qui ab oblongata ce-
 rebri medulla nascuntur, dum in cranio adhuc est, *Cerebri nervos* perpetuo vocabimus;
Cerebri reliquos vero, qui oriuntur, dum per spinam descendit, *nervos à spinali medulla proprie sic*
nervi qui *dicta* *profluente*, dicemus. Priorum officia non nemo duobus carminibus expressit, quæ
Aicanur. cum digna sint, vt memoriæ mandentur, huc descripsimus:
Nervi spi- *Optica prima; oculos movet altera; tertia gustat,*
nalis me- *Quartaque, quinta audit; vaga sexta est; septima lingua.*
dulla, pro
prie sic
dicta.
Nervorum Sunt igitur nervorum in vniuersum triginta octo paria, quæ diligenter vnicuius addi-
paria 38. scenda, qui feliciter medicinam factururus est, vt sciat, quo loco remedia applicanda
 sint, dum sensum aut motum alicuius partis, vel imminutum, vel pro-
 fus abolitum videt. Sed nos nunc singulorum histo-
 riam aggrediamur à Cerebri nervis
 exordientes.

CAPVT II.

De Nervis Cerebri.

EX octo coniugationibus, quæ à medulla cerebri oblongata, dum cranij limitibus Primum par cerebri.
a, 7. l. n. l. adhuc coercentur, oriri diximus, *primo loco* se offert ea, quæ ^a *Opticos nervos constituit*, fa-
ma apud omnes dissectionum proceres admodum celebratos. Hi enim non tantum,
si crassitiem spectes, maximi sunt: sed etiam omnium corporis nervorum facile mol-
b, 10. 10. E. E. lissimi. ^b *Oriuntur autem* ex medio basis cerebri, parte anteriore, ex opinione Veterum; Exortus ipsius. Progres- sus.
sed revera, si capite inverso dissectionem administres (quæ ratio genuina est) ex prin-
cipio truncorum priorum spinalis medullæ, vt quasi in occipitio eorum sit exortus,
statimq; versus coniugem sensum contendentes, supra ossis sphæroidis sellam vniun-
tur, (non, vt voluerunt quidam, tantum iunguntur) & commune corpus, quadratum,
confusa interiore medulla constituunt. Inde protinus iterum separati, vterq; in sui la-
teris oculum oblique fertur, per ^c foramen, quod ossis cuneiformis primum est, orbi- Insertio.
c, 2. f. 3. M. & 2. 3. K. tam ingredientis, & in ipsum oculi centrum desinentes. In hoc pari commodè lice-
bit demonstrare duas illas membranas, quas dixi in nervis esse, à duabus cerebri men-
ingibus derivatas: tum ipsam etiam substantiam interiorem medullarem, quæ à Ce-
rebri corpore proficiscitur. Ipse tamen nervus in plures ramos, (vt alij) nō discinditur;
sed latefcens, oculi tunicas constituit, & ex crassa quidē membrana, Corneam: ex tenui Membra-
degenerat
in tuni-
cas ocu-
lorum.
Vfus.
Forami-
na nervo-
rum opti-
corum.
Vveam: ex medullari autē substantia, Retinam efformat. Cum primum enim ad oculi
centrum appulit, membranæ hæ expanduntur, & humores sphæra confecta in se con-
cludunt. Nervi hi oculis videndi facultatem subministrant, vnde ipsis obstructis, vel
compressis cæcitas oritur. His Galenus foramina ascripsit, & Herophilus propterea ^d *πο-
ρος ὀπτικός visorios meatus* indigitavit, docentes, sensibilem & conspicuam ipsis inesse ca-
vitatem, quibus tamen omnes fere Anatomici contradicunt. Ego vero in Patavino
Gymnasio, & frequenti multorum confessu superioribus annis ostendi, meatus quos-
dam à principio nervorum, vsq; ad illum locum, vbi coeunt invicem, productos esse,
mox inde versus oculum evanescere. Ac proinde non tantum excusari posse Veteres,
sed etiā vera scripsisse monstravi, præsertim cum nullus eorum fuerit, qui insignes hos
ductus esse prodiderit: sed tantum meatus eiusmodi, qui non prorsus visum effugiant,
si quis & in magno animali, & ad lucem claram, ac statim postquam mactatum fuerit,
id velit expendere. Has enim tres condiciones & ipse Galen. 7. placit. 4. & libr. de
oculis, vt quis conspiciat, requirit. Cæterum antequam hinc discedamus, proble-
mata quædam in medium adducam, vt præter ipsam historiam vsus quoque demon-
strem eorum, quæ à me dicuntur, in primis cum nostra tempestate, ab iis fere tantum
dissectionis studium colatur, qui medicæ arti industriam suam locant. Primum ergo Proble-
mata.
I.
quæ causa fuerit, vt multi ex pluribus (præsertim sibi de industria concitatis) ster-
nutationibus, in cæcitate derepente lapsi sint. Fit hoc, vel quia arteriarum caroti-
dum rami, qui nervis opticis sic vicini sunt, vt tangant, repleantur, & repleti hos com-
primant: vel, quia copiosus, isque pirituosus humor, ex cerebro ad opticos nervos
traductus fuit, qui obstruxit. Illos, quandoque setaceo curatos vidi: hos, quibus ab

Obserua-
tio.

humoribus pituitosis malum hoc enatum fuit, nunquā convaluisse memini, nisi quendam lue venerēa laborantem, qui hydrargyro inunctus, liquefactis omnibus humoribus, sanitati restitutus fuit. Sed boni, piique Medici non est, ea in vsum revocare, quæ periculi plena, plus damni afferant, si noxia sint, quam boni apportent, si proficua. Et satius est profecto cæcitatem non pellerē, quam mortem adducere: quamvis plarumque, quos ratio non iuvat, eos temeritas iuverit, vt eleganter inquit elegantissimus Medicorum Celsus. Interim in oculorum affectibus, qui in medica praxi versantur, ea quæ per palatum pituitam educunt, adhibere discant potius, quam ad nares noxios humores attrahere. Vt taceam præter periculum quod evitant, plus etiam commodi ex masticatoriis nasci, quod tum experientia longa hæctenus docuit, tum Anatomia persuadet, cum nervi optici in suo exortu non longe à palato distent: longius autem à spongioso ossē, & via sit præternaturam ad quam humores ducuntur, vt dabitur dicendi occasio inferius, & iam ante me à doctissimo Vesalio demonstratum fuit. Quæritur deinde, quo pacto extra orbitam oculus, non rupto nervo optico possit excidere, cuius rei quamplurimas habemus historias. Sed non difficile est respondere ex iis quæ ante dicta sunt, nervos scilicet admodum extendi secundum longitudinem posse. Dum ergo humiditatis plurimum hic suscipit in inflammationibus oculorum, facile fit, vt laxetur: ipsi autem musculi plurimum intumescētes, cum amplius in orbita contineri nequeant, extra profiliunt. Plarumque enim ab inflammationibus oritur oculorum procidentia, quales sunt historiæ doctissimi Vegæ, qui mulierem quidē, procurato menstruorum fluxu: at iuvenem inunctionibus digerentibus curavit. Dignissima autem mentione quæstio est, & cui explicandæ occasionem mihi suggerit, quod legi apud nonnullos, cæcos à vulnere transuersim fronti inflicto, nonnullos vero à copioso alvi profluvio derepente exorto, visum & quidem subito recepisse. Causa non fuit alia, quam compressio horum nervorum à conterminis vasīs, venis putā & arteriis sanguine tumidis, enata, quas sine mora vulnus tale evacuavit. Quamobrem & ego nonnunquam, nec sine fructu, in ea cæcitatē specie, quam Barbari *Guttam serenam* appellant, mediam frontis venam pertundo, ex quo sanguinem eo vsque deduco, donec sua sponte fluere cessauerit.

Secundū
par.
Exortus.

Rami.

1.

2.

3.

4.

^b SECUNDVM PAR à lateribus basis anterioris cerebri, prope primæ originem *Veteres* Anatomici enasci dicunt: ^c *at nova dissectio* demonstrat, ad principii spinalis medullæ intimam partem prodire, & in suo exortu sic unitos, vt angulum communem efficiant, quæ causa est, cur ad easdem partes vterque oculus simul commoveatur. Tenius est multo si cum primo conferas, & durius, exitque è cranio per ^d foramen secundum ossis cuneiformis, quod oblongum est, sicque oculi orbitam intrat. Mox in plures furculos dispescitur, qui ad musculos oculi vadunt: & *primus* quidem supra primum par, siue opticum ascendens, in duos, tum palpebræ, tum oculi levatorem digeritur: *alter* valde conspicuus, pluribus furculis in adducentem disseminatur: *tertius* nec ipse obscurus, primo in duas, mox in plures fibras diuisus, in oculi depresso rem: *quartus*, in obliquum inferiorem, siue minorem circumagentem oculum versus angulum exteriorem. Tandem fibras quasdam tenues educit, quæ iunctæ cum primo pari, exterioribus oculi membranīs distribuuntur, adeo vt ad quatuor tantum musculos oculi, hoc

b, 7. I. n. 2.
c, 10. 10.
2. K. K.

d, 2. 5. 2.
N.

li, hoc secundum par propagetur, tum ad eum, qui palpebram attollit. *Vsus* huius par-
ris est, facultatem morricem musculis oculorum impertire.

e TERTIUM PAR ex inferna & posteriore medullæ cerebri sede, exiguo
nervulo oritur, rectaque sub cerebri basi versus anteriora excurrit, secundæ coniuga-
tioni, cum qua dictum *f* secundum ossis cuneiformis foramen oculi orbitam ingredi-
tur, attrēsum. Mox in quatuor ramos digeritur, ex quibus *g* primus, obliquo-
rum oculi superiori, & maiori, siue Trochleæ musculo vocato, ramulum offert, inde per
foramen ossis frontis supra orbitam exsculpro elapsus, in cutem, & *i* musculum fron-
tis, (quem potius supercilij musculum dixeris) desinit. Ramus hic diligenter notan-
dus est, quod obseruarem olim, ipso levi vulnere læso, palpebram prolapsam, dum su-
percilij musculus propterea paralytim incurrerit. Vidi etiam eandem paralytim natam
ex medicamentis frigidis & narcoticis, pro somno conciliando importunius adhi-
bitis. Sed & ex his ratio reddi potest, cur Hippocrates i. prognostic. inter lethalia si-
gna retulerit, in acutis morbis, semiapertis oculis dormire. Malum enim hoc si-
gnum est propterea, quod significet, siccatos esse admodum nervos, adeoque & ce-
rebrum, ex quo fit vt ægri tales, plerumque convulsi postea moriantur. Solet
quoque in nonnullis Epilepsiæ prælium in palpebris, facie tota, ac oculis, eo-
dem nomine oboriri, cum tertium hoc par ab humoribus epilepsiam generan-
tibus vellicetur, sicque convulsio oculorum & faciei nascatur. *1* Secundus ramus,
deorsum fertur, & per *m* quarti maxillæ superioris ossis foramen, quod sub oculi
orbita est, excidit, statimque in faciei anteriore parte in plures dissectus propa-
gines, in musculos superius Labium, & nasi alam abducentes: tum in ipsum labium, ac
gingivas dentium incisoriorum absumitur. *n* Tertius, per *o* foramen secundi ossis maxil-
læ superioris, post carunculam lacrymale in oculi interiore angulo positam, in na-
rium amplitudinem transmittitur, per tunicam eius diffusus, ex quo fit, vt acutissi-
mo sensu sit prædita, leviterque tantum attracta sternutationem efficiat. *p* Quartus,
per *q* eam rimam, quæ inter primum superioris maxillæ os est, & cuneiforme in ex-
terno oculi angulo, siue per quartum foramen ossis sphænoideis egreditur, & ad inte-
riorem temporalis musculi partem secedit. *Vsus* huius est, dictis musculi vim ac facul-
tatem movendi adferre.

r QUARTUM PAR ex medulla cerebri, sede posteriore enascitur, per fora-
men ossis cuneiformis *f* sextum è cranio egreditur, rectaque descendens, tres ra-
mos à se propagat. *r* Primus est statim à transitu, qui vitis aut cucurbitæ capreo-
lorum in morem aliquoties contrortus, & *u* duobus furculis *x* nervi auditorij, (de
quo iam dicturi sumus) vnitus, postea in maxillæ inferioris attollentem tempora-
lem & abducentem, tum buccarum, furculos digerit. Hinc ulterius descendens, *y*
secundum promit, qui in gingivas superiorum dentium molarium, ipsos etiam den-
tes, furculos seriatim propagat. *z* Tertius, à posteriore parte egressus, *a* maxillæ
inferioris foramen ad processum fundamenta, in superficie interna insculptum in-
grediens, radicibus dentium ordinatim ramulos largitur, ac tandem per anterius
b foramen in exteriori superficie positum, egrediens, in inferius labium, eiusque
cutem terminatur, quod reliquum eius est, in linguæ tunicam, iuxta radicem ex-
-

Notæ.

hauritur, & sic aptitudinem saporis dignoscendi offert. *Notetur autem hoc loco*, duo hæc paria quæ nunc recensuimus, tertium inquam, & quartum, ab Anatomicis communiter pro vno recenseri, eoque tertio: sed hac tamen distinctione, vt dicant hoc ipsum duplici radice oriri, altera quidem tenuiore, altera crassiore. Tenuiorem radicem vocant, quam nos tertium par statuimus: Crassiorem, quam nos quartum. Sed nos distinguimus, quod reuera, neque in exortu suo, neque in progressu inuicem coniungantur. Quartum autem par quod ipsi statuunt, à tertio non videtur distinguendum, vt Valuerda ipse, libr. 7. Anatomix, capite 4. concedit.

Quintum par. ^d QUINTVM PAR ex medulla cerebri oblongata, ea sede, qua cerebelli portio *d*, 7.1.nu. annectitur, prodit: enatum ex duobus nervis, quorum alter mollior, alter durior est. *s*.

Exortus. Egre diuntur hi vna membranam, & per foramen ossis temporum, quod in processu eius petroso insculptum est, insigne satis & tortuosum, auditus organa intrant. Inde *durior* illa portio confestim in priora abit, per canalem peculiarem vecta, ac rursus per idem os, oblique ad posteriora recurrit, & in primam auris internæ cauitatem secedit. hinc reflexus magis, duas propagines educit, vnâ supernè, alteram infernè: sed vtrinque per proprium foramen transit. ^e *Superior* per transuersum eiusdem ossis foramen fertur, per quod venula quoque in auditus organum pertransit, & paulo post egressum ^f quarti paris ramo, (prout nos tradidimus; vel vt cõmuniter alij paria numerant, tertij,) quem capreoli vitis ritu in orbem agi diximus, commiscetur. ^g *Inferior* per tertium eiusdem ossis foramen, quod angustum valde est, & tortuosum exit, & transuersim supra musculum maxillæ inferioris lateralem delatus, in fauces descendit, aliquam multis propaginibus in nares disseminatis. Confestim autem ^h quarti paris propagini capreolum imitanti commiscetur, siue surculo illi, qui ad linguam abit, à qua ad dentium radices, & musculos buccarum, vti & ceteram auriculæ radicem ambientem, abit. Per hunc ramum Anatomici credunt fieri, vt qui surdi nascuntur, etiam muti ferè fiant. Ceterum *mollis* illa portio, cum dura portione fertur: at vbi ad primam auris illam cauitatem peruenit, membranæ in modum per ipsam expanditur, sicque merito Nervus auditorius dici meretur, cum spiritus omnes ad auditum ipse suggerat.

Sextum par. ⁱ SEXTVM PAR paulo magis versus inferiorem ac posteriorem partem, quam *i*, 7.1.nu. quintum exoritur: nec vno, sed compluribus à se diremptis neruulis, qui tamen statim simul junguntur, etsi non adeo coalescant, vt vnicum omninò efforment, sed duos distinctos semper, vna tamen membrana, à dura cerebri meninge enata coërcitos, quæ res imposuit multis, vt pro vno habuerint. Sic juncti descendunt simul è cranio per ^l secundum & tertium foramen occipitij, per quod idem minor Carotidis arteriæ, *l*, 2.5.1.L. & maior venæ lugalis ramus caluariam ingrediuntur. Duo ergo cum sint nervi, alter in egressu magis vergit ad partem priorem dicti foraminis, ac *minor* est: alter, ad posteriorem, ac *maior*. Ille, mox ab egressu è cranio recta deorsum ad linguæ fauciumque musculos tendit, & ad partes in ore collocatas, in quas totus absumitur: *hic* contra, ^m *primam propaginem* ad eos, qui posteriorem cervicis partem occupant, præcipuè in primum scapulæ musculum, siue Cucullarem: deinde septimo pari, dictæque Arterix & Venæ, membranarum quarundam beneficio adhærens, ad laryngis latera descendit,

Minor nervus.

Maiores nervus, & eius propagines.

m, 7.1.p.

m. q. scendit, cuius musculis, præcipuè internam cauitatem tenentibus, transuersim ^u furculos largitur. Hic cum plures neruorum propagines inter se concurrant, iterumque disiungantur, *plexus* quidam constituitur, in quo *nodi* glandulis, vasorum diuicationibus attensis, non absimiles, reperiuntur, quod primum obseruauit doctissimus Anatomicorum Falloppius, qui oliuaris corporis imaginem referre voluit. Cæterum ipse neruus maior, inter eadem, (quæ dixi,) vasa medius incedens, sensim à larynge ad asperam arteriam fertur, ad cuius latus descendens, ad Thoracem tendit. Prius tamen quam hunc ingrediatur, supra jugulum in duos ramos dirimitur, ex quibus alter exterior est, & minor: alter interior, & maior. De horum distributione, & propaginibus nunc breuiter agemus, sed ita, vt cum dexter, quam sinister truncus aliter disseminetur, separatim vtriusq; historiam proponamus, & primum quidem dextri, deinde & sinistri.

2.
Plexus
neruorum
sextiparis.
Nodi.
Rami
nerui
maioris.

o. F.
p. r. ° DEXTRI ergo nerui *ramus exterior*, protinus à diuisione ^p propagines emittit, ad flectentem caput, Mastoideum vocatum musculus, tum hyoidis, sternohyoideum inquam, & laryngis, sternothyroideum, inde thoracis cauitatem ingreditur, ac vbi ad arteriam axillarem peruenit, ab interiore sui latere, nunc tres, nunc duos educit q furculos, vnum sub altero, qui circa dictam axillarem arteriam, tanquam axem, aut (vt verius dicam) trochleam quandam reflectuntur, & vna coeunt vnum constituunt ^r neruum, qui dextro asperæ arteriæ lateri, (membranæ beneficio) adnexus, ab infima sede ad summam recurrit, ad dextrum laryngis latus festinat, glandulæ incumbens, quæ dextrilateris radici appositæ est. Hanc vbi superauit, in plures confestim ^f furculos dirimitur, quæ in sui lateris musculos, in larynge sitos, & qui capita deorsum habent, motum ipsi concedentes, absumentur. Atque hic neruus à progressu ^{ss} *Recurrentis* dicitur, estque celeberrimus apud omnes, à sapientissima Natura magna prudentia conditus, vt in musculos laryngis, quorum capita deorsum spectant, inferatur, cum omnes nerui motum largientes, capitibus inferi debeant, & versus finem spectare, non contra. Et quia larynx vocis instrumentum est, vox autem non nisi motis musculis perficiatur, aut aperientibus laryngis cartilagine, aut claudentibus: idcirco constrictis vinculo, ab abscissis his neruis, qui facultatem se mouedi contrahendique musculis impertiunt, idcirco euenit, vt vox animali dematur. Id in canibus, aut porco, quod ille latrando, hic grunniendo indefinenter vocem edat, egregiè demonstrari potest. Altero enim neruo resecto, dimidium vocis adimitur; at vtroque protinus tota aufertur. Constituto recurrente propagine, ramus exterior sub jugulo oblique descendens, postquam in itinere ^t *furculos mediocris amplitudinis* in Pleuram, & Pulmonis tunicam digessit, tum ^u alios Pericardio & Cordi ipsi largitus est, vltius descendit intra mediastini duplicaturâ, & iuxta vertebrae in duos ^x ramos diuiditur, qui *stomachicum neruum dextrum* constituunt, oblique feruntur, & diaphragma inde vna cum œsophago perforantes, cui nullum tamen ramum impertiunt, in sinistram Ventriculi orificium ^y pluribus ramis, reticuli instar, exhauriuntur, id quod ita cum sinistro neruo cingunt, vt totum ex neruis constare videatur. Hinc tantus non modo cum cerebro ventriculi consensus est: sed etiam cum corde, vt ij affectus, qui orificio superiori dolorem inferunt, cordis esse videantur, & reuera quoque sint, patiente eodem corde

o DEX-
TRI ner-
ui ramo-
rum hi-
storia.
Exterioris propa-
gines.
1.
2.

Dexter
recurrrens
neruus.

3.
4.
5.

Vnde con-
sensus Vē-
triculi &
Cordis.

corde dolorem ob dolentem hunc neruum. ^z Atque hæc vera causa est, nerui scilicet ^z, 7. l. G. huius communio, non vicinitas vtriusque visceris, vt alij dicunt. *Interior ramus* ad anteriorem sedem radices primæ costæ thoracis abit, & sub pleura vertebris adhærens, per radices reliquarum costarum descendit, à singulo intercostali neruo è dorsi spina prodeunt ^a ramulum assumens, inde cum Arteriæ magnæ trunco descendente diaphragma permeans, ad os vsque sacrum deferitur, ad cuius regionem ternas profert propagines, quæ in viscera naturalia distribuuntur. ^b *Prima* inferiorem omenti membranam adit, perque eam descendens, in ramulos tres dirimitur, quorum ^c *vnus* dextro eiisdem membranæ lateri distribuitur, coloque intestino, qua parte ipsi committitur, ^d *alter* minimus & exilis admodum, intestinis duodeno, & jeiuno circa principium: ^e *tertius*, ventriculi fundo parte dextra, & superiori omenti membranæ, quæ tam paulo amplior est. Quod ^f restat huius propaginis in jecoris cauam partem, & felliculis vesiculam absumentur. ^g *Secunda*, in dextrum renem abit, & eius membranam. ^h *Tertia*, quæ grandior vtraque jam dicta, ad primam lumborum vertebram descendens, in mesenterij dextram partem, & intestina alligata porrigitur, mesenterij centrum cum Arteria & Vena comite ingressa. ⁱ Reliqua pars in vesicam, & in mulieribus in fundi vteri dextram partem abit. ¹ *SINISTRI* autem *nerui* ^m *ramus exterior*, nisi in descensu tum ad Pleuram & Pulmonis tunicam, (idque extrorsum) tum Pericardio ac Cordi ipsi furculos introrsum obtulit, ad arteriæ magnæ truncum descendentem, ea sede, qua primum è corde prodit, & ad spinam inflectitur, ⁿ tres educit furculos, qui ad dictam arteriam reuoluti, in vnum coeunt neruum, qui *sinister* ^o *Recurrentis neruus* vocatur, & similiter vt dexter sursum progreditur, & in laryngis musculos propagatur. Inde *renem* educit *furculum*, qui per cordis basin, eiusque tunicam, capillorum modo distribuitur. ^p Reliquum postea descendit, ad dextram oblique se inclinans, ad orificium superius Ventriculi abit, in cuius partem dextram, vt dexter antè in sinistram diffunditur, multos in ramulos, retis in modum, distributum. Ab hoc *furculus* secundum elatiorem Ventriculi regionem ad pylorum deferitur, quem vbi nonnullis furculis quasi implicauit, ^q in cauum jecoris proficiscitur. ^q *Interior ramus* primum ab intercostalibus propagines assumit, deinde diaphragma penetrans, in tres propagines diuiditur. ^q *Prima*, quæ transuersim ad ^r Lienem proficiscitur, & in itinere *duos furculos* educit, ^r *vnus* qui similiter in inferiorem omenti membranam, & coli intestini partem, quæ ipsi attenditur, ^u *alius* in Ventriculi fundum sinistram, superioremque omenti membranam mittitur. ^x *Secunda*, in mesenterij sinistram partem, eiusque loci intestina ab it. Nonnunquam etiam furculos promittit, qui cum vasis seminarijs ad testes per processus peritonæi excurrunt. ^y *Tertia* sinistram renem, eiusque pinguem membranam: quod ^z reliquum est, ad sinistram vesicæ, & vteri fundi partem accedit. *Vsus* huius paris satis manifestus est, vt nobilissimus, cum *exterior ramus* visceribus mediis: at *interior* omnibus infimi ventris ramulos largiatur, & dexter quidem, dextri: sinister autem, sinistri lateris. Præter hunc usum, Recurrentibus quoque ramis ad vocem formandam confert, facultatem motricem Laryngis musculis impertiendo.

^a *SEPTIMUM PAR* in postrema occipitij sede, vbi medulla cerebri jam-jam cranio egressura est, exoritur, adeoque omnium in Caluaria nascentium neruorum durissi-

durissimum habetur. Oritur autem aliquot radicibus inter se disjunctis, quibus *Exortus.* vtrique in vnum coeuntibus, per ^b quartum & quintum occipitij foramen, quæ inter maximum illud, vnde spinali medullæ descendenti via patet, & illud, ex quo sextum par exit sita sunt, cranium egreditur, statimque post egressum cum sexto pari membrana communi inuoluitur, vnde quidam non diligenter aduertentes commiseri crediderunt, sicq; vna descendunt. Vbi ad linguæ radicem peruenit, in omnes eius musculos ^c surculos digerit, nonnullos etiam ad quosdam ossis hyoidis, & laryngis transmittens, quemadmodum & eos, qui à styloide appendice initium petunt. *Vsus* huius coniugationis est, facultatem sentiendi mouendique à cerebro linguę *vsus.* musculis deferre.

^d Septem his paribus, quæ vulgo sic recēsentur, ^d OCTAVVM addimus, quod nervos *Octauum* olfactorios constituit, per quos à cerebro ad externos rerū odores apprehendēdos facultas deferretur. Hos vulgo ex cerebri substantia medullari in basi ipsius juxta primum par pronasci, asserunt: at sectio cerebri noua, quæq; inuerso administratur ordine docuit, ad cerebri extrema latera oriri, ea sede, quæ supra auditus foramina est, vnde patet, hæcenus dimidia tantum sui parte demonstrata fuisse. Sunt autem in exortu suo admodum acuti, & à se distantes: cæterum, sensim versus priora proficiscentes, inter supremam & mediam cerebri prominentiam crassiores euadunt, & ad se inclinant propius, sicq; tandem supra ossis spongiosi sinus intra cranium recumbunt. Intruduntur hi in cerebri processus mammillares: at Galenus, & Marinus, (quos fere tota Anatomicorum cohors sequuta est) Nervorum nomine vocare noluerunt, etsi colore, ductu, & vsu ipsis omnino respondeant, quod nec productiones reliquorum nervorum instar habeant, nec cranij cavitatem egrediantur: sed mihi non aliud profecto committere sophisma videntur, quam ij, qui dentes à numero ossium expulerunt, quod membrana exterius non inuestiantur, vt alia, etsi hoc neq; ad ossium, neque illud ad nervorum essentiam quidquam faciat. *Cur inter nervorū paria non recensentur.*

CAPVT III.

De nervis spinalis medulle proprie sic dicta, & primo quidem vertebrarum Cervicis.

NATURA solers rerum parens, quemadmodum Nervos condidit, vt essent vehiculum facultatis spirituumq; in Cerebro genitorum, quod Cerebrum ipsum per totum corpus diffundi haudquaquam poterat: sic cum idē minime posset Nervos vniuersis partibus opportunè largiri ob nimiam distantiam, *Spinalē medullam* effinxit, quę *Spinalis medulla.* nihil aliud est, quam cerebri cerebelliq; medulla per longum dorsū vertebrarū ductum extensa. Proinde visis jam ijs nervis, qui à Cerebri medulla, dum adhuc in cranio coercetur, originem suam ducunt: reliquum nunc est, vt & eos inspiciamus, qui proficiscuntur ab eadem medulla spinæ vertebris inclusa. Dicitur autem medulla, non quod affinitatem aliquam cum medulla ossium, ratione suæ substantiæ obtineat: sed quia medullæ instar, vertebrarum ossibus inclusa est: at substantiam continet cerebro similem, quod & ipsum Plato medullam vocabat, & hoc nomine *spinalis* vel *dorsalis* dicitur, ad differentiationem *Cur medulla dicta dicatur.*

Membranis duabus involuitur. Vfus.

Coniugationes, siue paria spinalis medullæ. Vnde procedant nervi ex spinali.

Nota.

Primum par cervicis. Prius principium. Posterius principium.

Secundum par. Prius principium. Posterius principium.

rentiam vtriusque, in spina non coercitæ, sed vel in calvaria, vt Cerebrum, vel in ossium cavitate, vt quæ proprie medulla indigitatur. Substantia hæc duabustegitur membranæ, non secus ac Cerebrum ipsum, vnde originem deducit, altera crassæ, altera tenuiore, quas involucrum quoddam tertium, validum, & membraneum investit, quod Galenus vertebrarum ligamentum putavit. Facta autem in eum finem est, vt motum & sensum, musculis & membranæ, ad quas Cerebri illa paria non pertingunt, distribuatur. Proinde cum nervorum ab ea nascentium, bene magna sit multitudo, eam tamē ad certas quasdam classes facile reduxerimus, si dicamus, omnes triginta constituisse paria, ex quibus septem ad medullam pertinent, dum per cervicis vertebrae vehitur: duodecim, dum per thoracis: quinque, per lumborum, & tandem sex ad eam, quæ sacri ossis foraminibus continetur. Egreduuntur autem nervi hi, per foramina vertebrarum, & vel gemino exortu, priore ac posteriore parte, quemadmodum accidit in primis duabus colli, & quinque sacri ossis coniugiis, quæ non à lateribus, hoc est, dextra vel sinistra parte oriuntur, sed antè & postèrè binos ramos educunt: vel simplici, per unum in utroque vertebrarum latere exsculptum, vt in reliquis ad unum omnibus evenire solet, in quibus unus nervus à dextro, alter à sinistro latere procedit. Primum autem & secundum par à gemino initio incipit, ne si simplici inchoaret, à vertebrarum commissura læderetur, quod crassius foret: aut si foramen maius fieret, vertebrarum os, (quod per se satis tenue fuit) ruptioni obnoxium redderetur. Vtrumque ergo malum vt evitari posset, duplex initium sapiens Opifex exstruxit: unum quidem ab anteriore, alterum vero à posteriore parte. Ceterum ubique dextri rami ad dextrum latus, sinistri ad laevum abeunt, & eodem vtroque modo distribuuntur.

^a PRIMVM ergo par, ^{aa} primo & priore principio, ab anteriore spinalis medullæ parte exoritur, & inter occipitis os, ac primam cervicis vertebrae egreditur, iuxta latera illius ligamenti teretis, quo supra dentiformem secundæ vertebrae processum occipitis ossis anteriori lateri alligari diximus, atque sic in mufculos collo insidentes, & œsophago substratos, cervicis, inquam, flexores, distribuitur. ^b Altero, & posteriore, similiter per foramen, quod occipitis ossi, ac primæ cervicis vertebrae commune est, iuxta posteriorem partem excidit, sed gemino furculo, quorum alter gracilis, in rectos minores & superiores obliquos capitis extensores absumitur, alter in principium musculi scapulam attollentis exporrigitur.

^c SECUNDVM par ^{cc} priore principio (quod gracilius est posteriore, quamquam utrumque sat gracile videatur) ab anteriore medullæ parte enato, inter primam & secundam vertebrae ad latus processus dentiformis exit, quod in mufculos collo incumbentes, quemadmodum & primi paris ramus prior, qui inter se complicatur, distribuitur, totumque fere in faciei cutim exhauritur. ^d Posteriore per latera posterioris secundæ vertebrae processus elabitur, sed mox in duos ramos inæqualis amplitudinis finditur, quorum ille, qui ^e crassior est, à priore parte ad posteriorem contendit, qua inter se mufculi, utrinque cervicis partem posteriorem occupantes congregiuntur, ibique ^f commixtus cum tertiæ paris nervorum furculo tertio, per medium dictorum musculorum excurrit, ex posterioribus ad anteriora revertens, sicque in æniuersam capitis cutem ad utrumque summum verticis, quemadmodum & ad aures distribuitur. Al-

ter, qui

^a, 7. 2. n. 1.
^{aa}, B.

^b, 7. 3. C.

^c, 7. 2. n. 2.
^{cc}, D.

^d, 7. 3. 1. E.

^e, F.

^f, G.
^{ff}, M.
^g, H.

ter, qui tenuior est, in rectos maiores & obliquos inferiores capitis extendentes musculos inseritur. De hisce ramis Galenus mentionem facit lib. 4. de locis affect. quem locum non pigebit huc transcribere, cum ad huius doctrinæ vsus illustrationem plurimum faciat. Caput, inquit, cuiusdam non ita pridem, impositis medicamentis vehementer calefacientibus vlceraverunt, putantes sensum ipsius graviter læsum hoc pacto posse revocari. Nos vero hunc ipsum sanauimus, inuenta sede affecta, tum ex reliquis accidentibus, tum ex procatarteticis causis. De singulis enim diligenter interrogauimus, atque vnam ex ipsis hanc esse inuenimus, cum sub multa pluuia à vento impetuoso ambulasset, pallium circa ceruicem madefactum, adeo vt vehementi se frigore in ea parte affectum sentiret. Itaque si sciueris, ex primis spinæ vertebri quatuor nervos ad caput ascendere, à quibus cutis ipsum ambiens sensum accipit, facile sedem affectam inuenies. Hac igitur sanata, capitis quoque cutis sanata est, vt pote quæ nulla primaria affectione laborabat.

h TERTIV M par, ex communi & laterali foramine, quod inter secundam & tertiam vertebram est, emanat, statimq; ab egressu in duos ramos scinditur, ex quibus *h h* anterior in quatuor propaggines subdividitur. *i* Prima primum cervicem flectentium, siue longum accedit: *l* secunda descendit, & cum *m* surculo quarti paris vnita in musculos œsophago subiacentes finitur: *n* tertia ascendit, cumque *o* secundi paris modo dicti ramo crassiore coiens, in cutim capitis posteriorem exhauritur. *p* Quarta impertitur musculis transversalibus, siue primo pari cervicem extendentium, tum in scapulæ levatorem, quorum ille in transversis processibus cervicis finem, hic initium habet, tandemque in quadratum buccas detrahentem, quem πλάτυσμα μυνόςδε, à Galeno vocari diximus, digeritur. *y* Posterior in secundum par thoracem extendentium implantatur.

q q QVARTVM par, ex communi foramine tertiæ quartæque vertebræ prodit, ac perinde vt tertium in duos ramos inæquales diducitur. *r* Anterior & maior, in tres alios surculos finditur: quorum *s* primus *t* cum alio tertijs paris ramo iungitur, & ad primum par & longum cervicem flectentium proficiscitur: *u* alter in transversalem cervicis, seu primum extendentium, & primum scapulæ musculum, Cucullarem dictum: *x* tertius, cæteris gracilior, cum quinti paris surculo, & quinti cum sexti ramo iunctus, iuxta mediastinum, seu thoracem intersepientem membranam, & supra pericardium deorsum procedit, vt ex tribus hisce principiis nervus diaphragmatis extruatur. *y* Posterior versus spinam commigrat, sub musculis eo loci collocatis, quibus etiã aliquamultos ramos largitur, inde inter musculos vtriუსq; lateris cervicis deorsum latus, ad quadratum buccas detrahentem musculum fertur. Hoc loco opera pretium est querere, quæ ratio sit, quod qui resolutione totius corporis tentantur, nihilominus Diaphragmatis motum liberum aliquamdiu habeant. Respondent nonnulli, id fieri, quod etsi à cerebro nihil spirituum transmittatur, attamen ex spinali medulla diffundi queat. Sed illi id quod in principio est petunt, cum nos ponamus nihil hinc spirituũ venire, quod videamus omnes totius corporis musculos ad quos à spinali medulla nervi mittuntur, resolutos esse. quare aliam responsionem querendam duxi, dicendumque, Diaphragmati duo motus competere, vnum qui est volutarius, quo utimur dum valide respiramus; alteri naturalem, ubi fibræ per se extenduntur, & contrahuntur. Hoc ergo naturali mo-

tu Homo seruat, cum videamus respirationem illam parvam esse, & debilem, ac quanta sufficit, vt pulmones moveri aliquantulum possint.

- Quintū par.** *Ramus anterior. Propagines.* **QVINTVM** par, inter quartam & quintam vertebram exit, & perinde vt duo proxime precedentia, in duos ramos finditur. ^a *Anterior* aliquot furculos educit. ^{y y, 7.2. nu. 5.} ^{z, V. a, inter V. & 6. b, X. c, Y.} ^{d, b. e, c. f, d. g, 7.3.1.e.} ^{g g, 7.2. nu. 6. h, f. i, g. l, S. & X. m, i. n, 7.3.1.1.} ^{o, 7.2. n. 7. p, m. q, 7.3.1.1.}
- ^{1.} ^{2.} ^{3.} ^{4.} ^{5.} ^{6.} ^{7.} ^{8.} ^{9.} ^{10.} ^{11.} ^{12.} ^{13.} ^{14.} ^{15.} ^{16.} ^{17.} ^{18.} ^{19.} ^{20.} ^{21.} ^{22.} ^{23.} ^{24.} ^{25.} ^{26.} ^{27.} ^{28.} ^{29.} ^{30.} ^{31.} ^{32.} ^{33.} ^{34.} ^{35.} ^{36.} ^{37.} ^{38.} ^{39.} ^{40.} ^{41.} ^{42.} ^{43.} ^{44.} ^{45.} ^{46.} ^{47.} ^{48.} ^{49.} ^{50.} ^{51.} ^{52.} ^{53.} ^{54.} ^{55.} ^{56.} ^{57.} ^{58.} ^{59.} ^{60.} ^{61.} ^{62.} ^{63.} ^{64.} ^{65.} ^{66.} ^{67.} ^{68.} ^{69.} ^{70.} ^{71.} ^{72.} ^{73.} ^{74.} ^{75.} ^{76.} ^{77.} ^{78.} ^{79.} ^{80.} ^{81.} ^{82.} ^{83.} ^{84.} ^{85.} ^{86.} ^{87.} ^{88.} ^{89.} ^{90.} ^{91.} ^{92.} ^{93.} ^{94.} ^{95.} ^{96.} ^{97.} ^{98.} ^{99.} ^{100.} ^{101.} ^{102.} ^{103.} ^{104.} ^{105.} ^{106.} ^{107.} ^{108.} ^{109.} ^{110.} ^{111.} ^{112.} ^{113.} ^{114.} ^{115.} ^{116.} ^{117.} ^{118.} ^{119.} ^{120.} ^{121.} ^{122.} ^{123.} ^{124.} ^{125.} ^{126.} ^{127.} ^{128.} ^{129.} ^{130.} ^{131.} ^{132.} ^{133.} ^{134.} ^{135.} ^{136.} ^{137.} ^{138.} ^{139.} ^{140.} ^{141.} ^{142.} ^{143.} ^{144.} ^{145.} ^{146.} ^{147.} ^{148.} ^{149.} ^{150.} ^{151.} ^{152.} ^{153.} ^{154.} ^{155.} ^{156.} ^{157.} ^{158.} ^{159.} ^{160.} ^{161.} ^{162.} ^{163.} ^{164.} ^{165.} ^{166.} ^{167.} ^{168.} ^{169.} ^{170.} ^{171.} ^{172.} ^{173.} ^{174.} ^{175.} ^{176.} ^{177.} ^{178.} ^{179.} ^{180.} ^{181.} ^{182.} ^{183.} ^{184.} ^{185.} ^{186.} ^{187.} ^{188.} ^{189.} ^{190.} ^{191.} ^{192.} ^{193.} ^{194.} ^{195.} ^{196.} ^{197.} ^{198.} ^{199.} ^{200.} ^{201.} ^{202.} ^{203.} ^{204.} ^{205.} ^{206.} ^{207.} ^{208.} ^{209.} ^{210.} ^{211.} ^{212.} ^{213.} ^{214.} ^{215.} ^{216.} ^{217.} ^{218.} ^{219.} ^{220.} ^{221.} ^{222.} ^{223.} ^{224.} ^{225.} ^{226.} ^{227.} ^{228.} ^{229.} ^{230.} ^{231.} ^{232.} ^{233.} ^{234.} ^{235.} ^{236.} ^{237.} ^{238.} ^{239.} ^{240.} ^{241.} ^{242.} ^{243.} ^{244.} ^{245.} ^{246.} ^{247.} ^{248.} ^{249.} ^{250.} ^{251.} ^{252.} ^{253.} ^{254.} ^{255.} ^{256.} ^{257.} ^{258.} ^{259.} ^{260.} ^{261.} ^{262.} ^{263.} ^{264.} ^{265.} ^{266.} ^{267.} ^{268.} ^{269.} ^{270.} ^{271.} ^{272.} ^{273.} ^{274.} ^{275.} ^{276.} ^{277.} ^{278.} ^{279.} ^{280.} ^{281.} ^{282.} ^{283.} ^{284.} ^{285.} ^{286.} ^{287.} ^{288.} ^{289.} ^{290.} ^{291.} ^{292.} ^{293.} ^{294.} ^{295.} ^{296.} ^{297.} ^{298.} ^{299.} ^{300.} ^{301.} ^{302.} ^{303.} ^{304.} ^{305.} ^{306.} ^{307.} ^{308.} ^{309.} ^{310.} ^{311.} ^{312.} ^{313.} ^{314.} ^{315.} ^{316.} ^{317.} ^{318.} ^{319.} ^{320.} ^{321.} ^{322.} ^{323.} ^{324.} ^{325.} ^{326.} ^{327.} ^{328.} ^{329.} ^{330.} ^{331.} ^{332.} ^{333.} ^{334.} ^{335.} ^{336.} ^{337.} ^{338.} ^{339.} ^{340.} ^{341.} ^{342.} ^{343.} ^{344.} ^{345.} ^{346.} ^{347.} ^{348.} ^{349.} ^{350.} ^{351.} ^{352.} ^{353.} ^{354.} ^{355.} ^{356.} ^{357.} ^{358.} ^{359.} ^{360.} ^{361.} ^{362.} ^{363.} ^{364.} ^{365.} ^{366.} ^{367.} ^{368.} ^{369.} ^{370.} ^{371.} ^{372.} ^{373.} ^{374.} ^{375.} ^{376.} ^{377.} ^{378.} ^{379.} ^{380.} ^{381.} ^{382.} ^{383.} ^{384.} ^{385.} ^{386.} ^{387.} ^{388.} ^{389.} ^{390.} ^{391.} ^{392.} ^{393.} ^{394.} ^{395.} ^{396.} ^{397.} ^{398.} ^{399.} ^{400.} ^{401.} ^{402.} ^{403.} ^{404.} ^{405.} ^{406.} ^{407.} ^{408.} ^{409.} ^{410.} ^{411.} ^{412.} ^{413.} ^{414.} ^{415.} ^{416.} ^{417.} ^{418.} ^{419.} ^{420.} ^{421.} ^{422.} ^{423.} ^{424.} ^{425.} ^{426.} ^{427.} ^{428.} ^{429.} ^{430.} ^{431.} ^{432.} ^{433.} ^{434.} ^{435.} ^{436.} ^{437.} ^{438.} ^{439.} ^{440.} ^{441.} ^{442.} ^{443.} ^{444.} ^{445.} ^{446.} ^{447.} ^{448.} ^{449.} ^{450.} ^{451.} ^{452.} ^{453.} ^{454.} ^{455.} ^{456.} ^{457.} ^{458.} ^{459.} ^{460.} ^{461.} ^{462.} ^{463.} ^{464.} ^{465.} ^{466.} ^{467.} ^{468.} ^{469.} ^{470.} ^{471.} ^{472.} ^{473.} ^{474.} ^{475.} ^{476.} ^{477.} ^{478.} ^{479.} ^{480.} ^{481.} ^{482.} ^{483.} ^{484.} ^{485.} ^{486.} ^{487.} ^{488.} ^{489.} ^{490.} ^{491.} ^{492.} ^{493.} ^{494.} ^{495.} ^{496.} ^{497.} ^{498.} ^{499.} ^{500.} ^{501.} ^{502.} ^{503.} ^{504.} ^{505.} ^{506.} ^{507.} ^{508.} ^{509.} ^{510.} ^{511.} ^{512.} ^{513.} ^{514.} ^{515.} ^{516.} ^{517.} ^{518.} ^{519.} ^{520.} ^{521.} ^{522.} ^{523.} ^{524.} ^{525.} ^{526.} ^{527.} ^{528.} ^{529.} ^{530.} ^{531.} ^{532.} ^{533.} ^{534.} ^{535.} ^{536.} ^{537.} ^{538.} ^{539.} ^{540.} ^{541.} ^{542.} ^{543.} ^{544.} ^{545.} ^{546.} ^{547.} ^{548.} ^{549.} ^{550.} ^{551.} ^{552.} ^{553.} ^{554.} ^{555.} ^{556.} ^{557.} ^{558.} ^{559.} ^{560.} ^{561.} ^{562.} ^{563.} ^{564.} ^{565.} ^{566.} ^{567.} ^{568.} ^{569.} ^{570.} ^{571.} ^{572.} ^{573.} ^{574.} ^{575.} ^{576.} ^{577.} ^{578.} ^{579.} ^{580.} ^{581.} ^{582.} ^{583.} ^{584.} ^{585.} ^{586.} ^{587.} ^{588.} ^{589.} ^{590.} ^{591.} ^{592.} ^{593.} ^{594.} ^{595.} ^{596.} ^{597.} ^{598.} ^{599.} ^{600.} ^{601.} ^{602.} ^{603.} ^{604.} ^{605.} ^{606.} ^{607.} ^{608.} ^{609.} ^{610.} ^{611.} ^{612.} ^{613.} ^{614.} ^{615.} ^{616.} ^{617.} ^{618.} ^{619.} ^{620.} ^{621.} ^{622.} ^{623.} ^{624.} ^{625.} ^{626.} ^{627.} ^{628.} ^{629.} ^{630.} ^{631.} ^{632.} ^{633.} ^{634.} ^{635.} ^{636.} ^{637.} ^{638.} ^{639.} ^{640.} ^{641.} ^{642.} ^{643.} ^{644.} ^{645.} ^{646.} ^{647.} ^{648.} ^{649.} ^{650.} ^{651.} ^{652.} ^{653.} ^{654.} ^{655.} ^{656.} ^{657.} ^{658.} ^{659.} ^{660.} ^{661.} ^{662.} ^{663.} ^{664.} ^{665.} ^{666.} ^{667.} ^{668.} ^{669.} ^{670.} ^{671.} ^{672.} ^{673.} ^{674.} ^{675.} ^{676.} ^{677.} ^{678.} ^{679.} ^{680.} ^{681.} ^{682.} ^{683.} ^{684.} ^{685.} ^{686.} ^{687.} ^{688.} ^{689.} ^{690.} ^{691.} ^{692.} ^{693.} ^{694.} ^{695.} ^{696.} ^{697.} ^{698.} ^{699.} ^{700.} ^{701.} ^{702.} ^{703.} ^{704.} ^{705.} ^{706.} ^{707.} ^{708.} ^{709.} ^{710.} ^{711.} ^{712.} ^{713.} ^{714.} ^{715.} ^{716.} ^{717.} ^{718.} ^{719.} ^{720.} ^{721.} ^{722.} ^{723.} ^{724.} ^{725.} ^{726.} ^{727.} ^{728.} ^{729.} ^{730.} ^{731.} ^{732.} ^{733.} ^{734.} ^{735.} ^{736.} ^{737.} ^{738.} ^{739.} ^{740.} ^{741.} ^{742.} ^{743.} ^{744.} ^{745.} ^{746.} ^{747.} ^{748.} ^{749.} ^{750.} ^{751.} ^{752.} ^{753.} ^{754.} ^{755.} ^{756.} ^{757.} ^{758.} ^{759.} ^{760.} ^{761.} ^{762.} ^{763.} ^{764.} ^{765.} ^{766.} ^{767.} ^{768.} ^{769.} ^{770.} ^{771.} ^{772.} ^{773.} ^{774.} ^{775.} ^{776.} ^{777.} ^{778.} ^{779.} ^{780.} ^{781.} ^{782.} ^{783.} ^{784.} ^{785.} ^{786.} ^{787.} ^{788.} ^{789.} ^{790.} ^{791.} ^{792.} ^{793.} ^{794.} ^{795.} ^{796.} ^{797.} ^{798.} ^{799.} ^{800.} ^{801.} ^{802.} ^{803.} ^{804.} ^{805.} ^{806.} ^{807.} ^{808.} ^{809.} ^{810.} ^{811.} ^{812.} ^{813.} ^{814.} ^{815.} ^{816.} ^{817.} ^{818.} ^{819.} ^{820.} ^{821.} ^{822.} ^{823.} ^{824.} ^{825.} ^{826.} ^{827.} ^{828.} ^{829.} ^{830.} ^{831.} ^{832.} ^{833.} ^{834.} ^{835.} ^{836.} ^{837.} ^{838.} ^{839.} ^{840.} ^{841.} ^{842.} ^{843.} ^{844.} ^{845.} ^{846.} ^{847.} ^{848.} ^{849.} ^{850.} ^{851.} ^{852.} ^{853.} ^{854.} ^{855.} ^{856.} ^{857.} ^{858.} ^{859.} ^{860.} ^{861.} ^{862.} ^{863.} ^{864.} ^{865.} ^{866.} ^{867.} ^{868.} ^{869.} ^{870.} ^{871.} ^{872.} ^{873.} ^{874.} ^{875.} ^{876.} ^{877.} ^{878.} ^{879.} ^{880.} ^{881.} ^{882.} ^{883.} ^{884.} ^{885.} ^{886.} ^{887.} ^{888.} ^{889.} ^{890.} ^{891.} ^{892.} ^{893.} ^{894.} ^{895.} ^{896.} ^{897.} ^{898.} ^{899.} ^{900.} ^{901.} ^{902.} ^{903.} ^{904.} ^{905.} ^{906.} ^{907.} ^{908.} ^{909.} ^{910.} ^{911.} ^{912.} ^{913.} ^{914.} ^{915.} ^{916.} ^{917.} ^{918.} ^{919.} ^{920.} ^{921.} ^{922.} ^{923.} ^{924.} ^{925.} ^{926.} ^{927.} ^{928.} ^{929.} ^{930.} ^{931.} ^{932.} ^{933.} ^{934.} ^{935.} ^{936.} ^{937.} ^{938.} ^{939.} ^{940.} ^{941.} ^{942.} ^{943.} ^{944.} ^{945.} ^{946.} ^{947.} ^{948.} ^{949.} ^{950.} ^{951.} ^{952.} ^{953.} ^{954.} ^{955.} ^{956.} ^{957.} ^{958.} ^{959.} ^{960.} ^{961.} ^{962.} ^{963.} ^{964.} ^{965.} ^{966.} ^{967.} ^{968.} ^{969.} ^{970.} ^{971.} ^{972.} ^{973.} ^{974.} ^{975.} ^{976.} ^{977.} ^{978.} ^{979.} ^{980.} ^{981.} ^{982.} ^{983.} ^{984.} ^{985.} ^{986.} ^{987.} ^{988.} ^{989.} ^{990.} ^{991.} ^{992.} ^{993.} ^{994.} ^{995.} ^{996.} ^{997.} ^{998.} ^{999.} ^{1000.}

C A P V T I V.

De nervis medulla vertebrarum Thoracis.

ASPINALI medulla dum per dorsi vertebrae excurrit, duodecim coniugationes prodeunt, vt recte doctissimus Vesalius censuit, vtcunque in totidem vertebrae vndecim tantum foramina sint exsculpta, quemadmodum obiciebat Columbus, quia inter extremam cervicis vertebram, & primam dorsi, primum par intercedit, quare inter thoracis potius quam colli paria adscribi debet. *Omnia hac coniugia post egressum bifariam diuiduntur, alterque ramus, qui maior est, semper antrorsum; alter, qui minor, ad posteriora reflectitur, & ad musculos dorso incumbentes.*

Omnia Thoracis coniugia bifida. Primum par. Anterior ramus.

¹ **PRIMUM** ergo par nervorum, qui à medulla thoracis prodeunt, ex communi foramine septimæ cervicis vertebræ, primæque thoracis, egreditur, eodem modo atque quinq; proxime dicta paria eademque etiam ratione in duos ramos confestim diuiditur. *Anterior, & maior, partim septimo cervicis, partim secundo thoracis nervo vnitur, eo modo,*

modo, quem antea exposuimus, ^u totusque sic in brachia postea exhauritur, ^x vnica propagine excepta, quæ ad principium ipsius enata; dictis coniungitur, & in priora, iuxta primæ thoracis costæ longitudinem ad sternum excurrit, subclauio musculo surculum elargiens, deinde reflexus sursum, in musculos qui à sterni summo originē ducunt, absumitur. Tales sunt flexor capitis, Mastoideus dictus, detrahens hyoides, siue sternohyoideus, & primus thyroidem laryngis cartilaginem extendentium, siue sternohyoideus. In hos tamē posteriores duos nonnunquā rami à sexta cerebri cōiugatione, & tertia thoracis transmittuntur. Idem etiam ramus, vbi alam excessit, commigraturus ad brachium, aliam quandam sobolem à posteriore sui sede educit, quæ ad musculum scapulæ cavitatem occupantem abit. ^y *Posterior ramus, & minor*, sub mulculis, qui vertebris adnati sunt, latitat, & soboles aliquot in secundum cervicis flexorem musculum, & extendentes Caput ac Cervicem, impertit: at vbi septimæ vertebræ spinam attigit, transversum ad humiliorem sedem abit, & in inferiorem partem primi scapulæ musculi, seu Cucularis, & tertii eiusdem, siue Rhomboidis, tum serratum posticum superiore surculis digerit.

Posterior.

^z *SECUNDVM par*, inter primam & secundam thoracis vertebram erumpit, & perinde in duos ramos finditur. ^a *Anterior* cum primo thoracis pari vnitur, atque sic cum quinto, sexto, septimoque cervicis, primum ac secundum thoracis nervorum paria vniuntur invicem, vt alii ab aliis non dignoscantur, sed rete efficiant, haud dissimile illis galeris, quæ ex Cardinalium pileis dependent, ex quo postea omnes nervi, qui ad brachia vadunt, emergunt, & originem trahunt. hic ^b ramum spargit, qui per primum costarum intervallum secundum primæ costæ ductum, ad vsque pectoris os progreditur, primum intercostalem nervum constituens, à quo ^c surculi in musculos thoraci incumbentes, distribuuntur. ^d *Posterior ramus*, eandem quam præcedentis paribus, disseminationem habet.

Secundū
par.
Ramus
anterior.

^c *RELIQVA* decem paria nervorum thoracis, eandem & exortus, & distributionis rationem observant. Omnia enim è communibus vertebrarum foraminibus ad latera prodeunt, & ab egressu statim in duos inæquales finduntur ramos, quorum alter anterior est & maior, alter posterior & minor. ^f *Anteriores* (qui intercostales nervos constituunt) in priorem partem feruntur, & singuli ramulum secundum longitudinē ordine largiuntur, interiori ramo sexti paris, qui sub pleura ad costarum radices descendit. Rami hi cum Venis, & arteriis intercostalibus iunguntur, cum quibus simul transeunt secundum costæ longitudinē ad partem priorem, per sinum, qui ab inferiore & interna costarum sede inculptus est. Cæterum qui ad venas costas pertinent, ad sternum vsque progrediuntur: at qui ad spiras, in abdominis anteriora supra peritonæum feruntur. Ab his multi rami in musculos intercostales disseminantur, non tantum internos, sed & exteriores, quemadmodum & alios ^g qui thoraci incumbunt, quales sunt quartus & quintus scapulæ musculus, siue duo serrati antici, tum & ^h latissimus humerum abducens. Similiter ⁱ in primum par musculorum abdominis, tum cutem thoracis, ab intercostali quinto circa costæ medium, propago musculum intercostalē perforans abit: & quadripartita in pectoralem humerum adducentē, tum cutim distribuitur, à quibus ^l surculi papillas postea petunt, & acutissimum sensum impertiunt. ^m *Posteriores* retror-

Reliqua
decem
paria.
Anterior-
res rami.Posterior-
res.

sum ad spinam contendunt, inter musculos vertebris adnatos, qui thoracis extensioni præfunt. Nec tamen in hos toti exhauriuntur, sed vbi spinarum apices jam attigere, inter vtriusq; lateris musculos, qua parte sibi mutuo junguntur, excidunt, sicque postea musculis omnibus, qui ab apicibus spinarum vertebrarum exoriuntur, neruos concedunt. Tales musculi sunt primus caput extendentium Triangularis, vel Splenius dictus, tertius scapulam mouens, siue Rhomboides, primus scapulæ Cucullaris, tertius humerum abducens, latissimus, Aniscalptor vocatus, tum ferratus posticus. Aliquam- multi quoque surculi in cutem dorsi distribuuntur.

C A P V T V.

De neruis medullæ vertebrarum Lumborum.

ASPINALI medulla dum per lumbos fertur, tamen si quatuor tantum foramina sint, quinque tamen paria oriuntur, cum inter extremam thoracis vertebrā, & primam lumborum, primum par intercedat. Perinde autem, vt de thoracis neruis diximus, & egrediuntur per communia foramina, & distribuuntur egressa, cum à singulis statim ab exitu vnus ramus, isq; grandior, ad anteriora: alter minor, ad posteriora dispergatur. *Anteriores rami* ad abdominis musculos; *posteriores*, ad eos excurrunt, qui vertebrarū spinis, ossibusq; innominatis incumbunt, vnde ramulos nonnullos & cuti lumbos inuestienti impertiunt. Eodem autē modo anteriores inuicem nectuntur, primus cum secundo, secundus cū tertio, tertius cum quarto, & quartus cum quinto, quemadmodum diximus brachij neruos inter se, dum plexū retiformem constituunt, complicari.

PRIMUM ergo par, quemadmodum & cætera, sub peritonæo egressum vertebrarum commune foramen, quod inter vltimam thoracis, & primā lumborum vertebrā est, protinus ab egressu in duos finditur ramos. *Anterior*, qui maior est, in diaphragmatis carneas portiones, tum principium primi femur flectentium musculi, *Ψάς* dicti, abit. ° Ab hoc surculus quidam principium ducit, cum præparante arteria ad testem plerunq; porrectus. *Posterior*, in musculos lumborum vertebris à posteriore parte incumbentibus, vt sunt primus & tertius thoracem extendentium, quorum ille dorsif longissimus, hic sacrolumbus dicitur cum lumborum extensor: at vbi à spinarum apicibus prodeunt, qua parte musculi dicti sibi junguntur, ad latera excurrunt. & in latissimum humeri abductorem implantantur.

SECUNDUM par, sub primo femur flectentium musculo *Ψάς* egreditur, inter primam & secundam lumborum vertebram. Huius *anterior propago*, ad secundum femur flectentium ilis ossis cavitatem implentem, & primum tibiæ flectentium, fasciæ, tum cutim femoris digeritur. *Posterior*, abdomen egrediens, tribus femur extendentium, siue Glutæis, & tibiæ extensori membranoso distribuitur.

TERTIUM par, similiter sub primo femur flectentium musculo, inter secundam & tertiam vertebram prodit. *Anterior ramus* propè ilium ossa transit, duas propagines digerens, vnā, quæ ad genu, eiusq; cutem proficiscitur: *alteram*, quæ Venam malleoli interni, Saphenam dictam comitatur. *Posterior*, reflectitur, & in musculos lumbis instratos disseminatur.

1, 7. 2. nu. ^t QUARTVM *par*, omnium lumbalium neruorum maximum est, & sub dicto mus- Quartū.
 23. culo femur flectente, tum pubis osse delatum, venam & arteriam cruralem comitatur.
 u, 7. 2. nu. ^u QUINTVM *par*, & vltimum, inter quartam & quintam vertebram emergit, cu- Quintū.
 24. ius *anterior* ramus, foramen, quod inter coxendicis os, pubis, atq; ilij est, transit, & pro-
 pagines, duobus femur circumagentibus, Obturatoribus dictis, alias flectentium fe-
 mur secundo, & tertio offert, alias ad penis musculos digerit: *posterior*, in musculos &
 cutem vertebris instratam abit.

CAPVT VI.

De nervis medullæ ossis Sacri.

1, 7. 2. nu. **A** MEDVLLA tandem, quæ ossis sacri vertebris coercetur, sex vltima neruorum Primum
 25. *spinæ paria* egrediuntur. Ex his, ^x *primum* inter vltimam lumborum vertebram, & Par.
 y, 43. primam ossis sacri emergit, eodem prorsus modo, ac reliqua à lumborum vertebris e-
 ducta, similiter eodem quoque modo in duos ramos distribuitur. *Anterior*, etsi neruis
 2, 7. 3. I. cruralibus admisceatur, y furculum tamen juxta ossis ilium internam regionem trans-
 nu. 44. mittit, & in abdominis musculos, ac secundum femur flectentium dispergitur. ^z *Poste-*
rior, in musculos ab ilium osse pronatos, maximeq; in primum femur extendentium,
 siue Glutæum magnum, tum cutim natium disseminatur.

RELIQVA Quinque *paria*, propriam quandam rationem habent; adeo vt prius- Reliqua
 quam egdiantur ex osse, singula ab utroq; latere gemina sint, sicq; à singulis vtrinq; quinque
 geminus neruus feratur, vnus in anteriorem, alter in posteriorem partem. *Anteriorum* paria.
tres superiores, veluti & primi *paris*, ad crus abeunt: *duo inferiores*, in ani & vesicæ mus-
 culos: & in *feminis* ad vteri ceruicem; in *viris*, ad penem: in *utroque autem sexu*, ad puden-
 da externa. *Posteriores* distribuuntur musculis ossis ilium, & sacri, posteriorem sedem
 occupantibus. Huiusmodi est primus & tertius thoracem extendentium, siue dorsi
 longissimus, & sacrolumbus: flexor lumborum, Sacer dictus, & latissimus humerum
 abducens, tum tres femur extendentes, natium authores, ideoq; Glutæi dicti. Atque
 hic est spinalis medullæ extremus finis, quæ in coccygis os penetrans, hoc modo ter-
 minatur: hæcque historia triginta parium neruorum, quæ ex spinali medulla egre-
 diuntur, quæ diligenter & accuratè memoriæ mandanda est, vt sciamus, cui loco re-
 media applicari debeant, si quando ab externa causa, puta casu ab alto, vel contusione,
 aut insigni compressione pars aliqua, vel motum, vel sensum, aut vtrumque amiserit.
 Principio enim semper illius nerui applicanda sunt, non loco in quo symptoma anim-
 aduertitur.

CAPVT VII.

De nervis per Brachia distributis.

ENVMERATIS nuncijs nervis, qui per viscera & musculos trium Ventrium di- Ortus
 sparguntur, reliquum est, vt eos quoque describamus, qui per artus propagantur. neruorū
 Occurrunt hic primum *per brachia digesti*, quorum sex paria vulgo ab Anatomicis brachij.
 consti-

constituuntur, orta à quinto, sexto, septimoq; pari neruorum, à medulla ceruicis prodeuntium, & à primo ac secundo illorum, qui è thorace emergunt. *Egrediuntur* hi nerui per communia vertebrarum foramina, vtrinq; , & protinus ab exitu inter se anterioribus maioribusq; ramis vniuntur, mox à se iterum separantur, rursus junguntur, & postremo separantur, adeo vt videantur retiformem quendam *plexum* efformare, qui non melius, quam cum galeris illis Cardinalium comparari potest. Neruorum hic implexus sub clauicula, eo loci, quo Venæ Arteriæq; axillares thoracis cavitatem egrediuntur, prodit, & ab hac omnes brachij nerui originem suam ducunt. Incertus tamen admodum exortus est, ob nexum, quamobrem nos in ipsis referendis cæterorum vestigijs, quam nostris obseruationibus potius insisteremus, ne temere & præter necessitatem nouarum rerum studiosi fuisse videamur.

Primus. ^a PRIMVS ergo *neruus*, qui ad brachium fertur, soboles est duplex, tertia nempè & quarta anterioris rami quinti paris ceruicis. ^b Alter enim ramus, ad secundum humeri musculum, deltoidem, fertur, & cutem ipsi instratam: ^c alter, versus scapulæ ceruicem, vbi in duos finditur, quorum ^d prior in deltoidem, qua parte à clauicula oritur, abit; ^e posterior, in quartum par musculorum ossis hyoidis, coracohyoideum inseritur, inde super scapulari superiori, & deltoidi, quo loci à scapulæ spina oritur, ramulum largitur. Hic per humeri elatiorem partem excurrit: at reliqui quinq; nerui, per alam ad brachium feruntur, ibidemq; in plures disperguntur ramos. a, 7, 2 E.
b, T.
c, b.
d, c.
e, d.

Secundus. ^f SECUNDVS crassior est, & à plexu illo retiformi, de quo diximus, originem sumit, neq; tamen à quo neruo satis perspicuum esse potest. Hic per anteriorem & mediam brachij partem defertur, quod sub primo cubitum flectente, siue bicipite musculo eà sede ingreditur, qua duo eius capita inter se vniuntur, & vbi tendines inferuntur, tum pectoralis humerum adducentis, tum deltoidis, eundem attollentis. Sub hoc ergo musculo reconditus, ^g duos furculos vtrinq; vnum emittit, qui duo capita bicipitis ^h ingrediuntur, deinde circa mediū longitudinis humeri, sub eodem bicipite musculo incedens, ⁱ alium furculum profert, quo mediante cum tertio neruo jungitur indeque ^j descendens ab externo latere in progressu ^k furculum distribuit capiti longioris radium ^l pronatoris. Vbi jam ad cubiti flexuram peruenit, iuxta externum latus tendinis dicti bicipitis musculi, ad membranam carnosam ductus, in cutem digeritur, duos in ramos f, 7. 2. 2.
g, 7.
h, 7.
i, 6.
j, 7.
k, 7.
l, 7.

Externus. diuisus, quorum alter externus est, alter internus: ille, gracilior; hic, crassior. ^m Externus ⁿ ergo, cum venæ cephalicæ ramo per cubiti sedem externā aliquo vsq; delatus, ad pollicis internodium secundum ^o distribuitur. ^p Internus, in duos ramos sub communi brachij vena, siue Mediana subdiuiditur, quorum qui ^q exterior est, obliq; sub cute procedens, relicta vena versus radium abit vsq; ad carpum: ^r interior vero, basilicæ ramo inferiori, cum obliquius incedat, attensus, in cubiti regione in duos ramos præcipuos ^s finditur, quorum ^t vnus per radium, ^u alter per cubiti regionem ad carpum, indeq; hoc superato, in manus internæ cutim distribuitur. m, 7.
n, 7.
o, 7.
p, 7.
q, 7.
r, 7.
s, 7.

Tertius. ^v TERTIVS brachij neruus, siue tertius, qui ad brachium fertur, proximè secundo subiacet, & perinde vt ipse à plexu illo retiformi oritur. Hic dum per alam progreditur, antequam adhuc brachium attingit, ^w sobolem expromit, qui inter pectoralem humerum abducentem, & deltoidem eundē eleuantem, sub cute dispergitur. Cum primum v, 7. 2. 2.
w, 7.

mum autem brachium attingit, sub Bicipitem musculum, siue primum cubiti flexorem *Soboles. post ingressum in brachium.*
 se recondit, ac deorsum vna cum secundo neruo procedens, ^u ramulū in caput secundi cubitum flectentis expromit. Hinc descendens à secundo neruo ^x ramum accipit, quo mediante inuicem junguntur, inaeque vltius per brachij anteriora in cubiti flexuram contendit, æquali semper interuallo à secundo neruo distans, interni humeri tuberculo, eiusq; anteriore sede inuectus. Vbi hoc superauit, complures ^y propagines educit, qui vna cum ramis, à quinto neruo diductis, qui per eiusdem tuberculi posticā regionem vehitur, in musculos internam cubiti sedem occupantes, & ab interno humeri tuberculo enatos, distribuuntur. Tales sunt duo quatuor digitorum extrema internodia flectentes, & ille qui tertium pollicis articulum curuat. Inde aliam expremat propaginē quæ inter dictos hos musculos, per radium vna cum Vena arteriaq; ad carpum deferretur, sub transuerso ligamento transiens, tenues quosdā furculos disseminat in abductorem pollicis musculum, & duos primum eiusdem articulū flectentes. Post hæc vbi ad volā manus peruenit, in tres ramos ^z dirimitur, è quarū *prima*, furculos duos pollici; à *secunda*, duos indici, & *tertia* vnū, medio digito in internum latus dispergitur. *Quartus.*
^a **QVARTVS** neruus, omnium qui ad brachium feruntur amplissimus est, cum triplo ferè cæteros crassitie vincat. Oritur hic nō minus ac reliqui à plexu retiformi, inde que per brachium similiter ac tertius, vbiq; inter musculos in profundis latitans, vena basilica arteriaq; axillari socijs, deferretur. Protinus autem ac brachium ingressus est, ^b *plures, sed exiguos furculos* in capita musculorum cubitum extendentium deriuat, & antequam ad dimidium longitudinis humeri peruenierit, oblique deorsum ad os humeri contorquetur, interq; hoc, & musculos cubitum extendentes progreditur. Prius tamen, quam totus reflectatur, ab interno sui latere ^c *furculū* educit, qui inter dictos musculos, tum secundū cubitum flectentium incedit, & in cutim internā brachij sedem inuestientē absumentur, sursum deorsumq; fibris nonnullis propagatis. Sobole hac disseminata, sensim per posteriorem sedem ad externum brachij latus, per sinum externi humeri ossis tuberculi in postica ipsius regione exsculptum, inuectus, ^d *properat*, vbi similiter ^e *furculum* promit, cutem accedens humiliori sedi externi lateris brachij obductam; deinde ^e *aliū*, qui in cutim vsq; in carpum digeritur. Inde iuxta cubiti articulū ^f *in duos ramos diuiditur*, externum & internum, qui in profundo & inter musculos abditi, quæadmodum & totus truncus, ad carpum descendunt. ^f *Externus*, secundum radij longitudinem incedit, & vbi ad e carpum peruenierit, transuersum ligamentum ab exteriori parte transit, moxq; in duos ramos ^g subdividitur, quorum *vnus* duplici furculo in externam pollicis sedem; *alter* partim in indicem, partim medium, absumentur. ^h *Internus* vero secundum cubiti longitudinem porrectus, soboles porrigit plures, & ⁱ *primam* quidem in musculum primum digitorum extensorem; ^l *secundam*, in extendentium digitos secundum; ^m *tertiā*, in extendentem carpum interiorem. In ipso autem ⁿ progressu tribus musculorum principijs ab vna, siue cubiti osse originem ducentibus propagines largitur. ^o Reliquum quod est in carpum terminatur. *Quintus.*
^p **QVINTVS** neruus, inferius quam quisquam commemoratorum ex eodem plexu retiformi productus, quartoq; iunctus, per brachij internā sedē, inter flectentes, & extendentes cubitum musculos, descendit. Nullam hic sobolem de se spargit, sed integer
 Kk rema-

Quartus.

Propagines.

1.

2.

3.

Rami duo.

Externus.

Internus.

Quintus.

remanet eo vsq; dum ad internum humeri tuberculum deuenerit, ad cuius posteriorē sinum reflectitur, & pari postea serie cum tertio nervo, qui per anteriorem regionem eiusdem tuberculi procedit, distribuitur. Vterq; enim ⁹ *propagines* largitur musculis, qui ab interno humeri tuberculo enascuntur, & cubiti internam sedem occupant. ^r *Surculum* quoq; educit, qui per radium vectus, inter musculos secundum ac tertium digitorum internodia flectentes incedit, sicq; ad volam manus abit, & ramū educit primum, qui bipartitus, minimi digiti interiori parti inseritur: deinde alium, qui & ipse bifariā fectus, in annularem, ac tandem alium, qui ad externam sedem interni lateris medii digiti proficiscitur. Cæterum ex eodem hoc quinto nervo, & ab externo latere iuxta medium longitudinis radij ^r *alius quidam surculus* enascitur, qui diuifus in tres ramos, in externam partem medij, annularis, ac minimi digiti diffeminatur.

Sextus.

^r *SEXTVS nervus*, ab infima sede plexus retiformis emergit, & per axillam, humerique & cubiti interiorem sedem, sub cute incedens, ad internum humeri ossis tuberculum properat, pluribus in hoc itinere surculis ad cutim vicinam dispersis. Cum primum autem tuberculum hoc attingit, in multas *propagines* scinditur, quarum *aliæ* basilicæ Venæ ramis subiiciuntur; *aliæ* incumbunt, sicque sub cute delatæ, vbi ad carpum deuenerint, terminantur.

CAPVT VIII.

De nervis per Crura digestis.

NERVORVM qui per crura propagantur quatuor sunt paria. Oriuntur hæc à tribus inferioribus lumborum, & quatuor superioribus ossis sacri coniugijs, quæ vbi per communia vertebrarū foramina egressa sunt, non secus ac nervi, qui ad brachium distribuuntur, retiformem quendam plexum, illo tamen longe maiorem efformant. Nec tamen æquali magnitudine præditi sunt, sed ¹ *primus*, & ² *tertius* tenuis est, vnde & ad femur tantum perueniunt; ^h *secundus*, paulo crassior, & tibiam attingit: at ^a *quartus*, tres reliquos etiam iunctos, solus crassitie superat, & extremos vsque ad digitorum apices defertur.

Primus.

^c *PRIMVS* ergo, ex elatiore plexus retiformis parte, qua tertius lumborum nervus cum quarto coit, exoritur. Fertur autem deorsum statim sub peritonæo ad femur, externo lateri tendinis primi femur flectentium musculi, incumbens, ad quod vbi peruenit, ^e *sobolem* educit, quæ per cutem anteriorem femoris, vsque ad genu articulum excurrit, ibique terminatur, & ^f *primo* tibiam flectentium musculo, tum secundo & tertio eandem extendentium, surculos offert.

^g *SECUNDVS nervus*, ex eodem plexu nascitur, & quidem infra primum, è regione connexionis tertiæ & quartæ lumborū vertebræ. Hic cum vena & arteria crurali (quæ sunt rami iliaci exteriores,) in femur per inguina descendit, q̄ vbi attingit, statim ^h *propaginem insignem*, à latere interno exigit, Venæ saphenæ, seu malleoli interni toto ductu, quo sub cute per interiora cruris ad magnū pedis digitū fertur, ab anteriore parte incumbens. Vt autem ipsa saphena in itinere nonnullos surculos ad proximam cutim digerit, ita & nervus hic complures propagines educit, quas inter ⁱ *præcipua* illa est, quæ anteriori genu regioni offert. Cæterum ipse ^l *truncus*, vbi hanc sobolem eduxit, vna cum

Trunci progressus

cum trunco Venæ & Arteriæ cruralis in femur penetrat, & in musculos dispergitur interiorem femoris partem occupantes,^m præsertim in tertium femur flexentium, & quartum tibiæ extendentium, sicque postea supra genu terminatur.

ⁿ TERTIVS, sub secundo ex plexu nascitur, è regione commissuræ quartæ & quintæ vertebræ lumborū. Hic supra secundū femur flexentiū, siue iliacū internū delatus, pubis ossis foramen transit, & duobus femur circumagentibus, quos Obrutatores vocāt, puta huius istius foraminis, tū duobus penē erigentib. musculis, qui à coxæ dicis osse nascūtur, ° propagines largitur. Inde nō secus ac duo præcedētes nervi descēdit, & in cutē femoris interiora investientē, nervulos digerit: ¶ reliqua pars in alto permanet; cuius^r præcipua soboles, partim in secūdū, partim in tertiu tibiā flexentiū absumitur.

^f QUARTVS nervus, ex ossis sacri quatuor superiorum pariū anterioribus ramis vnitis inuicem constituitur. Quo nomine & reliquos, imo omnes totius corporis nervos, non crassitie duntaxat, sed & duritie, quod ab extremis in spina prodeūtib. conficiatur, vincit. Hic per sinum in posteriori ossis coxendicis sede insculptum femoris posteriora subit. Protinus autem^t insignem propaginem ex posteriore sede exigit, quæ sub primo femur extendentium, siue Glutæo magno aliquamdiu hæret, inde in cutim natium, & femoris posteriora ad mediam usq; longitudinem regentē, dispergitur.^u Alias deinde vtrinque & quidem fere tres ad capita musculorum tertii, quarti, & quinti tibiæ, tum tertium femur flexentium. Inde *truncus nervi* inter musculos posteriorem femoris partem occupantes, iuxta os descendit, vsq; ad dimidium longitudinis ipsius, ^x ramumq; alium distribuit, carnosæ illi moli quinti tibiæ flexentis musculi, Bicipitis dicti, quæ ipsi postquam vltra femoris medium progressus est, interna parte adnascitur. Prodeū & hinc alii furculi, qui in cutim posteriorem femoris digerūtur. Vterius autē prouectus ipse truncus, tandem ad genu peruenit inter duo capita ossis femoris, & vtrinq; ¶ ramulum impertit in primum pedem extendentium, & plantarem musculum, moxq; in sinu posteriore ipsius genu, siue poplite, in duos inæquales ramos^z dividitur, qui per tibiā & pedem soli distribuuntur. Nec enim vllus est, qui per tibiā excurrat nervus, præter hos duos ramos quarti, si excipias solam illam insignem propaginem, quæ à secundo nervo derivata, vt diximus, comes saphenæ venæ per interiora cruris descendit.^a *Exterior ramus*, gracilior est, & versus eam partem abit, qua fibulæ appendix superior cum tibiā committitur, in itinere^b sobolem spargens, quæ sub cute ad malleolum externum abit, interea plurimos furculos ad cutim digerens. ° Ramus autem ipse inter musculos anteriorem tibiæ sedem occupantes transit, & ligamentum tibiæ fibulæque longum permeans, vna cum tendinibus musculorum digiros extendentium, sub transverso ligamento abit, & ad latera superioris digitorum sedis ramulos diffundit. ^d *Interior* per posteriorem cruris sedem defertur, latens inter plantarem & primum oblique pedem moventium musculum, tum longos digitorum flexores, iunctusque postea cum ramo externi, qui ligamentum permeat, ad plantam pedis abit, & in vtrumque inferius digitorum latus sobolem dispescit.

FINIS LIBRI SEPTIMI.

Kk 2

ADRIA-



ADRIANI SPIGELII

BRUXELLENSIS,

DE HUMANI CORPORA- RIS FABRICA,

Liber Octavus.

Qui historiam infimi ventris continet.

CAPVT PRIMVM

De Cute.

*Ratio or-
dinis.*



*Partes
infimi
Ventris.*

ACTENVS similes nostri corporis partes vidimus : nunc ad dissimiles accedamus , ad quarum constitutionem ipsæ concurrunt. Hæ merito ratione trium Ventrium dividuntur, ex quibus de infimo primū agendum est, quod sectionis quoque initiū ab hoc fieri soleat, teste Galeno, s. admin. Anatom. 6. siquidem facillime omnium ob intestina, & his inclusas fæces, putredine corripitur. Cæterum cum huius appellationes libro primo, statimque ab initio persequuti simus, nunc partes ipsas inspiciamus, quas optime in externas & internas diuidemus. *Externæ*, Abdominis nomine vulgo, & quidem proprie veniunt, quia abdunt conteguntque viscera imi ventris: & iterum vel communes sunt, vel propriæ. *Communes* dico, quæ cæteris quoque Ventribus competunt, cum vniuersum corpus involvant, quales sunt illæ, quas communia nostri corporis integumenta vocant, Cuticula inquam, Cutis, Pinguedo, & Membrana carnosa. *Propriæ* sunt, quas solum Abdomen habet, vt decem abdominis muscoli, & peritonæum. Harum partium situs in corpore ille est, vt dissecantibus primum Communes occurrant, his Propriæ subiaceant, & eo quidem ordine quo ipsas nunc enumeravimus. De externis primum dicamus, deinde & internas persequamur.

Primum

Primum igitur integumentum ex communibus Cutis est, quam Græci δέρμα vocant, Hippocrates δέριον, Herodorus αἰθραπίδω. Latini, Cutem, Pellem, Corium, & in quadripedibus, alutā. Dicitur δέρμα, & δέρις, vel ἀπὸ δέρεως, quod facile excorietur; vel certe, quasi τέρμα, cum terminus sit & superficies totius corporis. *Figura* Cutis, membrana-
rum in modum plana & depressa est, omnium tamē quæ in corpore sunt, crassissima & amplissima, quod sola vniuersum corpus involvat, & tegat. *Substantia* constat duplici, vna externa, & quæ superficialis est, altera interna. *Externam* Græci ἐπιδερμίδα vocant, Latini CVTICVLAM, *Cutis operculum*, & *summitatem*. *Interna*, totius nomine gaudet, quod respectu externæ maxima mole sit prædita, & quasi totam cutis substantiam constituere videatur. Dicitur autem externa ἐπιδερμὶς, & ἐπιδερματὶς, ὅτι ἐπὶ τὸ δέρμα πέ-
ται, quia cuti incumbit, quasi dicas, quid supra cutim positum; nō (vt quidam male interpretati sunt) Cuticula diminutive. Vocabula enim in his desinentia, non sunt diminutiva, apud Græcos, sed quid simile referunt ei, à quo denominationem habent. Sic ἐπιμυς, musculus, quo nomine dicitur Deltoides humeri os attollens, non paruum aut exilem humerum, sed potius musculum humero impositum significat. *Substantia* hu-
ius tenuissima est, & quædam quasi cutis veræ efflorescentia, quam tunicis cæparum Anatomici non inepte assimilarunt. *Ex sanguis* etiam, & *sensus expers*, densior tamen cute, vnde fit vt ecthymata, & pustulæ nascantur, cum humores aquei à centro ad circumferentiam pulsī, cutim quidem penetrarint, sed enim cuticulæ cancellos egredi nequeant. Sic tamen densa est, ne transpirationem impediat. *Oritur* autem, non vt quidam nostræ ætatis crediderunt, ex recrementis tertiæ coctionis, cum tenue per poros insensibiliter evanescat, crassum autem sordium specie cuti forinsecus adhæreat, & facile in balneis abscedat: sed potius à viscoso vapore sanguinis, à calore interno elevato, & tum aeris ambientis, tum cutis, respectu partium internarum frigiditate, condensato. Simile quid enim hic accidit illi, quod videmus in pultibus fieri, in quibus si oleosi & viscosi plurimum abundet, concrefcit in superiore parte levis quædam cuticula. Est autem necessario vapor hic viscidus, quia simplex facile digeritur, & in halitus insensibiles abit: at viscosus adhæret externis partibus, ibique condensatur. Sunt ergo tres causæ ad cuticulæ generationem concurrentes, *Materialis* quidem vapor, & is oleosus, ac viscidus: *Efficiens*, interna, hunc ipsum elevans, calor viscerum, & cæterarum partium; *Externa* autem, condensans frigus. Hæ prout intensiores fuerint, aut remissiores, ita crassior, aut tenuior Cuticula reddetur. Adnascitur autem generata cuti tam valide, vt difficulter novacula, aut cultro separetur: vi tamen ignis aut ferventis aquæ nullo negotio decedit in cadavere: in vivo homine attritione etiam, & vesicatoriis medicamentis. Observarunt autem nonnulli, Vesicantibus adhibitis, cuticulam hanc duplicem fuisse, prioreque ablata, aliam sub-
tus superiore longe crassiorem, comparuisse. Huius *usus* est, vt subiectam sibi cutem, quæ exquisitissimi est sensus, ab externo frigore, aut intenso calore defendat. Frigido enim tempore nimium constricta cutis, transpirationem præpediret, nisi cuticula frigoris ambientis vim, immediato contactu prohibiti, hebetaret. Contra calido nimium attenuata, omnem dissipasset internum calorem, nisi densitate sua Cuticula caloris exitum interciperet. *Sunt* & nonnulli, inter quos Galenus est, qui statuunt,

3. cuti, quatenus tactus instrumentum est, inferuire, cum medij cuiusdam officio fungatur. *Tertius* vsus est, ne Ichor ex Venis & Arterijs emanet, quem vsus facile ipsa Natura ostendit, vbi cuticula decessit ex attritione, aut alijs causis. Exsudat enim continuus quidam magno cum dolore humor.

CUTIS
VERA.

Quomodo
cutis ner-
uea dici
queat.

Differen-
tia cutis.
A crassi-
tie & de-
sitate.

CUTIS VERA, Cuticulæ, quæ sextuplo crassior est, subiicitur. Huius *substantia* non ex Vena & Arteria constat, vt hætenus plurimi crediderunt, persuasi fortassis à principe Philosophorum Aristotele, libr. de spirit. capit. 4. vbi, Cutis, inquit, tribus hisce, vena, arteria, & nervo constat. Vena quidem, nam dum pungitur sanguinem emittit; è nervo autem, quia tendi potest: ex arteria quoque, quia perspirationem habet. nam sola arteria spiritum suscipit. Sed enim si in propria significatione Philosophus horum nomina accepit, vera hæc sententia omnino esse nequit. *Ex Vena enim constare non potest*, quod cætera animalia, quæ ex sanguine sunt, cute carerent, cum tamen cutim & polypus, & sepiæ, & loligo habeat. Quod si vena alicubi cutim ingredi videatur, id non tam generationis, quam nutritionis gratia accidit. *Sed nec arteria* ad eius constitutionem quidquam facit, cum non nisi tribus in locis arteriæ cutim accedant, cæteræ per totum ferè corpus in profundo lateant. *Nec tandem nervus ad cutis compositionem concurrat*, cum pauci admodum nervi sub ipsa cute appareant, potiusque in partes interiores disseminentur. Quod si per nervum corpus intelligat, quod distendi & contrahi nervi in modum, queat, ab Aristotelis partibus jam merito sim, qui Cutis substantiam sui generis esse, nec ipsi similem in vniuerso corpore reperiri posse, adeoque verè ab Anatomicis nervum carne præditum vocari statuo. Et *nervum* quidem, vocabulo in communi significatione accepto; at *carne*, sui generis. Constat enim ex fibris quibusdam nerveis, quarum beneficio & distenditur, & iterum stringitur: Caro autem vocari potest, quæcunque substantia, quæ fibris, huiusmodi intertextitur. Est autem substantia hæc in Cute glutinosa, & spermatica: & *glutinosa* quidem, quod, vt Aristoteles, libr. 3. hist. anim. testatur, in omni cute mucosus quidam humor sit, sed in quibusdam paucus, in alijs vberior, vt in bubulo corio. *Spermatica* autem dicitur, quia semen suæ constitutionis materiam habet. Ex quo fit, vt cutis coalitus *κατὰ δυνάμιν σποδὸν*, & per medium heterogeneum, quod cicatricem Chirurghi vocant, accidat, quæ semper reliqua cute durior est, & poris caret, vnde nec pilis vnquam tegitur: contra cuticula etsi deperdatur, facile restituitur. In pueris tamen propter cutis tum humiditatem, tum humoris glutinosi copiam, obseruatum est, consolidationem vulneris per cutem veram factam fuisse. Sunt autem Cutis complures differentiæ, quas scire & ad perfectâ ipsius cutis cognitionem, & vsus in medica arte plurimum interest. Ac cum Aristotele teste, 5. de generat. anim. 2. cutem præ cæteris animalibus Homo suapte natura pro magnitudine corporis tenuissimam habeat, maximum tamen ratione ætatis, sexus, regionis, temperamenti, partium, & morborum, discrimen in crassitie & densitate obseruatur. Ratione ætatis quidem, cum pueris tenuis sit cutis & porosior; adultis, crassior, & densior. Ratione vero sexus, cum, Fæminis tenuior ac rarior, quam Viris. Totum enim corpus fæminis spongiosum est, vt inquit Hippocrates, libr. de morbis. In frigidis quoque *regionibus* cutis & crassior multo est, & densior, quam in calidioribus, in quibus rarior

actenuior, vt Æthiopibus. Et hæc quoque causa est inter alias, vt qui ex frigidioribus plagis ad ea accedunt loca, quæ circa æquinoctialem lineam sita sunt, facillimè febribus corripiantur. Cum enim densior sit cutis, fit vt calor ille insignis ab externo excitatus aëre, libere perspirare, vt conueniebat, non possit, vnde retentus, calorem præternaturalem, adeoque febrem inducit. Sic contra, qui ex calidioribus regionibus ad septentrionales accedunt, de immenso frigore conqueruntur, à quo tueri se vix vestimentis etiam queunt, quod rarior cutis aërem frigidum nimium admittat. Si *temperamenta* spectes, frigidioribus densior est cutis, minoribusque pertusa poris; contra calidioribus spongiosa non nihil. Ratione *partium* quoque differentia obseruatur. In fronte enim ac lateribus tenuis est, tenuior adhuc in vola manus, at tenuissima omnium in labijs, ac scroto. E contra in capite & sub calcaneo tam crassa, vt cuticulam solam sub calce paleæ hordei latitudinem crassitie adæquasse, aliquoties obseruari: tam duram autem, vt eadem cuticula primo ictu cultri quantumuis acuti acie eluserit. Dorsi etiam cutis, insigni duritie, densitate, & crassitie præ alijs prædita est. Quod si quis interroget, cum cutis capitis crassissima sit, qui fiat tamen vt cuticula tenuissima tegatur, quæ ferè cutis sibi subiectæ crassitiem, aut tenuitatem obseruare solet, & pro sui generatione copiosam in capite materiam habeat. Eleuantur enim ex infernis partibus ad caput crassi, & visceri humores, quæ crassam potius, quam tenuem efficiant. E contra, pedum calx, quæ tenui cute tegitur, & pauca excrementa crassa generat, crassissima tamen cuticula obducitur. Ad hæc respondeo, cuticulam capitis propterea exiguam esse, quod pili, qui hac corporis parte longissimi proueniunt, excrementa omnia pro sui materia, aut nutrimento rapiant. Nec tamen caluic cuticulæ crassities propterea adaugetur, quod ipsis materia illa in pilos non absorbitur, cum per eam cutis partem quæ calua est, excrementa vix transpirent, vtpote quæ jam densatos, & oclusos poros habeat. Cæterum sub calce densior est cuticula, etsi excrementa viscida eo paucissima confluant, quia nempe tenuior pars eorum excrementorum, quæ ad ipsam pertingunt, ob motum in deambulando dissipatur, remanente parte crassiore, quæ per poros cutis pulsa, callorum modo indurescit, vt rectius fortassis callum, quam Cuticulam dixeris. Hoc nomine qui manibus dura tractant, callosam cuticulam in vola contrahunt. In *morbis* calidis densior fit Cutis: in siccis autem, quam humidis tenuior. *Æstiuo*, quam hyberno *tempore*, rarior est cutis, ex quo fit, vt pelles animalium, quibus nos aduersus frigora munimus, si ætate excorrientur, minus nostrum calorem feruent, ac eorum quibus hyeme detractæ pelles fuerint. Cutis autem *color* etsi naturaliter albicat, magna tamen coloris ratione differentia notatur. In *viuo* enim homine, & qui inculpari corporis sanitate fruitur, tum in temperata, vel frigidiore orbis Zona degit, suffuso albedini rubeo colore, rosea apparet: in *mortuo* vero pallida est, quod sanguis, qui cutem tingit, ad interiora repens, externas partes deferat. Differt etiam ratione *ætatis*, cum pueris rubicundior sit, adultis albidior. Tenuior enim est sanguis pueris, adultis vero crassior: at qui tenuiorem habet sanguinem, rubicundiores sunt; qui crassiorem pallidiores, quia crassus sanguis ad externas partes non ita facile pellitur. Ratione *sexus* discrimen magnum est, cum sæminis candidior sit ob vitam sedentariam, quæ & ipsa præpedit, ne san-

*Problema
tadu.*

A colore.

ne sanguis ad extrema feratur: at Viris, qui corpus continuis exercitijs defatigant, rubet magis, nisi fortè pinguedinis copia prohibeat. Ratione *regionis* color quoq; valdè differens est. Scytharum enim gens, teste Hippocrate, libr. de aëre, aquis, & locis, fului coloris est, cuius causam subijcit, intensum esse frigus. Nec enim ad eos sol propius accedit, ex quo fit vt à frigore albedo exuratur, & fulua fiat. Phasianis flauum habent colorem, similem illis, qui iëtero detinentur, eodem teste. Cum enim stagnantibus vrantur aquis, & fructibus non benè maturis, fit vt obstructions in visceribus cumulent. Versantur præterea toto vitæ suæ tempore in palustri aëre, humidis crassiq; vaporibus inquinato. E diuerso Asiani, tum quoad corporis colorem, tum quoad formam pulcherrimi sunt, & quidem ob contrarias causas, nempe aëris temperiem, & omnium, quæ in alimentum ipsis cedunt, perfectam maturitatem. Qui sub Æquinoctiali linea habitant, nigri sunt, à qua qui distant magis, albidiores videntur. Vnde duplex genus Æthiopum nascitur, vnum quod nigerrimum est, quale est quod Nigritarum regna, magnamq; Abyssinorum partem incolit: alterum vero, quod inter fuluum, nigrum, & rubrum quodammodo ambigit, quales sunt Mauritani, & qui Fessæ regna occupant. Hispani qui non procul à Fretò Herculeo habitant, nigriores sunt Gallis, & Italis; hi rursus, Germanis, & Belgis. Peruuiana autem regio quantumuis sub Æquinoctiali linea sita sit, formosos tamen & candidos alit homines, quod à montibus & ventis, maximeq; à terræ vaporibus, aër apprimè temperetur ibi. Cæterum Æthiopes nigri sunt, cum cutim, & cuticulam habeant molliorem, porosq; amplos & valde laxos. Ex quo euenit, vt ipsis, dum calidissimo in aëre versantur, vna cum sudoribus, adustorum humorum vapores, quibus ob continuum æstum abundant, exspirent, ex quorum crassiore substantia siccata, & veluti torrefacta, cuticula nigra generatur. Nam & sanguinem calore exsiccatum atrum fieri, & carnem, quæ ex sanguine constat, nigrescere, si soli exponatur, nemo est qui non viderit aliquando. Sunt autem Æthiopes infantes adhuc & recenter nati, non nigri, sed rubicundi, quod ideo fit, quia cuticula ipsis, vt nobis quoq; progressu tantum temporis cum auferescere incipiunt, crescat: atq; hæc quidem mea est de nigredine Æthiopum sententia. *Temperamenti autem ratione* color cutis sic variat. *Frigidis & humidis* albo colore cutis candicat: at *calidis & siccis* subflaua est, & rosea. *siccis & frigidis*, fusca; *calidis & humidis*, rubicunda. Vt enim quisque in corpore humor abundat, teste Hippocrate, libr. de humoribus; sic diuersus in cute color efflorescit, quæ tamen sententia de ea tantum cûte intelligenda est, quæ alba cuticula tegitur, non de Æthiopum, quæ nigra, vel fulua. Sic ergo pituitosis, pallet, vel albicat; biliosis, flauescit; melancholicis, fusca est; at sanguineis, rubet. *Partes* quoque diuersos colores monstrant. In Genis rubedo plerumque est, quod venæ, à jugularibus ortæ, complures ibi excurrant, & cuticula tenuior sit, quam alibi, vnde facili negotio venarum ille calor transparet, & ex rubeo illo sanguinis, & candido cuticulæ, diuinus quidam, roseusque emergit. Quod si vel rariores ibi venæ sint, vel cuticula crassior, pallor faciem perpetuus occupat. Rubedo enim illa perpes non est, sed pro varietate humorum, & passionibus animi vehementer mutabilis. Circulus mammillas ambiens, quem Aream supra vocauimus, in Virginibus quidem pallet, at in Grauidis, & Lactantibus fuscus est, in Vetulis niger, & ijs qui antiquo aliquo affectu laborant

laborant croceus. In morbis quoque diuersis, diuerso colore cutis subfunditur. In Ictero enim flauescit, in Virgineo morbo pallida redditur. In magnis Lienibus, arquatoque morbo, & scorbuto, nigrescit: in alvo maculis, iisque nigris, ferrugineis, vel flauis conspergitur. In malignis quibusdam febribus, quas Peti- culares nostri Medici appellant, maculis afficitur, quæ pulicum morsibus non ab- similes sunt: in ijs autem, qui Veneno pesteque extincti sunt, dorsi cutem præ cæteris partibus contaminatam fuisse sæpe obseruauimus. Cui quidem rei causam fuisse existimo, quod paulo ante mortem deiectis ob vim veneni omnibus viribus, sustinere se, & tueri in latere ægri nequierint, adeoque in dorsum voluerint, vnde quicquid sanguinis in corpore fuit, ad partem decliuem per venas & arterias, à venæ Cauræ & Aortæ trunco per dorsum excurrentes, repente ad cutim decubuerit, vnde nigro ipsa colore postea suffusa fuit. Habet autem cutis temperamentum in primis quidem *qualitatibus*, inter calorem & frigus, inter humidum & siccum: in *secundis* au- tem, inter durum, & molle, medium. Cum enim tactui inferuiat, vt externas iniu- rias, antequam ab ipsis internæ partes lædantur præsentiat, medium inter tangibiles qualitates temperamentum habere debuit, cuius beneficio omnia extrema, quam ex- actissimè cognosceret. Cutis tamen, quæ internam manus sedem inuestit, exquisitè median temperiem nacta est, quod manus, quæ apprehendendi organum est, præ alijs omnibus partibus externis malis opportuna fuit. *Sensu* quoque omnis prædita est, in alijs tamen alijsque partibus magis. Exquisitissimus sensus illi est, in quam vel plures nervi inferuntur, vel quæ cum membranis immediatè connectitur, maximè si tenuitas accedat. Hinc obesi valde, quibus pinguedo copiosa inter cutem, & mem- branam carnosam intercedit, minus sentiunt: at circa lumbos à leui tactu titillatio mo- lesta percipitur, quod ibi musculorum membranæ copiosæ statim subsint, & cutis re- nuior sit. *Lauis* est tota cutis extrinsecus, intus ob connexum cum alijs partibus, aspe- ra & inæqualis. In quibusdam tamen partibus rugis & sectionibus insignita, vt in fronte, ex quibus nonnullæ transuersæ sunt, quædam rectæ. Sunt etiam in vola ma- nus, tum planta pedis, quas Chiromantæ contemplantur. Mulieribus quoque à partu rugæ in abdominis cute nascuntur, quas propterea nonnullæ, quæ turpiter virgini- tatem perdidierunt, vt factum dissimulent, cæcis remedijs tollere conantur. Est et- iam continua cutis, nisi vbi meatibus quibusdam, partim manifestis, quos *Foramina* vocabimus, partim obscuris, quos *Poros* dicemus, donata est. Sunt autem pori infi- niti illi meatus, exigui, quos extrema venarum & arteriarum oscula constituunt, in cute, quam cuticula, maiores, qui paruitate oculorum obtutum fugiunt, non nihil tamen vbi crassior est, vt in plantis pedum, conspicui. Ob hos poros, cum innumeri sint, cutem nassæ piscatoriæ doctissimus Plato assimilauit. Hi in cadauere facile visui se offerunt, sic candela, aut feruente aqua cutis amburatur. Solent quoque in Viuis hyberno tempore conspici, cum derepente corpus denudatur, vbi cuticula anseris deplumati cutem æmulatur. *Foramina*, grãdia sunt & maxime conspicua, qualia in ocu- lis, naribus, ore, auribus, vmbilico, pudendis, & ano, reperiuntur, quæ à poris non tantum magnitudine, sed & forma ipsa differunt, quæ poris rotunda est, propter ve- narum & arteriarum teretem figuram, cæteris vero varia, pro vsu singularum partium

*A tempera-
mento.*

A sensu.

*A supersti-
cie.*

*A fora-
minibus.
Pori.*

A motu. quibus infant, commodiore. Est autem tota cutis immobilis in homine, excepta illa, quæ frontem investit. In nonnullis tamen, sed rarum admodum id invenitur,

A situ. occipitij cutis movetur, quibus peculiare propterea muscoli sunt tribut. *Situs*, & sedem cutis, & connexionem denotat. Sedes est in extrema corporis parte, quod vniuersi corporis tegumen sit, & munimentum. *Connexio* autem eadem non vbivis cernitur. In quibusdam enim partibus maior est, adeo ut difficulter, & vix separari queat, quemadmodum in plantis pedum, & volis manuum, in quibus firmioris apprehensionis gratia connascitur subiectis partibus: in quibusdam minor, & facile separabilis, ut in infimo ventre, brachiis, & cruribus. In nonnullis locis *connectitur Tendinibus*, ut in vola manus; in aliis cum *Venis*, ut in brachio; in quibusdam cum *Musculis*, & *Carne*, ut in fronte; in plerisque omnibus cum *Pinguedine*; in nonnullis etiam cum *Membrana carnosâ*, ut in collo. In brutis animalibus contextu perpetuo pilis munitur, in Homine autem interpellata admodum est, adeo ut paucis in locis pilosa appareat. Et quamquam per vniuersum pæne corpus, sed rari valde pili nascantur, vola tamen manus, & planta

A Venis. pedis prorsus ab omnibus immunis est. Venas habet, quas *Cutaneas* vocant, quæ inter cutem & membranam carnosam feruntur. Sunt autem *duæ à Iugularibus*, per caput & collum disseminatæ: *duæ ab Axillaribus*, per brachia, pectus, ac dorsum propagatæ: una denique *ad inguinâ*, à ramo venæ Cavæ epigastrico. In pede Saphæna est, sive Malleoli interni vena, per totam cruris internam sedem recto itinere excurrent. Harum dextræ cum sinistris, inferiores cum superioribus iunguntur. Dextræ quidem cum sinistris, ut Iugulares circa frontem, ubi in unam venam coeunt, quæ Frontis dicitur, itemque circa mentum. Superiores cum inferioribus, in lateribus abdominis & thoracis, ubi vena ab epigastrica ascendens, cum crammaria descendente, eodem modo ac sub abdominis rectis musculis, quemadmodum diximus libr. quarto, iungitur. *Arterias* paucas obtinet, easque exiles, ad tempora & frontem, penem, scrotum, & digitos sitas. *Nervos* nullos habet proprios, sed fibras tantum ex nervis, quæ ad subiectas partes transmittuntur, propagatas.

A Arteriis.
A Nervis.

ACTIO. Quod *actionem cutis* spectat, nullam ipsi dissectionum Professores assignant, quod pars sit simplex & similis, non organica & instrumentalis. Id tamen de communi tantum intelligendum volunt, cum privatas necessario habeat, ob sui nutritionem. Attrahit enim alimentum, idemque retinet, concoquit deinde, & si quid tandem excrementosi relictum est, id etiam expellit. Sed revera & Communem habet actionem, sensum nempe tactus, cuius utilitas ad vniuersum, quod inest corpus, redundat, dum de quorumvis, quæ extrinsecus occurrunt, caliditate vel frigiditate, duritie, mollitie, asperitate aut levitate, cæterisque tum primis, tum secundis qualitatibus diiudicat. Non enim sensu tactus per se ad sui conservationem tam exquisito indiget: sed ob partes internas, quæ facile ab externis iniuriis cõsumptæ foret, nisi sensus ope animal ea evitaret. Quis enim ignem fugeret, aut corpus adversus frigora muneret, nisi cutis utrumque detestans, nostri defensionem iniungeret? Cæterum usus habet multiplices, qui tamen omnes eo respiciunt, ut cutis & tegumentum sit, & opti-

vsus.

mum

num munimentum. Hinc Hippocrates, Cutim, inquit, omnibus partibus *σώτην* & *σωτήριον* largiri, omnia inter senectere, & colligare. Quatenus ergo tegumentum est, omnia involuit: quatenus munimentum, ab omnibus iniuriis tam externis, quam internis defendit. Id quomodo præstet operæ erit pretium nunc paucis explicare. Primo igitur *temperamentum* accepit medium inter omnes omnium qualitarum excessus, ut de omnibus tanto rectius iudicaret, & eas quæ mediæ sunt, ac propterea gratæ, amplecteretur; quæ extremæ, & ideo ingrata, fugeret. Habet præter hoc temperamentum & aliud, cuius beneficio omnem aeris incursum innoxie sustinet, quod sane nulli alteri totius corporis parti, præterquam Cuti soli, concessum est. Nam siue carnem, seu ossa externo exponas aeri, qui siue calidus sit, seu frigidus, ita alterari subito videbis, ut putredinem minentur: cum Cutis innoxia omnes toto vitæ curriculo aeris iniurias constanter sustineat, perferatque. Ac certe idem hic evenire mihi videtur, quod videmus vulgo, accidere in fructibus arborum, pomis, scilicet & pyris, quæ putamine suo investita, diu à putredine illæsa conservantur, at detecta vel brevis semihorulæ spatio colorem, & cum colore temperamentum immutant, sicque corrumpuntur. Quæ causa est, cur in Vulneribus subito partium actio lædatur, ut neque alimentum recte concoquant carnes, neque recrementa expellant. Signo pus est, & sanies, quæ in vulneribus colliguntur, & illud quidem ex crassioribus, hoc vero ex tenuioribus excrementis: quod per insensibilem transpirationem, ut in partibus sanis fieri solet, dum calore robusto, nec debilitato fruuntur, minime digerantur. Aer namque externus subito atque detectam aliquam internam partem attigerit, temperamentum nativum corrumpit, & destruit. *Figuram* etiam habet, quam vniuersum corpus, cui obducitur, quemadmodum & *magnitudinem*. Ut tamen, quatenus corpus modo augetur, ob victus rationem lautiorē, & crescentem ætatem: modo imminuitur, ob ieiunia, & senectutem, æquabiliter vndique corpus contegeret, nervosam naturam, quæ & extendi & contrahi possit, nata est, ut propterea cutem, quam extrema obesitas ad rupturæ periculum extenderat, marcor in arctam contrahat angustiam. Est etiam *crassa ac densa*, ne à pungentibus aut incidentibus facile pertundatur, & sic periculose vasa subiacentium partium læderentur. Fecit quoque Natura *debilem*, ut facile excrementa reciperet, nec ad internas partes cum vitæ discrimine repelleret. *Meatibus* autem quamplurimis pertudit, iisq; tum magnis, tum parvis, tam ut necessaria in corpus reciperentur, quam inutilia extrapellerentur. Nam *per foramen*, quod oculorum commissæ palpebræ claudunt, rerum simulacra, quæ oculus excipit, intrant: at lachrymæ, & reliqua quæ oculi expurgant recrementa, egrediuntur. *Per nares* ad refrigerium cordis, aer attrahitur: emanat autem mucus è cerebro sensim destillans. *Ex ore* egreditur sputum, & alia quæ à cerebro orique vicinis partibus, stomacho inquam, & pulmonibus transmittuntur. Ingreditur contra cibus, potus & aer ad refrigerium cordis. *Aures* flavam & crassam cerebri bilem expurgant: contra sonum ab aere externo excipiunt. *Pudendum muliebre* virile semen suscipit: emittit autem menstruas purgationes, tum yrinam, & fœtum. *Anus* in utroq; sexu, & in Viris pudendi foramen, nihil externi excipiunt, sed excrementis tantum exonerandis sunt destinata. Per

umbilicum, dum adhuc vteri cancellis fatus includitur, sanguis maternus per vasa umbilicalia recipitur, cæterum nihil expellitur. Per infinitos autem illos cutis poros primo tenuior ac serosior sanguinis pars evaporat, quæ vbi copiose prodit, aut concrefcit, sudorem generat: siu parce, aut non coeat, insensibiliter evanescit. Prodit & pars crassior, & fuliginosior, ex qua pili: tum tertix concoctionis excrementa, è quibus cutis sordes: & oleosi tandem ac viscidi vapores, vnde Cuticula generatur. Transpirant autem hæc tum beneficio caloris innati, tum Medicamentorum discutientium, quam transpirationem Græci ἀδρλον διαπνολῶ, insensibilem appellant, quia externis sensibus inuestigabilis non est, ratione tamen colligitur, cum videamus sponte, vel ope medicamentorum tumores præternaturales sic discuti, vt tota materia in ipsis in halitus inconspicuos absorbeatur. Quare cum per tot foramina, & infinitos cutis meatus partes corporis interiores expurgentur, non mirum est, quod scripsit Hippocrates, eos qui cutem rariorem, & frequentioribus poris perviam habent, ab internis minime lædi, densam autem & duram cutem habentes, facile offendi, quod excrementis in corpore contentis non pateat liber per cutem exitus. Præclaram quoque aliam apud eundem legimus sententiam. 6. Epidem. sect. sexta, vbi cutis raritatem Ventrus constipationem pronunciat. Quæ certe sententia etsi prima fronte apprime mira videatur, ita tamen vera est, vt merito oraculi loco sit habenda. Humiditate enim excrementorum, ad cutem conuersa, sicca necessario alvi recrementa, & per consequens alvuseriam ipsa dura redditur. Per hæc cutis spiracula insigne quoque refrigerium corpori accedit, non tantum quia sic à calidis excrementis liberatur, verum & quia non nihil externi aeris per ea recipiat, cum & per hæc virtutes medicamentorum exterius vix corpus attingentium, vsque ad intima viscera penetrent, vt ab iis, quæ periapta dicuntur, fieri videmus. Quod si cutis hæc spiracula occludantur, calor internus augetur vt fieri solet tempore coctionis alimenti, quo revocatis ad interna spiritibus & sanguine, pori cutis occluduntur à privatione caloris, qui locum habet frigiditatis, ex quo retinetur intus calor, & augetur. Obtrinit autem cutis, qua parte crassior est, poros evidentiores, quod inde plura è subiectis partibus crassioraque excrementa ad cutem eleventur, tum etiam quia in crassa cute, cum ductus longiores esse debebant, merito ampliores conditi sunt, ne levi facta mora, in via hæreant, & obstructions facilius pariant. In faciei nonnullis partibus, & in vola manus, tenuissima est, & ægre à musculis subiacentibus separatur, quod ex partes, aut exquisitiori tactui sunt destinatæ: aut firmiorem apprehensionem præstare debeant. Propter hanc cutis tenuitatem in vola manuum, calor maior, quam aliis partibus percipitur, si quando in Iecore aut Corde nimius est. In facie vero, ira, tristitia, & aliæ animi perturbationes statim se prædunt, mutato variis modis colore. Dum enim commoverur in affectibus animi sanguis, & vel ad cor recedit ab externis partibus, aut à corde in has effunditur, eius perturbationem cutis in tenuissima, statim per coloris mutatione indicat. Moverur autem cutis in fronte, quia musculis arctissime connectitur, qui voluntarii motus sunt organa. Voluit enim Natura, vt Homo ipso vultu, omnem animi voluntatem, desideriaque exprimat, si quando verbis aperire non liceret.

Restant:

Restant adhuc duo in Cute consideranda, quorum alterum apud Recentiores cōtroversum est, alterum à me proponetur. Quæritur enim passim, an cutis Tactus sit organum, quod summus Philosophorum Aristoteles insensibilem esse scribat. Libro enim tertio de historia animalium capite vñdecimo ἀναισθητον, inquit, τὸ δέρμα πρὸς τὸ μὲν ὄντι καὶ αὐτὸ, μάλιστα δὲ τοῦτον τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ, διὰ τὸ μετὰ τὸ ἀσπαράσσειν εἶναι πρὸς τὸ ὄντι. Quæ verba quia doctissimus alias Theodorus Gaza haud satis fideliter expressit, sic interpretari libet. Sensu autem cutis ipsa per se caret, maximeque hoc in capite contingit, quod inter cutim & os, omnium minime caro sit interposita. Contra prima historiarum animalium quarto, tactum in corporis parte similari ponit, ut in carne, aut aliqua huius generis. Opinionem hanc Aristotelis, & ratio videtur stabilire, cum videamus carnem detectam cute dolere magis, quam cutem, adeoque sensu pollere acutius. Præterea cum cutis æqualiter omnia non sentiat, ex Avicennæ autoritate, tactus organum minime censetur, quod omne Sensorium & extrema & media obiecta æqualiter sentiat, uti oculus, qui medios & extremos colores suscipit. Galenus tamen contra, quem multi (& præsertim Medici) sequuntur, Cutem tactus organum statuit, motus temperamento, quod moderatissimum accepit, tum nervis, qui cum spirituum sensibilibus latores sint, infinitis extremitatibus in cute finiantur. Accedit, quod cutis tangilibus obiectis vicinior est, quam caro, cum totius corporis quidam sit quasi terminus. Sed enim utraque sententia conciliari facili negotio potest, tametsi Philosophi & Medici tantopere inter se decertent. Id tamen necessarium est, ut prius recte Aristotelis mens accipiat, quæ à quibusdam nimis maligne torquetur. Plurique enim, qui eam animo imbibere sententiam, Aristotelem prorsus Anatomiarum rudem fuisse, dum vnum atque alterum eius textum legere, misero sic malitiose insultant, ut neque quid velit Philosophus, neque quæ loquatur, si à Galeno dissentire ipsis videatur, considerare cupiant. Hinc indicta causa condemnasse sufficit, quia præiudicium fatuum, sanæ menti nullum relinquit locum. Idem certe & hic optimo Virò contigit, ut ex ignorantia vocum, quibus aliter paulo, quam Galenus usus est, quod alio scilicet tempore scripserit, graves calumnias audiat. Per Cutem enim cuticulam intelligit: per Carnem autem quicquid quocunque modo fibris nerveis intertextum est. Quamobrem & per carnem non tantum veram, & primario dictam intelligit, qualis est illa musculorum, sed etiam quæ Cutis Galeno dicitur, tum membranas nervosque, & sic revera tactus sensorium quam optime exprimit, cum illud certum sit, vnum & immediatum esse constituendum. Quodcunque autem ex his ponas, alterum obicietur, cui non quadrabit, quod à te statutum sit. Galenus autem per Cutim, veram cutim cum cuticula iunctam intellexit, & Cutim ad simpliciter, Cuticulam vero ad bene sentiendum conditam esse statuit. Cæterum ut constat, Galenus recte quidem cutim ipsam sentire credidit, at immediatum tamen tangendi organum non ita bene, ut Aristoteles, expressit. Si enim verum est, cutim proximum tactus instrumentum esse, quæ causa erit, cur membranae remota cute supraiacente sentiant, & viscera, quæ cute carent, itenique nervi? Caro ergo immediatum instrumentum est, non quidem illa muscosa, sed quæ pars est similis, fibris

nerueis intertexta, quæ & musculis, & membranis, ac cuti comperat, etsi sui quæque postea sit generis. Sed de hac re inferius plura dicemus, cum de instrumento tactus agendum erit. Caterum, quod dixi, cuticulam ad bene recteque sentiendum datam esse, ex Galeni dogmate; facit ut hoc loco moneam, multum referre diligenter hoc annotasse. Videmus enim sæpenumero grauer eos, qui medicinam faciunt, errare, dum in quibusdam tumoribus internis frigidos humores & pituitam causam constituunt, quod agri de frigiditate quadam conquerantur, cum potius calidi humores sint & biliosi, qui peccant. Nam quod frigiditatem persentiunt, non fit, quia frigidus humor sit, sed quia cutis ab interna sua facie, & caro quæ cuticula caret, sentiendi quidem, at sensibilia dignoscendi & dijudicandi perfectum instrumentum non sunt, nec percipere obiecta sub propria forma queunt, hoc est, calidum sub specie calidi, sed potius sub forma frigiditatis. Nunc videamus, quæ causa sit, quam propter Homo non quauis sui parte, ut cætera quadrupeda animalia pilis tegatur, sed in alijs tantum atque alijs partibus nonnihil pilorum habeat. De hac re ut iudicium feramus, causas pilorum prius explicare necesse est. Communis ergo & recepta hætenus ab omnibus sententia est, *materialem* pilorum causam esse tertiæ coctionis excrementum, hoc est, fuliginosos vapores, per cutis spiracula, & poros transeuntes: probabo tamen libro ultimo, sanguinis potius esse crassiorem partem. *Efficientem*, calorem qui pilorum materiam, tum ad cutim propellit, tum siccatur, & in pili formam reducit. *Finem* tandem, ut cutem, & ei subiectas partes tueantur, ornent, & à fuliginosis excrementis corpus liberent. Caterum homo, ut breuibus agamus, prona sui parte pilosior est, quam supina. Pectus enim habet, siquidem mas sit dorso pilosius, & ventrem ab umbilico usque ad peritonæum densissimis pilis horridum. In femore item, & tibia pili frequentiores longè antica parte, quam posteriore videntur: ad solum caput in postica pilosum est. Contra euenit in canibus, plurimisque alijs quadrupedibus, quæ supina parte pilosiora multo sunt, quam prona, caput tamen minus, quam collum dorsumve pilis horret. Homo ergo pilosissimum habet caput parte posteriore, & circa verticem, quod cum erectus corpore incedat, has partes habeat externis iniurijs, præsertim ex alto cadentibus, quales sunt pluuiæ grandinesque, magis obnoxias. Prona autem parte capiti subiecta sexus masculeus in homine pilis abundat, præ supina, quod recta incedens inter progrediendum currendumque recto corpore hanc partem plurimis exponat malis. Si quis enim per pluuias niuesque & ventos obambulet, anteriorem partem maiores pluuiarum iniurias perpeti, quam posteriorem viderit. Ex quo fit, ut qui septentrionales plagas incolunt, & Germani adeo ipsi anteriorem partem præ posteriore vestibus crassioribus aut pluribus muniant. Fæminæ glabro magis pectore sunt, & prona parte, quod carnosiores ibidem, quam Viri. Canes contra, cæteraque animalia quadrupeda cum prona incedant, prona parte minus cæli & tempestatû iniurijs exposita sunt: supina magis, unde in hac pilis crassioribus, longioribus ac densioribus armantur. Et hi ipsi pili à dorso paulatim versus latera inclinant, ut cutis, quantum fieri potest, minimum madefiat, sed aqua instillans protinus ad latera declinat, &

*Cur Homo interpellatus se-
rie pilis
tegatur.
Pilorum
causa.*

nat, &

nat, & inferior pilus superioris ductū excipiat, ac sequatur. Cæterū quo magis Omnipotentis illius nostri Opificis sapientiā admiremur, silentio hoc minime inuoluēdū est pilos densiores longioresve esse animalibus, pro cæli in quo versantur aut nascuntur temperie, iteq; p̄ morū varietate. Quo ergo frigidior regio est, aut ventosior, eo animalia pilis lōgioribus densioribusq; sunt vestita. Hinc fit vt Irlandia, quæ vna est ex Septentrionalibus regionibus frigidissima, canes p̄ducatur, quorū pili ob prolixitatē Leonis jubarē emulantur. Sed & Canes, quorū opera in aquis ad venationes vtimur, densissimis pilis donati sunt, ne vis aquæ aut frigoris ipsis noceat. At venaticis canibus, qui sylvas cāposq; incolunt, breues paucioresq; largita est sapiētissima parens pilos, ne cū ad cursū destinati sint, pilorū copia & longitudine impediatur. Allatū etiā est superiore ætate ex India nouū quoddam canū genus, pilis vndiq; nudum, si mentum duntaxat excipias. Summa .n. cæli temperies, & perpetua nullis nubibus tentata serenitas pilorū tegumenta repudiat. Et hanc causam esse reor, quod sues in Italia quoq; rariores habeant setas pilosq;, quam in Germania, aut Belgio. Quinimo huc pertinet, quod à Nauigatoribus accepimus, qui nouā Semblam perlustrati sunt, quæ regio ob intolerabile frigus perpetuasq; niues & ventos inhabitabilis est, albos ibi vrsos reperiti, tam densis & prolixis pilis obritos, vt tormentis bellicis lædi aut occidi minime potuerint. Contra Æthiopes & qui Africam incolunt, capillos habent breues, crispes, & raros, barbā similiter crispam, & raram: at Europæi, & si qui in alijs frigidioribus locis habitant, prolixiores comas barbamq; alunt, & quo frigidior quæq; regio est, eo vberiore prouentu & lætiore barbam profert. Vnde fit, vt Germani Italiam prolixiorē ferant, & visi sint nonnulli, qui barbam pedibus tenus longam in sinu reconditam gestauerint. Sic unicuique animali clementissimum illud ac omniprouidum Numen prospexit, vt quam commodissime hoc, quidquid habet jucūdiſsimæ huius auræ beneficio fruatur.

CAPVT II.

De Pinguedine.

PINGVEDINEM, quam Græci *πινελω*, & *πίπτια*, Latini pinguedinē & Pinguedinem appellant, Author lib. definit. Medicar. definit, affusionē esse alimenti, sensus expertem, maxime circa membranas concreſcentē. Nos *humorē dicimus oleosū nostri corporis, à calore moderato eleuatum, & circa frigidiores densioresq; partes concretum.* Sunt autem duæ pinguedinis species, *vna*, quam Adipem simpliciter vocant; *altera*, quam Sæuum: illam Græci *πινελω*, hoc *σάπ* appellant. Differunt autem pluribus inter se modis. Primo, quod in diuersis animalibus generentur, cum adeps in ijs nascatur, quæ ab vtraque parte dentes sunt, cornuum expertia, ac multifida. Sæuum autem in illis, quæ ab vtraque parte dentes non habent, & cornua gerunt, tum sanguinem crassiorem obtinent. Præterea sæuum concretū frangitur, adeps non frangitur. Adeps facile ab igne liqueſcit, non autem facile congelatur, mollior, & humidior remanet: at sæuum non ita facile liqueſcit, at liquefactum celerrime coit. Hanc differentiam diligenter obseruatam fuisse à Celso videre licet, dum adipem vocat bouinum, vrsinum, caninum, felinum: Sæuum autem bubulum, hircinum, caprinum. Nonnulli tamen sunt Medici, qui promiscuē

*Definitio.
Dua pinguedinis species.
Differentia vtriusque.*

Materia.

miscuè vtuntur, & quamcumque oleosam substantiam cuiusque animalis adipem aut sæuum pro lubitu appellant, vt monuit Galenus, qui tamen & ipse proprietatem hanc vocum sæpè neglexit. Quin imo lib. 11. simpl. cap. de pinguedine, Si voles, inquit, oleosam & pinguem in animalibus substantiam omnem adipem appellato: sed & pinguedinem appellare totum hoc genus licet. Sternitur autem pinguedo hæc, de qua nunc agimus, inter cutim & membranam carnosam in homine: in brutis vero membranæ subijcitur, vnde fit, vt cutem vniuersam moueant. *Materia* pinguedinis sanguis est, vt testatur Galenus, 2. de temperam. 3. & Aristoteles 2. de part. 5. quod ratione confirmare licet, cum nullum ex ijs, quæ sanguine carent, vel adipem habet, vel sæuum, siquidem sanguis deest. Non tamen quiuis sanguis est, sed optime tantum elaboratus & concoctus. Vnde quibus concoctio laudabilis non est, pinguedine destituuntur, & quæ pinguis sunt sanguinem purum ac paucum habent: macri autem omnes atricolorem, crudum, ac copiosum, cum latis venis. Nec tamen & concoctus omnis pro pinguedine aptus erit, sed qui oleosus est. Vnde Galenus cum ex sanguine pinguedinem gigni docuisset, 2. de temperam. 3. & 16. de vs. part. 2. addit, gigni ex sanguinis portione oleosa, siue pingui, per tenues venas effusa. Oleosum autem hoc ex aërea, maximeq; laudabili alimenti parte coctione conficitur & in sanguine perquam benè responderet butyrosæ substantiæ, quæ sic vocatur in Lacte. Vnde & videmus animalia pinguis butyri plus in lacte continere, minus macra. Gignitur autem maxime post tertiam concoctionem, Medicis sic vocatam, quod tunc maxime aptus sit, & elaboratus sanguis. Vnde & Philosophus 3. de part. animal. cap. 9. finem probæ concoctionis sanguinæ adipem & sæuum esse testatur. Loquitur autem de coctione sanguinis, quæ in renibus fit, in quibus cum alia non fiat quam tertia illa dicta, recte colligitur, secundum Aristotelem in illa tertia coctione fieri. Accedit, quod in quauis parte tum temporis demum ex sanguine eleuentur vapores illi oleosi, qui allidentes ad membranas in pinguedinem, quemadmodum crassiores reliqui in carnem mutantur. Cum ergo sanguis materia sit pinguedinis, sed sanguis maxime oleosus, & concoctus, patet infantes, quibus tum sanguis in alimentum partium absumitur totum, quod adhuc crescant, tum serosus admodum est, non pinguescere, verumq; esse, quod 3. de histor. animal. cap. 18. prodidit Aristoteles, omnia ætate prouecta potius; quam nouella pinguescere: sed præcipuè, cum iam suæ longitudinis, & latitudinis modum adepta, augeri in profundum incipiunt. Patet etiam eos, qui obesi valde sunt sæcundos minime esse, aut salaces, cum materia seminis in pinguedinem absumatur. *Efficiens* duplex est, prout duplex est actus generationis ipsius pinguedinis. Debet enim & materia ipsa attolli, & deinde concrefcere. Eleuat igitur sanguinem oleosum, in vapores resoluendo Calor; sed calor non quiuis, sed *moderatus*, cum *nimius* materiam adurat, & in bilem vertat, *moderato* minor, nec concoquat bene sanguinem, nec in vapores resoluat. Qui ergo calidi nimium sunt, pingues esse non possunt: neque qui frigidum nimium temperamentum sunt nati. Vt autem concrefcant, debet alicubi appellere, ne dissipetur: appellere autem debet ad corpus non quodvis, sed frigidum. Maxime ergo accommodatæ sunt membranæ, quæ vtramque hanc conditionem obseruant, cum & ob densitatem suam non facile oleosum hunc vaporem amittant, & ob frigiditatem facile condensent. Voco autem frigiditatem

*Cur infantes obesi nō sint.**Cur obesi infacidi. Efficiens.*

ditatem non illam quæ positiua à Philosophis appellatur, cum talis, vita remanente, nulla in corporis parte detur: sed calorem qui minor est, quam ille, à quo vapor eleuatus est. Nec mirum videri debet, quomodo minor calor concretionem efficiat, cum videamus plumbum liquatum, vbi ab igne remouetur mox cogi, etsi in locum satis calidum, igne tamen paulo frigidior, peruenerit. Hinc fit, vt animalia hyeme pinguiora fiant, cum & obstructa sit cutis, & frigidiores externæ partes, internæ autem calidiores, vt & concoquere melius alimentum, & coctum eleuare ac in vaporem soluere queant. Ijs etiam qui versantur in calidioribus locis, & exercitijs dediti sunt, nulla aut perquam pauca pinguedo est, quod consumatur materia illa; at ijs, qui otiosam vitam agunt, copiosa prouenit. Circa membranas igitur quam optime gignitur, quod nulla pars sit aptior ad concretionem faciendam, neque densior. Concrescit autem sic, vt ipsas membranas vndique inuoluat, & in minimos quosque poros sese insinuet, adeoque per vniuersam membranam pinguedo dispergatur, quod quiuis, si quam in hac re vel obiter collocare velit operam, aduerterit. Et ex his facile responderi potest ad vulgatam illam quæstionem, an pinguedo sentiat? sentire enim pinguedinem dicas, si quis hac voce intelligat pinguedinem, quo pacto Anatomici crassa minerua loquentes, sumunt, vt dum pinguedinem dicunt totum hoc, quod ex pinguedine strictè accepta, & membrana circa quâ concreuit constat. Non sentire inquires, si pinguedinem intelligat à membrana illa separatam, vt est illa, quæ propriè & à Medicis sic dicitur. Cæterum hoc loco dubium occurrit, cum dictum à nobis sit eleuari à calore vapores oleosos, itemq; eosdem concrefcere à calore partis vnius & eiusdem, quo pacto ab eadem causa duo diuersi effectus sequantur, ab vno scilicet calore. Sed respondeo, haud simplicè esse calorem nostri corporis, sed duplicem; vnum, influentem; alterum, innatum. Influentem constituunt spiritus; innatum, temperamentum ipsius partis. Ille, maior est; hic, minor: ille, eleuat; hic, cogit, ille, calor vere dici potest, hic, respectu illius frigus. De *Temperamento* adipis quanquā plurimum concertant inter se artis proceres, ex causa tamen materiali, quæ concoctus est sanguis & aëreus; ex efficiente, qui calor est; ex forma eius, quæ oleosa: ex fine tandem, qui est concoctionem iuuare partium, vnde in copia omento accrescit, facile iudicatur calidus esse. Sed imprimis & Galeni autoritas noranda est, qui 4. de vsu part. ca. 9. pinguedo, inquit, quod calida res sit, cognoscitur sensu ipso, vt entibus ea vice olei. Indicatur autem id non minimum, quod facile in flammam tranſmutetur, tanquam ad flammam proxime accedat, nihil enim frigidi promptè comburitur. *Alba* est in omnibus animalibus, in homine tamen minus, quam in cæteris animalibus senioribus etiā flaua fit. *Differt pinguedo copia*, ratione sexus, ætatis, temperamenti, regionis, partium, vitæ generis, temporis anni, & tandem morborum. Copiosior enim fæminis est, quam Viris. In recenter natis nulla est, at in ijs qui iustam ætatem attingere, copiosior. Calidis & siccis, nulla aut exigua; at calidis & humidis moderatè copiosa: frigidis item moderatè & humidis. Qui calidas incolunt regiones, aut calido anni tempore degunt, minus pinguescunt: ac qui in frigidis, & frigido tempore viuunt, copiosam habent. Vitæ genus sedentarium etiam obesos reddit; at valida & continua exercitia, maximeque curæ, macros reddunt. Inedia etiam & morbi longi prorsus absumunt. Sed & partes

An pinguedo sentiat.

Dubitatio.

1.

Temperamentum.

Differentia à pinguedine.

2.

non omnes habent, neque omni tempore: sed ea tantum, quæ indigebant. Sic clunes; habent copiosam, ut commodius sedeamus: sic omentum, ut foueat calorem internum. viscerum: sic eadem de causa abdomen. At cerebrum, palpebræ, & aures, manusque carent, quod ipsorum actioni nimium incommodasset. Ut autem partes ipsæ pinguedinem generent, præter materiam, sanguinem inquam oleosum, qui in corpore redūdare debet, vasa primū requirunt magna, unde fit, ut circa palpebras & caput pinguedo nulla nascatur, at copiosissima circa collum, nates, & lumbos. Deinde ut membrana adsit crassa, quæ prohibeat evaporationē, unde pulmones carent, qui tenuissima inuestiuntur membrana. Tandem, ut calida sit pars, quæ bene coquat sanguinem, & attollat, unde partes externæ & cerebrum non habent, reliqua autem viscera omnia, ipsumque adeo etiam Cor, etsi Aristoteles negarit. Cæterum non vniformis est pinguedo, quæ in humano corpore reperitur: sed sub cute quidem adeps: at scævum circa omentum, renes, cor, oculos, & ossiū articulos. *Vfus* pinguedinis multiplex est, quatenus tum vniuersum corpus inuestit, tum quibusdam partibus adnascitur. Ut enim totum corpus contegit, & aduersus externas iniurias protegit, & calorem naturalem conseruat. *Genera-
lia.* Protegit quidem, tum contra frigus, tum calorem, adeoque & æstiuo, & hyberno tēpore. Et *æstiuo* quidem aduersus calorem, quia cum aer tum tenuis sit, & pori aperti, quatenus oleosa est pinguedo, eius in corpus ingressum prohibet, nō se cus ac videmus Sepia-riarios, dum succos conseruare student ab aere, oleum superfundere: deinde quatenus aer omnes partes exsiccat, rursus humiditate innata conseruat. *Hyberno* contra frigus, ne penetret, & lædat viscera sua qualitate, quia pinguedo à leui frigore constringitur, & quasi coit, unde fit ut nequeat aer penetrare. *Conseruat autem calorem internum* pariter *tempore calido*, quia, ut modo dictum, quatenus oleosum est, exire & dissipari non patitur: *frigido autem*, quatenus sua caliditate fouet. *Particulares autem vsus*, quæ diuersis partibus præstat, plures sunt. In *clunibus* puluinaris vicem gerit; in *musculis* explet loca inania; *Vasis* substernitur, ut tuto eant; in *Visceribus*, coctionem iuvat. His nonnulli alium adhuc usum assignant, nempe ut inedia tempore sit loco alimenti. Existimant enim pinguedinem quo pacto antea vaporis specie ex venis excidit, ita postea in venas redire, ac in sanguinem mutari, quod tamen falsum esse credo.

CAPVT III.

De membrana carnosâ.

SV B Pinguedine membrana reperitur, pinguedinem ita vndique complectens, ut cum ipsa multifariam diuidi queat. Hanc Græci *ὑμὴν σαρκώδην*, Barbari panniculum carnosum, Recentiores latinæ linguæ studio magis addicti; Membranam carnosam appellant. Vocatur autem carnosâ, non quod carnosâ sit in homine; sed quod in brutis, quorum corpora prius dissecuerunt primi Anatomici, carnosâs fibrâs conspersâ fuerit reperta, ut nonnulli propterea musculum asseruerint, quamquâ certe & in multis animalibus muscoli fungatur actione, cum huius beneficio cutis reddatur mobilis, in canibus, equis, aliisq;. Rerentum ergo fuit hoc nomē postea in homine, & imposuitur membranæ illi, quæ cum ipsa habuit analogiam. Sic supra musculos vocatos esse diximus;

mus, omnes eas partes, quæ analogiam vllam obtinere cum musculo, cui merito illud nomen tributum à principio fuerat. Est tamen & in quibusdam locis in homine carnosæ, vt in fronte, & collo, quamuis vtrouque musculus dicatur esse. Adhæret autem cuti vsque adeo valide, vt difficulter ab ipsa separetur. In recens natis rubra est, at in adultioribus alba. Oblita est interius mucoso & lento quodam humore, procul dubio ad faciliorem musculorum motum, ne ob frequentem motum, musculorū superficies exsicceetur. Sensum exquisitissimum obtinet aliarum membranarum in morem, vsq; adeo, vt vellicata ab acribus humoribus, aut puncta, motum concussuum & horrores excitet, quales in febribus aduerti solent. *Vsus* eius est, vt sua densitate vapores eleuatos à sanguine excipiat, & frigiditate respectiua, condenset, sicque firmus sit paries cui pinguedo adhæreat; tum calorem foueat internarum partium, ne aut dissipetur in nimium, aut lædatur ab externis iniuriis. His addunt nonnulli, vt cutim adeuntia vasa fulciat, cū inter hanc & cutim ferantur omnes illæ arteriæ vel venæ, quas subcutaneas appellant. Sed reuera membrana carnosæ à pinguedine non ita iure distinguitur, cum eius gratia potissimum facta sit, vt scilicet oleosos vapores & pingues excipiat, tum & ipsa membrana ad pinguedinem ita se habeat, quemadmodum fibræ in carnibus & musculis, vt cuius patebit, qui tractare pinguedinem voluerit. Vbique enim dispersa quasi filamenta membranæ per ipsam conspiciet, plenaque veluti fibrarum esse. Accedit, quod in obesis à pinguedine distincta neutiquam reperiatur.

CAPV.T IV.

De Peritoneo.

ABLATIS^a quatuor tegumentis communibus, de quibus nunc diximus, ^bMusculi abdominis occurrunt, quorum quinque sunt paria, vt supra libro quarto, docuimus. Primum, Obliqui sunt Descendentes, secundo Ascendentes, hinc Recti, & Pyramidales, quibus postea omnibus Transuersales subiacent. His ergo & ipsis re-
^cmotis vna cum tendinibus ^cMembrana quadam occurrit totam infimi Ventris cavitatē succingens, quæ Græcis περιτόναιος χιτών, hoc est, tunica prætensa, aut περιτόναιον σκέπασμα, id est, operimentum prætensum, interdum etiam simpliciter περιτόναιον dicitur. Hippocrates
^e7. Epidem. etiam περιτόναια in plurali numero nominauit. Arabes Ziphach appellant, cō-
^emuni membranatū nomine, κατ' ἐξοχὴν. Latini Græcam vocem Romana ciuitate donarunt, & Peritoneum vocant. Non desunt tamē, qui vocibus magis, quam rebus additi, Abdominis membranam nominant. Dicitur autem peritonæum περιτὸν περιτένειν, ab
^eofficio quo fungitur. Prætenditur enim non tantum infimo ventri vniuerso, sed etiam
^eomnibus ipsi inclusis visceribus, quibus membranam largitur. Comparatur à plerisque
^eob figuram, sacco, qui spherica figuræ sit, & oualis, oblongus, ac nonnihil depressus.
^eInterior superficies, qua viscera respicit, læuis, æqualis, ac lubrica, humore quodam
^eaqueo in abdomine contento irrigata: exterior vero, qua musculis abdominis adhæret
^easpera & inæqualis. Substantiam habet membraneam, tenuem quidem, at validam
^e& densam, fibris quibusdam exiguis præditam, quæ extenso & distracto leuiter perito-
^enæo, (obscure tamen,) compareat, vt propter hanc causam aranearum telis sit à non-

Appella-
tio.Etymolo-
gia.

Figura.

Superfi-
cies.
Substan-
tia.

nullis Anatomicis assimilata. Non tamen ubique eadem est tenuitas, sed sub umbilico crassior, usque adeo ut manifeste ibi duplicata videatur: supra umbilicum vero, & à lateribus ita tenuis, ut simplex omnino appareat. Quin imo neque æqualem crassitiem in omnibus visceribus, quibus circumtenditur servari conspicias: sed in quibusdam, teste etiam Galeno 6. administrat. anatom. s. seipso crassiore constare substantia, in nonnullis tenuiore. Hac ratione in Iecore tenuissimum visitur, itemque in Liene, minus in Renibus: crassum contra in Ventriculo, Intestinis, & Vesica, ita ut quibusdam imposuerit, credentibus esse partem peculiarem prædictorum viscerum. Andreas Laurentius in Viris à cartilagine ensiformi ad umbilicum usque crassiorem esse hanc membranam notavit; contra, in foeminis ab umbilico ad pubem, esse validiorem. Ego tamen, ut verum fatear, nunquam tale quid observare potui, nec Naturæ in hac re consilium intelligam. *Conexio.* Annectitur, superius quidem Diaphragmati: inferius, ossibus pubis, & ilium: antè validissime transversis abdominis musculis, & imprimis tendinibus, accirca lineam candidam: retro, capitibus eorundem musculorum, & membranæ nervorum, è lumborum vertebris prodeuntium. Anatomici autem unanimi consensu in ea sententia sunt, nullum esse viscus infimi ventris, nec ullam eiusdem arteriam, aut venam, quæ citra viscerum insertionem libera incedit, quin ab hoc membranam accipiat. *Exortus.* De exortu autem lris est, cum nonnulli peritonæi originem à ligamentis illis repetant, quibus cum vertebræ lumborum, & os sacrum connectuntur. Doctissimus Fallopius à validissimo nervorum plexu, à quo mesenterium oriri dicitur, pronasci credit: at Piccolhomineus Ferrariensis, cum quo & ego facio, duplex peritonæi principium constituit, vnum quod vocat principium ex quo, alterum quod appellat à quo. Illud geminum esse vult, primum à prima, & secundum à tertia lumborum vertebra, quia hic crassissimum, & non nisi disruptum separari potest, sic valide adnectitur: hoc à dura & tenui membrana cerebri derivat. Prodeunt enim circa dictas vertebra nervi, qui colligati inter se utraq; meninge, dum ulterius provehantur, membranam hanc constituunt. Nec immerito propterea hic adeo crassum est, cum postea in plurimas membranas, tanquàm productiones quasdam dividi & extenuari debeat. Ex qua opinione non male fortasse consensus illius insignis, quæ intestinorum & quorundam imi ventris viscerum cum capite est, ratione reddemus. *Duplicatio.* Observatio autem omnino dignissimum videtur, Peritonæum ubique duplex esse, sed præsertim circa lumborum vertebra, ubi Vena Cava, Arteria magna, & Renes utriusque interiacent. Sed & in hypogastrio, manifesto in duas tunicas dispescitur, in quarum amplo intervallo Vesica continetur, & Uterus. Quanquam igitur ex Galeni omniumque Anatomicorum dogmate constet, univèrsa infimi ventris viscera peritonæo includi, re vera tamen distinguendum est, & alia quidem in ipsa cavitate, alia vero extra hanc in spatio, quod ex duplicatione oritur, sita esse, dicendum. Et in cavitate quidem omnia illa, quæ à Venæ Portæ ramis nutriuntur, ut sunt illa, quæ nutritioni & coctioni ciborum famulantur: in duplicatura autem, quæ à Cava alimentum accipiunt, ut sunt ea, quæ modo enumeravimus. *Foramina.* Vasa quoque umbilicalia duplicato peritonæo, ut tutius incedant, fulciuntur. Foramina quoque habet, & superior quidem, qua Diaphragmati iungitur, tria. Primum in dextra parte, ut Venæ cavæ truncus

truncus ascendens; *secundum*, in sinistra, ut Oesophagus cum nervis orificio stomachi insertis; *tertium*, ut Aorta, Vena sine pari, & nervus sexti paris transeat. *Inferius* circa anũ, & inguina, ubi vaforum tria genera ad crura transmittit. ^c *Anterius* ut umbilicalia vasa, ^f Vena, inquam, & duæ arteriæ, & ^h vrachus exeant. ⁱ *Processus* etiam obtinet duos, in anteriore facie, iuxta pubis os sitos, vtrinque vnum, qui non minus in maribus, quam feminis reperiuntur. Sunt autem oblongæ productiones exterioris peritonæi membranae, Cucurbitæ, quibus Chymici utuntur, per quæ similes, arctæ superius, inferius laxæ. Hi foramina tendinum musculorũ obliquoꝝ & transversoꝝ egrediẽtes, in *Viris*, ad scrotum abeunt, & sic extra ventris cavitatem dependent: in *Mulieribus* autem, ad inguina producuntur, & in Vulvæ elatiorem sedem terminantur. Descendunt autem cum *illis* Venæ & Arteriæ spermaticæ una cum cremasteribus musculis, & remeant contra à testibus, similiter processibus istis inclusi cum parastatis, vasa deferentia: in *his* vero vteriligamentum rotundum, quod in latam ac nervosam exilitatem supra pubis os degenerat, cui Clitoris alligatur. Adhæret autem à principio interior peritonæi membrana exactissime, quæ foramen, per quod egrediuntur dicta vasa ex infimo ventre, constringit, & claudit, qua disrupta, exterior laxatur, & sic hernia fit, descendente postea vel omento, vel intestino, aut etiam utroque. *Venas*, & *Arterias* à vicinis partibus obtinet. *Nervos* autẽ exiles, ab iis, qui ad abdominis musculos propagantur. *Vs vs peritonæi* primus ac precipuus est, ut sit operimento omnibus partibus, quas investit, non solum quo ab externis iniuriis liberæ sint, sed etiam ne ipsorum calor, aut humores, exspirent, ve effluant. Nisi enim Iecur, Lien, Renes, & Ventriculus, involuta membrana hac forent, externa vaforum oscula, quæ in nonnullis valde sunt patentia, præsertim arteriarum, sanguinem effudissent. Hinc factum est, ut sollers Natura ijs visceribus, in quibus plures arteriæ sunt, & adeo discrimen imminet maius, crassioꝝ largita sit tunnicam, ut ab omni effusione tutam præstaret. *Secundus vsus* est, ut viscera omnia suis sedibus alligeret. Sic Hepatis ligamentum à peritonæo est, & omnes membranae, quæ ab ipso oriuntur, reliqua vinciunt. His vsibus ut satisfaceret, primo *figuram* dedit ovalem, sed depressam, quia talis erat ipsius infimi Ventris figura. Decet enim vestẽ, aut sepimentum, partis investiendæ aut obvallandæ figuræ coaptare. Quare & in aliis visceribus, quibus portio aliqua ipsius obducitur, figuram eandem observat. Porro *internam superficiem* lævam fecit, ut viscera in abdominis compressione citra offensam premerentur: & quo mollior adhuc contactus ille fieret, lubricam reddidit aquoso humore, in abdominis cavitate circa intestina natante, qui ne vnquam deficeret, ex vaporibus à ventriculo & cæteris visceribus exhalantibus, continuo regenerari voluit. *Externam superficiem* contra aspera est, ut transversis abdominis musculis validius adnæteretur. *Substantiam* autem largita est membraneam, ut facile distendi citra ruptionem, & in sese contrahi sine complicatione posset. Partes enim imi ventris, modo alimentis turgent, ut Ventriculus; modo flatibus, ut Intestina; modo sætu, ut Uterus; modo etiam vrina, ut Vesica; modo etiam evacuata in sese concidunt. Hanc autem membranam *firmam* esse voluit, quia non nisi magno cum detrimento; & incommodo peritonæum rumpitur, tum quia robore quoque indiget, ut viscera in suis sedibus alligata conservet. Nilominus tamen ne nimis pondere premat, tenuis est ubique, præterquam sub umbi-

Processus.

Vasa.

Vs vs.

1.

2.

e, K.
f, L.
g, M.M.
h, N.
i, P.P.

lico, quod magno consilio factum est, cum hac parte maxime omnium ruptioni opportunum foret. Sedentibus enim, aut stantibus, viscera ad imam partem deuoluuntur, quorum pondus vt innoxie peritonæum sustineat, hanc eius partem munire ac firmare debuit. Et hinc fit, vt quibus tenuius peritonæum à primo ortu contigit, in magna spiritus cohibitione, vehementi saltu, aut clamore, in quibus versus inferiora decidunt intestina, facili negotio peritonæum rumpatur. Est & circa viscera quædam *tenuius*, circa alia *crassius*. Nam in quibus copiosæ sunt arteriæ, & spiritus, ne dissipentur, vt in Liene: aut humores, vt in Ventriculo, ne effluant, ijs crassiorem membranam concessit. Crassior etiam ijs est, quæ repletæ valdè intumescunt, vt Vesicæ, vtero, & ventriculo, vt simul cum his extendi queat, quod fieri non potuisset, si tenuior his tunica obtigisset. *Connexionem* tandem cum musculis abdominis transuersis validissimam habet, ad æqualem ventris compressionem in respiratione, & sæcum expulsionem faciendam. Neque enim inter ipsa spatium licebat intercedere, quod musculis contractis peritonæum in rugas iuisset. Connexio autem hæc validior est circa tendines, quam carnosam partem, quod cum caro musculorum in abdominis compressionem contrahatur, impedita fuisset, nisi laxius carnibus connecteretur. *Exortus* causam nunc nullam inquiri, cum de origine adhuc sub iudice lis sit, & ego omnes partes, simul & formari & generari credam, quamuis de peritonæi principio, si quod est, maxime omnium Piccolhominei sententia mihi arrideat.

C A P V T V.

De situ, tam naturali, quam eo qui præter naturam est, omnium quæ in imo ventre continentur, viscerum.

Ratio ordinis in sequentib.

DI X I M V S ab initio huius libri, partes infimi ventris esse duplices, continentes, & contentas, siue externas alias, alias internas. De illis abundè hætenus egimus, restat nunc vt & harum historiam persequamur. Sunt autem duplicis generis, quædam enim considerari queunt, quatenus ad fœtum pertinent in vtero adhuc conclusum, quales sunt secundinæ, & Vasa vmbilicalia, de quibus in libro de formato fœtu complura diximus; quædam quatenus tum embryo ni, tum nato homini sunt communes, quarum tractationem nunc aggrediemur. Antequam tamen membratim de singulis agamus, prius omnium situm explicabimus, nec tantum eum qui homini competit, dum inculcata sanitate fruitur, sed etiam dum ab exquisita illa valetudine declinat. Argumentum non tantum vtile, sed & maxime necessarium omnibus cognitu, qui animum ad Medicinam appellant, vt tum affectas partes ex situ cognoscere, tum medicamenta applicare norint. *Viscera* ergo quæ in imo ventre coërcentur, vel indiuidui conseruationi, adeoq; Nutritioni inseruiunt, vel speciei, & propterea Generationi. Quæ ad nutritionem faciunt, vel ad coctionem alimenti conferunt, vel ad excrementorum in coctione genitorum expulsionem. Quæ ad coctionem conferunt vel primam faciunt, vt Ventriculus, qui cibum in ore masticatum in chylum conuertit, cuius propterea actio est $\chi\lambda\omega\sigma\iota\varsigma$, & Chylificatio dicitur: vel secundam, vt Venæ, præsertim quæ
in He-

Viscerum imi ventris diuissio.

in Hepate sunt, & Liene, ad quæ duo viscera chylum ex intestinis Venæ mesaraicæ, mesenterio deductæ, ferunt. Primam coctionem adiuuant Omentum, & Pancreas: secundam dictorum viscerum parenchymata. Excrementa autem suscipiunt, primæ quædem coctionis, Intestina: at secundæ, Vesicula fells. Serum vero quod *ζυμη* & *τροφῆς* Hippocrati vocatur, Renes, à quibus ad Vesicam demandatur per Vreteres. Generationi inferuientes partes, pro sexus diuersitate duplices sunt, Viriles, & Muliebres, de quibus postea dicturi sumus, dum huic tractationi colophonem supremum imposuerimus. Omnes ergo hæ partes infimo ventri includuntur, qui *superius* quidem septo transuerso, & cartilagine ensiformi; *inferius*, ossibus pubis; *anteriorius*, abdomine propriè sic dicto; *posteriorius*, lumborum vertebriis & osse sacro; *ad latera vtriusque* superius quidem, costis spurijis, at inferius ossibus ilium & coxendicis circumscribitur.

a, 8. 2. F. Cæterum ^aHEPAR in dextro hypochondrio situm est, concaua sui parte ^bVentriculum: conuexa vero diaphragma tangens. Hoc in medio ^cfissuram habet, in quam vena umbilicalis inferitur, à qua in ^dduas partes, (quas Lobos posthac semper vocabimus) dirimitur. Earum *dextra* dextrum hypochondrium totum occupat, ad renem vsq; eiusdem lateris pertingens, cui sæpè etiam incumbit. *Sinistra* breuior est, ad mucronatam cartilaginem extensa, quæ anteriorem ventriculi partem, ac pylorum ambit. Situs hic, qui Hepati naturalis est, non raro mutatur, sic tamen vt nullam quandoq; ipsius, aut vicinorum viscerum actioni noxam inferat: interdum vero vt grauiter lædat. Illum nonnaturalem situm vocabimus, hunc præter naturam. *Nonnaturalis* ergo situs quadruplici potissimum occasione contingit, dum vel decumbimus, aut sedemus, ambulamus, aut respiramus. *In decubitu* enim, si quidem *supini* jaceamus, intra præcordia se recondit, & Diaphragma premit, vnde fit, vt qui obesi sunt difficilius respirent decubentes, cum septum transuersum magna hepatis mole nimium afficiatur: at si in alterutrum latus voluantur, à ventriculo vel abscedit, vel eidem circumuoluitur. Abscedit quidè, si dextro innitantur: at amplectitur vndiq; , si sinistro. Hinc causam licet petere, quam propter in jecoris inflammatio e, ægri de dolore in dextro hypochondrio conquerantur decumbentes in latere læuo: contra minus doleant, jacentes in dextro. Trahitur enim tum ligamentum hepatis pendentis quasi, quod & ipsum cum sit inflammatum, non potest non graues dolores excitare. Patet autem ex his, eos qui cubitum ituri primum in sinistro latere dormiunt, multo rectius ciborum concoctioni consulere, quàm faciunt ij, qui in dextro recumbunt. Hepar enim ventriculum vndiq; ambiens mirum in modum chylificationem adiuuat, propriumq; stomachi calorem fouet ac tuetur. *In sedentibus*, aut *ambulantibus* ad umbilicum magis vergit. *In respiratione* autem, quemadmodum & cetera infimi ventris viscera, dum diaphragma contrahitur & inspiratio fit, versus inferiora descendit: at dum relaxatur, & exspiratio contingit, superiora petit. Ex quo fit, vt in cadaueribus Iecur sub spurijis cartilaginibus & in præcordijs reconditum semper inueniatur, cum expirando moriamur, & propterea simul cum Diaphragmate ascendat. *Præter naturalem quoq; situm* Hepar interdum occupat, quod euenit vbi prægrande est, & magnitudine laborat. Solet enim quibusdam in maximam molem accrescere, vt vtrumq; hypochondrium impleat, quod plerumq; nimium obesis obtigisse vidimus. Obseruatum autè à me est, huiusmodi voraces fuisse, quod propterea eue-

HEPATIS
situs
naturalis.

Nonnaturalis
situs.
1.

Præter-
naturalis
situs.
1.

nisse crediderim, quod eorum ventriculus plurimo calore sic circumdatus plus digerat, concoquatq;. Ita memini legisse me olim apud doctissimum Gemmam Frisū historiā mulieris, quę cum prodigiōsā fuisset ingluviei, post mortem hepar habuisse tanta mole præditum, vt membra spiritalia, vicinasq; omnes partes compresserit. Nonnunquā ab insigni inflāmatione sic tumet hepar, vt notauerim naturali loco non contentum, & ventriculū, & magnā tenuium intestinorum partē cooperuisse. Quod si vmbilicalis vena laxetur, rumpaturve, jecur ad Diaphragma sursum trahitur, cuius motus cum impediatur ob compressionē, fit vt vna cum respiratione, vita tollatur. ^{e, 7.2.H.} LIEN alterum hepar est, ex Aristotelis opinione, 3. de part. an. 3. ideoq; in sinistro hypochondrio ex hepatis regione situm. Hic *caua* sui parte ventriculum tangit, *gibba*, & *superiore* Diaphragma, at *inferiore* reni sinistro incumbit. Mutat & hic situm, partim à causis naturæ vim nullam inferentibus, dum sedemus, respiramus, aut decumbimus, quod tamen admodum exiguum est: partim ab alijs, quæ destruunt naturā. Euenit hoc potissimum laxatis ligamentis ab humorum affluxu, aut ab ingenti aliquo tumore, quod sæpius contingit. Obseruatum autem est vsq; adeo nonnunquam extensum fuisse, vt vmbilicum attigerit, nonnunquā etiam vltierius porrectum, non paruā dextri lateris partem occupasse. Narrat *Vesalius*, l. 5. de hum. corp. fabr. cap. 9. historiam adolescentis, cuius cadauer Patauij aperuit, in quo Lien in eam magnitudinem erat profectus, vt vix hepati cesserit, cuius anteriori parti adnatus etiam, ventriculum compresserat. Notauit & *Georgius Garnerius* vidisse se Lienem cuiusdam Nautæ, viginti tres libras pendentem, in abdomine tam latè protensum, vt totam eius cauitatem implere videretur. Vidi & ego frequenter maximos Lienes: sed & in Cuniculo aliquādo Lienem in dextro, Hepar autem in sinistro hypochondrio positum fuisse. Id quod idem *Cornelius Gemma* in humano cadauere vidit, & *Aristoteles* in alijs animalibus, vt testatur 1. histor. animal. 17. Cæterum quibus suo de loco mouetur Lien, aut quibus aliquo morbo laborat, & præsertim scirrho, ijs necessario Ventriculus imbecillior est, quia ad fundum calore illo, quem Lien sanus impertire solet, non fouetur, sed frigiditate potius extranea afficitur. Inter hæc duo viscera ^f VENTRICVLVS medio loco positus est, ^{f. 8.1.G.} ollæ instar inter carbones circum congestos. ^{G.} Superius huius orificium, quod stomachus dicitur, Lieni proximum est, & sinistrum hypochondrium tenet, à suo situm immobile: at *inferius*, quod Pylorus vocatur, contra dextrum hypochondrium spectat. Fundus in horum medio positus est, qui nonnihil situm suum mutat. Decumbentibus enim, ad Diaphragma magis ascendit, cui ratione superioris orificij adnectitur: stantibus & sedentibus ad vmbilicum cum pyloro descendit. Ventriculo etiam cibus repleto nonnihil ad inferiora, & abdomen antrorsum vergit. Quod diligenter notandum est vel ideo. vt pro stillicidijs alium atque alium locum eligamus, si æger decumbat, aut se deat. Satiùs tamen esse crediderim, vt sedentibus fiant, cum versus abdomen Ventriculus his voluatur: decumbentibus autem supinè, ad spinam retrorsum trahatur. Eligendus vero tunc erit locus, qui sub mucronata cartilagine in medio est. Porro in vulnerato diaphragmate ad superiora Ventriculus ascendit, cuius rei historiam *Pareus*, lib. 9. Chirurg. cap. 81. refert. Cum enim quidam in neruosa Diaphragmatis parte transfossus esset, post obitum Ventriculus, quem anxie in suo loco Pa-

LIENIS
situs na-
turalis.
Non na-
turalis.
Præter-
natu-
ralis.

1. 2.

VEN-
TRICV-
LVS
situs
naturalis.

Nō natu-
ralis.

1.
2.
3.

Præter-
naturalis.

co Pareus quæsierat, in Thorace repertus est, etsi vulnus, per quod ascenderat, vix pollicem latum æquaret. Notauit & Vesalius, lib. 5. cap. 4. Omentum ita præter naturam auctum fuisse cuidam, vt Ventriculum ex sua sede sic deorsum distaxerit, vt eius munere deficiente, varijsque singultibus o mortis, occasio mortis inde nata fuerit. PANCREAS naturalem suum situm non mutat, cum Ventriculi posteriori parti, eiusque fundo adnatum sit, quemadmodum & duodeno intestino, & Venæ portæ, quam intra se comprehendit. Vbi admodum intumuerit, id latus Ventriculi comprimit, ac

PANCRE-
ATIS si-
tus.

g. 8.5.I.L.

coctionem turbat. § DVODENVM *intestinum* similiter perpetuo eundem locum obseruat. Ortum enim ducit à pyloro, & ad posteriora sub ventriculo reflectitur, vt lumborum vertebris ligamentis membranis adnectatur, quo recta absque vlla circum-

DVODENI
situs.

b. K.L.L.

uolutione deorsum feratur. ^h IEIVNV *intestinum* totum ferè vmbilicalem regionem occupat: at ILEON in ilijs situm, quæ inde nomen acceperunt. Hæc duolocom non naturaliter mutant, *ventriculo* cibis referto, à quo comprimuntur. Sic in *valida spiritus retentione*, & clamore à Diaphragmate pressa descendunt. Contra dum *vterus*

IEIUNI &
ILEI situs
naturalis
Non na-
turalis.

plenus est, versus superiora ascendunt, & arctantur, ex quo fit, vt de alui duritie grauidæ ram frequenter conquerantur. In *stantibus*, aut *sedentibus* versus inferiora non nihil deuoluuntur; vnde herniæ stantibus magis, quam decumbentibus contingunt. Validiore vi descendunt in *cursum*, *saltu*, aut *equitatione*, à quibus hoc malum mirum in modum incrementa sumit. In *decumbentibus supine* versus vmbilicum se recipiunt; at ijs, qui in alterutro latere jacent, ad illud cui incumbunt. Præter naturam situm mutant *distentis intestinis flatibus*, vt in Colicis doloribus, multoque magis *laxato nonnihil mesenterio* ab humoribus, vt in obesibus, propter nimiam humiditatem. In *hydrope* in vmbilicum labuntur, quod diligenter ijs notandum est, qui paracentesin exercent. In *hernia* similiter ad vmbilicum, inguina, aut scrotum descendunt. In *volvulo* autem vna pars intra alteram reconditur, vnde Chordapsus nascitur.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Præter-
naturalis.

i. O.

1 CÆCVM in dextro ilio situm est, & naturaliter vix locum mutat, quod dextro lumbo alligetur: vidi tamen præter naturam in suspensio quodam, quem Patauij secumimus, cæcum totum cum parte ilei & coli, qua sibi inuicem nectuntur, in scrotum prolapsum fuisse. Id tamen an ex violentia mortis, in qua valide ob spiritum retentum, imi ventris viscera deorsum pressa sunt, an ex hernia antiqua contigerit, scire non po-

CÆCI si-
tus.

Præter-
naturalis.

l.P.P.P.

tui. 1 COLON in dextro ileo, vbi vacuus, & commodus locus est exoritur, ac reni dextro incumbens, ope peritonæi alligatum lateri, ascendit, sub hepate fellis vesiculam contingens. Hinc fit, vt bile transudante, luteo colore, qui semper in colo visitur, inficiat, & sæpe vlcera excitet, quæ in crassibus intestinis frequentiora multo sunt hac quoque de causa, quam in tenuibus. Inde sub fundo ventriculi per medium ventris transtuerim incedens, annexum inferiori omenti portioni, ad sinistram renem reflectitur, cui peritonæi beneficio alligatum, per inania eius lateris deorsum ad os sacrum fertur. Ad hoc vbi peruenit, in nonnullis dextrorsum reflectitur, deinde rursum ad os sacrum voluitur, vbi tandem in rectum intestinum terminatur. In quibusdam tamen circa hanc circumuolutionem recta, vbi primæ vice ad regionem ossis sacri circa initium recti intestini peruenit, finire solet. Ex quo vel nullo monente patet obiter, Colon intestinum in alijs atque alijs longius esse, aut breuius. *Hunc situm na-*

COLI si-
tus natu-
ralis.

Arabibus *Zirbus adiposa*, & interdum etiam simpliciter *Zirbus* vocatur. Dicitur autem *βηπιλον*, ὅθεν τὸ βηπιλεῖν, quasi supernatans, quod superioribus intestinis veluti innatet. Est autem *membrana* densa, ac tenuis, ex plurimis venis, arteriisque cum pinguedine copiosa in formam retis contexta. Quae enim parte pinguedo cernitur, vasis adnata, si- lum retis exprimit, quæ errabundo ductu varie inter se excurrunt; quæ vero parte mē- branea est, cancellos, seu vacua illa spatia, quæ retium chordis interiacent. Porro quo quisque obefior est, eo copiosior pinguedo in omento reperitur, ut nonnunquam ob- seruatum sit, copia & pondere suo peritonæum rupisse, aut valde laxasse. *Maximum* autem inter cætera animantia Homines habent, unde & *βηπιλονοπέσαι*, quasi *omentum gerentes* à Poetis dicuntur. Reliquis enim umbilicum vix attingit: at homini sæpe ad ossa usque pubis porrigitur. Mulieribus tamen magis, quam Viris, & obesis, quam ma- cris, unde in illis quidem vteri os comprimendo, sterilitatem: in his, peritonæum la- xando, herniam caufatur. Figura marsupium aucuparium refert, ut Galenus 6. de anatom. administ. testatur, cum è gemina membrana constet in fundo connexa, & orbiculatum orificium habeat. Id eleganter videre licebit, si ex eiusdem consilio a- qua repleueris. *Connescitur* semper, teste Galeno 6. adm. anat. §. tribus partibus, ^b Ven- triculo, ^c Lieni, & ^d Colo. Superior enim pars Omenti, fundo ventriculi, seu gibbæ eius parti secundum longitudinem adnascitur, & paulatim descendens, ad ilium & pubis fere ossa protenditur, mox subtus regreditur, & ad Coli intestini dextram par- tem, quæ Ventriculo proxime est subiecta, reflectitur, cui pauculis quibusdam liga- mentis, tum etiam ventriculi simis alligatur. Nonnunquam, eodem teste, Iecinoris fi- bræ, & spuræ cuidam costæ adnectitur. *Componitur* ex membranis duabus, quarum altera superior, altera inferior est. ^e *Superior* ad Ventriculi fundum, à tertia ipsius tunica & communi oritur, ac hepatis & Lieni cauo committitur. ^f *Inferior*, à peritonæo statim sub septo transuerso ad dorsum enascitur, & hepatis cauo, diaphragmati, ac duodeno intestino, tum lienis simo, ac tandem coli intestini toti illi parti, quæ sub ventriculo in- cedit, annectitur. *Exortus* ergo omenti ex iisdem est sedibus, quibus adnascitur. Ha- bet & vasa omnis generis. *Venas* à sola vena Portæ, & superior quidem membrana vtramque Gastroepiploidem, dextram & sinistram: inferior autem epiploidem dex- tram, & posticam. *Arterias* totidem à Celiacæ, & Mesenterico ramo. At *nervos* exiguos, à sexti paris ramo costali.

V s v s *Omenti* præcipuus est, ut Ventriculi & Intestinorum natiuum calorem pin- guedine sua foueat, & coctionem iuuet. Hunc Galenus lib. 4. de vs. part. 9. elegan- ter probat, adductis in medium exemplis eorum, quibus ob vulnus in abdomine in- flictum excidit, & postea abscissum est. His enim omnibus Ventriculi coctio læsa fuit, plurimisque tegumentis eguere, ut calorem imi ventris tuerentur. Contra tamen apud Forestum legimus, fuisse iuuenem, qui omento ablato nihilominus commode vixerit: sed huc trahendum non est, cum videamus quandoque in Natura plurima præter rationem fieri. Assignat & alium usum Galenus 4. VI. part. 11. qui statuit, tempore inediæ calori natiuo alimentum sua pinguedine suggerere. Quin & Hippo- crates, lib. de glandul. adhuc alium usum omento tribuit, humorem videlicet ab in- testinis copiose influentem, si à glandulis excipi & absumi vna vice non queat, in se

Etymolo-
gia.
Substan-
tia.Magni-
tudo.

Connexio.

Membra-
na dua.Origo.
Vasa.V s v s.
L.2.
3.

„ veluti in æstuario quodam asservandi. Glandulæ enim, inquit, in intestinis maiores
 „ sunt, quam alibi in corpore, & pascuntur humectationem nimiam ex intestinis expri-
 „ mentes: intestina vero ex vasis in omentum suscipiunt, ac remittunt humiditatem.
 Omentum autem in glandulas distribuit. Cæterum quia Author huius libri mea sen-
 tentia Hippocrates non est, cum Galenus in 1. comm. de art. 46. expresse scribat, Hip-
 pocratis librum de Glandulis iniuria temporis periisse, non multum in huius loci de-
 claratione laborabo: præsertim cum & absurda doceat, utpote Glandulas in omento
 reperiri, quod à nemine vnquam Anatomicorum statutum est. Nisi si forte Omenti
 nomine abusus est, & Mesenterium intellexit. Quicquid sit, quia præcipuus, ut dixi,
 usus est, Ventriculi & Intestinorum coctionem iuvare, videamus nunc quomodo
 huic vsui Natura satisfecerit. Primum ergo *figura* cavitati inferioris ventris accom-
 modata fuit, ut commodissime omnes ipsius partes contegeret. *Magnitudinem* autem
 obtinuit, quantum erat spatium tegendorum viscerum: sed homini tamen, quam re-
 liquis animalibus maius, quod cum erecto corpore incedat, nullisque munitus sit pi-
 lis, facile ab externis iniuriis lædatur, & tam à frigore, quam nimio calore. At enim
 cætera animantia cum prono corpore ambulent, tot cæli aerisque iniuriis non sunt
 opportuna: ut taceam, quod extremis cruribus foveant abdomen. Hinc fit, ut ani-
 malia, quæ omento destituuntur, quemadmodum sunt Lepores, & Cuniculi, abdo-
 minis calorem contractis pedibus foveant, maximeque post cibum assumptum, ut
 quod ingesserunt, felicius concoquât. *Substantia* membranæ est, ut commode disten-
 di & laxari posset, ventre repleto aut inanito: ad quam rem *tenuitas* ipsius plurimum
 facit, quantum vis & ne oneri sit subiectis partibus, prohibeat. Est autem *densa*, quo-
 minus internus calor dissipetur, aut externus aer ingrediatur. Illo enim expirante,
 debilitas omnium viscerum: hoc inspirante, corruptio sequeretur. Hoc nomine &
pinguedo copiosa intertexta est, quæ hic egregie olei officio fungitur, quod nostri Se-
 plasiarii expressis plantarum succis affundunt, ut ab externi aeris ingressu vendicen-
 tur. Non mirum ergo, si minus commode viuant, quibus omentum in magnis abdomi-
 nis vulneribus ablatum est. Non tamé totum omentum ex pinguedine propterea cõ-
 stat, sed quibusdam locis membrana singulari Opificis providentia interpellata est.
 Debuit enim dilatari & constringi quoque, quod munus membranæ substantiæ ma-
 xime omnium competit. Pinguedo autem hæc prope venas & arterias consistit, ad tu-
 telam vasorum, quæ externis quamplurimis periculiserant obnoxia, sed maxime
 compressioni, in ventris repletionem, & pluribus corporis motibus. Est autem *membra-
 na* ex qua Omentum conficitur, *gemina*, ut modo Ventriculo, modo Intestinis, quorum
 actio alterna est, inferuiat. Stomacho enim repleto cibus, at vacuis intestinis, superior
 membrana attollitur, relicta in suo loco inferiore: contra repletis intestinis, inferior
 ascendit. *Connectitur* autem cum superioribus partibus ab dominis, quod infimis anne-
 xum, dum homo erectus incedit, in se convolutum fuisset. Inferius liberum est, ut mo-
 do superior modo inferior membrana ascenderet. Imprimis tamen ventriculo alliga-
 tur, tamquam mediæ inter colon & lienem parti, à qua æqualiter dependet. Ne ta-
 men in decubitu ad latus hinc inde volueretur, à lateribus, lieni quidem in sinistro,
 colo autem & hepatis in dextro, adnexum est. Quo ad *exortum*, eo loco pronasci conve-
 niebat

niebat, cui iungitur, quod inde venas & arterias pro sanguine & vita hauriat.

Caterum sub finem huius capituli corollarij loco adicere libuit explicationem aphorismi Hippocratis, qui est quinquagesimus quintus septimæ sectionis, huc maxime facientis, & qui sine anatomica scientia declarari neuti quam potest. Inquit ergo *Hippocrates, Quibus Hepar aqua plenum in omentum irruerit, is venter aqua repletur, & moriuntur.* In huius explicatione duo quærentur, primo, per quas vias Iecur aqua plenum in omentum irrumperit, deinde an, & cur, necessario moriantur. Videndum tamen primum est, quid per Hepar intelligat, tum per aquam, inde Omentum, & tandem per verbum irruerit. Per *Hepar* enim duo intelligere licet, vel totum jecoris corpus, vel vnâ tantum ipsius particulam. Galenus exteriorem ipsius partem intellexisse videtur, cum in commento inquit, *hepar aptissimum esse ad generandas vesicas aqua plenas, & distensas dictas, & quidem in ea quæ ipsum exterius ambit membrana.* Meo tamen iudicio non inepte totum viscus hac voce sumi potest, quatenus ex venis & parenchymate constat, cum vniuersum venosum genus, quod in iecore est, aqua impleri, & distendi possit. Sed & ipsum verbum *μεδεν* id nobis tacite videtur insinuare, cum iecur aqua plenum dici non possit, si vna tantum ipsius pars non nihil aquæ contineat. Per *Aquam* autem similiter duo commode intelligimus. Primo quidem humorem serosum ac frigidum instar aquæ, quomodo accepisse videtur idem Hippocrates, lib. i. de morb. mulier. vbi hydropem mulieribus ab aquoso liene fieri scribit, cum mulier insigni febre laborans, plurimum biberit nec re vomuerit, aut per vrinas, sudores, vel alvum reddiderit. Tunc enim Lienem aqua repleti, quæ postea in Ventrem, aliasque partes fluat. Deinde & humor biliosus, tenuis, & aquæ instar fluidus, qualis plerumque iis, qui ascite laborant, in ventris cavitate continetur. Talis enim copiosissime in feruido iecore generari potest, præsertim ex vsu vini generosi, aut alimentorum, quæ hepatis calidam intemperiem augeant. Cumulari autem potest tum in ipso, tum in toto corpore, & venoso genere, indeq; ad iecur ob partis debilitatem transferri. Mea ergo sententia per aquam hoc loco vterque humor, & calidus, & frigidus, dummodo fluidus sit instar aquæ, sumi potest. Aquam hanc in Omentum eis *ὄντι* *πλεον*, irrumpere ait, quæ verba intelligi possunt, primo quasi dixerit, *ὄντι τὸ ὄντι πλεον*, supra omentum, in cavitatem abdominis, quæ scilicet inter peritonæum, & intestina continetur. Et in hac significatione videtur accepisse Galenus, in commento, dum inquit, ex vesicis hydatidibus dictis, quæ sub cute iecoris sunt, si perumpantur, aquam effundi ad locum membranæ abdominis interioris epigastrio respondentem, in quo aquæ hydropicorum congregari solent. Sumi etiâ potest pro substantia omentis, quæ ex venis, & arteriis constat, in qua notatione sumserunt nonnulli Recentiorum, auctoritate Hippocratis fulti, quilibet. i. de morb. mulier. Splenem aqua tumidum excrementa sua in corpus, & maxime in Omentum per venas deponere scribit. Sed & interna tandem illa cavitatis, quam omenti duplicatio constituit, intelligi potest. Nec ex his vna tantum est expositio quæ mihi arrideat, sed, si quod res est fateri debeo, omnes sanæ veræque videntur. Nec enim moveor auctoritate Galeni, qui negat in cavitatem omenti ex hepate quicquam influere, nisi prius exedatur, cum Anatomica inspectio me longe aliud docuerit, ut postea dicemus. Hæc autem aqua non destillat sensim, ut voluerunt

*Irrumpe-
re.*

quidam declarare verbum *ράγειν*, sed irrumpit, & magna vi ac confertim illabitur, *Ραγή* enim impetum fluxionis denotat, vt patet clarè ex 5. aphorism. 32. *ὅτι γωαγκί*, inquit, *αἷμα ἐμειούση, ἥρ' καταμηνίαν ραγύντων λύσις*. Mulieri sanguiné vomenti menstruis cōfertim erumpentibus, solutio accidit. Galenus enim in comm. testatur, Hippocrati in more esse positum, vt confertim factas euacuationes, siue arte, siue natura, per verbum *ράγειν* designet, adeoq; & in hoc aphorismo *ἥρ' καταμηνίων ραγύντων*, idem esse atq; *ἀθρόως ἐκκερύντων*. Et sanè & proprium est mensium in sanis mulieribus cum impetu fluere, non paulatim. Sic Aristoteles 7. histor. anim. 1. *τὰ καταμηνία καταράγειν* scribit, cum primum virginibus decimo quarto anno erumpunt. Irrumpere ergo hic fluxionem confertim factam significat, priorq; aphorismi pars, ex toto jecore serosum & biliosum humorem confertim excerni posse testatur, & quidem vel in omenti partem superiorem, quæ est in abdominis cauitate circumsepta à peritonæo & intestinis: vel in venas, quæ per omentum disperguntur, vel deniq; in partem interiorem, quæ est cauitas, quam duplicatum peritonæum constituit.

*Tres viæ
per quos
aqua in o-
mentum
irrumpit.*

Si quærat nunc per quas partes hæc fluxio fiat, vt tres sunt partes quæ per omentum intelliguntur, ita tres quoque vias esse dixero. *Prima* est exterior illa pars Iecoris, quam tegit membrana à peritonæo profecta, & quæ nullo modo omento includitur, aut eidem etiam alligatur. Hanc ipsam quoque viam agnouisse videtur Galenus, cum in commento huius aphorismi inquit, ruptis vesiculis aqua plenis in jecoris superficie contentis, aquam in abdominis cauitatem, cui Omentum includitur, effundi. Sed & citra vesiculas euenire potest, vt aqua confertim ex hac jecoris parte effluat, perrupta illa membrana à magna serosi humoris copia, vel exesa etiam à nimia biliosi acrimonia. Non minus hanc viam doctissimus Fernelius sciuisse videtur, qui libr. 7. de morb. & symptom. part. causam Hydropis ascitis non aliam esse testatur, quam viscerum, Iecoris, inquam, Lienis, & Mesenterij, siue fissuram, siue erosionem: eos autem grauissimè hallucinari, qui cæcos quosdam ductus sibi imaginantur, per quos in abdominis spatium confluat, cum ascites peræque omnes inuaderet, & natura humoribus distribuendis inutiliter tot vias parasse videatur. Adde, (inquit) quod ijs, quos ex vrina dies viginti suppressa, extinctos nouimus, aquæ nil quicquam deprehensum est, per cæcos illos ductus in abdominis spatium refluxisse, quoniam integra his, non pertusa erant sanguinis ferique conceptacula. Hinc fit, vt ascites ijs ferè superueniat, qui rupta vel exesa viscerum vena cruentis vomitionibus, aut deiectionibus opportuni sunt. Licet enim suppressus sanguis sit, serosus tamen humor per derelictam fissuram præterfluit, inciditque in spatium abdominis. Ego tamen hanc Fernelij opinionem haudquaquam semper veram existimo, cum ex jecore aquam etiam sine manifesta continui solutione, siue tunicæ & membranæ exterioris, siue etiam ipsius substantiæ effluere statuam: sed per cæcos membranæ ductus, qui ampliores reddi possunt, quando membrana copia humoris nimium dilatata, attenuataque fuerit, vt mediante nostro calore per ipsam aqua transsudare, ac sic paulatim stillare queat. Cæterum hoc modo paulatim tantum humores à jecore excidunt, non confertim fluunt. Ascites ergo vt plurimum sic oritur, hoc est, citra aliquam membranæ perditionem, aut fissuram, si quando ab Hepatis vitio

vitio originem trahit. Si enim omnis hydrops ex manifesta continui solutione accideret, de repente in omnibus generaretur, cum plerunque tamen semper paulatim aqua in abdomine colligatur. Quin imo cum omnis continui solutio in eiusmodi visceribus lethalis ferè sit, nullus omnino conualesceret, cum multos tamen in principio curatos viderimus. *Alteraviam* per quam aqua in Omentum confertim irrumpit, venæ sunt. Ex jecore enim per venam Portæ in ramum Splenicum, & Lienem ipsum humor deponitur, qui deinde in ramos Ventriculnm adeuntes, à quibus propagines ad Omentum disseminantur, influit, quarum tunicas vel copia dilacerat, vel acrimonia exedit, & sic in spatium abdominis, vel omenti cavitatem fluit. Sunt & qui statuunt, citra vasorum solutionem, quæ difficulter hic contingere queat, cum vasa omenti vndique copiosa pinguedine cingantur, per cæcos ductus humorem transfundare, ubi omenti venæ aqua repleta fuerint. Quæ sententia mihi profecto non displicet, cum sciam ex Hippocrate, per tunicas arteriarum venarumque ex abdominis capacitatem ad renes etiam crassos humores pelli, qui certè non aliam viam, quam cæcos hos ductus sequuntur. Quin imo aquam in abdomine contentam quandoq; confertim ad intestina confluere, & per aluum expurgari videmus, quod non nisi raptis in venas mesaraicas humoribus contingere potest. *Tertia tandem via*, & quam omnino

*Altera.**Tertia.*
LOBVS
HEPATIS.

6, 8. I. M.

Galenus, ac Recentiores quoque ignorasse videntur, est ^a *Lobus exiguus* in caua Hepatis parte juxta Portas vocatas, situs, qui in ipsam Omenti cavitatem totus reconditur, ab alijs Anatomicis nondum descriptus. Hic enim longè tenuiore membrana, quam reliquum hepar tegitur, ut omnino credibile sit, à leui iniuria, facillimè perumpi. Accedit, quod & ipsa substantia mollissima sit, ut cuius patebit, qui parenchyma à venis liberare voluerit, cum vel leui affricatione digitorum discedat. Ut taceam in hoc loco complures venæ cauæ propagines, & ipsum venæ Portæ truncum esse situm, in quibus maior serosi humoris copia, quam in alijs jecoris partibus contineri potest. Per lobum ergo hunc, aut partes ei conterminas, quæ tenui omenti portione circumsepuntur, in omenti cavitatem commodissimè serosum humorem ex jecore erumpere, pronunciamus.

Quæritur autem, an quibus ita irruperit aqua moriantur, deinde an necessario moriantur? Contrarium enim hoc videtur Hippocrati 6. aphorism. 14. ubi, ab Aqua, inquit, inter cutem habito, si aqua, quæ in venis est in ventrem confluerit, morbi fit solutio. Eandem sententiam repetit in Coacis prænotionibus, ut videatur omnino magni esse momenti. Sed dicatis, in nostro aphorismo per Ventrem abdominis capacitatem, in laudato modo, aluum & intestina intelligi, ut adeo uterq; sit verus. Aqua enim si ad aluum abeat, morbus soluitur: at si in Ventre remaneat, partiū naturalium calorem debilitat primum, deinde exstinguit, unde mors sequitur. Non tamen necessario, sed vtpurimum, cum fieri possit, ut spontè naturæ aqua in ventre collecta, per vrinæ, aut aluum expurgetur. Hinc illud in Coacis prænotionibus oraculum, In aqua inter cutim incipiente, alui profluvium aquosum oboriens, citra cruditatem morbum soluit. Cæterum ut iudices, an aliqua salutis spes reliqua sit, præ cæteris vrinæ inspicere, quæ si pauca reddantur, sintq; rubicundæ ac crassæ, & febris valida detineat, de ægro conclamatum esse dixeris.

*An moriantur, quibus aqua in omentū irruperit, & an necessario.**Sed*

Sed restat dubitatio, quomodo jecur ita repleti aqua queat, vt si aqua illa in omentum irrumpat, venter inde distendatur, & ægri moriantur? Videtur enim fieri non posse, vt tanta aquæ copia in jecore contineatur, quod triplo minus est abdominis cavitare. Sed jecur vbi aquam illam exonerauerit, propter imbecillitatem, & vasorum dilationem nimiam factam, tum generat, tum facile ex vniuerso venoso genere suscipit nouam materiam, quæ continuo postea in cavitatem imi ventris exstillat. Et hoc illud ipsum est, quod Hippocrates dicebat, si scilicet hydropico succedat alui profluuium, ita vt aqua, quæ in venis est, ad aluum conuertatur, morbi fit solutio. Quod enim reliquum est aquæ in abdomine contentæ, Natura sæpe dissipare ac discutere consuevit, præsertim si bona victus ratio, & medicamenta accedant.

CAPVT VII.

De Gula.

CVM Ventriculus Gulæ, siue Oesophago continuetur, de vtroque hoc libro agemus, quantumuis Gula in medio potius, quam infimo ventre sit sita. Pars ergo illa teres, quæ ab ore ad Ventriculum descendit, Græcis οἰσοφάγος dicitur, & propriè ipse i. histor. animalium 16. vbi ἐν τῷ, inquit, ἑσώχενος, ὃ πῶς οἰσοφάγος καλεῖται ὅτιν, ἔχων τὴν ἐπ' αὐτῇ ἀπὸ τῆς μήκους ἐσώχενος. Quem locum doctissimus Gaza sic interpretatur, Gula intra collum est, ab angustia & longitudine nuncupata, cum ita potius vertendus esset: Intra collum oesophagus est, cognomen habens ab angustia, & longitudine. Sed locus tamen ipse nihilominus obscurus manet, cum οἰσοφάγος, ab antiquo potius verbo οἶσθ, & φάγμα, quod cibum ferre significat: at σῶμαχος, quasi σῶς & μακρὸς dicitur. Ex quo fit, vt locum illum paulo aliter legendum censeam, præsertim cum capite 12. dixerit, σῶμαχον intra collum asperamque arteriam sitam esse. Vera ergo lectio fortassis hæc est, ἐν τῷ ἑσώχενος οἰσοφάγος ὃ, πῶς σῶμαχος. Latini Gulam vocant, Arabes Meri & Veser. Dixi autem hanc partem propriè Stomachum vocari, quod apud Latinos hæc vox pro Ventriculo quoque sumatur, vt cum Celsus inquit, Imbecilles stomacho, quales maxima pars literatorum, omnesque fere cupidi literarum sunt. Est autem pars organica, cuius initium à faucibus ad linguæ radicem, statimque inter asperam arteriam, cui substernitur, tum corpora vertebrarum colli, & quatuor priorum thoracis, quibus insidet, recta descendit. At vbi ad quintam thoracis vertebram peruenit, trunco arteriæ magnæ descendenti cedens, non nihil ad dextrum latus flexitur, deinde cum eadem ad nonam vsque deductus, paululum à corpore vertebrarum membranarum beneficio eleuatur, arteriamque supergrediens, Diaphragmatis nervosum corpus à læuo latere pertransit, & circa vndecimam Thoracis vertebram ventriculi sinistro orificio inferitur. Constat autem ex tribus membranis, quarum vna communis est, duæ propriæ. Communis membrana proprias inuoluit, & cooperit, quam nonnulli à Peritonæo, alij à ligamenti vertebrarum, quibus adhæret, deducunt. Propriarum prima, siue externa, carnosa, & crassa est transuersis tantum fibris donata:

altera,

Synonymia.
Etymologia.

Origo, & progressus.

Substantia.

altera, & interna, membranosa, fibris rectis, & tenuissimis constans, membranæ illi, quæ palatum, os, fauces, & labia tegit continuata, ex quo fit, ut in labijs signa futuri vomitus appareant. *Venas* habet, tum à Caua, tum vena Portæ. A Cauæ quidem ramo sine pari, dum in Thorace adhuc est; à Portæ autem vena, vbi Ventriculo iungitur, sparsis versus superiora à coronario ramo surculis. *Arteriæ* ab Intercoastalibus, & Celiacæ ramo Coronario accedunt. *Nervi* autem insignes, à sexto pari, qui obliq; securitatis gratia, deferuntur, ut inquit Gal. 6. v. l. part. 6. & copiosi sunt, unde tam exquisitus circa superioris ventriculi orificium sensus. Habet & *glandulas*, duas quidem in faucibus, gulæ & laryngi communes, quæ saliualem humorem, ne exsiccentur, præparant, & Latinis Tonsillæ vocantur: *alias vero* duas in medio stomachi ductu, à posteriore ipsius sede, qua is asperæ arteriæ in duos truncos diuisæ subijcitur. *Vena.* *Arteria.* *Nervi.* *Glandula*

Vfus Oesophagi est, ut infundibuli loco seruiat, per quod cibus ac potus in ore non nihil confectus, ad ventriculum transmittatur. Sed præter hunc & *Actionem* habet, cum cibum excipiat per dilatationem membranæ propriæ interioris, & exceptum detru-dat in ventriculum per constrictionem externæ tunicæ propriæ, & musculorum, quos Pharyngis vocauimus, supraq; libro quarto descripsimus. *Vfus.* *Actio.*

CAPVT VIII.

De Ventriculo.

OESOPHAGO Venter continuus est, qui Græcis *γαστήρ*, & *κοιλία* dicitur à cavitatē: at Latinis *Ventriculus* ad discrimen ventrium maiorū. Hic *figura* vtriculari pastorum tibiz perquam similis est, cum oblongus sit, & rotundus, supra gulam: inferius duode-num connexum habens, quibus duas illas fistulas eleganter exprimit. A sinistris, & in fundo amplior paulo: at dextrorsum sensim attenuatur. *Situs* autē est in superiore infimi Ventris parte, inter primas lumborū vertebrae, & cartilaginē mucronatam, fundoq; ad vmbilicum vsq; præsertim dum sedemus, aut ambulamus, porrigitur: quod si cibo potuq; repletus sit, vltērius etiā non nihil descendit. *Elatiore* sui parte, qua superius orificium est, in sinistram partem paululum declinat: *inferiore* autem, in dextrum latus. Proxime ergo Diaphragmati subiacer, q; maiore etiam parte contingit, unde admodū alimentis distentus, Diaphragmatis motū impediendo, Dyspnœam concitat. *Anterior* & à dextris hepatis cano regitur; à *laeis*, Liene; *posterior* Arteria magna, Venaq; caua, & pancreas sita sunt, à quibus veluti focalis quibusdam incalescit. Quamobrē si huiusmodi viscera affecta sint, præsertim si scirrhus laborent, aut aliqua frigida intemperie, concoctionē necessario lædi, facile ex his colligitur. *Magnitudo* ipsius, etsi ab Hipp. quinque palmorum longitudine definita sit, admodū tamen variat. Communiter fœminis, quā maribus minorem cōtigisse obseruauimus, q; propter vterum, ut commodius in grauidis distenderetur, euenire crediderim. Notauī etiā in Viri cadauere ventriculi amplitudinē quatuordecim aquæ libras cepisse, & magnitudinē etiam in viuus ex oris longitudine desumi posse, cum grandiorē habeant ventriculū, quibus os maius est. *Conne-* *Connexio* *titur sinistro orificio* cū gula; *dextro*, cum intestino duodeno. *Fundo*, cū omenti parte superiore: *suma* vero, cū portione partis eiusdē inferiori. *Constat aut ex tribus membranis,* *Substan-* *tia.*

quarum *prima* cōmunis est, à peritonæo enata, ea parte, qua septum transuersum circa superius orificiū succingit. Rectas hæc habet fibras, & omniū quæ à peritonæo prōdeūt, crassissima est. *Alterā*, quæ exterior propriariū, tota carnosā est, transuersis cōstans fibris, quibus pauca quædam, sed carnosæ, obliquæ subiacent. *Tertiā*, siue interior, neruosa, œsophagi tunicæ, labiorum, & omniū quæ in ore sunt, cōtinua, triplici fibrarū genere mire intertexta: inter quas rectæ copiosiores sunt, & magis conspicuæ. Habet præterea *duo orificia* in elatissima sui regione: *vnū*, quod sinistrū dicitur, & dextro maius est, cui Oesophagus continuatur. Vocatur à Græcis, καρδία, Cor, à quo dolores in ipso facti, καρδιαλγίαι & καρδιωμοί dicuntur, quod maximus inter cor, & ipsum sit consensus, non quidem, vt vulgo creditur, ob vicinitatem, sed potius ob neruos, qui ex eodem ramo sexti paris in vtrumq; viscus disseminantur, vnde fit, vt vno laborante alterum similiter afficiatur. Constat hoc fibris carnosis orbicularibus, vt alimento intra ventriculū recepto, exacte claudatur, cum plurimū in coctione referat, ne fumi à cibis eleuati, & cum his calor, dissipetur. *Alterum*, dextrum dicitur, & inferius, quamuis non minus in elatissima quoq; sede sit positū, quod Veteres, à quibus hæc appellatio fluxit, male crediderint, in inferiore loco reponi. A Græcis πύλωρος dicitur, quasi Ianitor, quod cibus ex Ventriculo ad intestina viam aperiat. Huic præter transuersas, quas habet, fibras, intrinsecus crassior spissiorq; circulus circumiectus est, sphincteris musculi in modū, vt & claudi, & aperiri queat. *Venas* complures habet, quæ tamen omnes à Portæ vena originem trahunt, & vel à Trunco, vel Ramis, iisq; Splenico, aut Mesenterico. A *Trunco* quidem Pyloricus ramus. A *Splenico* autem, Gastrica, à qua Coronaria nascitur, Gastroepiplois sinistra, & Vas breue. A *ramo Mesenterico* antequam diuidatur, Gastroepiplois dextra. *Arterias* habet ab arteriæ magnæ ramo Celiaco, quæ singulas venas comitantur, de quibus supra libro sexto dictum est. *Nervos* complures & insignes à sexto pari, qui vna cum œsophago Diaphragma transeuntes sese interfecant, & *dexter* quidem sinistram & anteriorem: *sinister* vero, dextram & posteriorem ventriculi partem cingit, vnde fit, vt exquisitissimo sensu orificium superius sit donatum. Voluit enim Natura, vt esset sedes appetitus animalis, & defectum alimenti in corpore quam celerissime persentiret, cum deficiente in Venis naturali sanguinis copia, exhausti nonnihil in corporis nutritione, Ventriculus, & potissimum eius interior tunica constringatur, vnde tractis neruis dolor ille, quem famem appellamus, nascitur. *Incedunt* autem tria hæc vasorum genera inter tunicas ventriculi, & quidem communem & proprias, sicque extremis oscillis in internam propriam terminantur.

Orificia
duo.

Vena.

Arteria.

Nervi.

Vasorum
progressus

ACTIO.

Chylus.

ACTIO Ventriculi, est ciborum in chylum conuersio, quam Græci χύλωσις appellant. Est autem *Chylus* succus albus, & mediocriter crassus, cremori hordei non absimilis, à Ventriculo ex alimentis per concoctionem elaboratus. Coctio autem hæc per calorem fit, nec tantum illum, qui substantiæ Ventriculi innatus est, aut à Corde indefinente fluxu suppeditatur: sed & quem circumstantes partes suo foru suggerunt, cuiusmodi sunt in *dextra parte* Iecur, in *sinistra* lien, *superius* diaphragma, *inferius* intestina, ante omentum, *retro* arteriæ, & venæ cauæ trunci. Calor autem hic non est nimius, ne adurat, sed moderatus, & blandus, humiditatis cuiusdam non expers, vt elixationi similis sit illa coctio. Vt autem quamplurimum ipse in se reciperet, nec tamen multum

multum loci occuparet, *figuram* rotundam nactus est, utpote capacissimam: longam tamen, ut duo orificia contineret, quorū vtrumq; in elatissima regione est situm, ne si in fundo alterutrum fuisset, stimulatum cibi pondere, incoctum adhuc alimentū exigisset. *Magnitudo* autem tanta est, vbi cibi vna vice recipiat, quantum ad nutritionem est opus. Fecit etiam *substantiam* ex membrana, ut & extendi, dum cibum, præsertim in copia sumimus, & contrahi iterum possit, dum munere suo peracto exinanitur. Ne autem confestim elaboretur, cum coctioni certum debitumq; tempus sit definitū, interiorem membranam omni fibrarū genere intertexuit, quibus constrictis, vndiq; cibū amplectatur & contineat. Contra ut perfectō absolutoq; opere chylo liberaretur, exteriori transuersas fibras largita est, quibus ad intestina protrudit. Vnde & *duo orificia* nactus est, vnum quo excipit, alterum per quod pellit. Et illud quidem hoc amplius est, ut cibus leuiter à dentibus præparatus, necdum bene comminutus promptius in Ventriculum transiret, quod metuendum non erat, ut in inferiore fieret, per quod iam coctus & elaboratus chylus transit. *Venas* etiam habet, ut nutriatur, cum non minus ac omnes aliæ partes sanguinem pro alimento habeat. *Arterias*, ut viuatur, & *Nervos*, ut sentiat. Alios vsus horum vasorum libris præcedentibus quarto, & sexto, exsequuti sumus, quos breuitatis studio nunc non repetemus.

Sed enim cum hæcenus complures Hippocratis aphorismos, qui citra historiam anatomicā intelligi non queunt, exposuerimus, quā rem, ut vtilem, sic quoq; gratissimā studiosis futuram iudicauimus, merito laboris pretium facturū nobis visū sumus, si huc difficillimi illius explicationem coniecimus, quē nescio an quisquā adhuc ante nos recte intellexerit. Aphorismus est quinquagesimus quartus vltimæ sectionis, in quo Hippocrates, Quibus, inquit, inter ventriculū & septum transuersum pituita concluditur, doloremq; infert, utpote quæ ad alterutram cavitatem exitum nō habet, iis per venas ad vesicam conuersa pituita, morbus soluitur. Controuersia est quid per *cavitatem* illam intelligat, quam inter ventriculū & septū transuersum conclusam ait. *Marinus* antiquus Medicus, & qui dudum ante Galeni tempora floruit, & aphorismos commentariis illustrauit, statuit, cavitatem hanc inter carnosam septi transuersi partem, & peritonæum esse, quo septum inferiore sui parte tegitur. Negat enim fieri posse, ut inter ventriculū & Diaphragma humor cōcludatur, cum necessario defluat, & in abdominis cavitatem effundatur. Sed impropria nimis hæc loquendi ratio foret, si pro peritonæo Ventriculū Hippocrates dixisset, qui alias ab omni verborū abusu mirifice abstinuit. Hanc cum *Galenus* aduertisset, aliud spatium ostendit, illud nempe, quod, ut ipse loquitur, infra septum transuersum est, sed intra eam membranæ abdominis interioris partem, quæ ad epigastrium attinet. Sed cum & sic impropria quædam dicendi ratio foret, illam *ego* merito cavitatem statuerim, quæ ad sinistrum orificium ventriculi, sub Diaphragmate, membranæ inclusa occurrit, in qua aquam, flatum, & pituitam coaceruari, sæpenumero obseruauimus. *Via* autem per quas Pituita ad hanc cavitatem peruenit, pori sunt & insensiles illi meatus membranarum ventriculi, per quos transsudat, cum totum corpus sit transpirabile. Quæ sane viæ pluribus à me excogitatæ parebunt, nostroque effictæ cerebro, cum nec ipse negem prima fronte vix credibile quid videri: at iis qui in Naturæ operibus, tum eorū, qui ex morbis obierūt dissectionibus

Explicatio aphorismi 54. sect. 7.

“
“
“

Quid per cavitatem intelligas Hippocratis opiniones. Marini.

Galenus.

Authori.

diligenter versati sunt, nihil omnino, quod mentem in admirationem possit trahere digni aestimabitur. Quin imo hoc loco exoptem, omnes qui Medicinæ nauant operā hanc uti corporis transpirationem bene animo comprehendant suo, cum ex hac multarum grauissimarum quæstionum solutiones promptissime petantur. Cæterum abundat in Ventriculo pituita, vel ob destillationem à capite, vel propter crudos humores ex crassis cibis genitos, quo pacto memini à me curatum, qui ab esu anguillæ in hunc affectum incidit, & alium quendam, qui admodum huic malo opportunus erat, si quando crudos cibos vel degustauerat. Collecta autem sic pituita *dolores concitat*, quod sinistram ventriculi orificium tum frigiditate pituitæ, tum flatibus inde obortis, afficiatur. Dolor autem hic nonnunquam eo exacerbari consuevit, ut ægri animi deliquio corripiantur. *Tenetur autem conclusa*, quod neque ad medii ventris cavitatem, ob solidiorem diaphragmatis substantiam: neque ad imi, ob dictam membranam, transsudare queat. Hos enim ventres per ἡδὲ πῆλιν κοιλίας intelligit, quamquam non desint, qui credant, Thoracem & ventriculum denotasse, qui tamen errant, cum hos frequenter sic, & Thoracem quidem, πῶν αἰώ, at imum ventrem, πῶν κάτω appelliter. Accedit, quod expressè in hoc aphorismo Ventriculum *παστέξ* vocet. Quod si tandem inquirat, *per quos ductus* pituita hæc in *vesicam transfluat*, illi respondeo, Venas esse ex Hippocratis sententia: intelligi autem venam Cavam, & Arteriam magnam, in cuius ramos illi cavitati vicinos, attenuata à nostro calore pituita rapitur, & postea per emulgentes propagines in renes transmittitur, à quibus ad vesicam tandem deriuatur, cum via sit eo rectissima. Quo loco nota, non solum diuinissimo Hippocrati hanc de qua diximus, transpirationem corporum, fuisse cognitissimam, ut ex diuersis ipsis oraculis, præcipue libro de alimento patet, sed & eandem hic ad usum reuocatam, cum dicat pituitam hanc in venis ex illo spatio rapi, inde ad vrinæ vias transmitti.

C A P V T IX.

De intestinis.

Synonyma. **V**T Gulæ Ventriculus, sic ventriculo continua sunt *Intestina*, quæ Græcis έντεα dicuntur, ὅσα τὸ έντός εἰναι, quod in intimis corporis partibus consistent. Fuere nonnulli, qui χολάδας dixerunt, quod bilem, χολήν appellatam excipiant. Latini communiter *Intestina*, & nonnulli *Interranea* vocant, quæ tamen vox in latiore significatione usurpata quævis interiora viscera, peritonæo inclusa, denotat. Hinc phrasis illa apud Latinos vulgaris, quæ *exenterare* dicunt animalia, cum interiora viscera eximuntur. Barbari *Chordas* nuncuparunt, quæ appellatio postea fidibus cessit, quæ ex intestinis fiunt, & testudinibus obducuntur. Fuit tamen hæc vox & Græciæ olim familiaris, quod patet ex Athenæo 7. δειπνοσοφ. vbi hædorum intestina χόρδας ἐλεον appellat. **Situs.** *Sita sunt* in infimo ventre, cuius amplitudinem fere vniuersam occupant, & cum longissima esse debuerint, quo facilius caperentur, plurimis modis inuicem sunt conuoluta. **Cōnexio.** *Connectuntur* autem beneficio mesenterii, cuius interuentu, quemadmodum & omentis, dorso alligantur, cæterum ab illi ossibus magna ex parte sustentata. **Initium.** *Initium* ipsorum à dextro

à dextro ventriculi orificio, siue pyloro est, cum quo continuantur: at finis in podice terminatur. *Figuram* nacta sunt teretem, quæ quibusdam locis deprimitur, aliis recta est, nonnullis in sinus implicita. *Longitudinem* autem tantam habent, vt quatuordecim fere vlnas Patauinas æquent, vel si maius cum cæteris Anatomicis efferre, sumpta mensura à corporis proportionem, sexies longiora sint eo homine, cuius sunt intestina. *Crassities* tamen inæqualis est, cum alia crassiora sint, alia tenuiora. *Substantia*, Ventriculi substantiæ non absimilis, cum tribus consistit tunicis, vna communi, & duabus propriis. *Communis* quidem, mediate à Peritonæo deriuatur: at immediate in Duodeno, & ea coli parte, quæ ventriculo adhæret, ab inferiore omenti membrana exoritur, in ieiuno autem ileo, & reliqua coli parte, & crassis intestinis, à Mesenterii membranis. *Primæ propriarum*, siue exterior, membranosa est: *secunda*, & interior, carnea, quamuis ob crustam, qua intrinsecus succingitur, & exteriæ coctionis excrementis ipsorum intestinorum enata est, carnosa videatur. Inter communem & propriam, quemadmodum & in Ventriculo, vasa discurrent, Venæ & Arteriæ, Mesaraicæ vulgo nuncupatæ. Oriuntur *Venæ* à Vena portæ, tamen si non ab vno & eodẽ ramo ad singula dispergatur. *Ad intestinum enim Duodenum*, duodena mittitur; *ad Ieiunum, Ileum, Cecum & Coli dextram partem*, Dextra mesenterica: *ad sinistram autem Coli, totumque Rectum, Hæmorrhoidalis: ad mediam vero Coli partem*, quæ sub ventriculo transuersim incedit, Epiplois postica. *Ad rectum tamen intestinum*, & à Cauæ ramo hypogastrico vena mittitur, quæ Hæmorrhoidalem externam constituit, de quibus omnibus supra, libro quinto egimus. *Arteriæ* partim à Cæliaco ramo, partim ab vtraque Mesenterica oriuntur. *Ad Duodenum quidem & Ieiuni initium*, propago à dextro Cæliacæ ramo mittitur: *ad Ieiuni autem reliquum, Ileum, Cecum, & Coli partem dextram*, Mesenterica superior: *ad Coli vero partem sinistram, ac Rectum intestinum*, Mesenterica inferior, quæ cum venis ad extremum podicem descendens, Hæmorrhoidalem arteriam constituit. Tandem *ad Coli partem mediam*, quæ Ventriculo subest, Epiplois postica vadit, quæ ab inferiore parte Arteriæ Splenicæ, quæ Cæliacæ sinister ramus est, enascitur. *Nervos* habent, à sexto neruorum pari. Et *Duodenum quidem*, exiguos à stomachicis, qui pylorum adeunt: *reliqua* quamplurimos, vtrinque à ramo, qui costarum radicibus exporrigitur: *Recti autem finis*, siue Podex, quatuor à quinta coniugatione ossis sacri. Hinc tam exquisitus intestinorum sensus, grauissimique dolores in colo & recto male affectis, perferuntur. *Foris pinguedinem* adnatam habent, quod diligenter notandum est contra Medicos complures, qui statuant pinguedinem in dysenterici initio ab intestinis abradi. Quam prorsus ineptam sententiam ineptius adhuc probare conantur ex intestinis animalium domesticorum, quæ mensis quotidie inferuntur, in quibus pinguedo internam superficiem occupat, ignari à Lanionibus intestina inuerti. *Intrinsecus* mucosa quadam substantia obducuntur, quæ pituita quædam est excrementitia, in prima coctione nata, qua sapientissimus Opifex intestina quasi inuitrauit, vtalui fæces lubricitate promotæ, ex corpore promptius depellantur. Huius utilitas quanta sit, tum demum intelligimus, cum post diuturnasalui fluxiones, in quibus pituita hæc vna excreta est, ventris beneficium consideramus. Vtunque autem intestinorum vnus continuusque sit ductus, adeoque vnus intestinum dici possit, quidquid ab infimo Ventriculi orificio, ad extremum

Figura.
Magnitudo.

Substantia

Venæ.

Arteria.

Nervi.

Pinguedo

Substantia
mucosa.

Numerus

Differētia
intestino-
rum. vsq; anum porrigitur; solent tamen complura numerari ob diuersitatem, quæ occurrit circa substantiam, figuram, situm, magnitudinem, vasa, & officium. Ratione enim *substantia*, crassiora, vel tenuiora dicuntur: à *figura*, alia recta, vt duodenum & rectum; alia anfractuosa, vt Colon. item læuia, aut aspera. Pro *situ*, vel mediam abdominis sedem occupant, vt tenuiora; vel lateralem, vt crassa. A *magnitudine*, quædam ampliora dicuntur, vt colon; quædam angustiora, vt cæcum. Alia longiora, vt ileum, alia breuiora, vt duodenum. Ratione *vasorum* notatu digna est differentia. Quædam enim plura recipiunt, vt jeiunum & ileum, quædam pauciora, vt duodenum, & rectum. Ab *officio*, quædam chylo perficiendo & distribuendo dicata sunt, vt tenuia; quædam facibus colligendis, & excernendis, vt crassa. Cæterum utcumq; sit, recepta est hucusq; ab Anatomicis diuisio, petita ex diuersitate *substantia*, adeoq; intestina in tenuiora, λεπτά ένπερ ἀειρά & ενδύς, & in crassiora, siue παχέα diuiduntur. Numerantur autem tria tenuium, totidemq; crassarum.

TENUIA
Primum. *TENVIUM* primum ab Herophilo δωδεκάδακτυλον, à nostris *Duodenum* dicitur, quod longitudine duodecim transuersos digitos exæquet. *Ortur* hoc à dextro Ventriculi orificio, siue pyloro, quo nomine à Galeno εκφυσος dicitur. Recta deinde sub ventriculo ad posteriora descendit, quousq; intestina cætera in gyros & anfractus cum mesenterio inuolui incipiunt, cum solum hoc cum mesenterio non connectatur.

Secundū. *Secundum tenuium*, νῆσον, & *Ieiunum* dictum, quod in cadaueribus semper fere vacuū reperiatur, ob vasorum multitudinem, & flauæ bilis vim acrem, quam ab hepate recipit adhuc puram. Huius *principium* à dextris est sub colo, vbi duodenū desinit, & intestina torqueri incipiunt, ac circa vmbilicalem regionem, quam ferè totā occupat, in orbem quamplurimos conuolutum, in ilium terminatur. Habet autem *Venas*, & *Arterias* rum maiores, rū frequentiores, ac cætera intestina, vt nihil omnino præterlabatur chyli, quin ad hepar quam celerrimè traducatur. Est autē tanta harum copia, vt vel ex hac sola totius ieiuni circumscriptionem Anatomici nobis designent. In huius principii, *Meatus biliaris* inferitur, per quem ab hepate bilis euacuatur, quæ postea intestina ad expulsionem stimulat, ac vna cum facibus extra corpus deturbatur. *Longitudo* eius duodecim palmorum est, triumque digitorum: at latitudo digiti annularis transuersi. Cum autem duæ membranæ sint propriæ, ex quibus constat, interior externa longior est, quod *plicis* innumerabilibus sit corrugata, quæ transuersim & orbiculariter intestinum cingunt vt chylum præterlabentem morentur, & æqualiter extendant.

Tertium *Tertium* tenuium, Græcè λεπτόν dicitur, *Tenue*, à membranarum quā præ reliquis habet, tenuitate. Nonnulli & ειλέν vocant, & ab hoc Ileum morbū denominari statuūt, cum Hippocrates, cæteri q; omnes elegantiores hoc nomine pro morbo vrātur. Quin & Galenus expresse 2. meth. 2. nomen Ileos non à parte laborāte, sed à symptomate deductum esse testatur, siquidē ειλέν idem sit, quod circumuolui. Latini horum errorē sequuti *Ileum* communiter appellant. *Initium* ducit, vbi minores, paucioresq; Venæ reperiuntur: at finit circa dextrum renem, vbi tum cæco, tum colo jungitur. Totum autem sub ter vmbilicum, ad ilia vtrinq; & coxas situm est, omnium intestinorum *longissimum*, cum viginti & vnum palmum exæquet. Cæterum vt longitudine reliqua superat, ita ab

ita ab iisdem latitudine superatur, cum angustissimum sit, si cæcū excipias, & vix transuersum digitum æquet. *Plicas* habet in tunica interiore rariores & minores, quam jejunum, quæ circa finem, sensim obliterantur. Est autem *substantia* tenuium intestinorum, ut diximus, Ventriculi ferè, cum consent ex tribus tunicis, una *communi*, quæ à peritonæo nata est, & *duabus proprijs*, primum externa, quæ tenuior est interna, & carnosior, transuersis atq; orbicularibus fibris, ut ego quidem reor, insignita, paucis quibusdam rectis, ad transuersarum tantum tutelam. Deinde interna, rectis partim, partim obliquis, paucioribus tamen rectis, quam crassorum intestinorum tunica donata.

CRASSA.
Primum.

4, 8. 5. 1. O. a *CRASSA* deinde sequuntur, quæ ileo intestino adnectuntur, ex quibus primum est *CRASSA*. per idem foramen ingreditur chylus, exeatq; hinc barbaris Orbūm, & Monoculum dictum est. *Figura* in homine, crassum ac teretem lumbricum, in orbes conuolutum æmulatur, cum tenue admodum sit, quo nomine & inter tenuia potius, quam crassa referendum videatur. Quia tamen in quadrupedibus, simia, inquam, cane, alijsq; in quibus prisca Anatomi exercabantur, qui primi partibus appellationes tribuere antequam humani corporis dissectiones aggressi sunt, crassius est tenuibus, vel quia eius substantia in homine quoq; paulo crassior est ea, ex qua tenuia intestina constant, propterea in crassorum numerum relatum fuit. *Maius* est in fœtu, quam adulto, si corporis proportionem inspicias, & in hoc longitudinem quatuor digitorum transuersorum: at latitudinem pollicis habet. Mesenterio non adnectitur, ut cætera intestina, sed quibusdam quasi fibris in orbem conuolutum, reni dextro, mediante peritonæo, adheret. In homine sano semper inane est, reperi tamen in quodam cadauere Parauij Lumbricum rotundum continuisse. In quadrupedibus contra est, plenum semper excrementis, quod simia maius habeant, quam Homo; & hac canes adhuc maius, sed longè maximum cuniculi, sciuri, & glires.

Secundū.

b, 8. 5. 9. C.C.C. *Secundum* crassorū *Colon* est, καλὸν ὄρεα τὸ καλῦεν, à retardando dictum, quia scilicet in eo excrementa alui remorentur. Absyrtus antiquus scriptor in Hippiatricis, ὄρεα τὸ καλῦεν ἐν ἑαυτῷ deriuat, quod in seipsū contorqueatur. Hippocrates lib. 6. Epid. ἐν τερῶν appellat κατ' ἐξοχῶν, hoc est, simpliciter intestinum. Absyrtus etiam μόνεντερον, quasi dicas, quod solum intestinum est. *Oritur* superius ab ileo & cæco, & inferius ad initium recti circa primam ossis sacri vertebam terminatur. *Ortum* .n. statim per dextrum ilium ascendit, ac ubi ad hepar peruenit, flexum sub Ventriculi fundo transuersum ad sinistrū ilium abit, in quo iterum viam flectens, deorsum vsq; ad ossis sacri initium excurrit. *Alligatur* autē primum in dextro latere reni dextro, ope membranæ externæ, deinde in medio ventriculi fundo, ac tandē in sinistro latere reni læuo. *Longitudo* eius palmarum septem est, totidemq; digitorum; at latitudo pugnū æquat. Est .n. amplissimum, ut quidquid chyli inutilioris remansit, in se recipiat, & aliquādiu complectatur, ne Homo animal sapientiæ studio Musisq; dicatū, egerendis fecibus continuo interpellatur. *Figuram* teretē seruat, ut cætera intestina; inæqualiter tamen varijs extuberantijs, modo intumescit, modo subsidet, idq; propter *Cellulas*, quas intus habet. Nascuntur hæ *Cellulae* ex interiore tunica, in quas rugæ ipsius expansæ sunt, quæ à lateribus euidentius comparent: at quo viciniore sunt ipsi recto, eo magis obliterantur, adeoq; ipsū colō equa-

Cellulae.

lius

*Ligamen-
tum coli.* lius redditur. Ne autem cellulae hae dissoluantur, prouida Natura *ligamento* quodam, & vinculo prospexit, quod per huius elatiorem & mediam sedem, secundum intestini longitudinem excurrit, sed medij digiti latitudine est, quo rupto, aut laxato protinus euanescent. Sunt & *appendiculae* quaedam pingues, quae adnascuntur, ubi propius ab intestino recto abest, euidentissimae in valde obesis. Habet & *Venas*, & *Arterias*, quamuis pauciores, & minores, quam gracilia, delatas à ramis venae Portae, & Arteriae magnae. *Nervos* autem à sexta coniugatione frequentes, vnde tam exquisitus in ipso sensus est.

Valuula. Cæterum hoc loco minimè prætereunda est *Valuula*, à Recentioribus Anatomicis in exortu huius intestini, ubi ileo jungitur, inuenta, membranosa, orbicularis, sursum spectans, vnoque verbo, similis illis signiformibus, quae in cordis sinibus continentur. Magnum profecto & egregium diuinæ providentiæ specimen, cuius vestigia cum per totam hanc rerum vniuersitatem summa solertia diffusa sint, in quibusdam rebus singulariter eminent. Quia enim in alui excretionem, quae per ventris compressionem fit, à musculis abdominis septoque transuerso feces in Colo contentae, in tenuiora intestina regurgitare poterant, & hinc vomitus stercorei consequi, regressum illum Valuula haec egregiè coercet, & impedit. Aperta enim tam exactè foramen illud, quod ileo coloque commune est, occludit, vt ne flatus quidem in ileum possit ascendere. Hanc valuulam si quis videre cupiat, rectum intestinum aqua repleat, & dependente Colo à manu, suspendat. Aqua enim ubi ad valuulam peruenerit, consistet, nec ulterius, ne vi quidem adacta, progredietur, nisi valuula illa prius rupta, ipsi cesserit. Et hoc est, quod Galenus 13. meth. 17. obseruauit, quamuis causam ignorauerit, Clysteres per sedem infusas, ad jejunum vsque intestinum ascendere neutiquam posse. Quod tamen ipsum de sanis tantum, ijsque quibus secundum naturam se habet Valuula intelligendum est, cum saepenumero in dissectionibus à me obseruatum sit, Valuulam hanc laxiorem quibusdam à morbo fuisse, ita vt aqua, vel aer inflatus per colon, in ileum pertransierint. Rarius tamen id contingit, nec nisi præter naturam, in ijs, qui ileo & colicis doloribus vexantur, quibus interdum clysteres ad Ventericulum vsque vna cum excrementis sic ascendunt, vt vomitu reddantur. Et in huiusmodi casibus Valuulam hanc ruptam, aut malè affectam fuisse credendum est: vel mucus, pituitaque crassa ita oblitam, (quod facilius mihi persuaferim) vt caeco ac colo quasi agglutinata, aperiri haudquaquam potuerit. Atque hoc est quod idem Galenus 3. de sympt. causis. notauit, ali quibus clysteres iniectos sic ascendisse, vt vomitu reiecti sint, non secus ac faeces, quae per lethales voluulos nonnunquam euomuntur. Illud autem notatu dignissimum est, tenuium intestinorum membranarum propriis, coli proprias esse crassiores & nervosiores, quantoque propius ab intestino recto absunt, eo magis crassescere, & interiorem tunicam transuersis circularibusq; fibris plurimis donari, paucis rectis, nec ijs valde conspicuis, cum tenuium intestinorum tunica interior, obliquas habet, paucas rectas: exterior vero transuersas.

Observatio.

Tertium. Tertium, & vltimum crassorum Rectum est, Graecis ἀπὸ τοῦ σμῆνον dictum, quod à principio ad finem recta semper sine spiris, aut protuberantijs procedat. Vocatur etiam ἀρχον, vel quasi ἀρχή, quod principium videatur omnium intestinorum, vel quia ἀρχὼν, sit & Princeps, summam in nos potestatem gerens, cum cogat nos vel in maxime feriis negotijs,

negotij, onera quibus premitur, deponere. Colo intestino *magnitudine* admodum cedit, cum nec ita amplum sit, & longè breuius, ut potè spithamæ longitudinem non superans. *Substantia* tamen eadem est, quæ Coli, præterquam quod in extremitate musculum habet orbicularem, quem *σφιγκτηρ* Hippocrates vocat, de quo lib. 4. dictum est. *Tunica* autem paulo crassiores sunt, & carnosiores, ex quo fit, ut vulneratum consolidetur, præter cæterorum naturam. Hæ plurimas transuersas, & nonnullas rectas fibras, paucissimas obliquas obtinent. *Venas* etiam, non tantum ut reliqua à Vena Portæ, sed etiam à Caua habet, quæ ex magno ramo iliaco prodeunt, & Hæmorrhoidales externas constituunt. *Oritur* statim à Colo, cui continuatur in summitate ossis sacri, & pergit ad extremum coccygem, ubi anum constituit.

ACTIO intestinorum triplex est, meo iudicio. *Primus* chyli à Ventriculo transmissi vberior coctio, *alter* eiusdem digestio, *tertius* expulsio. *Vberior* quidem coctio, cum interna intestinorum tunica, si quid in Ventriculo non benè elaboratum sit, in horum longo transitu perficiat, ut notat Galenus, 4. de vsc. part. 17. & 18. introduct. 11. Hunc usum quæcunq; intestina præstant, cum benignissima Natura quam maximè sollicita fuerit, ut prima alimenti coctio quam perfectissima foret, quod sciret errores eius in coctione secunda emendari neutiquam posse. *Digestio* autem, cum ex his succus, qui in chylo est optimus, à venis & arterijs mesaraicis attrahatur, & ad hepar totumq; venosum ac arteriosum genus distribuatur. *Vsus* hic similiter omnibus competit, præcipuè tamen tenuibus, ex quo fit, ut vasa & maiora frequentioraque obtineant. *Receptio* tandem, & *expulsio* eorum quæ inutilia sunt, potissimum crassorum est, quæ primum quidem receptaculi munere funguntur, & retinent, ne continuis excretionibus, Homo in rerum diuinarum contemplatione interpellatur, mox, ubi aut copia sua, aut qualitate molesta sunt, excernunt, pelluntq;.

Ad hæc præstanda maximè opportuna fuit intestinorum naturalis constitutio. Nā quo ad *sedem*, perquam commodè in imo Ventre, & quidem inter Ventriculi inferius orificium extremumq; podicem sita sunt, ut ab illo promptè suscipere, per hunc, quæ superarunt, detrudere possent: quidquid autem vtile est, per venas mesaraicas, & arterias, rapi ad hepar, & arteriosum genus deduci queat. Ex his primum locum habet *Duodenum*, quod sub ventriculo ad posteriora reflectitur, ut lumborum vertebris adnectatur, minimeq; flexuosum est, ne chyli ingressus præpediatur. *Ieunum* postea, & *Ileum*, mediam regionem & proximam mesenterij centro occupant, ut ubiq; à centro equaliter abessent, ex quo Venæ Portæ, & Arteriæ magnæ truncus, à quo infinitas propagines distributas habent, emergit. *Colon* autem circa inania loca, siue *κενέσπores*, & sub ventriculo situm est, vndiq; tenuia ambiens, ut quia fecibus primum continendis, mox excernendis destinatum erat, eo in loco jaceret, ubi tum à musculis obliq; ascenditibus, tum à Diaphragmate commodius comprimeretur, & excretio fecū voluntaria fieret. Laterales enim partes, dextram sinistramq; obliq; descendentes abdominis comprimunt; mediam, & quæ transuersim sub ventriculo excurrit, ex superiore sui parte Diaphragma, ex inferiore tenuia intestina, quæ colon ambit. Cū autē Valvula impediatur, quo minus ad ileum regurgitent feces, necessario per rectum intestinum, ubi nullū, quo quiescant locum inuenerint, detruduntur. *Rectum* eam potissimum sedem obti-

nuit, vbi quam celerrime quæ excernenda sunt, expellere possit. Situm hunc vt perpetuo inter se seruent, nec confundantur vnquam, vicinis partibus *annectuntur*, primum quidem mesenterij beneficio, quod per hoc vasa mesaraica ad intestina deducantur; deinde & omenti, quod coli mediæ partimesenterij loco inseruiat. Vt autem vna vice, quantum ad corporis nutritionem restaurandam sufficit, suscipere apta nata sint, *figuram* accipere cauam, & quidem teretem, vtpote quæ capacissima. Rursus vt acceptum alimentum debito tempore retineant, & æqualiter per omnia extendant, *longa* sunt; maxime tenuia, quibus id muneris peculiariter tributum est. Crassa autem, quod tantum inutile colligant, breuiora, & ampliora sunt facta. Hinc & *tenuia* interio rem tunicam plenam *rugis* obtinent, vt transeuntem chylum remorentur, & intercipient; *crassa* autem, anfractus & *cellulas* ne in vnum forte locum feces colligantur, & vicinas partes comprimant, sed potius per cellulas dispersæ, æqualitatem coli obseruarent. Cùm enim ex ventriculo cibus descendit, intestina copia irritata protinus, quam fieri potest, à se conantur propellere, vnde semper versus inferiora detrudunt. Ne ergo illapsus subito iterum excidat, rugis plicisque sollers Opifex præcauit, quæ præterlabentem intercipient, & æqualiter extendunt. *Substantia* autem membranæ est, ventriculi substantiæ non absimilis, tum quia extendi, dum recipiunt, tum quia subsidere in se, dum inaniuntur, debebant. Habent autem duas membranas proprias, vt actio retinendi, vel expellendi rectius perficiatur. *Tenuium* quippe interna, obliquas habet; externa, transuersas, quod horum potior actio retentio sit, & distributio chyli: *crassiorum* vero interna, transuersas; externa, obliquas, & rectas, quod maiore vi indigeant in fecum expulsionem. Membranæ autem hæ in illis tenuiores sunt, quod liquidiorum materiam mollioremq; suscipiant: in his crassiores, quod siccam, duramque. *Venis & Arteriis* donata, vt sanguinem pro nutritione; & spiritum pro vita continuo affluentem accipiant: tum etiam vt id, quod in chylo utilis succi est, ab iisdem arteriis exsugatur, teste Galeno 4. de vs. part. cap. 17. vbi inquit, arteriarum orificia ad intestina pertingentia modicum quiddam cibi assumere, plurimum autem Venas. *Nervos* habent, non tantum ob sensum, vt tum grata arripiant, tum noxia molestaq; pellant: sed etiam motum. Est enim motus quidam obscurus intestinorum tenuium, quo chylum à supernis ad inferiores sedes promouent, quum in nostro arbitrio non sit, illum vt feces crassorum, depellere. Hunc elegantius demonstrare, quam in lumbricis terrestribus, & hirudinibus non licet, dum in se contrahuntur: nec verius dari probare, quam in herniis illis maximis, in quibus vniuersum, aut maxima pars ilei, in scrotum incidit. Quo enim detruderentur fæces, nisi hoc ipso modo, cum nihil sit quod à se motum habeat, præter illum qui competit ratione prædominantis elementi. Et ex hoc motu rationem licet reddere Ileis, siue conuoluuli, in quo superior intestini pars inferiori inuoluitur, qui morbus proinde & solis tenuibus competit, quod crassa hoc motu careant.

CAPVT X.

De Mesenterio.

DI X I M V S præcedenti capite Intestina Mesenterij beneficio quasi ligamento, ac *Etymo-*
vinculo quodam inuicem iungi: merito ergo vtriusque historia connectenda est, *logia.*
vt eodem quasi loco eorum tractatio absoluat, quæ Natura inuicem iuncta esse
voluit. **M E S E N T E R I V M**, *μεσεντέριον* & *μεσέντερον*, à situ dicitur, quasi *μέσον*, ἢ *ἐν τέρων*,
hoc est, medium inter intestina. Cicero 3. de nat. Deorum, *Medium intestinum* vertit, non
citra multorum iniquam reprehensionem. Veteres enim Romani non intestina tan-
tum à nobis hodie sic dicta, vocabant, sed quæcunque imi ventris viscera, & ea quæ
supra Interanea nominari diximus. *Medium* ergo *intestinum* Tullius pro medio viscere
dixit, quia mediam inter cætera sedem sit nactum. Theodorus Gaza, Vir Græce Lati-
neque doctissimus, licentius paulo, quam boni Interpretis est passim *Lactes* apud Ari-
stotelem transulit, cum Lactes non mesenterium, sed proprie intestina tenuia mesen-
terio annexa significet. Nonnulli *μεσάριον* appellant, vnde venæ mesaraicæ dictæ: at
alii qui in duas partes diuidunt, in eam nempe, quæ intestina tenuia colligat, & eam
quæ crassa, *μεσάραιον* proprie vocari statuunt, partem eam quæ tenuium intestinorum
vinculum est, quod sit *μέσον* ἢ *ἀραιὸν*, subintellige *ἐν τέρων*, hoc est, medium inter tenuia
& angusta intestina: *μεσώφιλον* vero, quæ crassa continet, quasi *μέσον* τῶ *κώλῃ*. Posterioris
mentionem Hippocrates 6. Epidem. iniecit, & Galenus 4. aphor. 6. Palladius Sophi-
sta qui in eisdem libros commentatus est, per *κώλῃ* Hippocratem intestina intelligere
statuit, & sic mesocolon ab ipso mesenterium vocari. *Galenus* autem in libro de dis-
sect. Venar. & Arter. 9. *mesenterium in tres partes diuidit, in eam*, quæ tenuium intesti-
norum est, & media; *in dextram*, quæ coli dextram partem alligat: & *sinistram*, quæ
læuam; ac prope sedem pertingens, rectum intestinum lumbis annectit. Et si enim
vnum videatur & continuum, ratione tamen gemini exortus, & intestinorum, ad
quæ abit, merito diuiditur. *Figura* tam mesaræo, quam mesocolo plana est. Illud ta-
men in plicas totum contractum est, & circulari ambitu cingitur: hoc, curvum & ob-
longum secundum coli intestini processum. *Crassissimum* quoq; est mesaræum: latitudi-
ne, à centro ad peripheriam, spithamæ: longitudine autem, & circumferetia, trium vl-
narum. Errat enim Piccolhomineus, qui ambitum horum æqualem censet longitu-
dini intestinorum dum expansa extra corpus demonstrantur. *Membranas* habet duas,
sibi inuicem incumbentes, validas satis, inter quas vasa ad intestina, vt tuto & citra
periculum incedant, excurrunt. *Venas* etiam obtinuit, *Mesaraicas* vulgo dictas in-
numeras, quæ cum arteriis & neruis Mesenterii centrum ingrediuntur, ac post-
ea innumeros in ramos dispersæ intestina adeunt, inter communem, & pro-
prias tunicas delatæ. Oriuntur autem hæ à venæ Portæ ramis Mesentericis, &
dextra & sinistra. *Arterias* similiter duas, à Mesenterica duplici, superiore & in-
feriore propagatas, quæ eodem ac Venæ modo distribuuntur, & incedunt. *Nervi*
pluribus furculis propagantur. Duo quidem, vtrinque vnus, ab iis orientur, qui à
sexto pari costarum radicibus offeruntur: alii vero à furculis prodeuntibus à nervis
medullæ spinalis inter primam, secundam, tertiam, & quartam vertebram lumborū.

Diuisio.

Figura.

Magni-
tudo.

Substantia

Vena.

Arteria.

Nervi.

Ne vero ruptioni opportuna forent vasa, arteriarum venarumque diuaticationibus
Glandula. glandulas interiecit, quæ in magnitudine cum propaginibus suis proportionem ser-
 uant. Maxima harum est ad Mesenterij centrum, ubi prima fit vasorum distributio,
 qua scirrho laborante totius corporis marcor, ob impeditam chyli transmissionem se-
 quitur. *Cōnexio.* *Connectitur* Mesaræum anterius intestinis tenuibus, posterius lumborum ver-
 tebris à quibus nascitur suo centro. Mesocolon, in dextra parte dextro ileo; in sinistra
 læuo, musculoque primo femur flectentium, quem Hippocrates *ϕόκος* appellat; ante,
Exortus. Colo intestino, & Recto vtrinque. *Oritur* autem omnium Anatomicorum sententia
 à ligamentis vertebrarum lumborum, quibus validissime alligatur, gemina quasi ra-
 dice, vna maiore, qua primæ, altera minori, qua tertiæ adnascitur. Id intestinis omni-
 bus, & peritonæi membrana, renibus incumbente, ablata, quam optime patebit. *Adeps.* *Pin-*
guedine quamplurima suffusum est, quæ vtramque membranam intercedit, sanguine
 ex vasis transudante, & membranarum respectiua frigiditate concreto.

V s v s. *V s v s* Mesenterij verus præcipuusque est, vasa ad intestina excurrentia tuto deduce-
 re, & ab omni disruptionis periculo salua, integraque præstare. Vt enim plantæ ali-
 mentum ex terra radicibus trahunt: sic animalia sanguine donata ex intestinis ope
 vasorum, quæ ne obnoxia forent tot discriminibus, ubi vel salit Homo, aut eibis ple-
 na intestina distenduntur, sagax Natura membranis inclusas propagare voluit. Vasa
 hæc non tantum Venæ sunt, vt communis est opinio, sed & Arteriæ, vt Galenus claris-
 sime 4. de vf. part. ostendit, & nos quoque supra cum de arteriis mesentericis agere-
 mus. Eadem tamen Venæ & nutrimentum rursus etiam afferunt, vt idem 3. facult.
 natur. 13. & 4. vf. part. 19. docet, & Arteriæ spiritum. Cum enim, inquit, in venis, quæ
 multum spatium inter hepar, & partes circa ventrem occupant, abundantia fuerit ali-
 menti, sursum fertur in hepar: cum autem vacua sunt, & nutriri auent, per easdem i-
 plas ex hepate rursus trahitur. Per easdem ergo venas simul & alimentum in hepar de-
 fertur, & rursus ab eo in ventriculū trahitur, sed non eodem tempore: quemadmo-
 dum alio tempore spiritum recipimus, alio rursus foras mittimus: ita alio tempore ie-
 cure ex ventre, alio venter ex iecore trahit. Vsum hunc adeo eximium vt opportune
 præstaret, figuram primo circularem largita est. Intestina enim, quæ annexa, longissi-
 ma sunt, quibus vt mesenterij longitudo responderet, nec tamen propterea non in
 exiguo & angusto spatio continerentur, rotundum ambitum, qui capacissimus est, in-
 depta fuere. Rursus ne distensio quoque eorundem impediretur, de qua diximus,
 dum se contrahunt ad chyli digestionem, plurimis plicis corrugauit. *Latitudinem* au-
 tem largita est spithamæ, vt venæ portæ truncus in mesenterium propagatus, spatium
 iustum haberet, in quo in alios atque alios minores ramulos discinderetur. *Substantia*
 autem ipsa summo consilio dura membranaeque est, tum quia ratione fibrarum, ubi
 opus est, extendi contrahique in omnes dimensiones potest, tum quia leuitate prædi-
 ta, quo minus inclusa vasa comprimantur. Accedit, quod densitate vapores interci-
 piat, ne quid vtilioris chyli temere ex mesaraicis vasis in ventris cavitatem exhalet, sed
 frigiditate potius membranarum in pinguedinem cogatur. Et hæc ipsa quoque *pin-*
guedo, cum media vasorum spatia expleat, non parum postea idem præpedit, nec mi-
 nimus etiam momenti præuiæ præparationi aspergit, innatum vasorum calorem fo-
 vendo,

vendo, & conseruando. *Glandulis* vasorum diuarcationes obsidentur, tum ne vasa comprimantur, si quando intestina, & ventriculus alimentis distenduntur, sicque chyli transitus intercipiatur: tum quia sagax Natura non ignorabat, vasa suscipiendis noxiis perquam opportuna fore, vbi in ramos diducuntur. Proinde ad mesenterij centrum, vbi prima vasorum distributio est, grandiusculam substruxit: cæteris vero iustissima ratione pro magnitudine cuiusque elargita fuit. Sunt nonnulli Recentiorum, qui & alium præter hos usum assignant, vt scilicet coctionem quæ in intestinis est, digestionem potius, quam assationem perficerent. Ad hanc enim maxime commodam glandularum naturam inquirunt, cum humiditatem copiosissimam ad se trahant, ex sententia magni illius Hippocratis, qui glandulas cænofo humido pasci ac quasi nutrirî credebatur. Ex his ergo copiosis vaporibus eleuatis, & in spatia intestinorum media effusis, veluti in duplici vase cibi potusque materia coquitur. Mihi tamen hic usus à Naturæ consilio non nihil alienus videtur, quod sciam, quamplurima esse animalia, quæ glandulis in mesenterio destituuntur; & ex iis etiam, quæ sua natura obtinent, nonnulla glandulis plena esse, vt quæ macilentia sunt: alia oppido quam exiguas habere, vt pingua, cum in his adeps vasorum diuisiones defendat. Pinguedo ergo cum optimæ coctionis signum sit, coctioque hæc citra glandularum usum absoluat, credibile omnino est, nihil ad hanc ab illis conferri. *Connectitur* autem merito antè intestinis, cum ad hæc deducat vasa, ex quibus chylus attrahatur: posterius, lumborum primæ, & tertiæ vertebræ ligamenti validissimis, ne in violento corporis motu, qui in saltu præsertim fit, aut cursu, à pondere cibo turgentium intestinorum detractum disrumpatur. *Ortum* autem à lumbis habet, quod tutius hic longe, quam alibi Venæ, Arteriæ, & Nerui in ipsum inferantur.

CAPVT XI.

De Pancreate.

PANCREAS, *παγκρέας*, & *καλλιπρέας* Græcis dictum, ^a omnium est nostri corporis glandularum maxima, & rubicundissima, proptereaque carni molliori, à qua appellationem traxit, admodum similis. *Figuram*, vt reliquæ, ovalem non seruat, sed in-forme ac laxum corpus est, tres aut quatuor digitos longum: in sinistra parte prope ^b lienem situm, cui superius ventriculus incumbit, inferius peritonæi membranæ, quibus valide adnectitur, subiacent. In medio ^c Splenicam venam ad lienem transeuntem, simul & ^d celiacæ arteriæ ramum sinistrum, ac neruos sexti paris, qui ad ventriculum, & Duodenum migrant, quemadmodum & meatum biliarium, in se complectitur, & suffulcit. *Membranam* quoque habet tenuem, à peritonæo prosectam, qua inue-
stitur, & veluti suspensum tenetur.

Hoc nonnulli dissectionum Professores puluinaris cuiusdam vices obire, & ventriculo subterni credunt, ne repletus is duritie vertebrarum lædatur. Meo tamen iudicio potior usus ille est, qui glandulis quoque cæteris communis, vt attendatur vasis, ne, cum incumbere alteri corpori minime possent, periculo ruptionis opportuna redderentur. Accedit alterum compressionis, à ventriculo ciborum copia distenso, quod

Etymologia.

Figura. Situs.

Membra.

V s v s.

1.

2.

3.

solers Opifex faciliè hac carne præcauit, quæ neq; tam mollis est, vt prementi cedat nimium, neq; tam dura, vt obesse possit.

CAPUT XII.

De Hepate.

Etymologia. **Q**UOD Græci ἥπαρ dicunt ἀπὸ τῆς ἡπανίας ἢ ἀλλων ἢ στόματος μορίων, ab inopia cæterarum partiū, cui succurrit, Latini jecur appellant, quasi juxta cor, aut viribus, aut situ collocatum. Tam nobilem .n. hanc partē omnes panē Philosophi pariter, & Medici æstimarunt, vt in ea animā, q̃ naturalem vocarunt, sedem ac domicilium posuerint. Obtinuit tamen consuetudo, vt Græca vox communiter quoq; vsurparetur. ^a *Po-* *483.C.C.* *situm* est in infimi vētris dextro hypochondrio, totum sub costis demersum, tanquam in loco tutissimo, superius Diaphragma, inferius Ventriculum respiciens. *Connectitur* autem non vni conterminarum partium, sed *conuexa* quidem, & *elatiore* sui sede cum Diaphragmate, à quo transuersi digiti interuallo distat, beneficio ligamenti membranei, lati, neruosi, ac impense validi, quod à peritonæo, qua septum inferiore sede succingit, enascitur, & transuersim per hepar ad posteriora excurrit. *Anteriore parte* duobus vinculis alligatur, vno quidem cartilaginis ensiformi, quod robustissimum est, latum, ac duplicatum, à membrana, qua hepar succingitur profectum: ^b *altero*, vmbilico, est- ^{b, l.} que Vena vmbilicalis, quæ fœtu in lucem edito cavitatem suam amittit, ac ligamenti officium subit. Sima connectitur Mesenterio, *vena Porta*: Costis, *Caua*: at omento, *lobo* illo exiguo, per quem aquam à Iecore in omentum transfundi supra statuimus. *Figuram* habet panē rotundam, supra conuexam, infra concavam. ^{c, C.C.} *Conuexa pars,* ^{d, 8.8.A.A.} *læuis est, & æqualis*: ^e *cava* (quæ & sima dicitur) varijs protuberantijs sinibusque exasperata. *Inter protuberantias* dignæ sunt notatu, ^e *duæ illæ* exiguæ eminentiæ, in ^{e, N.} *dextra parte* circa ^f *venæ portæ* egressum locatæ, quas Galenus cum tota Asclepiadum familia *πύλας*, sine *Portas* vocauit. Imprimis verò ^{f, B.} *Lobus* ^{g, M.} *exiguus*, cuius supra quoque mentionem fecimus, cum de Omento loqueremur. Hic molliore constat carne, & tenuiore, quam reliquum hepar, membrana succinctus est, de quo sanè à nemine, quod sciam, Anatomicorum, hæctenus quicquam memoriæ est proditum. Sunt & duo *sinus*, *alter* à dextris insculptus, qui veliculæ biliaris dimidium corpus excipit: *alter* læuis, vt transeunti stomacho cedat. ^{h, 8.2.a.} *Fissura* tandem quædam ^{i, L.} *anteriore sede* cernitur, per quam ⁱ *vmbilicalis vena* egreditur, *διασπαρῆ* Herophilo appellata. *Magnitudo* jecoris tanta est, vt vnuersum dextrum hypochondrium impleat, & nonnunquam extendat sese vsque ad regionem vmbilicalem. Cæterum plurimum pro subiectorum diuersitate variat: obseruataque à me plarunque hæc fuit proportio, vt, quibus magnum jecur est, ijs quoque magnus sit Ventriculus, & contra. Obtenet autem Homo jecur omnium animalium maximum, proportionem sui corporis habita. Vidi enim sæpenumero tam vastam eius molem, vt ad Lienis regionem validis ligamenti annecteretur diaphragmati. Ipsa autem magnitudo penes ætatem quoq; multum variat. nam pueris maximum est, vt plus sanguinis conficiatur pro augmento corporis: adultis minus: adhuc minus, senibus, vt sic juxta ætatem jecur paulatim decrescat.

l, demon-
stratur 8.8
fig 2. crescat. *Numero vnicum* est, neque vt in reliquis animalibus brutis in lobos diuisum, *Nume-*
 sed integrum solidumque. *Substantiam* habet rubram, ac mollem, concreto sanguini *rus.*
 perquam similem, quæ ^l innumeris venarum Portæ & Cauæ radicibus circumiecta *Substantia.*
 est, olim *παρέχυμα* Erasistrato dicta. Tegitur hæc membrana tenuissima ac simplici, à
 ligamenti hepatis enata, quæ arctissime parenchymati iungitur. Quod si separetur a-
 licubi, excidete è vasis aquosa materia, & collecta inter ipsam & carnem, *videndæ* Græ-
 cis appellata generantur, quibus ruptis, effusq; in abdominis cauitatem, aqua, Hy-
 drops ascites nascitur. *Venas* habet tam à Caua, quam Portæ vena, quod nulli præter *Vena.*
m, F.F.F. huic visceri, aut parti totius corporis contigit. Distribuantur *m* *propagines* Cauæ magna
n, E.E.E. ex parte in conuexa sede, at ⁿ *porta*, infima, sic tamen, vt vtræque per ^o ana-
o, G.G.G. stomoses siue communia quædam oscula, de quibus superius libro quinto mul-
 ta diximus, inuicem committantur. Plures autem multo sunt venæ portæ sur-
 culi, quam cauæ, adeo vt si definire numerum etiam libeat triplo plures esse
 non malè dicturi simus. Inter has, tenues quædam gracilesque propagines dedu-
 cuntur, venis oppido quam similes, quæ cum Portæ radicibus similiter per ana-
 stomoses iunctæ, sensimque in maiores collectæ, tandem in vnum caudicem ab-
 eunt, per quem bilis ab hepate in vesiculam fellis deponitur. *P* *Arteria* paucae sunt, à *Arteria.*
 dextro Cæliacæ ramo exortæ, quæ in sinistram hepatis partem, quo loco vena portæ e-
 greditur, disseminantur. *Nervi* duo sunt, ijque exigui, à sexta coniugatione deriuati, *Nervi.*
 qui per ipsius tunicam, quæ cauam succingit, disperguntur. Horum alter, à ramo qui
 superioris ventriculi orificium adit, transmittitur: alter, à ramo illo, qui radicibus costa-
 rum dextri lateris expanditur.

p. 8.8.1.H.
q. L.

ACTIO *Iecoris* est, chyli à venis mesaraicis ex intestinis attracti, & ad radices por- *ACTIO.*
 tæ in cauam partem delati, coctionem in venis adiuuare, vt optimus, & nutritioni
 corporis opportunissimus sanguis elaboretur. Nec enim crediderim veram esse eorū
 sententiam, qui statuunt, chylum hunc ad hepar deductum, è portæ venis, in ipsum
 parenchyma excidere, in quo perfectionem ac rubrum colorem indipsceatur, inde à
 Cauæ radicibus attrahi, & per totum corpus diffundi. Nec. n. vnquam id reperire mi-
 hi in vllō animalium licuit, quæ propterea post pastum aperui, vt taceam, absurdam
 hanc esse opinionem, & à Naturæ consuetudine alienissimam, quæ nullibi extra vasa,
 siue chylum, siue sanguinem, præterquam in corde, in quo caloris fontem constituit,
 & sinus ac cauitates peculiare propterea exstruxit, effundit. Venæ ergo sunt, quæ *Venas he-*
 sanguinem coquunt, & in se vim ac facultatē sanguificandi insitam habent, quod nec *patis san-*
 ipse quidem *Galenus* negare potuit, qui i. v. part. 16. sanguinis generandi & in om- *guinam*
 nes partes ferendi gratia venas factas testatur. Et 4. v. part. 7. hanc facultatem ipsis *conferre,*
 tributam inquit, ne dum per eas fertur sanguis tempus ipsi alimento frustra pereat.
 Quin imo de different. morbor. 7. validissimo etiam argumento comprobatur, cum ve-
 narum affectus obitare inquit, quo minus sanguis utilis gignatur. Si ergo rectè con-
 cludimus, cerebrum rationis esse domicilium, quod eo læso & laborante, mentem no-
 stram minus valere cernimus, rectè profecto & venas sanguinis officinā vocabimus,
 quod ijs affectis, protinus prauum ac deteriore sanguinem generari videamus. Co-
 ctionem

*Hepatis
parenchy-
ma quos
usus præ-
stet.
Exemplū.*

ctionem tamen hanc plurimum adjuuat hepatis parenchyma, quod & Venas ipsas stabilizat, ne concidant, aut confundantur; & calorem fouet, ne expiret, vel dissipetur, tum de suo etiam non nihil impertit. Atque ut exemplo illustrem quæ jam dico, non noui præclarius, & quod parenchymatis usum rectius exprimat, quam ipse ventriculus, qui cum in se propriam habeat, ac insitam facultatem conuertendi alimentum in chylum, nihilominus citra circumstantium viscerum operam, (ut testatur Galenus, vel ex historia illius cui omentum exemptum fuit) chylum vel crudum, vel certè semicoctum relinquit. Sic Venæ utcumque vim sanguinem generandi in se habeant, nisi tamen facultas quædam externa quoque ab hepatis calore accedat, illa quam primum dissoluitur, & perit. Rursus ut eorundem viscerum affectus in ventriculi detrimentum concedunt, (videmus enim Liene refrigerato aut scirrhum patiente coaffici ventriculum) ita quoque hepatis parenchymate læso sanguificatio protinus afficitur. Nam siue calida laboret intemperie, siue frigidam suscipiat, mirandum non est, eandem venis è vestigio communicari, quæ ita ipsius parenchymati permixtæ sunt, ut vix quisquam Anatomicorum hactenus fuerit, quin sibi persuaserit, ideo ab hepate enasci. Non ergo venis tantum hepar auxilio est, sed & Ventriculo, cuius coctionem eodem quo diximus de venis pacto, auget, seruatque.

VSVS.

Quam commodè autem huic actioni visibusque omnia inferuiant, nunc breuiter tradamus. Primum *in infimo ventre situm* est, ne ab alijs visceribus quæ alimenti elaborationi subueniunt, disparatum esset, maxime cum ex ijs sit, quæ familiam in hoc genere ducunt. Situm autem est *in elatiore parte*, cum inferior ab intestinis impleatur, ut superflua primæ coctionis sine aliarum partium incommodo extra corpus quam citissimè pellerentur. Accedit quod in medio trunci sic situm sit, ut æqualiter ad supernas infernasque partes sanguinem dispescat. Tenet autem *hypochondrium*, ut Ventriculus utrinque ab ipso, & Liene foueatur: quia tamen Liene nobilius est, propterea & *dextrum* locum, & nobiliorem occupauit: sub costis spurijs reconditum, ut tutum se ab omnibus externis iniurijs præstaret. *Connectitur* autem merito vicinis partibus, ut ubique alligetur, nec pondere suo moleque ruat. Et diaphragmati quidem, ne deorsum cadat: umbilico, ne ad superna rapiatur: cartilagini ensiformi, ne dum extendimus dorsum, ad posteriora declinet: costis, ne nimium ad anticam partem, flexo corpore, excidat. *Figuram* autem variam habet, cum peculiarem non exigat, sed vel vicinis partibus ne incommodet, vel alijs ut accomodet, conformatum sit. Superior ergo pars conuexa est, læuis, ac æqualis, quo diaphragmati cedat, eiusque cavitati congruat: inferior sima, ut ventriculum amplectatur, qui cum sphaericus sit, rotundum ambitum accepit, ut ubique æqualiter tegat. Hinc factum est, ut omnibus animalibus eadem hepatis figura non sit, sed ijs quibus Ventriculus est oblongus, jecur quoque oblongum contigerit; quibus rotundus, rotundum. Homini autem *maximum* obtigit, ut plus sanguinis reciperet, quo, si à corde discedas, omnium viscerum refertissimum est, 3. de part. 12. cum Homo ex omnibus sanguineis plurimo abundet, ne deficient spiritus in tot obeundis animæ functionibus, quas plures præ cæteris animantibus accepit. Et propterea *unicum* quoque est, cum numerum magnitudo compenset. *Substantia* autem, ut reliquorum viscerum, parenchymatis, quæ sit in prima fætus generatione, excidente è venis sanguine,

sanguine, & concreſcente. Venis enim, arteriſque vndique intexitur, vt & aperta ipſa conſeruentur, nec concidant; & decenſe ordine, nec confundantur, quæ ratio communis eſt omnium parenchymatum. Decuit enim alicubi congeriem eſſe venarum, in qua potiſſimum concoctio celebraretur, maxime cum non vna, ſed gemina vena requirebatur, quod ſupra demonſtrauiſmus, quæ per anastoſes inuicem coniungerentur. Venas autem cum nullibi tutas ſciret ſagax Natura, niſi vbi alicui ſolidiori corpori inniterentur, ideo carneam maſſam circumiecit, ſpatiaque omnia ſic expleuit, vt ab omni periculo tuta liberaque forent. Tegitur autem hæc ſubſtantia *membrana*, tenuiore, quam lienis eſt, quod arteriarum copia tanta non eſſet, quæ cogeret diligentius vaſa ſtipare. Præcauit enim Natura vbiuis, ne quidquam inutile, aut non neceſſarium conderet. *Venas* autem habet tum à Caua, tum Porta, vt ex portæ vena reciperet Chyli tenuiorem partem Caua, vt complexi ſumus in ſuperioribus, libro quinto: Portæ autem vena craſſiorem retineret, ſicque poſtea ſanguis deſæcator vitales animaleſque partes nutrirer; craſſior vero, naturales. Hoc nomine *anastoſes* condidit, quæ viam tranſeunti chylo, aut ſanguini elargiuntur. In medio autem ramorum portæ excurrunt tenues quædam venulæ, quæ poſtea in caudicem collectæ in fellis veſiculam deſcunt, vt quidquid bilioli eſt in chylo, antequam ad Cauam tranſmittatur, in Porta exſugatur. Pauca ſunt *Arteriæ*, eæque tantum in ſima parte, cum ad conuexam plurimum vitalium ſpirituum à corde per venam Cauam transferatur. *Nervos* habet, ne ſenſu omnino deſtituatur: ſenſus tamen hic obtuſus admodum eſt, quod & exiles ſint ærui, nec altius ſe penetrerent.

Cæterum cum de ſanguinis generatione diuerſæ extent Authorum ſententiæ, apud omnes tamen receptum ſit, in iis potiſſimum venis, quæ per hepar diſperguntur peragi, anſam nobis hic locupletiſſimam datam exiſtimauiſmus, noſtram quæ de ſanguinis generatione eſt, ſententiam, hoc loco breuibus explicandi. Alimenta ergo, ſiue ſolida ſint, ſiue liquida, primam quandam ac præuiam præparationem in ore accipiunt per maſticationem, quæ dentium opera ſit. Hinc deglutita, ad ventriculum tranſmittuntur, qui vndique circumamplectens, ac debito tempore retinens, in chylum beneficio, tum caloris innati, quem habet, tum viſcerum adiacentium, præcipue autem hepatis & lienis, vt & omenti, conuertit. Inde vbi quam optime elaboratus eſt, leuior redditur, à fundo aſſurgit, & ſuperna petit, ſicque pylorum ſtimulando, quo reſeratur efficit. Videmus enim excrementa alui quoque, quo magis concocta ſunt, eo leuiora eſſe, grauiora, quanto minus paſſa à noſtro calore fuerint. Hoc ergo aperto, ventriculus ipſe tranſuerſis fibris ſe ſtringens, ad inteſtina propellit, inque via, ſi qua portio minus exacte præparata fuerit, vltiore coctione abſoluitur. Inteſtina Chylum acceptum protinus, copia ipſius irritata, à ſe detrudere conantur, proindeque ad inferiora pellunt: at plicæ, quo minus totus elabatur impediunt, ſeu potius, vt æqualiter extendatur, efficiunt. Hinc Venæ & Arteriæ meſaraicæ, quicquid vtilis eſt materiæ hauriūt, illæ quidem plus, hæ minus: illæ que ad Hepar transferunt, hæ ad Lienem. Tenuius enim eſt quod arteriæ accipiunt; craſſius, quod venæ. Cæterum dum chylus ad hepar ſic contendit, & iam ad venæ portæ diuarcationem peruenit, Lien ingenira facultate per ramum Splenicum craſſiorem ac terreſtriorem eius partem ad ſe allicit, vt ad he-

par, non nisi laudabiliores partes deferantur. In hoc itinere chylus aliquam præparationem suscipit, elaboratur autem ulterius, tum in hepate, tum liene. Nec tamè omnia vasa in jecore concoquunt, sed tantum venæ portæ, in qua si quid biliosi occurrat, protinus per meatus bilarios, partim per cysticum ad fellis vesiculam, partim per hepaticum subito ad jejunum intestinum, demandatur. Vbi perfectus est sanguis, eius *tenuior pars* per anastomoses in Cauæ radices deponitur, & partim per truncum ascendentem, partim per descendentem abit. Per illum ad superiora, & ad cor deferitur, & quidem in dextrum ipsius ventriculū, in quo attenuatur, postea in venam arteriosam distribuitur, tum ad pulmonum nutritionem, tum ut per arteriam venalem ad sinistrum cordis sinum abeat, in quo extremus colophon (ut ita dicam) imponitur, cum attenuetur ulterius, & in sanguinem arteriosum vertatur, qui postea per Aortam pro vita singularum partium, diffunditur. Per descendentem autem truncum venæ cauæ, ad reliquas omnes partes nutritioni non dicatas digeritur. *Crassa contra*, ad mesenterij nutritionem descendit. Illa pars, quæ ad Lienem abiit, ubi iam elaborata & confecta est, partim lienem ipsum, partim viscera omnia, ad quæ Splenica vena pertingit enutrit, puta ventriculum, omentum, & coli sinistram partem, ac rectum intestinum. Quia tamen pars quoque serosa, una cum chylo vecta est, quo per angustissimos quoque anastomosium meatus sanguis penetraret ad Cauam: ea autem nutritioni postea profus inutilis sit, ut & illa ex corpore quamprimum amandetur, per emulgentia vasa, tam venas, quam arterias à Renibus attrahitur, à sanguine separatur, & per earunculas papillares transeolatur in fistulas, in quarum pelui collecta, sensim per canales vterumque in vesicam destillat.

C A P V T XIII.

De Vesicula biliaria.

IN hepatis caua parte, qua dextrum ventriculi latus amplectitur, sinum insculpi oblongum pro vesica biliaria, præcedenti capite diximus. De hac ergo cum nobis sit agendum, à nomine, nostro more, exordium petemus. Vocatur Græcis κύστις χολώσις & χολιδόχος, Latinis Vesica, aut folliculus felleus, quia conceptaculum sit, in quo biliosum venæ portæ excrementum colligitur. *Connectitur superiore* mediaque sui portione cum hepate, cui secundum latitudinem in sinu proprio innascitur: *inferiore* autem reliqua, extra substantiam jecoris libera propendete, ventriculi dextro lateri, coloq; intestino incumbens, sæpe numero vtrumque flauitie tingit. Parua est, & vix duos longitudine transuersos digitos æquat: variat tamen hæc magnitudo pro temperamento, & copia bilis, qua impletur. Calidioribus enim maiorem esse deprehendi, & in Dysentericis Dissectis vsque adeo grandem sæpe vidi, ut naturalem magnitudinem multis modis superaret. Formam refert subrotundam, à latiore basi in angustum apicem, pyri instar definens. *Duplici membrana constat*, una exterior, tenui, & communi, fibris omnibus destituta, sed nonnunquam pinguedine obducta. Hæc à iecoris tunica enata, dimidiam tantum partem succingit, eam scilicet, quæ extra iecoris sinum prominet. *Alteram membranam propria*, crassa, validaque est, triplici fibrarum genere intertexta, ex quibus

extima

*Ety-
mologia.
Cōnexio.*

*Magni-
tudo
Figura.
Substantia*

extima tranſuerſæ ſunt, *intima* rectæ, *media* inter vtraſque, obliquæ, rectis longe pau-
ciores. Interius *mucosa* quadam *ſubſtantia*, ab excrementis tertiæ coctionis enata ob-
tenditur, quæ prohibet, quo minus à bilis acrimonia lædatur. Generat enim quævis
membrana mucosum excrementum, & viſcidum, cuiusmodi & pus eſſe ſolet, quod
ſiue vlceribus, ſeu vulnere adfecta conſicit. Ipſa autem membrana in æqualem craſ-
ſitiem naſta eſt, cum in fundo tenuior ſit, in ceruice, durior craſſiorque. Habet & *Vaſa*
omnis generis: *Venas* quidem duas capillares, à venæ portæ trunco, vtrinque, antequam
in ramos diuiditur, enaſcētes, quas *cyſticas* vocant. *Arterias* ſimiliter duas impenſe gra-
ciles, à dextro Cæliacæ arteriæ ramo, eiſque ſuperiore ſede, vbi hepatis cauum ingre-
ditur, enatas, quæ eandem cum venis appellationem habent. *Nervum* tandem exilem,
& vix conſpicuum, à ſextæ coniugationis ramulo, qui iecoris tunicam perreptat. In-
feruntur hæc vaſa, primum in ceruicem veſiculæ, deinde ad fundum, in infinitos ra-
mulus diſperſæ, propagantur.

Vene.

Arteria.

Nervi.

a. 8. 8. 1. a.

b, b.

c, F.

d, F.

e, G.

f, c.

g, c. d.

h, 8. 7. H.

Diuiditur veſicula fellis à diſſectionum profeſſoribuſtrifariam, in fundum ſcili-
cet, ceruicem, & meatuſ bilarios. ^a *Fundum* appellant illam partem, quæ latior eſt, &
extra hepar prominēt, membrana comuni recta. ^b *Cervicem*, ſtrictiorem, quæ ſen-
ſim in anguſtiorē meatum definit, vnde ^c *cyſticuſ* meatuſ exſtruitur, vbi *Valvulæ*
tres bilis reſreſſum præpedientes, ſitæ ſunt. Haſ ſi videre cupiaſ, expreſſam ex veſi-
cula bilem in meatum digitis reprime. nam circa *Valvulaſ* immobilem conſiſtere ad-
vertet. *Meatuſ* tandem duo, *ποροι χολιδόχοι* dicti, *meatuſ*, vel *pori bilarii* Latinis, quorum
^d *primuſ* eſt, quem modo ex elongata *Veſiculæ* ceruice pronāſci diximꝰ: ^e *alter*, ex
hepate egreditur, interdum vno, interdum gemino ramo, at ſtatim coeunte in ſimpli-
cem, qui inferiore omenti membrana ſuffultuſ, venæque ſubſtantiam mentituſ, de-
ſcendit, ac cum primo meatu ^f *coiens*, & *communem canalem* conſtituit: vltერიſ deinde
progreſſuſ, in Ieiuni inteſtini principiuſ ^h *inferitur*. Inſertio autem hæc non re-
cta eſt, cum oblique inter vtramque inteſtini tunicam duorum quaſi tranſuerſorum
pollicum longitudine deducatur, interioreſ vero perforat. Vocatur prior meatuſ
cyſticuſ, alter *hepaticuſ*, vterque à parte vnde originem trahit. Ille enim ex veſica, hic
ex hepate bilem ad inteſtina purgat. Vt autem ad veſiculam ab hepate transferatur,
innumera quædam exileſ venulæ ſunt, inter radiceſ venæ portæ diſperſæ, quæ poſtea
collectæ ſenſim, in ſuperioreſ veſiculæ partem eam, quæ ſinui hepatis adhæret, & vbi
longuſ quidam *valvulæ* oblongæ inſtar, ductuſ eſt, terminantur. Alter autem meatuſ
ſimiliter infinitiſ ramuliſ in hepate inter Cauæ radiceſ excurrit, & poſtea in vnum
caudicem, vndique omnibuſ propaginibuſ collectiſ, tranſit.

Partes
diffimi-
lares ve-
ſiculæ
felleæ.
Fundus.
*Cervix.**Meatuſ*
*bilarii.**Commu-
niſ cana-
liſ.*

VSVS.

V s v s *Veſicula fellea* eſt, dum ſanguis in venæ portæ radicibuſ coquitur, quidquid
calidi & ſicci eſt in chylo, vt in alimentum commodum homini cedere nequeat, ad ſe
trahere, & poſtea ad inteſtina demandare, vt ipſa irritata acrimonia bilis, quidquid ſe-
cum, & inutiſ excrementi reliquuſ eſt, è corpore depellant. Sapienter ergo ſagax
Natura hepati *adiunxit*, ne longiuſ ſcilicet abeſſet ab officina, vbi excrementa,
quorum receptaculuſ eſt, colliguntur. Poſuit autem in caua regione, cum in hac
ſanguiniſ coctio celebretur, vt quam proxime ſcilicet à venæ portæ radicibuſ, venulæ
quibuſ bilem allicit, abeſſent. *Figuram* etiam largita eſt rotundam, vt capaciſſima

foret : sed cum globi modo adamussim sphaerica non posset esse , ne scilicet à Colo subiecto, aut Ventriculo cibus repleto premeretur , rotunditatem ipsius longitudine compensauit. Rursus vt eadem impleta extenderetur , & iterum inanita subsideret , *membranam substantiam* , omnis generis fibris donatam , nacta est : at ne eadem à bilis acrimonia noxam subiret , *mucoso quodam ac viscido humore* interiore parte oblita , quæ liberam innoxiamque præstat. Trahunt autem bilem exiles illæ venulæ , quæ in medio radicum portæ disperguntur , feruntque ad superiorem partem , in canalem oblongum , vt sensim exstillet in cavitatem. *Valuulam* autem hic exprimit , vt si quando (quemadmodum sæpissimè fit) vesicula obstruatur , totaque turgeat bile , nihil tamen ad hepar regurgitare queat. Quod si venarum oscula libere in cavitatem hiascent , impediri regressus neutiquam potuisset : at sic , dum in canalem hunc patent, folliculo pleno, valuula comprimitur, sicque clauduntur. Trahit autem mea sententia, atque in hunc usum præter alterum meatum condita est, quando vel copiosa bilis in corpore abundat, aut recto tramite, repleto vel Ventriculo, vel intestinis, expurgari nequit. Hinc rationem petas , cur famelicis promptius, quam ijs , qui alimentis plenum habent stomachum Ventriculus bile scat. Vacuo enim stomacho in jejunum recto itinere fertur, & si biliosi sint, copiosè refunditur, vnde pyloro præter naturæ leges laxius patente, facili negotio aliquid Ventriculum subit. Ex eodem quoque fonte licebit respondere , cur quibus duris & cibis colon intestinum turget, & dura sunt aluo , capitis doloribus sint opportuni. Non enim hi excitantur, quæ vulgo adfertur ratio , à foetidis vaporibus ad caput exhalantibus , (nam quæ duriora sunt ea excrementa, eo vaporis foetorisque magis expertia) sed quod pressa à colo vesicula fellea, & immemor sui officij reddita, biliosum recrementum ex hepatis vasis in sanguinis generatione non elicit purgatque, vnde retentum in venis, & digestum per corpus, quamcumque partem imbecilliorē inuenerit, (solet autem esse vt plurimum caput) eam afficit, & labefactat. Euacuatur autem absoluta sanguificatione, cum plena ferè facta est , & jam vniuersum id, quod utilis erat in chylo, ex intestinis attractum fuit. Mittit autem ad intestina, & quidem per meatum cysticum, cuius initio *tres valuulae* foris spectantes appositæ sunt, quo minus regrediatur. Et hic ipse meatus *in principium ieiuni intestini insertus est*, quod intestinum hoc primum sit, in quo chylus parietibus adhæret, ob plicas, per quas chylus quasi distenditur, vt sæpè jam diximus. Quia autem frequentiores hoc, quam ileum habet plicas, rum maiores etiam, ideo Natura sagacissima effecit, vt bilis sincera adhuc, nec chyli moderata temperie, jejunum acrius irritaret. Sapienter autem hoc excremento abusa est, cum *acrimonia* quidem sua stimulare intestina officij sui immemora posset : deinde *tenuitate* quas habet partium, pituitam, quæ in gracilibus cumulatur, incidere, derergerè, & expurgare : *siccitate* tandem, quo minus in intestinis putredines fiant, prohibere, *Alter meatus, hepaticus dictus*, qui in ijs quoque semper animalibus reperitur, quæ Vesicula carent, eo trahit tempore, quo Ventriculus cibus destituitur, similiterque ad intestina per communem canalem subito deportat. Fit vt interdum meatus hi obstruantur, imprimis vero fellis Vesicula, ex quo deinceps bile non expurgata, plurima incommoda longo ordine se consequuntur. Nec tamen

alteru-

Vfus Ve-
sicula fel-
leæ.

Vfus mea-
tus hepa-
tici.

alterutro tantum obstructo, vt quidam ignari Anatomiae blaterant, Icterus nascitur, qui protinus atque hunc viderint, vesicæ felleæ obstructions crepant: sed aut utroq; aut communi canali, cum alter alterius officium mox subeat. Habet tandem *Venas*, vt alatur: *arterias*, vt viuatur: *neruos*, vt sentiat. Est enim inepta explodendaq; eorum opinio, qui bile, siue nutrirî, seu delectari existimant. Eccur enim Natura, quæ nihil vnquam frustra condidit, tanto artificio per vniuersum vesiculæ corpus, tot exiles venulas deduxerit, sanguinemq; largita fuerit, nisi & illas, & hunc officio suo destinasset?

CAPVT XIV.

De Lienæ.

LIEN, Græcis σπλῆν dicitur, ἀπὸ τῆ σπλῆν, quod trahere significat, quia, vt loquitur Aristoteles, 3. de part. anim. cap. 7. ἀντισπᾶ ἐκ τῆ κοιλίας τὰς ἐκμαδας τὰς περὶ σπλῆν, ex ventre superfluos humores ad se trahit. Latini græca voce sepius Splenē, sua Lienē vocant, quæ vox vnde sit deducta, ab Authoribus non traditur. ^a *Situs* est, in infimi ventris hypochondrio sinistro, è regione hepatis: sed paulo depressius, non tamen vsq; adeo, quin adhuc sub spurijs costis contineatur, q; propterea notandum est, ne erremus cum Medicis quibusdam, qui etiam in sanis lienē tactu deprehendi, sibi alijsq; temere persuadent. Est tamen *vnus* tantum, quamuis præter naturam duplex quoq; nonnunquā obseruatus sit. *Connectitur* elatiore quidem parte, diaphragmati; inferiore, renis sinistri membranæ externæ, vtrinq; exiguis gracilibusq; membranæ. *Sima* parte primo superiori membranæ omenti, deinde ope vasorum Ventriculo: *conuexa* vero, dorso. Hinc est, vt schirro laborantes de respirationis difficultate conquerantur, quod diaphragma mole lienis deorsum trahatur. *Quin* et si vincula hæc rumpantur, obseruatum à nonnullis est, herniam natam fuisse. *Magnitudinem* quod spectat, homini ex cæteris animalibus proportionem corporis maximus contigit, minor tamen est multo, quam hepar, vt qui longitudine quasi sex digitorum, latitudine trium, crassitie sit vnus. Fit tamen vt in summam molem abeat, mireq; intumescat, sepeq; ad abdominis vsq; medium porrigatur, humorum affluxu, quos facile ob carnis laxitatem admittit, concitato. Semper tamen minor maiore melior est, nisi admodum paruitate peccet, quod & ipse annuit Aristoteles, 3. de histor. animal. 16. Sic Laniones nostri ex viscerum paruitate, referunt hepatis & lienis, carniū bonitatem dijudicant. Obseruauimus autem eos, qui in palustribus habitant locis, maiorem habere, quam qui sicca incolunt: & qui amplius sunt præditi venis, maiorem, quam qui paruas habent. Exinde contingit, vt macilentis pinguioribus facilius in tumidos lienes incurrant. ^b *Figura* ipsius est oblonga, linguæ bubulæ, secundum Hippocratem; suillo lieni juxta Aristotelem, similis. Est ergo oblonga, Geometrarum & Euclidis ἐπερόμηνες, siue quadrilateram figuram, altera parte longiorem exprimens. hinc Splenia apud Antiquos dicebantur linteola oblongæ figuræ, quibus cerata aut emplastra oblinebantur; inde ad omnis generis linteola translatum est, & emplastra. hinc Martialis Spleniatum mentum vocat, quod splenio obvolutum. Sic enim lib. 10.

Etymologia,

Situs.

Numerus.
Connectio.

Magnitudo.

Figura.

*Cur spleniatō saepe prodeam mento,
Albare pictus sana labra cerussa,
Philani, quæris: bafiare te nolo.*

Superficies.

Superficiem habet, vnam, exteriorem, qua costas respicit, & *gibba* dicitur; alteram^c interiorē, qua spectat ventriculū, & *concaua* vocatur. Vtraque læuis est, & æqualis, nisi vbi linea recta,^d ῥ' α φ η dicta, in sima consistit, quo loci^e Splenica vasa lienem ingre-^{d.} diuntur. Ruffus & Hippocrates aliam quoq; diuisionem habet. Summam enim par-^{e.} tem, *Caput*; infimam, *Caudam* appellant. Quod si ab hac figura discedat, fit Triangularis nonnunquam, quandoq; globosa; interdum varijs extuberantijs exasperatur. Aliquādo in capite est crassus: in cauda gracilis, interdum contra. Illum Hippocrates *lienem*

Substantia.

accliuem; hunc *decliuem* appellat, & mentionem inijcit 6. Epidem. sect. 3. text. 33. ^{f.} *Sub-* f. 8. 9. 3. stantia eius est παρίχμουα, sed laxum & spongiosum valde s innumeris venarum arteriarumq; propaginibus refertum, ex quo fit, vt vbi humorem imbibit, in maximā molem se tollat. Hæc^h *membrana* vndiq; tegitur, quæ tenuis quidem est, si in se consideres; at si contendas cum hepatis membrana, crassiuscula apparebit. Oritur ex membrana

Membrana.

Color.

peritonæi, & lineæ rectæ lienis inseritur, totumque postea viscus succingit. Hanc obseruauimus non raro, in senibus quibusdam in osseam naturam degenerasse. *Color* in embryone rubeus plerumque semper cernitur, si sana habeat viscera: in adultis ad nigredinem nonnihil declinat. Monstrauimus tamen non semel in publico Theatro Patuij, Lienem satis magnum, Iecori rubedine non cessasse, vt propterea existimē, lienē nigriorem multo hepatis parenchymate, non benè sani hominis esse, vtcunq; magnitudinem naturalē non valde superet. Quod si præter naturam se habeat, humoris quē in se traxit colorem exprimit, & velliuidus, plumbeus, aut cinereus est. *Vasa* habet omnis generis: & ⁱ *Venas* quidem, à ramo splenico, qui vbi ad ventriculū & omentum

Vena.

propagines plures disleminauit, torus postea in lienem absumitur, ^l *cauam* ipsius partem, vbi ^m linea recta est, ingressus. Vtcunq; autem ramus ipse amplius est, & insignis, ⁿ rami tamen ac primū in parenchyma absorpti, in tenuissimas & capillares fibras, easque innumeras degenerant. Antequam etiam ingrediatur, eximia quadam & insigni ^o anastomosi cum arteria comite coniungitur. *Arterias* habet à Celiacæ ramo sinistro,

Arteria.

quæ quintuplo plures sunt, quam venæ, vt omnino credibile sit, in lienis tumoribus, alijsq; affectibus scirrhis, materiam copiosiore in arterijs, quam venis contineri, & propterea per arterias quoq; sæpius, quam venas euacuari. Quod & designat viæ breuitas, quam Natura semper in recrementorum expurgatione sequi solet, quæ per arterias potius, quam venas esse videtur. Sunt enim quatuor loci per quos Lien expurgat humores prauos, vt testatur Hippocrates, lib. de morb. 4. Osputa, nares, vrinæ meatus, & podex, ad quas omnes, si primam exceperis, breuissima via per arterias, longa nimis est per venas. Ad *Ventriculū* enim, vnde ad os postea demandatur transmissa materia, arteriæ copiosissimæ à splenico celiacæ ramo abeunt, Gastrica præsertim, Gastroepiplois sinistra, & Vas breue arteriosum. Quamquam & per venas hic eadem breuitas sit, cognomines comitesq; arteriarum; sed imprimis per vas breue dictum, de quo notatu digna est historia Cardinalis Cibonis apud Valuerdam in Anatome, libro 6. c. 5. Exstinctus hic erat sanguinis per vomitum reiectione, cumq; à Medicis aperto cada-

Per quas vias Lien expurgatur.

i, 8. 9. 1.
B.B.
l, A. A.
m. a. a.
n, vide 8.
9. 4. vbi omnes lienis vena à parenchymate denudata proponuntur.
o, C.
p, 8. 9. 1.
C. C.

uere

uere causa tanti fluxus inquireretur, compresso ventriculo viderunt Lienem turgescere; rursus hoc compresso, ad ventriculum copiosum sanguinem per vas breue effundi. Ad *nares*, in ijs qui splenetici per hæmorrhagias sanantur, vt Bion apud Hippocratem in Epidem. lib. 2. sect. 2. tex. 27. facilis via est, ex arteria splenica in Cæliacam, ex hac in Aortam, à qua in caput certissimus est ductus. Per *vrinas* similiter à cæliaca statim via ad emulgentes est, ex his per renes & vteres ad vesicam. Vnde Hippocrates libr. de internis affectibus, Lienosis diuretica iubet præscribere; & lib. de externis affectib. biliosis, qui magnum lienem habent, ac ideo prauis ac fædi coloris sunt, malignaq; contrahunt vlcera, vrinas vult subduci. Ad *podicem* per arterias & venas hæmorrhoidales æqua via est. *Nervi* tandem sunt exiles, à sexti paris ramo, qui in ipsius membranam exporriguntur, in substantiam autem non penetrant.

De Lienis actione plurimæ sunt dubitationes & controuersæ, quas nos breuitatis studio ne attingemus quidem. Plerique tamen statuunt, receptaculum esse humoris melancholici, qui in hepatis sanguificatione, tanquam crassum excrementum separatur, (cum tenue per vesiculam bilis purgetur,) & ab hepate ad lienem demandatur. Quam sententiam, vt omnino falsam demonstramus esse, singula verba accuratius considerabimus. Et *receptaculum* quidem esse non potest, cum nullam obseruet conditionem earum, quæ conceptaculis excrementorum propriæ sunt. Nec enim cauitatem habet, vt bilis vesicula, intestina, & cerebri ventriculi; nec humorem continet eiusmodi, cuius receptaculum esse dicitur, cum in sanis lien purissimo sanguine semper scateat; nec propè est ad locum, à quo excrementum haurire dicitur, sed potius è regione situm: nec tandem locus est, per quem commodè extra corpus excrementum illud pellat, cum potius in suprema imi ventris regione, vbi nobilissimorum viscerum sedes est, sit locatum. Qui autem humoris melancholici conceptaculum sit, quod nullam cum ipso obseruet proportionem? Omnium enim consensu Melancholia in minima quantitate gignitur, & tamen lien vesicula fellis, cæterisque excrementorum receptaculis multo est maior. Quod si melancholia illa in hepate generetur, qui sit vt non pariter statim ex hepate trahat, vt fellis folliculus, aut per quas vias immediatè ad lienem ducitur. Quod si per splenicum ramum dicatur ferri, quam absurdum id erit, Naturam non statim ad intestina deduxisse, sed prius ad lienem, vt in ipso conseruetur, cum via vtraq; eiusdem sit breuitatis, & incommodum præterea inde futurum sit, vt melancholicus hic humor omnem sanguinem splenicorum vasorum contamine. Quare omnino statuerim, verissimam esse Aristotelis sententiam, 3. de partib. animal. 7. hepar & lienem cibi concoctionem iuuare, & lienem ipsum quasi jecur adulteratum esse. Hoc patet, quia conditiones omnes habet, quæ ad eam rem requiruntur. Habet enim Venas & Arterias, habet angustissimos meatus, habet parenchyma quas omnes Galenus diuersis in locis tradit, & maximè necessarias, ac quasi proprias esse testatur. Accedit, quod læsoliene iisdem morbi contingant, qui hepar affectum sequuntur. Est & ratio anatomica maximi momenti, quod cum cætera viscera, partesq; bipartitæ sint, Natura quoq; hepar bipartitum condere voluerit. Cum ergo hepar vnum non sufficisset, siquidem optimum sanguinem respicias, Lienem condidit, qui alium elaboraret, & minus laudabilem.

Nervi.

Actio.

Lien non est receptaculum.

Nec humorem melancholicum continet. Nec melancholia in hepate generatur.

Aristotelis sententia.

Hepatis
sanguifi-
catio duo-
bus à Lien-
is san-
guis dif-
fert.

Differt enim hepatis sanguificatio duobus potissimum à lienis, *primò materia*, deinde *sine*. *Materia* quidem, cum crassior sit, & terrestrior chyli pars, ex qua sanguinem facit lien; tenuior & benignior, ex qua hepar. Antequam enim ad Iecur peruenire possit chylus, per mesentericas Venas attractus, quidquid in eo est crassius ac terrestrius, lien per splenicum ramum trahit, i bidemque beneficio caloris, tum qui in venis est, tum potissimum qui in arteriis, quarum maximam copiam hic esse diximus, in laudabilem, optimum, sed crassiorem paulo sanguine transmutat. Existimo autem & quod à mesaraicis arteriis chyli attractum est ex intestinis (de qua re supra lib. 6. ex Gal. diximus) ad lienem à ramo cæliaco sinistro, siue splenica arteria deduci, cum absurdum sit, arterias illas, quæ copiosiores sunt venis in illo viscere, sic otiosas esse. *Sine* deinde differt, cum sanguis, qui ab hepate conficitur, tum pro corde, tum cæteris animalibus, vitalibusque partibus generetur. Elaboratus enim in hepate, partim ad cor abit, per ascendentem venæ cauæ truncum, vt ex ipso fiat arteriosus sanguis: partim ad reliquas partes animales, vitalesque, vt eas nutriat. Naturalibus enim omnibus solisque, venæ portæ truncus & ramalimentum deferunt. Voluit enim Natura has partes crassiore sanguine nutriri, vt calor ipsarum esset validior, cum idem calor in crassiore substantia semper sit fortior. Accedit, quod & ipsa substantia harum partium crassior sit, quam cæterarum, ex quo conueniebat, vt simili sanguine nutrentur, quemadmodum videmus Naturæ hunc esse ordinem, vt tenuiores partes, tenuiore alantur; crassiore, crassiores.

Vfus.

Nunc videamus quam bene omnia ad actionem hanc in liene conspirent. *Situm* habet in infimo ventre, vt in eodem cum cæteris nutritioni dicatis iaceret. In hypochondrio sinistro, vt hepar nobilior viscus nobiliorem locum teneret; è regione iecoris, quia est *ἡ νότον ἡπαρ*, vt loquitur Aristoteles 3. de part. 7. vt Hippocrates 6. Epidem. *ἡ ἡπαρ ἀεὶ σερὸν*: vt Plato in Timæo, *ἡ ἡπαρ ἐκμαγεῖον*. Paulo tamen depressius, quia debet *ἀντιστῆναι*, & antequam chylus ad hepar perueniat, terrestriorem partem attrahere. Sub costis nothis reconditus, vt tutum haberet ab externis iniuriis locum. *Vnus* est, quia *ἐπαμφοτερίζει*, vt loquitur Philosophus, cum hepate, & *connectitur* diuersis partibus, vt vbiq; substernaculum habeat. Superius diaphragmati, ne decidat: inferius reni, ne corruiat: posterius dorso, ne pronus: anteriori ventriculo, ne supinus fiat. *Magnitudo* homini maxima proportionem sui corporis, vt defæcari sanguis felicius queat à crassis humoribus, cum Homo animal sit sapientiæ studio addictum. At sanguis quo tenuior est, & purior, eo sapientiores reddit, 2. de part. cap. 2. *Figuram* autem cum Natura tribuat semper, quæ actioni cuiusque est conuenientissima, & loco vbi sita est: actio autem lienis peculiarem nullam requirat, benignissima parens hic solum locum respexit. Quia ergo dorsum erat concavum, merito pars posterior lienis, quæ illud respicit, conuexa est: Ventriculus autem, quia est conuexus, merito pars anterior, quæ eum inuertitur, concaua facta est. *Substantia* est *παρέγχυμα*, quia viscus est. Viscera autem omnia sunt *παρέγχυματα*, quia omnium vsus communis est, Venarum necessariam ad coctiones congeriem fulcire, & fouere. Propterea & *membrana* tegitur, vt cætera viscera. Protegmine enim opus fuit, quo illæa seruentur: cum autem id densum requireretur, & leue, non melius erat, quam membrana. Est autem crassior hepatis membrana, quod

quod plures contineat arterias, quæ adeo protegmine firmiore indigent, tum quia laxior quoq; ipsa est substantia. Vasa obtinuit eadem quæ cætera viscera, & ob easdem causas. *Venas, & arterias*, vt materiam coctioni aptam deferrent, & concoquerent: *Nervum*, vt membrana sensum habeat, & quia non ingreditur parenchyma, hinc fit, vt lien obtuso admodum sensu sit præditus. Neq; enim dolet ipse, cum ægri de eius doloribus conqueruntur: sed partes sunt adiacentes, quæ lege consortij ab ipso afficiuntur. Non negligenda tamen hic est *anastomosium* consideratio, siquidem cum crassus valdè sit humor qui concoquendus est in liene, voluit Natura arterias jungere venis, vt quod attractum ab vtroq; esset, in commodum vtriusq; coniungeretur, sicque rectius coctio fieret, & obstructions præpedirentur.

CAP V T XV.

De Renibus, & his succenturiatis glandulis, itemq; canalibus urinae transitum concedentibus.

RENES Græcis νεφροί, & τοῦ νεφρον, à mingendo dicti, quod serosus humor per hos in *Etymologia.* vesicam transcoletur. *Duo sunt numero*, vtrinq; vnus, nonnihil sub jecore & liene post *Numerus.* intestina, & ventriculum, in lumbis, inter vltimam costarum spuriarum, tum ossa coxæ, *Situs.* quo loco corpus cingimur ad vestes constringendas, *siti*. Incumbunt autem sima sui parte muscutorum, quos *ῥέας* Hippocrates vocauit, (suntq; primi femur flectentes,) capitibus, sub quibus maximi nervi reconduntur, quo nomine & νευρομύτρες dicti, unde fit vt calculo in renibus existente, stupor in eius lateris crure perſentiat. Atq; his membranæ externæ beneficio cōnectuntur: sed dexter præter hæc cæco, sinister colo & lieni sibi incumbētib. Inæqualis etiam vtriusq; positio est, cum læuus dextro elatior *Cōnexio.* sit, non tamen dimidia sui parte. *Figura.* *Figura* phaseolum tam exactè referunt, vt nesciam si quid sit in tota hac rerum vniuersitate, quod sit similis. *Longitudo* enim latitudinem superat, crassities autem ubiq; æqualis est, depressa. *b* *Exterius gibbi*, quo nomine & gibbam faciem dicimus: *c* *interius caui*, superius nonnihil, quam infernè latiores. In gibba parte *Magnitudo.* æquales: at *caua*, vt hepar, inæquales, cum in hanc alia vasa ingradientur, alia exeant. *Longitudine*, quinq; transuersos digitos: latitudine, tres: at crassitie, pollicem æquant. Dexter tamen sinistro semper maior est.

In his consideranda sunt partes, tum externæ, tum internæ. *Externas* voco, membranas quibus vestiuntur, pinguedinem, glandulas quæ incumbunt, & vasa quæ vel egrediuntur, vt vteret, aut intrant, vt venæ, & arteriæ emulgentes. *Internas* substantiam ipsam, & huius colorem, vasa, & carunculas.

MEMBRANA renum duplex est, vna communis & externa, à peritonæo deducta, qua tota eius substantia inuoluitur, & *Renis fascia* dicitur, à μενεσφομήτρα, quod in ea veluti matrice renes contineantur, pro ligamento inseruiens, qua diaphragmati & lumbis necitur. *d* *Alterà proprià* est, & interna, immediatè parenchyma ambiens, à communi tunica vasorum renum ingredientium exorta, ac validissimè connata, vt vix separari,

Pinguedo. nisi cura difficultate, queat. Cingitur externa multa pinguedine, adeo ut renes ex visceribus maxime pingues sint, teste Aristotele, 3. histor. animal. 17. & nonnunquam in obesis penitus sub adipe recondantur. Dexter tamen minus semper quam sinister; & utunque vehementer pingues fuerint, aliquid semper mediis deest.

Glandula. ^c GLANDULÆ (quarum nostra tempestate primus mentionem fecit Bartholomæus Eustachius Sanctoſeuerinas Medicus Romanus,) duæ sunt, utrinque una, elatiori renis parti supra pinguedinem incumbens, externæ eiusdem membranæ, sed imprimis septo transuerso, validissime adnexæ. *Figuram* habent semilunarem, & fere rebus similē (vnde *Renēs succenturiati* dicti,) in aliis aliisque locis magis aut minus depressam: *substantia* tamen paulo laxior est. *Venas* habent, & *arterias*, ex mediis emulgentibus: *interdum* tamen & à rene vena transmittitur. *Nervos*, à plexu retiformi neruorum, quem costalis & stomachici aliquam multisurculi efformant. *Faciæ* sunt, ut ego quidem arbitror, ad implendum vacuum, quod inter renes & diaphragma interstat, & ad fulcimentum Ventriculi, eo loco, qui est supra Venas & Arterias emulgentes.

Vreteres. **VRETERES**, ὑρέτρες, ab officio dicti, ὅτι τὸ ὑρέειν, à mingendo, πόροι φλεβικοί, & *meatus* *Substantia.* *vrinarii* Latinis. Vasa enim duo sunt, teretia, venarum instar, nisi quod alba sint, (vnde Celso *Vena alba*) crassiora, ac nervosiora, utrinque vnum. Hæc ^h ex renum sima parte, ubi sinus exsculpti, ⁱ postquam interiorem ipsorum cavitatem succinxerunt, & tubulos octo, aut decem effinxerunt, (de quibus postea loquimur,) egredientes, ac per lumborum regionem vectæ, (in qua mediante membrana à peritonæo delata, vndiq; alligantur musculis ῥόας dictis,) in vesicam implantantur. Hinc est quod *duplici membrana constant*: una *communis*, siue *externa*, à qua & venulas & arterias suscipiunt capillares, à partibus vicinis cum membrana profectas: altera *propria*, siue *interna*, quæ priore candidior, & venarum tunica durior, paucioribus obliquis fibris donata est. *Inferuntur* autem in posteriorem & humiliorem vesicæ partem; non procul à sphinctere musculo, circa ceruicem, inter duas membranas proprias delatâ, in cavitatem penetrantia. Infertio autem obliqua admodum est, qua solers Natura cauit, quominus aut in compressione ipsius, aut nimia ab vrina distensione, quicquam in Vreteres regurgitet, cum potius his ipsis meatus occludantur, ut videmus quotidie, dum à pueris vesicæ porcorum inflantur, ne flatum quidem exire. *Magnitudo* eorum tanta est, quantus progressus per lumbos, longi palmum, & latitudine paleæ. In iis tamen, qui nephriticis doloribus sunt obnoxii, dum calculus descendit, ad intestini usque crassitiem dilatantur.

Vasa. **VENAS**, & **ARTERIAS**, à vicinis partibus habent; sed **NERVOS**, à sexto pari, & lumborum medulla, vnde exquisitissimo sensu sunt prædita. *Venas* habent à Caua prodeuntes, ex quibus duæ *Adiposæ* dicuntur, quod in membranam anteriorem disseminentur, & tota adipe inuoluantur, quemadmodum & adipis materiam suppeditât. Harum ⁱ *dextra*, ab emulgente oritur: at ⁱ *sinistra*, à Caua. *Alia* duæ ^m *emulgentes* ab officio, amplissimæ, ex ipso trunco Cauæ descendente, inter primam & secundam lumborum vertebrarum oriundæ, quæ transuersim delatæ, in ⁿ *simam* renum partem, in ^o *duos* prius deductæ ramos, inferuntur. In hac diuisione membrana communis vasa hæc inuoluntur, quæ præter pinguedinem, quam habere solent copiosam, ut plurimum glandulosis quibusdâ corporibus fulciuntur. Ex his ^p *sinistra* paululum sublimius, ut ipse etiam ren lævus, sita est: ut

e. 8. 13. r.
G. G.

f. H. & I.
g. K.

h. 8. 13.
D. D.
i. vide §.
10. 4.

i. §. 3. v. in
dextro latere pos-
tum.
l. v. in sin-
istro latere.

m. q. vide
& 8. 10. I.
B. B. & 8.
13. I. E. E.
n. 8. 10. I.
E. E.

o. c.
p. B. sin-
istri late-
ris.

g. B. dextra
sedis.

est: at *q dextra* longior esse solet. *Valvulam* etiam intra se habent, quæ feri in *Cauæ* truncum regressum impedit. *Notatu quoque hoc loco dignissimum est*, à Vena sine pari (quam *ἄρτην* Græci appellant) furculum è thorace transmitti, per quem insignis fit thoracis cūrene sinistro, ex Falloppij, (qui primus hūc obseruauit) sententia, consensus, cum & pus & aqua, aliaq; materias in thorace collectas, huius rami beneficio, per vrinas expurgari crediderit, vt superius quoq; lib. 6. mentionē fecimus. Quamquā mihi alia videatur via, vtriq; lateri, dextro & sinistro, cōmunior, nempe Arteria magna, per quam (raptoper eius poros insensibiles pure) propinquiore via ad emulgetes arterias, & renes, deducitur. Atq; vt hāc sententiā verioem esse mihi persuadeam, imprimis me movet, quod videam, nō iis tantū, quibus in sinistro latere, sed & in dextro pus colligitur, per vrinas excerni, à quo tamen latere venę ramulus nullus, vel eodem teste, descendit. Ergo via assignanda alia est, quę vtriq; lateri sit communis, vt est quam præstant Arteriæ.

Propago à
Vena sine
pari.

r. 8. 10. 1.
C. C.
r. d.
u. E. E.

Arterias habet duas, vtrinq; vnā, nomine, magnitudine, progressu, insertionē, & denique officio, dictis Venis respondētes. Dicuntur n. ^t *Emulgentes*, & extrūco Arterię magnę enatę, insignes, trāsuersum ad renes ^t venis socię abeūt, ad quas vbi deuenere, in ^t duos ramos diducuntur, quorū alter in superiorē, alter inferiorē ^u simę partis sedē implātātur.

Arteria.

Nervos vtrinque, *partim* à sextæ coniugationis ramo stomachico vnum, qui gracilis est, & *ia* renum membranā propriā disseminatur: *partim* ab iis, qui circa mēterium egrediuntur, & in ipsā substantiā distribuuntur.

Nervi.

Inspiciamus nunc INTERIORES PARTES, inter quas occurrit *primum* ablata membrana vtraque *Color* considerandus, qui rubicundissimus est: *deinde substantia*, seu parenchyma, quod Iecoris & Lienis parenchymate multo est durius, cordi nōnihil accedens densitate. In hoc plura occurrunt videnda; & *primum* quidem, ^x Vasorum Emulgentium per ipsā digestio, quę vbi bipartita simam partem ingressa sunt, vterque ramus, subito in quatuor aut quinque minores subdiuiditur, qui rursus in alios minores dirempti, tandē in capillares minimasq; venulas resoluūtur, quę variis modis per substantiā renum vsque ad gibbā partem disperfæ, ad ^y capita caruncularum papillariorum desinunt, in quæ serum transfundunt, vt ad ^z Vreterum tubulos distillet. Eodem modo ^a Vreteres, qui circa simam partem, angustiores sunt, statim ac in renū cavitatem consistunt, ampliores sunt, & ^b sinum quendam membraneum effingunt, quem Anatomici *Peluis*, & *Infundibulum* appellant, qui postea in duas, (quandoque in tres etiam partes, tanquam ramos quosdam dirimitur) quarum vna ad renis sedem elatiorem, altera ad inferiorē tendit, vtrq; postea iterum in quatuor, vel (quod pluries euenit) *ia* quinque subdiuiditur, quos ^c *Tubulos* & *fistulas* *Vreterum* vocamus, & octo sunt numero, aut decem. Non tamen, vt emulgentes, in capillares venulas scinduntur; sed æquali fere crassitie, (nisi quod in progressu paululum latescunt) vbi ad gibbā pænē partem peruenierint, in finem latum & rotundum terminantur, ^d papillares carunculas in se recipientes, à quibus, tanquam operculis, eorum extremitates obturantur.

Interiores partes
renum.
Color.
Substantia
Emulgentium
vasorum
in renis
substantia
digestio.
Vreterū
tubuli.
Peluis.

x. horum
ingressum
in sima vi
de 8. 10. 2.
progressū
deinde i-
bidem,
fig. 3.
y. 8. 10. 4.
D. D.
z. C. C.
C.
a. E.
b. B.
c. C. C.
C.
d. D. D.

Sunt autem *Caruncule* hæc exigua corpuscula, carnosa, parenchymate renum nōnihil duriora, & papillis mammariarum quam simillima, à quibus etiam *papillares caruncule* denominantur. Pisi sunt magnitudine; superius latiusculæ, inferius conuexæ, quæ si dissecentur, vulnere secundum longitudinem facto, leuē *canaliculum*, capilli crassitie, à

Caruncule
papillares.
ACTIO.
Magnitudo.
Figura.
Canaliculus.

Situs.

tie, à summa parte ad infimam per medium habere videntur. *Sita* sunt in gibba ferè renum regione, & in vreterum (quibus etiam propterea numero respondent, vt adeo decem sint,) tubulos supremos dehiscunt.

ACTIO.

Atque hæc Renum, partiumque eis adhærentium fabrica est; quorum *actio*, quicquid serosi est & aquei in vasis, tam Venis, quam Arteriis, ad se trahere, separare, transcolare, & per Vreteres ad Vesicam mittere, vt inde extra corpus pellatur. Cum enim ex vena Portæ per angustissimos meatus anastomosum ad Cauam in hepate sanguis deducendus erat, vt ostendimus, quo tenuissimus tantum in Cauam deferretur, crassior autem in portæ vena remaneret, pro nutritione partium alimenti coctioni inseruientium; & vero vel tenuissimus agre transiret, Natura vehiculum addidit, (quo nomine Hippocrates appellat) aquosum serum quod, ne postea, (cum ineptum sit ad nutritionem) in Caua & Aorta redundaret nimium, Renum beneficio expurgauit. Primum ergo ad se trahunt renes, vt ostendit Galenus ex Hippocratis etiam sententia, 1. natur. facult. 15. Venis non mittentibus, 2. eiusdem 1.6. de locis affect. 3. de ren. affect. 1. quo pacto fellis vesicula bilem allicit. Attrahit autem non solum serum: sed vna cum modicum sanguinem, qui postea in renibus à sero separatur. Sanguis hic deinde in nutrimentum cedit parenchymatis: at serum, à capillaribus venis emulgentium, ad summitatem caruncularum deponitur, è quibus postea, veluti lac è papilla in tubulos vreteris exsudat, sensimque collectum in peluim, quo loci omnes tubuli concurrunt, vbi guttulam constitierint, per vreteres ad vesicam destillat.

Merito ergo *duo facti sunt renes*, ob corporis æquilibratam, ne vnus factus, aut in medio, cum grandior necessario esset, reliqua viscera comprimeret: aut in latere corporis, tolleretur æqualitas. *Iacent autem sub iecore & liene*, eo loco, qui in trunco corporis exacte quasi medius est, vt vndique ad se quam commodissime traherent. Dextro autem sinister superior est, vt ille iecori cedat, quod descendit demissius liene. Non sunt autem penitus ex aduerso, ne alter alterius actionem impediret. *Figuram* habet phascoli, ab interna parte, qua se respiciunt, sinuatis; ab externa, qua dorsum spectant, gibbi, vt illic quidem vasa tutius implantarentur; istic, loco, in quo siti, accommodarentur. *Substantia* autem est dura, densa, ac compacta, tum vti vasa tenuissima rectius fulciret: tum, vt prohiberet, quia intestinis subiacent, coloque præsertim, ne ipsis, aut faciibus, aut flatibus turgidis, nimium comprimantur. Et quia tenuissimas venas arteriasque recipiunt, quæque ad extremitates vsque producuntur, hinc adeo fit, vt *duplici membrana* tegantur.

CAPVT XV.

De Vesica Vrinaria.

Nomen.

VESICA vrinaria Græcis *κύστις* & *πόδης*, ab officio suo dicitur. ^a *Sita* est in imo ventre, ^a, 8. 11. P.

Situs.

sede extima, nempe in hypogastrio, in ea cauitate, quam Peluim vocari, sæpe iam

Cōnexio.

numero diximus. *Connectitur inferiore sui parte* ^b recto intestino cui incumbit; ^c superiore, ^b, S. ossi pubis, at ^d *fundo* (mediante vracho) vmbilico. Hinc eximium inter ipsam, & ^c, E. hunc consensum in quibusdam notauimus, qui grandiore vesicæ calculo laborabant, ^d, R.

cum

cum de graui circa vmbilicum dolore, eoque continuo conquererentur, quem non aliunde accidisse nobis persuasimus, quam ab vracho, à vesica ob calculum expansa, aut detracta, simul reuulso, vnde partes circa vmbilicum sensu acriore præditæ, simul vellicatæ, impendio quam molestum sensum perceperunt. *Figuram* habet ovalem, cum *superior pars* amplior sit: *inferior*, angustior, sicque pyrum exacte referat, ex quo ab Anatomis in *Corpus* & *Cervicem* diuiditur. Comprehendit sub se corpus & *Fundum*, quæ latior illa pars est, ex cuius centro *h* Vrachus pronascitur, & sursum vectus, in vmbilicum definit. *Substantia* autem constat, *partim* membranea, vt *Corpus*; *partim* carnosæ, vt *Cervix*, quæ vulnerata propterea coalescit, cum cætera vesicæ vulnera sint lethalia, vt testatur Galen. 6. aph. 18. *Membrana* autem triplex est, *una* communis, & *duæ* propriæ: *illa*, exterior est, à peritonæo deducta, qua conterminis partibus alligatur; *hæ*, interiores, quæ solidæ, ac duræ, sed crassæ magis minusque prout distenduntur, aut relaxantur. *1* *Primæ*, quæ media est inter communem & propriam, crassiuscula est præ reliquis, *1* fibris rectis conspersa, quæ affluente sanguine admodum comparent, & à nobis supra inter musculos Vesicæ, autoritate Excellentiss. Aquapendentis relata, cuius officium statuimus, vrinam è vesica, se contrahendo, expellere. *Alteræ*, quæ intima, lucida, ac alba, exquisitissimi sensus, vt norunt, qui calculo vesicæ laborant, omni fibrarum genere donata. Intrus crusta quadam mucosa, quæ tertiæ coctionis excrementum est, in ipsa vesica excretum obducitur. *Foramina* tria obtinet: *primum* est in ceruice, per quod vrina excernitur: *duo* alia in postica se de & inferiore, non longe ab eius ceruice, à se inuicem duorum digitorum latitudine distantia, per quæ serum ex vtreteribus instillat. Obliqua sunt admodum, ne vrina in vesica collecta, regurgitare ad vtreteres queat. Habet & *m* *musculum*, *Sphincterem* appellatum, qui ad *n* *cervicem* situs, cuius historiam supra lib. 4. executi sumus. *o* *Venas* etiam, & *p* *Arterias* obtinet, *Myopagasticas* dictas, vtrinque ad ceruicis latera implantatas, quæ statim in duos ramos diuiduntur, quorum *alter* per vesicam, *alter* per ceruicem, & hinc in maribus, per colem distribuitur. *Nervos* insignes, nec vt fellis vesica paruos, qui *q* *partim* ab illis sextæ coniugationis neruorum cerebri, qui per costarum radices exporriguntur: *partim* ab illis transmittuntur, qui postremi à spinali medulla ossis sacri originem trahunt.

Constituit autem solers Natura vesicam tanquam receptaculum, & cisternam serofi humoris, qui à renibus allectus per vtreteres transmittitur, & retinetur, donec insigni eius copia collecta, pro nostro arbitrio depellatur. Sapienter ergo *in imo ventre* collocauit, vbi renes siti sunt, & quidem *in infimo loco*, vt destillantem humorem opportunius excipiat, & promptius circa corporis extrema hærens, iterum vbi opus est, deponat. *Figuram* rotundam, vt quamplurimum caperet, ne homo vrina assidue vigente, à negotiis & rerum diuinarum contemplatione auertatur. Ne tamen à vicinis partibus nimium forte premeretur, præsertim à fæcibus durioribus recti intestini dum alvus redditur, oblongior facta est, non exacte globosa. Quæ causa est, cur & sic, dum fæces detrudimus, vrinam sæpe, fereque semper simul mittamus, quod scilicet vesica non nihil vna à fæcibus egredientibus comprimatur. *Substantia* autem opportunissima est, quæ & extendatur in molem, & iterum contrahatur, simul ab iis, quæ recipiuntur, quia acria sunt, non facile offendatur, cum mucosa crusta ipsi intrinsecus obtendatur. Vt autem

Figura.

Partes
dissimila-
res.
Substan-
tia.
Membra-
na.Forami-
na.Muscu-
lus.
Vena.
Arteria.
Nervi.e, 8. 13. I.
M.M.
f, N.
g, 8. 12. O
h, P, sed
imprimis
8. 3. L.i, 8. 13. i.
M.M.
l, a. a.m, 8. 13. I.
O. O.
n, N.
o, 5. 3. n. 8.
p, 6. 2. 2.
q, 7. 1. 7.

pro nostro arbitrio retineretur vrina, *Sphincterem musculum* naſta eſt, quo contracto, aut in media ſua figura relictō, ne guttula quidem exſtillat: aperto autem effluit. Quia tamen & vi quadam expellere conueniebat, totum veſicæ corpus *prima propriarum membranarum*, (quam ſupra musculum ſtatuimus) cingit, qua contracta cum impetu exprimitur. In quod ſane munus & tranſuerſos abdominis muſculos, & imprimis pyramidales habet conſpirantes, vnde videmus vrinam pro noſtro arbitrio & in altum propelli poſſe. Iam vt nutriretur, *Venas* habet: & vt viueret, *Arterias*; vtque ſentiret moleſta (ne acrimonia vrinæ corrodat, & (præſertim vbi plena eſt) copiam, *Nervos* quoque accepit. Inſeruntur autem hæc vaſa ad Ceruicem, quod locus maxime commodus ſit, cum validus ac carnoſus, ne cūſuſpenſa ipſa vaſa incedere cogantur.

CAPVT XVI.

De partibus genitalibus in mare, & primum quidem de iis, quæ ſeminis generationi inſerviunt.

PARTES, quæ infimi ventris cavitae coërcentur, geminas eſſe, & alias quidem nutritioni dicatas, alias vero generationi inſeruire, ab initio huius libri ſtatim monuimus. Voluit .n. benigna parens, ne Homo omnium conditarum rerum nobiliſſimus vitæ huius uſura cōmodè (quantum licuit) duntaxat frueretur: ſed &, quia fatalis tandem terminus ipſi impendet, ad æternitatem ſeſe in noua ſobole proucheret. Illas quam affabrè extruxerit, quamq; ipſarum uſus & actionis gratia ſitum, figuram, ſubſtantiam, ac magnitudinem tribuerit, non perfunctorie, opinor, explicuimus. Reliquū eſt proinde, vt & has nunc breuiter perſequamur, in quibus, ſi alicubi, magnum certe non ſolum prouidæ mentis, ſed & mirabilis cuiuſdam ſapientiæ teſtimonium reliquit. Sunt autem hæ partes, vt ſexu, duplices, quod neq; in vno, neq; ab vno ſolo generari fatum voluerit, ſed vnum quidem materiam exporrigere, alterum vero ſulcipere & fouere. *Vir* ergo ea organa accepit, quæ partim ſemen opportunè generant, partim conſectum in vterum promptè expellunt. *Mulier* contra, quæ à mare concipiunt, & in hominem efformant. Agemus nunc de Virilibus, quarum hiftoriam primo, deinde actionem & uſus, vt conſueuimus, perſequemur.

Vaſa præparantia.

Principium.

VASA ergo PRÆPARANTIA, à Galeno ἀρτηριαὶ ἀπογενναστικὰ dicta, duæ ſunt venæ totidemq; arteriæ, quæ idcirco à diſſectionum profeſſoribus, *Venæ*, & *Arteriæ præparantes* vocantur, ex quibus arteriæ venis ſunt ampliores. In his potiffimum origo, progreſſus, & inſertio obſeruanda ſunt. ^a *Venarum* enim *dextra* paulo ſub emulgentē è trunco deſcendente venæ Cauæ, non tamen à dextro ipſius latere, ſed antica ſede enaſcitur, & vel ſimplici initio, vt plærūque, vel gemino, vt non raro. Quandoque ab emulgentē propaginem exiguam aſciſcit, id quod à Galeno quoque jam diu obſeruatum fuit. ^b *Siſtra* ex media & inferiore ſede emulgentis læui lateris oritur, quamquam & pluries viſum ſit, vtramque venam exinde enatam. Contra ^c *Arteriæ* ex ipſo trunco, ſed longius, & pænè duorum tranſuerſorum digitorum interuallo ſub emulgentibus, à priore parte egrediuntur. Cæterum obli- ^d que

^a, 5.3.2. & 8.12.M.

^b, 5.3.ψ.

^c, 6.2.1.

que deorsum ad venas feruntur, quibus non procul ab exortu ope membranæ à peritonæo profectæ copulatæ, inde per lumborum regionem supra primum femur flectētium muscolum, *dextra* à dextro latere, *sinistra* à sinistro, super Vreteres vecte excurrunt, in itinere tenues peritonæo furculos impertientes. Cum primum autem ad processus ipsius peruenerint, cauitatem abdominis relinquunt, & comite neruo gracili à sexta coniugatione, tum Cremastere musculo, in scrotum descendunt. Ingressi vero, varijs subito ^dplexibus ita inter se coeunt, & commiscuntur, vt corpus quoddam efficiant, *pyramidis formam referens*, plenum infinitis venis & arterijs, vario modo sibi per anastomoses mutuas implicitis, cuius basis in parastatas, ad superiorem testis sedem, implanta- *Inferio.* tur. Vocatur plexus hic à nonnullis *pampini formis*, ab alijs, *corpus varicosum*.

Ipsæ autem PARASTATÆ sic dictæ, *ἀπὸ τῆ παρ' ἐξουδὸς τοῖς ὀρχεσιν*, corpora sunt alba, & *Paraasta-* ferè teretia, nonnihil tamen depressa. *Oriuntur* hæc à plexu vasorum præparantium, *te-* *stibus* (vnde *ἐκ τῶν δυνάμεδ' ἐκ τῶν* dictæ) *incumbentia*, quorum intimæ tunicæ illigantur, obliq; *Ortus.* *Situs.* posterius versus inferiora, & testis fundum excurrunt, indeque in vas deferens, cum *Inferio.* quo nonnihil reflectuntur, desinunt. *Substantiam* habent omnino testis instar glandu- *Substan-* *lia.* losam: duriores tamen, sed nulla cauitate donatam, in quam ex testibus, quo loco coniunguntur, quamplurimæ tenuissimæ *fibra* notatu dignissimæ terminantur. Habet *Fibra.* & tenuem quandam, qua succingitur, *membranam*, interiori testis tunicæ propriæ per- *Membra-* *na.* quam similem.

^e 8.13.1. ^c TESTES vero, qui cum his coniunguntur, *substantiam* reliquis glandulis simili- *Testes.* *Substan-* *lia.* lem obtinent, albam, mollem, & spongiosam, plurimis venulis, & arteriolis refer- *Partes.* tam, vnde ab humorum affluxu nonnunquam in magnam molem abeunt. Horum superior pars *caput testis* dicitur, inferior *fundus*: illud, angustius est: hic, obtusior nonnihil, ampliorque. *Magnitudo*, & *figura*, oui columbini est, quod nomen à plæ- *Magni-* *tudo.* risque, sed præcipuè Arabibus postea tributum fuit: non tamen æqualis utrique, sed *Figura.* *Muscu-* *lus.* perpetua quasi Naturæ lege sinistro maiore. ^f *Muscolum* quoque habent, quem *Tunica* *quatuor.* *1.* *κρεμαστή* ex vocant, ab osse ilium enatum, & capiti insertum, quem supra libro quarto in reliquorum historia complexi sumus. Inuoluuntur autem *tunicis*, quas quaternas statuimus, etsi variè inter se de numero earum disceptent Anatomici. Harum binæ am- *2.* bos coërcent, reliquas vterque proprias habet: vnde illæ *communes*, hæc *propria* dicuntur. *Communium* prima atque externa, *ὄρχων* vocatur, siue *bursa scroti*, quæ nihil est aliud, quam cutis cuticula recta, & quia membranæ carnosæ sibi subiectæ validissime adnectitur, vt quasi in vnâ videantur tunicam coire, fit vt quam promptissimè contrahatur, & rugosa fiat, præsertim si quando sanus homo in aëre frigidiore obambulet. In infima sede lineam habet secundum longitudinem excurrentem, qua in dextram sinistramque partem diuiditur, & sutura vocatur. *Alter*a, & *interna*, quam *V-* *3.* *ter*es *ἐνυδροειδὴ* vocarunt, quasi dicas, rubicundam, à colore rubro, quem habet à fibris carneis, quibus variè conspergitur. *Ruffo* *δαρτὸς* dicitur, hoc est, excoriabilis, quod ab alijs nullo negotio diuellatur, separeturque. Hæc à carnosâ membrana nascitur, quæ hic, quam alibi, multo est tenuior, subtiliorque: venis tamen, arterijs- *que* plurimis referta. *Propriarum tunicarum* ^g *prima*, *ἐνυδροειδὴς* nuncupatur, quod testem *g* *ὡς ἐνυδροὶ* tanquam in vagina, contineat, vnde & latina lingua opportunè *vaginalem* dixeris.

dixeris. Paulus Ægineta *ἐλικοειδέα*, hoc est, *capreolarem* vocat, quod vasorum præparantium plexum, in modum capreolorum hederæ contortorum (quos Græci *ἐλικας* appellant) in se coërceat. Membrana est valida ac densa, abundè venis prædita, cuius extima superficies aspera est, ob fibras, quibus cum Darto adhæret: interior, lævis, estque non alia, quam ipsi processus peritonæi, quos supra testes inuoluere diximus.

^h Altera est, quæ hac aperta statim in conspectum se offert, & proximè testes complectitur, alba, crassa, & valida, à præparantium vasorum tunica enata, quam Ruffus propterea *ὑμὲνα νευρώδη*, nostri *albuginæam* appellant. *Vasa* habent omnis generis, *Venas*, & *Arterias* à præparantibus propagatas, quæ & in proprias tunicas disperguntur: at *Nervum* gracilem à sextæ coniugationis surculo costali, qui vna cum vasis, & Cremasterē musculo, peritonæi cavitatem egreditur. Cæterum vocantur testes, vel quod virilitatis testimonium præbeant, cum ex his virum agnoscamus præ muliere: vel, quod nulli apud Romanos testari licuerit, nisi cui testes essent, & sexus foret masculini. Græcis *διδυμοί* quasi *gemelli*, quod quemadmodum hi in vtero vno nascuntur, sic isti in vno scroto semper gemini (modo naturæ ordinem respicias,) continentur. Vocantur & *ὄρχεις* & *ὄρχιδια*, itemq; *κύαμοι*, *faba*, ex qua appellatione decantarum illud Pythagoræ præceptum enatum mihi persuadeo, *ἀπέχου κύαμων*, Abstine à fabis, hoc est, à Veneris illecebris, quanquam non desint doctissimi viri, qui aliter explicent.

h, 8.13.4.
B.B.

Vasa.

*Etymo-
logia.*

Parastatis autem (ut diximus) circa testis fundum, inferiore sede continuantur: *VASA DEFERENTIA* dicta, & in glandulas prostatas inferuntur, ideoque partim extra abdomen in scroto situm obtinent, partim in ipso imo ventre. Vasa sunt colore candida, *substantia* nervosa, perobscura quadā cavitare prædita, quo nomine *πύρις σπερματικός*, meatus seminales, Herophilus vocavit. *Oriuntur* autem à parastatis inferiore sede, sursumque (præparantibus vasis in peritonæi processibus connexa) feruntur, quos ubi superarunt, & jam abdominis amplitudinem ingressa sunt, reflectuntur, & posteriorem vesicæ regionem petunt, inter quam & rectum intestinum incedunt, donec iuxta cervicem nonnihil prius dilatata, mox vnita, in glandulas prostatas vtrinque terminentur.

*Vasa de-
ferentia.
Substan-
tia.
Ortus.
Progres-
sus.*

i, 8.12.2
& 8.13.1.
X.X.

l, vide 8.
16.1.C.C.

*Vesiculæ
femina-
les.*

*Humor
oleagino-
sus.*

Paulo tamen antequam dilatentur & coeant, lateribus ipsorum *VESICULÆ* quædam adnascuntur, *SEMINALES* dictæ, insignes & magnæ, quas non rectius, quam vix racemo (cum plures sibi adhæreant,) comparaueris. Nec tamen, aliarum instar, singularem cavitatem insculptam obtinent, sed anfractuosa, granorum mali punici cellulas ordine & figura eleganter æmulantur, plenæ humore oleaginoso, & nonnihil flavo, qui per foramen proprium caruncula obturatum in vrinarium meatum effundi solet, ut sequenti capite dicitur.

m, 8.16.
fig.1.D.D
& fig.2.
H.H.

*Prostatæ
siue glan-
dulæ se-
minales.*

Pori.

Ipsæ autem *PROSTATÆ*, siue *Glandule seminales*, in quas deferentia vasa inferuntur, glandulosa sunt corpora, inter cervicem vesicæ, & rectum intestinum sita. Per harum medium incedit Vrethra, quæ vrinæ iuxta ac semini communem viam largitur: insertio tamen nulla comparet, nec manifestus ductus est, per quem ex glandulis in ipsam semen deponatur, sed cum membrana satis densa obuoluantur prostatæ, (ne quoniam spongiosæ sunt, semen spontè ab illis defluat) ea sede, qua communis ductus est, tenuior rariorque videtur, *poris plurimis per viam*, quæ tempore coitus, rarefacta

n, 8.16. fig
1.E.E. &
fig.1.K,K
o, 8.16.2.
I.I.

rarefacta membrana ab affluente calore,aperiuntur aliquantulum,& euidentes fiunt. Poros hos,& meatus sæpè mihi sat commodè videre contigit in ijs, qui gonorrhæa admodum laborarunt,cum ijs patentiores sint, cuius etiam mali propria sedes sunt ipsæ hæ glandulæ.Sed & in canibus iuuenis quandoq; deprehendi, quos vna cū meis commilitonibus strangulauius. Sæpè .n. euenit, vt compressis nimium à diaphragmate(intercepto spiritu)visceribus,duroq; stercore in recto intestino hærente, glandulis his pressis,semen longius effuderint, sicq; meatus hos apertos postea viderimus. *Substantia dura est,& spongiosa,magnitudine juglandis ferè.*

CAP V T XVII.

De ijs partibus, quæ vrilis seminis excretioni sunt dicatæ.

PL V R E S partes sunt,quæ ad seminis generationem faciunt,à se distinctæ, vt nunc ostendimus:at vna tantum,excretioni destinata esse dicitur, **P E N I S** scilicet,quam **P E N I S.** quam reuera & ipse simplex non sit,sed ex multis, partim similaribus,partim dissimilis naturæ compositus, quæ tamen omnes affabrè in hanc actionem conspirant. Huius appellationes diuersas libro primo, cum externarum partium nomina traderemus, abundè recensuimus: nunc quem situm habeat, quam figuram, magnitudinem, & connexum persequemur.

In primis tamen monendum est, *Penis* vocabulum, vt communiter sumitur, non totum id designare, quod nunc eo ipso intellectum volumus, cum *penis due sint partes, vna,* & quidem præcipua, quæ infra commissuram ossium pubis in perinæo sita est; *aliera,* quæ ab elatiore eorundem ossium sede propendet, & vulgo penis dicitur. Illam *ἡ ὀσφυρμα* Græci, hanc *σῆμα* appellant. *Situs* est ad externam imi ventris partem, ad radices ossium pubis, *figura* exactè teres, nisi in superiore parte, quæ dorsum dicitur, latiusculus foret. *Longitudinem* habet in corpore ad Naturæ leges conformato, & ætate iusta, spithamæ, vbi erigitur: quamquam plurimum variet, pro familiæ, & vitæ ratione. Vidimus enim familias, quæ hoc nomine melius, peiusve audierunt: quantum autem frequens coitus ad augmentum accessionis faciat, quotidie illi aduertunt, qui in Veneris prælia, vel frequentiores, vel alacriores descendunt. Ineptum autem illud est, quod quidam produnt, futurum esse penem maiorem, si vasa vmbilicalia non proximè ad vmbilicum ligentur, abscindanturq; in recens natis, ob vrachum, qui inter vasa vmbilicalia continetur, & vesicæ fundo adnectitur, vnde putant retro penem cum vesica trahi. Id enim quomodo fiat, non satis animo meo apprehendere valeo.

Cæterum ipse penis ex compluribus constat partibus, quas commodè in externas, Diuisio partium. siue continentis, & internas, seu contentas diuidemus. *Externa* sunt, quatuor illa **Externæ.** communia nostri corporis tegumenta, dummodo pinguedinem excipias, quæ hic nusquam est inueniri, ne penis erectioni incommodet, aut liquefacta, indicibilem illam voluptatem interpellat. Cuticula ergo hic mediocris est: cutis crassiuscula in flaccido pene laxa, in rigido tensa: membrana carnosa non nihil neruea. *Interna partes* sunt **Internæ.** plures, duo scilicet penis neruosa corpora, septum, canalis, glans, quatuor muscoli, **I.** duo neruosa corpora, **Duo neruosa corpora.** & vasa. *Constat enim ex a duobus corporibus, oblongis, neruosis ac duris, vt ligamentum,*

tum, non tamen ita densis, vt illa, quæ partes inter se vinciunt. Hæc intus^b raritatem *b. 8. 16. 7.* habent, spongiæ similem, atraque materia, & veluti sanguine nigricante oppletam. Videntur enim ex innumeris arteriarum venarumque surculis quam tenuissimis inter se complicatis, retia quædam efformari, quæ inter infinitas quasdam^c fibras (à nobis, *e, D. D. D.* quia seriatim septo nerueo attentæ sunt *Pectiniformes* dictas) dispersa, & quasi intertexta sunt. Per hanc substantiæ raritatem, ne spiritus diffusi confestim dissipentur, & penis ante tempus flaccescat, Natura tunicis quibusdam membranosis, nervis, ac densissimis corpora hæc tanquam inuolucro quodam obduxit. In medio autem vtriusque corpus aliud interiectum est, quod^d *Septum pellucidum* vocamus, ac vtrumque *d, D. D. D.* coniungit, & nerueum est, atque candidum. Cæterum hæc duo corpora ab inferiore ossium pubis sede, vbi crassiora sunt, & teretia, oriuntur, distincta à se mutuo, instar duorum cornuum literæ Pythagoricæ, vt vrethræ inter vtrumque locum medium concedant. Mox autem vt ad commissuram eorundem ossium peruenerint, interuentu modo dicti septi inuicem coniunguntur, sicque vnita vsque ad glandem, cum qua priore sui parte iunguntur, excurrunt. His subiicitur^e *Canalis*, *δυσήδρα* dictus, eiusdem *e, 8. 15. E.* cum corporibus substantiæ neruose, laxæ, densæ, ac mollis. Teres hic est, & cauus, eandem à principio ad finem amplitudinem obtinens, vnde & Celso *fistula urinaria* vocatur. *& 8. 16. 6.* *A. A.*

Ortus. Incipit autem à ceruice ipsius vesicæ, à qua tamen non nascitur, nec continuatur, vt quidam volunt: sed coniungitur duntaxat, cum facillè vesica cocta à canali recedat, sicq; ad glandem vsque porrigitur. Ad huius initium tria sunt *foramina*, vnum in medio, maius & amplius cæteris, quod ab ipso efformatur, & ceruici vesicæ adnectitur: duo minora ad latera vtrinque angustiora, à ductu, qui à feminalibus vesiculis in canalem patet. Constat autem *substantia* eius ex duplici membrana: vna interna, qua & glans tegitur, ex membrana tenui penis neruos inuestiente pronata, quæ sensu perquam exquisito prædita est, vt seminis acrimoniam, præsertim qua parte inter glandulas prostates consistit, persentiat, voluptatemque excitet: altera externa, carnea, pluribus transuersis fibris aspersa. *f* Musculos habent hæc corpora duos, quos libro *f, 7. 15.* quarto *g* *collaterales penis musculos* vocauimus, & breuiores sunt, ac crassiores cæteris. Hi à coxendicis appendice, infra principium duorum corporum neruorum enati oblique ascendentes, non procul à principio iisdem inseruntur. *h* Alios duos *h, F. F.* *i, I.* *l, b.* *m, c.* habet *Canalis*, qui longiores sunt, at graciliores, ab *i* ani sphinctere prodeuntes, qui inuicem internis *l* lateribus iuncti, recto gradu sub canale excurrunt, & in medio longitudinis suæ ad latera *m* inseruntur. Hi muscoli etsi carnes sunt, substantiam tamen habent plurimum cum penis substantia conuenientem, cum eo erecto statim ad sua principia contrahantur, & cum eodem flaccescente remittantur. *Vasa* habet omnis generis, quorum *n* *aliacutanea* sunt, nec penis substantiam ingrediuntur, *o* *alia vero profunda*, & in intima corpora penetrant. *Vena & Arterie cutanea*, à Pudenda descendunt, quæ ad radicem penis ingressæ per latera dorsi excurrunt, & satis euidenter sunt. *Profunda gemine* ab Hypogastricis enatæ, ad bifurcatum penis exortum insertæ, quæ per penis longitudinem disseminantur. Imprimis vero insignes sunt Arteriæ, per totam penis substantiam mirificè dispersæ, ita vt dextra in sinistrum, & sinistra in dextrum diffundatur. *p* *Nervi* quoque duo magnitudine eximijsunt, ab ossis sacri medulla

q. 8. 16. 4.
H.
c. 1. 1.

dulla pronati, quorum alter cutaneus & minor: alter profundus est, & insignior, sub ossibus pubis ad penis radicem per mediam bifurcationem ascendens, indeq; ad musculos, totum corpus, & glandem disseminatus. 4 *Glans*, vltima penis pars est, duobus nervosis corporibus priore sede obnata, quæ nonnihil ambitu quoque excedit, cum coronæ modo circulo cingatur, anteriustamen acuta est. Exquisitum hæc sensum habet, substantiamque spongiosam, vt penis: sed solidiorem, in medio foramine pertusa, & tenuissima membrana inuestita. Obregitur autem cute à penis cute producta, & reflexa, quam *ἡ δὲ λω*, & *præputium* vocant, quæ ab Hebræis & Turcis, olim hodieque ressecatur, vnde Recutiti & Apellæ dicuntur. Inferiore parte membranam, vel vinculum, quod *ἡ λινὸν*, frenum appellant, & cum summa glande ligatur.

6.
Glans penis.
Sensu.
Substantia.
Foramen.
Præputiū.
Frenum.
ACTIO
& VSPS.

Atque hæc omnium quæ ad generationem faciunt, viro concessarum partium structura est, quæ quam affabre sit facta, ex functionibus nūc videamus. Cum enim in generatione hominis requirebatur sexus, neq; vnus in se generare posset, vt demonstrat Aristoteles 1. de gener. animal. sed per venereum congressum in altero; Viro quidem elargita est, prouida in omnibus Natura, vt semen in vterum muliebrem exporrigeret. Cæterum cum id minime posset fieri, nisi semen prius confectum & elaboratum quam optimè foret, proinde *duplices sunt ea partes, quas hactenus persecuti sumus*, & alia quidem ad solam generationem extructæ, alia autem ad excretionem. Videamus primum illas, quæ generationi incumbunt, ex quibus imprimis *Vasa* occurrunt, *preparantia* dicta, quæ duæ sunt Venæ, totidemque Arteriæ, à Cauæ & Aortæ trunco descendente pronata. Vasa hæc materiam seminis transferunt, quam Natura esse voluit sanguinem, quod hic animæ (quæ in semine erat collocanda) sedes maximè sit propria. Sanguinem autem hunc non quemuis esse conueniebat: sed quam optimè elaboratum & perfectum: qui cum duplex esset in corpore, tam ille, qui in Caua vehitur, quam qui in Aorta continetur, non ex Venæ portæ trunco, sed ex his, & quidem vtraque, canales deduxit, vt *venosus* quidem, seminis (quod sic dicitur) crassamentum: *arteriosus* autem, spiritus suppeditaret. Semen enim Virile corporis nostri materia, ex qua partes conformentur non est: sed sanguis maternus à semine virili attractus in vterum, tum semen muliebri in coitu effusum. Virile autem cum vtroque mixtum, *calidum primum nativum* in singulis partibus, deinde in corde *influens* illud constituit. Quare ex spiritibus constat, qui cum citra crassiorem materiam, in qua resideant, promptè sanè euanescerent, in corpore quodam maximè opportuno Natura firmavit. Hoc eleganti exemplo docuit summus Philosophorum Aristoteles, primo de generatione animalium secundo, vbi illos, τὸ σπέρμα τὸ τῆς ψυχικῆς ἀρχῆς, semen principij animæ: hoc, τὸ πνευμονικὸν σπέρμα, seminis corpus appellat, quod mox *διαλύεται*, inquit, & *πνευματωδαι*, solui, ac in spiritum verti. Quæ sanè verba malè à quibusdam intellecta, occasionem dederunt doctissimum & quam optimè de humana societate meritum virum, acerbè ac contumeliosè reprehendendi. Nec enim, (vt aiunt ipsi) in inanes auras & vaporem dissolui voluit, sicque euanescere ex vtero: sed quia φύσιν habeat ὑγρὰν καὶ ὑδατώδη, humidam & aqueam naturam, ratione crassamenti *διαλύεται*, dissolui: ratione vero spirituum *πνευματωδαι*, spiritescere, & quidem (vt eleganti exemplo verborum obscuri-

tatem explicat) ὡς περ εἶδομεν τὸν ὄπιν, τὸν τὸ γάλα σπαισῶντα, quemadmodum videmus coagulum lac cogens. Soluitur enim, & in omnes partes, cum quibus commiscetur, sic diffunditur, qualiter coagulum, & fermentum absumi videmus, etsi revera commistū sit, illud cum lacte, hoc cum pane, vt nequeas vllam particulam ostendere, quæ ex coagulo aut fermento sit effigurata: neque tamen etiam, quæ non coagulum, aut fermenti aliquid habeat. Sic in embryone haudquaquam monstrare licuerit, quæ pars ex semine virili condita sit, cum neque vena neque nervus, neq; caro, nec cutis, ex semine constet, sed vniuersum dissolutum fuerit, ac in spiritus verſum, qui postea per totum corpus diffusi, vt sic cum vbique sit, nullibi tamen monstrari digitis queat; & cum omnibus partibus insit, nullam tamen earum efformet. *Materia ergo seminis sanguis est: sed sanguis purus, & elaboratus, maximeque spiritibus refertus, cum semen ipsum non fere aliud, quam spiritus sit, iunctus modico humido, in quo subsisteret. Deduxit autem merito ex Arteriam magnam, & Vena caua vasa preparantia, ex quibus arterias ampliores fecit venis, quia plus scilicet spirituum, quam corporis seminalis requireretur. Vnam tamen sinistram, nequaquam vt dextram ex ipso trunco ductam voluit; sed ex emulgente potius ramo, eiusque media sede, ne contra iustitiæ leges, quas tam sancte vbique ac religiose obseruat, hic temere peccaret. Expediebat enim, vt vtrumque vas æqualis esset longitudinis; adeoque præparatio seminis ab vtroque æque fieret. Cum ergo truncus cauæ, ad dextram non nihil sedem necessario declinet, vt cedat Aorta sinistra occupanti, futurum omnino erat, vt si ex eodem loco prodiret sinistra, è quo dextra nascitur, hac multo longior fieret. Sed & serum sanguini miscere in sinistro voluit, non quidem (vt plerique omnes censent) quo à sinistro teste generarentur fœminæ, à dextro mares: (semen enim quod in coitu emittitur, in glandulis proſtatis est, & ex vtraque effusum in canalem vrinarium, confunditur) verum, vt acredine non nihil semen profunderetur, qua voluptatem illam in coitu, siue auget, seu perficeret. Quod si ex vtraque emulgente duxisset, nimium seri semen infundasset. Ineptum autem est, quod ab aliis fere omnibus tradi videmus Anatomicis, cauisse Naturam prudenter hoc inuento, ne arteriam magnam sinistra vena superequitaret; à cuius continuo motu ruptionis periculum præsentaneum imminerebat, cum videamus, per vniuersum fere corpus, arterias venis subſterni, nec vnquam obseruamus, vllam hoc nomine ruptam, detritamue.*

Cæterum hæc vasa merito longissima sunt, vt diligens quædam præcedat præparatio, quam facile in his fieri obseruabis, si sanguinis duntaxat aduertas albedinem, quam augeri cum itineris longitudine indubitata fide oculorum æstimatio præstat. Hæc causa quoque est, cur in tot plexus cocant, vt scilicet, quemadmodum intestina, cum longiora sint futura, in angustiore spatio promptius continerentur. Arteriæ autem longius sub emulgentibus, quam Vena oriuntur, vt breuiores sint, quia spiritus præparatione, vt sanguis, tam exquisita, non indigebant. Coniunguntur quoque per anastomoses, vt Arteriæ quidem præparatos spiritus, Venæ autem sanguinem conferrent, & quædam exacta commixtio fieret, antequam Parastatas materia seminalis ingrederetur. Inde ad has vtriusque sanguinis mixtura transfunditur, & mea quoque sententia, in his in semen perfectum propria vi elaboratur. Dico, in his elaborari,

Parastatarum v-
sus inue-
stigatur.

rari, quod plenas semine, non ego tantum: sed & alii quam plures doctissimi Viri mecum invenerint, tum quia haud temere Naturam huc materiam seminis deposuisse; sed potius, ut coqueretur, crediderim. Addo autem, *vi propria*, ut demonstrum, me cum iis non facere, qui cum testes nunquam in se semen continere inveniunt, adeoque officinam seminis non esse, vel oculorum testimonio conuincantur, irradiatione tamen in parastatis generare profitentur. Atque nunc antequam ulterius prouehamur, ut omnia clariora sint, quæ dici in hoc negotio possint, duo quidem imprimis mihi agenda videntur. Primo, demonstrandum quibus ex causis hanc facultatem, tum generandi in se, tum in alio per irradiationem testibus derogem: deinde inuestiganda propria ipforum actio, & si quid erit, quod possit obici, diluenda. Nec enim ita temere à Galeni opinione vnquam discedendum, aut aliorum Clarissimorum Virorum sententiis contradicendum putavi, nisi quoties causas habui admodum graues, experientiamque ipsam contrariam viderem. *Testes igitur in se non generant*, quod materia seminis testes non ingrediatur, sed in parastatis remanet, ut & alii obseruarunt, inter quos imprimis doctissimos duos, Falloppium inquam, & Fernelium nomino. Et quam ineptum foret hoc Naturæ consilium, quæ cum breuissima semper vtatur (vbicunque licet) via, nihilque frustra tentet, si materiam hanc à parastatis ad testes, iterumque ab his ad illas traduxisset, & in tam anxio itinere, difficilique, nihil à parastatis beneficij quæsisset. Taceo nunc, in testibus semen nunquam, interdum ferofum tantum humorem reperiri. *Sed nec per irradiationem testes semen generant*, cum hæc ope spirituum necessario accidar, quod præparatio seminis sit coctio, omnis autem coctio ope calidi spirituumque perficiatur. Spiritus autem cum in testibus non sint, ut in fonte caloris, aliunde ergo ipsis accedunt, quemadmodum Cerebro à Corde: at certe quod testibus affluit, non tanti est, ut aliis partibus possit suppeditari postea: ut nihil iam dicam, neque arterias, nec venas à testibus ad parastatas desinere, quæ vicem possint obire canalium, per quos influant. *Quod si obiciat quispiam*, vicinæ beneficio irradiationem hanc fieri, id mihi quidem ex iis esse videbitur, quæ inter impossibilia referuntur, quæque à Naturæ institutis maxime aliena sunt, cum nullibi spiritus ob tenuitatem suam, nisi per crassiores fistulas traducat & communicet aliis partibus, ut videmus in arteriis & nervis contingere. Quod si à corde influat vis generandi seminis, quid opus est à testium arteriis spiritum aduocare, cum parastata copiosioribus irrigentur arteriis, & per quas à corde rectissima via est, qua assiduo ac indefinenter spiritus influant. Nec vero peculiarem credendum est requiri hic calorem, qui semen confectum primum, deinde fecundum reddat, qualem nonnulli, vana certe opinione, confinxerunt sibi, qui spiritus quosdam singulares, in testibus generari statuere, diuersos ab illo triplici spirituum genere, quod vulgo statuitur, cum in nulla vniuersi corporis coctione distinctum esse videamus genus: sed omnibus, ut ventriculo, hepati, lieni, mammillis, cæterisque à Corde influere. Quod si inde Ventriculus chylum, Hepar sanguinem, Mammillæ lac generant, id non ideo euenire putandum, quod à diuerso calore influente coctio sit instituata: sed quia temperamentum illius partis diuersum longe est, ab aliarum temperie, quemadmodum neque in oculo alius

Testes in se semen non generant.

Testes neque in alio semen generant.

*Parastata-
tarum
verus v-
sus.
Testium
verus v-
sus.*

animalis spiritus est ab eo, qui ad aures transmittitur, etsi in illò videat, in hoc audiatur: sed quia illa partis illius conformatio est, aliudque temperamentum. Calor enim non nisi solam coctionem efficit: at formam aliam atque aliam temperamentum partis, materiæ concoquendæ inducit. *Parastata ergo semen generant, & quidem in se, atque à se*, propria & insita facultate, ob temperamentum, quo præditæ sunt, coadiuuante tamen quam plurimum, & excitante hoc ipsum, calore à corde influente. *Testes autem coctionem seminis secundo adiuuant*, quatenus scilicet serum ad se trahunt, digeruntque, illud inquam, quod necessario vna cum sanguine ad parastatas vadit, vt per tenuissimos arteriarum venarumque plexus, tum anastomoses transeat. Si enim hoc consilio Natura (vt diximus superius) sanguini sero prouidit, vt in hepatis parenchymate, ex radicibus Portæ ad Cauam traduceretur, in quo satis euidentibus adhuc sunt anastomoses: multo profecto magis erat necessarium, vt in his prospiceret, quæ ita angustæ sunt, vt omnino sensum omnem effugiant. At reuera id fieri, vel ipse nos sensus edocere potest, cum videamus in Testibus nonnunquam serosum humorem coaceruari: & sinistram testem multo maiorem dextro, quod scilicet per venam emulgentem læui lateris, serosior sanguis traducatur. Accedit, quod testis substantia glandulosa est, qua Natura per totum fere corpus ad serositates huiusmodi absumendas abusa est, vel ipsius magni Hippocratis testimonio. Et hoc nomine fibræ illæ tenues, ad parastatas à testibus, ea parte, qua inuicem cohærent, digeruntur, vt per eas commode attrahant. Quod si quis hanc sententiam non omnino quidem à veritate alienam esse statuatur, at interrim vrgeatur vulgari illo dubio, quæ causa sit, si testibus seminis generatio proprie non competat, ijs tamen vt ablati, vel quocunque morbo, causæve externa, & imprimis frigore læsis, animal semen aut non conficiat, aut certe generet infæcundum. Illi ego respondeo, me sic nihil hac ratione vrgeri, vt haud videam quid facilius sit, quam huic scrupulo satisfacere. Nec enim vel frigore testis afficitur, vel cultro (dum castramus) læditur, quin vna afficiantur, & lædantur ipsi adnatæ parastatæ, in quibus seminis officinam ponimus. Quod si jam illudere quis responsionem hanc voluerit, dicatque, infæcundum quoque futurum esse animal, si abscisso teste parastatæ relinquantur, nec illi ego valde contrarius propterea fuero. Infæcundum enim merito erit, cum coctio perfecta in parastatis tum haudquaquam futura sit, quod serum illud superfluum non absumatur, à quo semen aquosum nimis efficitur. At inde non magis sequitur parastatis fecunditatem seminis accedere à testibus, ac hepatis venis, à liene vis sanguificandi, quod læso liene videamus sanguinis generationem in jecore corrumpi, cum crassior chyli pars non attrahatur. Videbimus tamen nihilominus hoc, materiam scilicet seminalem confici, quæ nonnunquam & Eunuchos, quibus relicta parastatæ, ad venerem excitat, & effunditur, quamuis ob dictam causam fatum haudquaquam generet. Cæterum testes ne frigoris tempore plurimum paterentur, Natura *musculos* tribuit, & complures *tunicas*, vt illi quidem contracti, abdomini admoerent, à quo fouerentur: hæ autem, tegerent. Hoc idem præstant & ipsæ *communes membranae*, quæ attactæ leuiter à frigiditate, protinus contrahuntur in rugas, quo nomine cuti tam valide Natura membranam carnosam fibris carneis conspersam iunxit.

*Dubia
soluitur.*

junxit. *Siti* autem sunt *extra abdomen*, propter parastatas connexas: at hæc, vt longior esset via valorum præparantium, sicque melius seminis materia præpararetur. Elaboratum hoc modo semen in parastatis, per *deferentia vasa* ad glandulas transmittitur. *Vasa* hæc *per obscura cauitate pradita* sunt, quod semen facile, cum totum sit spirituosum, permeet: *neruea* autem & *crassa tunica constant*, quo minus idem dissipetur. Hæ in glandulas *prostatas desinunt*, in quibus colligitur, & tanquam in promptuario asseruatur. Antequam autem eo perueniant, *Vesiculis* quibusdam *annectuntur*, quæ quod oleosum, & pingue est in semine, ad se attrahunt, à quibus postea, sensum in communem vrinæ seminisque ductum, siue *vræthram*, per *foramen caruncula obturatum*, elabitur, vt is continuo irrigetur, nec vrinæ acrimonia erodatur, vel exsiccat, in se confidat. Idem fit, & potissimum coitus tempore, vbi compressis his vna cum glandulis, copiosius effunditur, ne seminis acrior vis, damni quid inuehat, propterea que huius humoris defectu nonnunquam stranguriam nasci Galenus nobis author est. *Sunt* autem *complures*, ne, si vna duntaxat foret, cum impetu efflueret; sic, cum multæ sint, ex vna in alteram paulatim deriuatur. *Intus anfractus habet*, vt sensim ac sensim distribuant ad infimam, ex qua in meatum paulatim transmittitur: ne autem regurgitet, caruncula ductus ille obturatur. De *prostatibus* postea dicturus sum, cum penis actionem inuestigabimus.

Est autem **PENIS ACTIO** erectio, cum à Natura conditus sit, vt semen optimè elaboratum in vterum transferat. Vterus hic, cum in corporis cauitate necessario recondideretur, quo tutior foret ab externo frigore, ne seminis calor, dum ipsum exporrigeretur, euanesceret, *canalem longum* Natura effecit, per quem ad vterum excurreret. Canalem hunc, vt recondere in vaginam vteri Vir posset, durum esse conueniebat & tensum: at si perpetuo talem seruaret homo, non minus molestum incommodumque illi foret, ac si manum perpetuo tensam erectamque secum circumferret. Proinde sic solers Opifex condidit, vt vtrique sane tempori inserviret, & vbi opus fuit, in coitu quam facile erigeretur, reliquis autem flaccidus à corpore dependeret. *Substantiam* ergo ipsi concessit, quæ facile tenditur; & materiam, quæ admodum inflat. Talis substantia est corporum neruorum, & vrinarij meatus, ex poroso neruo, & fungoso constans, ad quam arteriosus sanguis & spiritus, imaginatione venerea concepta, copiosissime affluunt, & tendunt. Id ipsum videmus venis nonnunquam contingere, vt spiritibus turgidæ fiant calidiore tempore in manu, brachiove. Cæterum vt & quam citissime, & maxima copia affluerent, calore prospexit, confricatione, & *sensu insigni glandis*, quæ attrahunt spiritus & sanguinem: at ne facile dissiparentur, *septo & tunica neruea* vndique muniuit, & prohibuit. Hoc nomine per vniuersam penis substantiam, omnis generis vasa, sed imprimis *arterias* sparsit, quod ab his quidem maxime omnium tenderetur. Nec tamen corpora tantum neruosa dicta, sed & canalis ipse, & simul muscoli, quod eiusdem fere cum his substantiæ sint, inflantur. Ex quo fit, vt *canalis* viam quidem aperiat: at *musculi collaterales* penem detineant, vt quam rectissimus staret, ne forte ad latus declinans meatum clauderet. Ne quoque idem pressus à corporibus neruosis subsideat, *inferiores musculi inflati*, & proinde *contracti*, deorsum trahentes ipsum, impediunt. Sed & aliud

& aliud insigne officium præstant, quatenus breuiiores, adeoque crassiores facti, dum omnia cætera sic tument prostratas glandulas comprimunt, sicque *per angustissimos illos meatus & inconspicuos*, in vrethram granulatim semen, (non secus ac argentum viuum in corio arctè conclusum solet) exprimunt, adeoque summa coitus voluptas exoritur, quod membrana interior, qua vrethra inuestitur, (præsertim vbi media inter glandulas incedit) acutissimi sensus sit, & gratissimus quidam ac indicibilis pruritus excite-
tur. Rarefiunt enim tum pori illi angustissimi à calore affluente, patentioresque fiunt: quo tamen angustiores sunt, eo maior delectatio percipitur. Ex quo fit, vt qui raro Veneri indulgent, maiore perfruantur voluptate: qui sæpius, minore: sed interdum nec cogitantibus quidem effluat, vbi laxiores pori illi redduntur. Sic exclusum ex glandulis semen, à meatu vrinario, contractis *transuersis extrema membrana* (ex qua constat) fibris, propellitur.

*Vbi volu-
ptas per-
cipiatur.*

Duæ ergo sunt partes, in quibus maximè voluptas percipitur in emissionem seminis, Vrethra, & præsertim illa ipsius pars, quæ intercedit duas Prostratas; in ipsa autem pugna, *Glans penis*. Hoc nomine *reliqua penis corpora ambitu nonnihil excedit*, & maxime circa *Coronam*, vt vndiq; arctius ab vteri vagina, & transuersis eius rugis constringatur. Acuta vero antè est, vt in ipsum internum osculum sese penetret. Vt enim vterus semen felicius, & calens benè hauriat, glandem vterum ingredi conueniebat. Substantia spongiosa, & solidiore, quam corpora constat, vt quam plurimos spiritus susciperet, eoq; diutius tensa maneret, cum ipsa & Hymenem percurrere, & deniq; omnia agere debeat. Exquisiti sensus, vt tanto maior hæc delectatio sit, quam Lucretius describens, libro I. hominum Diuumque voluptatem appellat. Quanquam autem exquisitissimi sensus sit, mirabilis tamen in omnibus Natura præcauit, vt compressa, aut trusa, suauem quandam potius delectationem, quam dolorem percipiat, quod ideo contigit, vt dum in pugna comprimitur, ob suauitatem, potius incredibilis illius voluptatis assurgeret, quam ob dolorem subsideret. Reliquorum vsus facillè ex dictis quiuus colliget.

C A P V T XVIII.

*De partibus genitalibus in fæminis, & primo quidem de Pu-
dendo muliebri.*

ENARRATIS partibus genitalibus Virorum, nunc Muliebres inspiciamus, quas commodè in Pudenda, Vterum, & Testes, ipsisq; annexa Vasa præparantia, & deferentia, diuidemus. Dicuntur ^a *Pudenda* (Græcis *αἰδοῖον γυναικῶν*) quicquid nobis de ob- a, 8. 17. l.
scænis partibus citra dissectionem in oculos incurrit. Latinis antiquioribus *Natura* vocabantur, vnde doctissimus Romanorum Varro, Nutrices, inquit, naturam, qua fæminæ sunt, Porcum appellant. Obscæniorè vocabulo *Cunnum* nonnulli dicunt: at qui student honestis auribus placere, *locos muliebres* nuncupât. Ex his primo omniû occurrit ^b pars illa, ex qua pili primis adolescentiæ annis erumpunt, quæ *pubem*, ἡβήω, appel- b, A. A. A.
lant; annos autè ipsos, quibus prodeunt, pubertatis. Vocatur & *κτὲς πέπτεν*, & à pilis *πείχων*.

PUDENDA

Pubes.

τελῶσις. Aristoteli ἐπιστεῖον, ὁπὸ τῆς ἐπιστάδα, quod in congressu mutuo hæc pars præcipue concutitur. In hac, superior pars præ reliquis non nihil eminentior est, & pilosior, quam ideo *Veneris montem* appellant. Erumpunt autem pili circa decimum quartum annum, qui in mulieribus quidē, quàm virginibus crispiores sunt. *Rima magna*, quæ inter ^c labra consistit, maior est, quàm ^d foramen colli vteri, seu ceruicis, quæ virile membrum admittit, cū ab osse pubis incipiat, & fere ad anum vsq; perringat, vt inter hanc & istā perinæū trāsuersi digiti latitudinem vix excedat. Græcis σχίσμα vocatur, siue *fissura*, ad cuius latera sunt ^e duo *labia*, καὶ ἡμῶν Hippocrati dicta, quibus interiores pudendi partes clauduntur, non secus vt dentes & lingua, labii oris. Constant ex communi corporis integumento cute, quæ adipem non paucam, & fungosam cōtinet. Diductis his non nihil, ^f *alæ* in conspectum prodeunt, quæ Græcis πτερόγνια, quibusdam & πτερυγώματα dicuntur. Galeno νύμφαι, quod primæ sint, quæ sponsum admittant, vel certe, quod scarurienti vrinarum fonti præesse videantur. Productiones enim sunt duæ, vtrinq; vna, quæ ex molli & spongiosa carne, tum ex reduplicatione cutis ad latera externi ceruicis osculi oriuntur, & sub labiis rector, ad commissuram ossium pubis ascendunt, iunctæq; & Clitoridem amplectuntur, vnde quibus hæc magna est, iis & alæ maiores esse solent. Figura & colore galli cristam æmulantur, vnde *Crista* fortassis Iuuenali Poetæ, dum scribit,

Callidus & crista digitos impressit Aliptes,

Ad summum Domina femur, exclamare coegit.

Hæ quoties collabuntur ad se inuicem, externum ceruicis osculum exacte claudunt. In harum ergo apice ^h *Clitoris* est, caro quædam neruosa, dura, intus nigricante & spongiosa materia plena, similis omnino illi, ex qua præcedenti capite duo neruosa penis corpora exstrui diximus. Sed vt substantiam eandem cum virili pene obtinuit, ita quoque vsum fere, & figuram. Erigitur enim non secus ac penis vna cum circumstantibus alis, si quando lasciuie manibus tractatur, copioso spiritu influente; ac rursus hoc dissipato, flaccescit. Hoc nomine ab Albuca *temigo*, ab Auicenna *virga*, à Laurentio *mentula* muliebris dicitur. Constat autem ex tribus corporibus, quorum ⁱ duo lateralia, à nonnullis *ligamenta*, aliis *Crura* vocata, quod ipsis erecta inniti videatur, & ab ossis ischii tubere interno distincto principio enascantur: ^l *tertium*, ac inter hæc medium, è superiore parte commissuræ ossium pubis prodit, in cuius extremitate ^m *glans* est, à Veteribus ⁿ *μύς* τὸν dicta, vt puto, ob similitudinem quæ ipsi est eum baccis myrti; quæ etiam ⁿ *tenuissima* cute tegitur, tanquam præputio quodam, enata ex nympharum coitu. Huic nonnulli *musculos* quoq; ascribunt. Vocatur à Græcis κλειτορίς, ab obscæno verbo κλειτορῆζειν, quod hanc partem digitis perulenter fricare significat. Polluci lib. 2. ἐπιδέλης, qui definit τὸ ἐν μέσῳ σχίσματι σκαῖρον σαρκίον, carunculam quæ in media muliebris pudendi fissura subsultat. Hæc interdum ad tantam magnitudinem intumescit, vt sæpe anatomix ignaris imponat, qui credunt mulieres in viros commigrasse, quod extra pudendum propendeat, instar mentulæ virilis. Atq; hoc quidem fœminarum genus eo sæpe infanix deuenit, vt cum aliis mulieribus illicite coeat, in quas elegans est carmen Martialis ad Bassam.

Inter se geminos audes committere cunnos,

Mentiturq; virum prodigiosa Venus.

T t

Vocab.

Fricatri-
ces.

Vocantur à Græcis antiquis *τελευτῆς*, Latinis *fricatrices*, quas frequentissimas in Ægypto & Africa, Nautæ, qui orientales plagas peragrati sunt, referunt reperiri. Cæterum doctissimus Hippocrates, libro de natura muliebr. morbi cuiusdam meminit, quæ *κλῶνα* appellat, & Interpres vetus recte *Columellam* traduxit: at cum ignoretur ab aliis hoc morbi genus, plures varias lectiones excogitarunt, pleriq; tamen legunt *κλῶνα*, inter quos præcipue familiam ducit Hieronymus Mercurialis, Vir sui seculi doctissimus. Ego nihil immutandum censeo, cum videam duo esse morborum genera, quæ *κλῶνα*, hoc est, *Columna* appellari queant, deducta similitudine ab vuula in faucibus dependente. Primum est, de qua nunc locuti sumus, Clitoridis prominentia, & aucta præternaturam magnitudo: alterum, (quam sæpe depræhendi,) carnea quædam & callosa excrescentia circa osculum ceruicis. Et de hac posteriore, vt imprimis Hippocratem laudato loco verba fecisse statuo, sic reor etiam non alteri magis, quam huic conuenire curationis modum, quem ibidem proposuit, puta resectionem. In hæc corpora *o Vena, & Arteria* o, 8. 17. 3.
pudendæ numerosa sobole propagantur, tum *Nervus à sexta* coniugatione, vasa quæ H. H.
omnia insigniora sunt, quàm corporis ratio exigit.

Foramē
Vesicæ.

Sub ipsa autem Clitoride supra ceruicis externum osculum, quod Nymphæ circumstant, *Foramen* quoddam reperitur, mediocris magnitudinis, per quod fæmininus se- p, 8. 17. 1.
xus vrinam reddit. Diligentius hoc propterea notandum est, ne suppressa vrina erre- E.
mus cum iis, qui anatomie ignari sunt, & catheterem in vuluæ vaginam iniiciunt, cre-

Carun-
culæ myr-
tifformes

dententes ex illa vrinam reddi. In hoc sinu *quatuor caruncula* obseruantur, quas à forma, quam similem habent, cum myrti baccis, *myrtiformes* appellant: in Virginibus rotundæ, in defloratis attritæ & flaccidæ. Hæ in quatuor quasi angulis sitæ sunt, *duæ* à lateribus secundum longitudinem, *vnâ* in elatiore parte, quæ cæteris maior ac bifida, vt dictum vrethræ foramen obturet, occludatque: alia in inferiore, versus interiora. Has carunculas coniungit membrana quædam, partim carnosa, partim nervosa, mediocriter crassa, in medio, instar oblongioris annuli foramine, pertusa, vt in adultis minimum digitum facile admittat. Per hoc Virginibus menses effluunt, & vrina: at membrana decantatissima illa est, quæ *Hymen* dicta, *ὕμην κατ' ἐξοχήν*, & virginittis signum statuitur,

Hymen.

reueraq; est, quoties reperitur. De hac cum plures sint Anatomicorum inter se controuersiæ, quas nunc in medium afferre præter nostri propositi rationem censemus, hoc vnum monendum duximus, in rebus Anatomicis audiendos neutiquam esse, vtcunq; in aliis medicinæ partibus docti fuerint, qui experientia & obseruationibus carent. Rident ergo imprimis illi, qui nunquam: post hos, qui raro admodum inueniri, nec nisi præternaturam existimant. Hanc enim in omnibus quas secui virginibus me depræhendisse, in publico Theatro sæpenumero demonstrasse testor, nec defuisse vnâ notauimus, nisi præternaturam, vel quia petulanti manu (vt interdum euenire solet) rupta sit, vel quia ab affluxione humorum, (quod etiam quandoque accidit) erosa fuerit. At enim in maturis Virginibus crassiorem reperi: in iunioribus debiliorem, mollioremque, rarissime imperforatam, nec nisi semel, dum hic Patauii adolescens Medicinæ studio incuberem, quam nulli propterea, quantumuis omnes animi nervos intenderent, perrumpere voluerunt, Chirurgia tamen curata est ab Excellentissimo Præceptore meo Hieron. ab Aquapendente. Aliis enim in primo congressu facile rumpitur, ex quo fit, vt virgini-
bus

bus fere omnibus sanguis in coitu maritali effundatur. Dixi fere, quod non ignorem contingere nonnunquam posse, ut foramen sit amplius, penisq; angustior, sicque prompte citra vim ingrediatur vterum. Et hinc consuetudo nata est, teste Leone Africano, ut qui Fessam incolunt, in nuptiis, dum noui coniuges amoris indulgent, præ foribus astent, quibus si monstretur sanguis effusus in coitu, lati ad conuiuia parata se conferunt, de virginitate sponsæ sibi mutuo gratulantes; sin minus, impransim discedunt. Cæterum eos hic, qui Medicinam faciunt, velim admonitos, ut cautiore esse discant, nec Virginibus, si quando ex vtero laborent, temere pessaria intrudant, cum ea ad vterum nequeant pertingere, nisi prius virginale claustrum rumpatur. Hymen autem membrana, cum carunculis myrtiformibus corrugata, formam calicis parvæ rosæ semierpanæ refert, unde & fortassis ab Antiquis flos dicta, & hinc nata phrasis *deslorare virginem*, quod pudicitiam expugnare significat. De hoc flore virgineo elegantissimum carmen est apud Catullum, quod cum dignum sit ut alibi quoq; legatur, huc transcripsimus:

*Vt flos in septis secretus nascitur hortis,
Ignotus pecori, nullo contusus aratro:
Quem mulcent aura, firmat Sol, educat imber,
Multi illum pueri, multa optauere puella.
Idem cum tenui carptus defloruit ungui,
Nulli illum pueri, nulli optauere puella:
Sic virgo dum intacta manet, tum chara suis: sed
Cum castum amisit, polluto corpore, florem;
Nec pueris iucunda manet, nec chara puellis.*

1. 8. 17. 1. Post carunculas has, & hymenem, 1 rima occurrit sub vesicæ foramine, rugosa, inter
F. & fig. 4 duas alas sub magna rima conclusa. Vocatur hæc *cervicis osculum*, Galeno *στίμα τεραχίλου*, nonnunquam *externum orificium*. Per hoc primò in vaginam penis virilis ingreditur, *Cervicis osculum.*
E. quod in quibusdam præter naturam, (sed raro tamen) imperforatum est, unde *ἀτρήτευ*, *Duo cæca foramina.*
dicuntur. Ultimo tandem loco, nec negligenda sunt duo *cæca foramina*, quæ statim apparent diductis labiis, sed fere tantum in viuis, cum admodum parua sint, in quibus serosus quidam humor non parua quantitate prodit, qui maris pubem in coitu madescit.

CAPUT XIX.

De Vtero.

VTERVS à figura vtris, vel vtriculi, qua voce Plinius lib. 11. cap. 37. quoq; non ineptè *Vteri sty mologia.*
appellauit, dictus videtur. Huius enim ritu cauus est, & sætum coerces. Hippocrates & Galenus ut plurimum *ὑστέρα*, & *μήτρα*, aliqui etiam *μίστρα* appellant, ex quo etiam sacris literis vsitata phrasis nata est, *ἐν γαστέρῃ*, pro eo, quod nos dicimus vtero ferre, & grauidam esse. Latinis *matrix* dicitur. Vt cunq; autem vnus còtinuusq; ductus sit, à fundo vsq; ad pudenda, quia tamen diuersæ in eoreperiuntur partes, à còmode trifarià *CERVIX*
diuiditur, in *cervicem vteri*, *osculum*, & *fundum*. Dicitur *CERVIX* tota illa pars, quæ *vteri.*
virile membrum in coitu suscipit, unde & *vagina penis* quibusdam, quanquam communiter *appellatio*
T t 2 niter

niter *collum* nominetur, quam appellationem & Græci retinuerunt, *αυχένα*, & *τραχηλον* τῆς μητρὸς vocantes. Soranus Ephesius honestissimum vocabulum indidit, qui κόλπον γυναικείου, *sinum muliebrem* appellat. Est autem *meatus teres*, ab ^f externo orificio, ad ^f E. vide & 8. 17. f. internum vteri osculum pertinens. ^h *Situs* ergò est in imi ventris cavitare illa, quæ pelvis dicitur, inter ⁱ vesicam & ^l rectum intestinum, quibus membrana à peritonæo enata alligatur. Exstruitur autem ex *membrana duplici*, quam super transuersum feces, spongiosa quædam caro intercedit, similis omnino illi, quæ in duobus nervosis penis corporibus reperitur. Huius beneficio à libidine, & in coitu à penis frictione erigitur, ac intumescit, infinitis venarum arteriarumq; surculis copiosam spirituum vim suggerentibus. Voluit enim sapientissimus Opifex, ut penem vndiq; amplexu suo comprimeret, quo suavior maiorq; sexus utriusq; delectatio foret, eoq; modo in coitu pro ratione penis, nunc latior, nunc angustior, modo breuior, aut prolixior redderetur. Hoc nomine internam quoq; tunicam frequentibus ^m *rugis transuersis & orbicularibus* intertexuit, ut artius retineant, quæ in *Virginibus* duriores sunt, ac eminent: in *Vetulis*, ac *is*, quæ sæpe virum admiscere, sensim quasi pereunt. Ipsa autem ceruix in iuenculis mollissima est; at *is*, quæ sæpe conceperunt, indies fit durior. *Connectitur* ceruix cum vicinis partibus: *anterior*, ⁿ ceruici vesicæ urinaris; & quia non nihil latior est, etiam ossibus pubis, ope membranarum à peritonæo prodeuntium: *posterior* ^o recto intestino, cui toto ductu incumbit. Hoc quoque diligenter notandum, Ceruicem, cum nec virilem penem suscipit, nec menses fluunt, contortam esse, & in se pluribus rugis concidere, ut internas partes ab externo aere, siue calido, seu frigido defendat, quo nomine menstruo tempore, mulieres, nisi sibi prospiciant, impense refrigerantur.

^{Os Vteri.} *Os Vteri*, τὸ στόμα τῆς μητρὸς, & Galeno interdum *Cervicis internum orificium*, foramen est, quod oris modo dilatari, & constringi potest. *Situs* est inter ^q ceruicem & fundum, ex cuius infima sede protuberat, *corpus referens* quasi glandem obtusam, perforatam transuersa linea, quod tamen cum hiat, exacte rotundum efficitur. Hoc perpetuo conuiuet: at *conceptionis tempore primisq;* (dum vteroggerunt) *mensibus*, sic constringitur, ut ne angustissimum quidem admittat stylum: in *coitu* contra adeo dilatatur, ut penis glandem suscipiat, quem dum suauiter amplectitur, multa voluptate vtrumque sexum perfundit. In *partu* adeo extenditur, ut commodum egredienti (vtrunque magno) fœtui aperiat viam, quam rem considerans Galenus, se admirari quidem, at intelligere non posse, ingenue confitetur. Quod si forte inuersum sit, induratum, exulceratum, eicatrice obductum, aut nimis humidum, sterilitas sequitur. Inuersum enim glandi virili non opponitur, ut semen recta iniiciatur in vterum, vnde refrigeratur, atque adeo infandum fit: *induratum* verò, non admittit glandem, nec ingressuro cedit: *exulceratum*, penis attractum refugit: *eicatrice si obductum sit*, obstruitur via semini: *humidum* vero, nimis laxatur, nec infasum semen retinet, beneque clauditur. Sic quibus *nimio coitu laxatum*, plus æquo apertum est, Hippocrate teste, i. morb. muliebr. non concipiunt. *Figura* ipsius, si quando extra vuluam procidit, aut inuertitur, os tincæ piscis exacte refert. Vt enim illud, sic hoc oblongum est, quando conuiuet.

^{Vteri fundus.} *VTERI tandem* ^f *FVNDVS* sequitur, qui proptie *uterus* dicitur, cum omnium partium vterum constituentium nobilissima sit, & in cuius actionem omnes reliquæ cōspirant.

21. fig. 1. A spirant. Vocatur & *Matrix*, quod matris officio fungatur, generando & fouendo factum. Hæc elatissima vteri pars est, in suprema dicti osculi regione sita: cuius magnitudo omnibus æqualis non est. *Virginibus* enim, quantumvis adultis, nucem iuglandem non multo excedit: non item *Vetulis*, quia exsiccatur. *Mulieribus* autem, & iis, quæ virum expertæ sunt, præsertim si sæpius conceperint, amplior euadit: quemadmodum & iis, quæ *mensēs effluunt*, cum eo tempore venæ omnes sanguine turgeant. *Grauidis* contra, in tantam assurgit molem, quanta pro commodo fœtus habitaculo sufficiat. *Figura* concurbitulæ Chirurgorum perquam similis, cum ex latiore fundo in angustū os coarctetur. Hanc tamen non semper seruat, sed non nihil in grauidis immutat, vndique in rotundam sphaeram se conglobando, ex quo Galenus vesicæ vrinariæ assimilabat. *Conne-*ditur fundus conterminis partibus, non tamen quauis sui sede, sed ad latera tantum, cum ante, retro, & supra se partem non habeat, cui adnascatur, sed liber sit, vt in coitu nunc ascendere ad superiora, nunc descendere versus inferiora queat.

Situs.
Magnitudo.

Figura.

Cōnexio.

1. 8. 18. d. Sunt autem *ligamenta quatuor*, ex quibus ^t duo superiora sunt, lata, ac membranosâ, à peritonæo enata, quibus ossis ilii lateribus vterus alligatur. Laxa sunt, & mollia, d. 8. 19. O vt cum vtero dum grauidus est, & extendi, & iterum dum subsidet postea à fœtu liberatus, contrahi possint. Deducunt hæc ^u vasa præparantia & ^x deferentia vtero, quemadmodum & ^y testes continent: & quia lata admodum sunt, ab Arethæo vesperilionum alis fuere, nec inepte, assimilata. Hæc ligamenta, vteri fundum in suo loco detinent, ne à quauis causa inde dimoueatur, quemadmodum videmus interdum ascendere, & diaphragma ac hepar comprimendo, suffocationis periculum inducere; nonnunquam prorsus in sinum decidere; interdum etiam vna cum ceruice, eaque inuersa ex-
tra pudendum propendere; sæpe ad lumbos & coxas declinare. Neque vero, dum vteri hunc fundum sic locum mutare dicimus, solum ipsum, sed vterum vna cum testibus & vasibus intelligimus. Et quamuis dubitatum sit à multis de hac re nostro seculo, quibus res visa fuit risu potius, quàm fide digna: merito tamen ridendi illi ipsi sunt potius, vt, qui neque in Anatomicis quicquam, neque in rerum Natura experientiæ habeant. Reuera enim multiplicem loci mutationem, non tantum in iis, quæ vtero non gerunt: sed & in ipsis grauidis sæpenumero animaduerti, vt vel propterea censeam, non frustra doctissimum *Hippocratem*, in libr. de mulierum morbis, tam crebram huius morbi fecisse mentionem, tamque sollicitè symptomata ipsius omnia assignasse. Nec *Plato* certè, quem diuinum vulgo appellant, vterum frustra appellat animal vagabundum, ac generandi avidum, quod passim per corpus oberrat, meatus aeris intercludit, respirare non sinit, extremis denique vexat angustiiis, ac morbis omnibus premit. Male tamen propterea à Galeno, 6. de locis affect. 5. repræhenditur, quasi animal quoddam statuerit, cum *Plato* eo loci per similitudinem loquatur, & cum de pene virili dixisset, animal esse veluti imperiosum, rationis expers, voluit idem de muliebri vtero per comparisonem efferre. Vterus tamen per se non mouetur: sed ab aliis trahitur, aut pellitur, idque fit, si præter modum distentus sit aqua, vel mola, aut (quod frequentissime euenit) copioso flatu: quoties lecur nimium tumefactum ad sinistram partem protrudit, aut Lien ad dextram: intestina plena flatibus, aut excrementis, antè, vel deorsum. *Hystericus* autem affectus, meo iudicio, sic generatur: inflatur vterus, & ligamēta

Ligamēta superiora.

Vteri ascensus.

Vteri prolapsus.

Vteri inclinatio.

An vterus vere loco moueatur.

Hystericus affectus ut generatur

menta ipsius, à copiosis flatibus, (pluribus de causis excitatis) vnde sursum trahitur, & hepar ac diaphragma premit, sic respirationem intercipit. Non tamen ideo gravidæ uteri præfocationem patiuntur, aut quando mola vterus distenditur. Vergit enim tunc potius pondere suo deorsum, aut ad posteriora, & sic tantum intestina premit. At flatibus repletus, ob leuitatem ascendit, se intestina inter insinuat, & ventriculum, ac diaphragma petit. Et hoc est quod Hippocrates dicit, vacuos & leues vteros, facilius mulieribus ascendere, & os earum intorqueri ^z *Ligamenta inferiora*, processus sunt neruei, teretes, ac caui. Oriuntur à lateribus fundi vteri, prope ^b vasa deferentia, quæ contingunt, ad inguinaque descendunt per ^c productiones peritonæi, (de quibus iam actum est) ac supra pubis os, in latam, ac nerueam exilitatem degenerant, cui Clitoris alligatur. reliqua pars vsq; ad genu postea in internifemoris membranam excurrit. Huiusmodi ligamenta in inguine infra supraq; glandulis fulciuntur, vt propterea huc nonnullis, (cum concaua sint,) excrementitios vteri humores transferre videantur. Ego quoque, anno supra millesimum sexcentimum vigesimo pridie Nonarum Februarii, fæminam Patauii aperui, quæ à nimio coitu mortua dicebatur, reperi que ligamenta hæc, qua parte vicina sunt vtero, plena semine fuisse.

z, 8. 18. e.
e. 8. 17. T.
T. 8. 20.
c. c.
a, 8. 18. Z.
b, x. x.
c, 8. 2. P. P.

Substantia vteri ex plurimis constat membranis, iisque nerueis, infinitos tubulos, amplosque cuniculos constituentibus, quæ anfractuoso transitu inuicem cohærent. Facile hi comparent in vtero gravidæ, cum omnia distensa sunt: at in non prægnante, dum membranæ sunt corruptæ, & cōtractæ, nec foramina hæc conspicua sunt, nec tubuli: ipsa quoq; substantia dura est, vt in illa, mollis. Vt cunq; autem plures sint membranæ, omnes tamen à duabus tantum conteguntur, vna externa, quam à peritonæo deducunt anatomes periti, altera vero interna. Externa lubrica est, ac læuis, nisi qua sede intrant vasa spermatica, aut exeunt ligamenta; omnium tamen, quæ à peritonæo oriuntur, crassissima. Interna vero, plena meatibus exiguis, maxime sub fundo ea sede, qua vterus tegit intestinum rectum. Meatus hi, vbi mulier à menstruis purgationibus vacat, vix conspiciuntur: quo tempore vero laborat, euidenter fiunt: quippe cum per hos purgetur menstruus sanguis ex corpore. Hos Veteres venarum, arteriarumque ora crediderunt, & quia in vtero ouillo, tum etiam vaccino, (quem propterea velim tyrones ante humani vteri dissectionem inspiciant,) cauitatem habent instar acetabuli, (est hoc mensuræ genus, quo acetum antiquitus vendebatur,) idcirco *κετυλεδόναι* appellauerunt, nec modo in prædictis quadrupedum vteris, sed etiam in muliebri. Cæterum fundi externa superficies, superne ad latera, obrusos duos emittit *processus*, qui in nō gravidis prominentias illas nonnihil exprimunt, quæ in vitulis conspiciuntur, vbi primum cornua erumpunt, quos ideo Diocles *κεράιας*, Cornua vteri vocauit, sed in prægnante vteri forma in vesicæ figuram mutata, pereunt.

d *Cauitatem* habet, si dissecetur, vnicam, in qua nulla obseruantur *cellulae*, quas quidam sibi finxerunt, decepti fortassis libro de anatome parua, qui male ad Galenum authorem refertur, cum spurius sit: beneficio tamen ^e *lineæ*, simili sururæ, secundum longitudinem, in dextram sinistramque partem, diuiditur. Est autem exigua admodum hæc cauitas, & vix vulgaris fabæ magnitudine, vt facile tota repleatur in coitu, cum etiam in quolibet seminis minimo, formatrix vis vniuersa lateat.

d, 8. 17. e.
D. D.
e, C. C.

Habet

*Ligamē-
ta infe-
riora.*

*Obserua-
tio.*

*Substan-
tia.*

*Mem-
brana.*

*Coty-
lones.*

*Cornua
vteri.
Cauitas.
Cellula
vteri.
Sutura.*

*Magni-
tudo ca-
uitatis.*

f, huius di-
cata est
8. 21. 2.

Vasa.

Vena.

Per quas
venas

gravidis
menses
fluunt.

Arteria.
Nervi.

Habet tandem vterus ^f Vasa omnis generis, quæ exterius vterum ingrediuntur, & diligenter consideranda sunt, ut rationem multorum affectuum liceat reddere, qui ob consensum vteri enascuntur. Sunt enim vasa insignia & frequentia, præsertim Venæ, quæ arteriis multo maiores, atque à Caua originem trahunt, ut cum vniuerso corpore propterea vterus consortium habeat. Oriuntur hæ à duplici ramo ex utroque latere, vno præparantium vasorum, altero hypogastricæ. Vena, quæ à præparantibus oritur, à superioribus descendit, & per vniuersum vterum dispergitur, maxime tamen per fundum, & cum utrinque implantetur, dextræ cum sinistris per anastomoses inuicem copulantur. Altera, quæ à ramo hypogastrico mittitur, ab inferioribus ascendit, & partim per ceruicem, partim per fundum disseminatur. Ex his, quæ ab hypogastrico ramo prodeunt, maiores sunt iis, quæ à præparantibus descendunt, utrique autem per ipsam substantiam vteri disperguntur, multis intus vniti anastomosis. Per illos putant nonnulli menses fluere, cum forte gravidis prodeunt, quod credant ex vteri fundo nihil his egredi posse, persuasi auctoritate Hippocratis, qui os vteri gravidis clausum, γ. aphor. 51. pronunciat. At illi mihi non recte intellexisse videntur, cum eo aphorismo sic inquit, *ὁ γαστήρ ἐν γαστρίᾳ ἔχουσι, τοῦτέστι τὸ σῶμα τῶν ὑστερῶν συμμεικμένον*, hoc est, ut ego verendum censeo, quæ vterum ferunt, iis os vteri conuiet; *συμμεικμένον* enim, non significat (ut ipsi explicant) prorsus clausum esse, ut stylum ne minimum admittat: sed conuiere, ut nos palpebris, cum dormimus. Arterias similiter duas habet à præparantibus arteriis, & hypogastricis deriuatas, ac eodem cum venis modo propagatas. Nervi quoque habet, primum à sexta coniugatione cerebri, qui vteri fundum accedunt, suntque exiles; alios deinde per ceruicem dispersos, & humiliorem eius sedem, ac pudenda, plures & maiores, ab ossis sacri neruorum paribus, quod hæ partes sensum exquisitiorem in coitu venereo requirebant. Per hos nervos, qui sane exigui sunt, Anatomici sibi maximum cum cerebro consensum, præcipue in hystericis affectibus imaginantur. Ego verò, ut non negem consentire per hos posse quamplurimum, ita certe non facile patiar persuaderi mihi, per Venas & Arterias non longe plus consortii obtinere. Vtuncunque enim hæc vasa, in iis quæ prægnantes non sunt, exilia videantur, ad eam tamen magnitudinem ac molem ab affluxu sanguinis postea excrescunt, ut interdum quoque digiti crassitiem in gravidis indepta, meminerim me obseruasse. Hic ergo sanguis ad vterum fluens refluensque per arterias & venas, cerebrumque petens, aut cor, horribilium accidentium author est, præsertim si qualitate maligna sit præditus, ut consuevit retentus aliquamdiu & corruptus in hystericis. Quam cerebrum autem, & crassa tenuisque ipsius membrana venis & arteriis scateat, iisque amplissimis, nemo est qui ignoret.

C A P V T XX.

De testibus, ipsisque annexis vasis præparantibus, deferentibus, & cæcis.

TESTES
Differen-
tia testium
virilium
& mulie-
brium
à situ.

a, 8. 18. a.
b. & 8. 19
N.
b, d. d.

HABENT & sæminæ testes, sed longe aliter in his se habent, ac in maribus. Nam quod a situ attinet, non ut Viris extra abdomen dependent, sed infimo Ventri inclusi sunt, & vteri lateribus, ope ^b ligamentorum superiorum, quæ laxa sunt ac mem-

*A Sub-
stantia.*

ac membranosa, adnectuntur. In non prægnantibus supra fundum, duorum digitorum latitudine, remoti iacent: in grauidis, qua ilium ossa sacro iunguntur. quanto enim magis vterus extenditur, tanto inferiores ipsius fundo deprehenduntur. *Substantia* mollior est, laxior, ac humidior, & si à membrana separet, tota ex plurib. glandulis ac vesiculis coagmentata, quæ apertæ aqueum humorem, aut sero lactis, sed paulò crassioris, similem in se continent. Sunt hæ vesiculæ vero aliis plures, aliis pauciores, nec vniiformiter sibi iunctæ.

A figura.

Hinc est, quod obseruari, vix certam esse ac vnicam ipsis *figuram*, sed plurimum inter se pro subiectorum ratione differre. Depressi tamen omnes sunt & lati, non ouales, ut marium. *Simplici* etiam inuestiuntur *membrana*, à peritonæo deducta: at viro-
rum testes, quatuor integuntur. *Magnitudine* quoq; admodum cedunt, & temperamento multis modis frigidiore sunt præditi.

*A tuni-
carum
numero.*

*A Ma-
gnitudi-
ne.*

*VASA
preparã-
tia.*

Conueniunt tamen, quod vasis præparantibus, & deferentibus vtriq; donantur, etsi & in his non leue occurrat discrimen. VASA ENIM PRÆPARANTIA, *utcumque numero non discrepant*, cum duæ sint ^c venæ, duæ quoque ^d arteriæ: *nec exortu*, siquidem ^e vena dextra similiter vt in maribus à trunco Cauæ infra emulgentem; ^f sinistra è medio emulgente sui lateris; at vtraque ^g arteria ab ipso trunco exoritur: *nec progressu* denique. Hoc tamen peculiare obtinent, quod nec imi ventris cauitatem egrediuntur, nec antequam ad testes veniunt, inter se commiscuntur, sed in duos ramos diuiduntur, quorum maior postea ligamento membraneo vteri suffultus, ad testem abit: *minor* in vteri fundum definit, cum in Viris tota in parastatas absumantur.

*VASA
Deferen-
tia.*

^h VASA DEFERENTIA à testium extremitate inferna oriuntur, duraque candida, ac neruea sunt, & per ligamentum vteri, larum, ac membranosum, (quod superius ligamentum vocauimus) excurrunt, non tamen recta, vt in Viris, sed flexuose, quod via breuior sit. *Amplitudinem* quoque eandem vbique, vt in his, non seruant: sed circa testes lata admodum, inde vbi nonnihil recesserunt, angustiora fiunt, ac tandem circa vterum rursus latescunt, in cuius cornua & capacitatem inseruntur. Parte autem aliqua in vteri cernicem implantari, quod Andr. Laurentius se inuenisse gloriatur, nec nos vnquam reperire potuimus, & aperte à Galeno negatur, qui libr. 2. de sem. cap. 3. non modo, inquit, in nullo sæminei sexus animali huiusmodi meatus deferentes ad vesicæ cernicem inferi, sed ne ad cernicem quidem vteri peruenire. Quod si aliquando Laurentius inuenit, lusum Naturæ fuisse credimus, nec inde quid vniuersale astruendum, quomodo Natura tum in his nonnunquam locis, tum in præparantibus vasis, & renibus, ac vena sine pari, & aliis ludere consuevit.

*VAS Cæ-
cum.*

Est & aliud vas, quod ⁱ CAECUM quia vnicum tantum habet orificium, & à Fallopio inuentore, qui Tubæ extremo orificio assimilauit, *Tuba Falloppiana* dicitur, non secus vtero, ac intestinum cæcum colo connexum. Hoc à cornibus fundi oritur, sursumque oblique è testium regione fertur, suffultum ligamento membraneo superiore vteri, sicque testes circumdat, nec tamen aut ab iis nascitur, aut ipsis vlllo modo infertur, quemadmodum nec vas apparet, quod huc à testibus perueniat. Peruium hoc est ab ortu suo circa fundum vteri: at in fine cæcum clausumque.

CAPUT XXI.

Traditur actio & usus singularum partium, quæ ad genitalia mulierum referuntur.

QUEMADMODUM partes, quæ in Viro generationi famulantur, eo omnes conspirant, ut fecundum beneque elaboratum semen opportune in uterum coniiciatur: ita quæ fæmineo sexui tributæ sunt, ad hominis procreationem omnes tanquam summum ultimumque scopum collimant. Sed ut illa actio non ita simplex est, & vnica, quin alias sub se compræhendat, cum semen neutriquam expelli possit, nisi prius generetur, nec generari, nisi materia aliunde accedat: sic ad hominis generationem, quæ fit in utero, complura concurrant necesse est, ut adeo solertissimus nostri corporis Architectus, non temere tot partes in sequiorem sexum construxerit, quæ humanæ societatis propagationi inseruirent. Primum namq; ut generetur fœtus, seminis vtriusque conceptio requiritur; deinde eiusdem conseruatio; hinc opportuna maturatio, act tandem in fœtum redacti exclusio. Recipi semen non potest, nisi iniiciatur in uterum: iniici autem nequit, nisi per coitum, qui ut fiat, rigiditas vtriusq; membri, & insignis quædam voluptas requiritur, cum Homo omnium animalium sapientissimum, ad fœditatem coitus, nisi maxima delectatione quasi compulsus, nunquam descenderet.

Actio partium genitaliū, quæ sunt in feminis.

Sed videamus nunc, quàm sapienter omnes, quas exposuimus partes, his actionibus inseruiant. Primum enim se offert forinsecus *puendum*, quod ex labiis, nymphis, carunculis myrtiformibus, & clitoride constituitur: tum *cervix*, & *osculum internum*, quæ omnia ad delectationem, vel vtriusque, vel certe alterutrius sexus mirifice faciunt. Hæ enim partes cum ex substantia quadam spongiosa effictæ sint, præcipueque *Cervix* & *Clitoris*, non secus ac penis, ita omnes in coitu eriguntur & intumescunt. *Labia* ergò, *nymphae*, ac *myrtiformes carunculae*, dum inflantur, validè penem amplectuntur, & premunt, præsertim in iuueniculis, vnde Viro insignis voluptas accedit. *Clitoris* vero, cuius propria actio est erectio, fæminis præcipuum titillationis est instrumentum, vnde lasciuientibus indurari & prominere solet. Erecta autem sic pubi virili opponitur, à qua cum concutitur in coitu, uterum mouet, & semen quod paulò remotius est, in suis receptaculis excitat, prolicitque. Inde rationem licet haud difficulter petere, quam propter situm circa pubis ossa obtineat, & substantiam eandem cum pene, tum arterias, venasque maiores, quam sui corporis ratio exigebat: nervos quoque insigniores & frequentiores. *Cervix* autem, & *internum osculum*, vtrique sexui voluptatem confert, & illius quidem actio similiter erectio est; huius, apertio. Erigi enim conueniebat, ut & prompte exciperet penem, cum in corrugatam recta via non penetrasset, & exceptum commode amplecteretur. Vndique ergo penem stringit, & secundum omnes ipsius dimensiones sese erigit, sicque *brexi* occurrit, *longo* cedit, *crasso* dilatatur, *tenui* constringitur. Natura enim ita omnibus penis differentiis consuluit, ut non opus sit, sollicite vaginam cultello æquam quærere, sed ubique Opificis beneficio inueniatur. Id quoque vtilitatis hæc ratio attulit, ut dum flaccescit penis, cum eodem *cervix* hæc concidat, sicque vteri osculum dum extrahitur, non refri-

Pudendū.

Cervix. Internū os.

geretur. Fit autem hæc erectio eodem modo, vt in pene repletionem, quia tum substantia sic adaptata est, vt promptè spiritus excipiat copiosos, & arteriis tam copiosis ac grandibus referta, vt plurima materia suppeditetur. Os quoque *uteri internum dum inflatur* aperitur, vt glandem penis in se recipiat, quam stringendo, cum in Viro potissima sit voluptatis sedes, immensam delectationem exhibet. Sed & ipsis fæminis voluptatem affert, quod norunt nonnulli, qui certo quodam situ mulieris in coitu (quem aperire quamuis honestus sit, multis de causis hic nolumus) membrum ad uteri orificium intimius protrudunt, vnde segnem uterum semenque proritant, qui coeundi modus dignissimus est vt ab iis obseruetur maritis, qui sobolis gratia matrimonium iniere, cæterum coniuges habent ad Venerem & feminis eiectionem tardiusculas. At enim hæc partes vbi libidine non turgent, collapsæ in se omnes resident, prohibentque, quo minus aer externus ad uteri fundum penetret. Et *labia* quidem, rimam magnam: *nympha*, externum uteri osculum claudunt: *cervix* autem in se concidit, & quemadmodum penis flaccidus rectitudinem non obseruat, sic ipsa flaccida incuruatur. *Osculum* autem & *ipsum internum*, præsertim dum conceperint, ita stringitur, vt vix specillum tenue primis gestationis mensibus admittat. Hoc officio & membrana ipsa fungitur, quam *hymenem* vocari diximus, quæ in virginibus externo osculo à Natura præfixa est.

Atque hæc sunt partes, quæ feminis virilis eiectionem, penisque amplexum adiuvant: sunt & aliæ, quæ muliebris expulsionem inferuunt. At enim cum id prius ex sanguine & spiritibus vitalibus elaborandum fuerit in testibus, elaboratum deinde detinendum, donec opportuno tempore in uterum porrigeretur, à Venis & Arteriis præparantibus, idonea materia defertur ad testes, sed brevior longe ductu, quam in Viris, quod minus coctionis requirebat, vt liquidius ipsum sit & frigidius. Antequam autem inserantur in testes, *capreolorum instar torquentur inter se*, quo longiora nonnihil fierent, quamuis & hoc ipso modo prudentissime seminis præparationi Natura providit. Nam cum præparantia vasa in duos diducantur ramos, quorum alter ad uterum tendit, alter ad testes: illeque tempore gestationis uteri, aut mensium, ad insignem magnitudinem excrescat, ne impetu quodam, magna que copia sanguis in testes irrueret, capreolaribus his vasorum præparantium ductibus effecit, vt materia semini conficiendo destinata, sensim & paulatim testem ingrederetur. Testes autem *vna tantum* circumdedit *membrana*, quod extra corpus non propenderent, vt Viris, quibus contra externas iniurias muniendi erant. *Deferentia* autem *vasa brevia sunt & lata*, vt cito ad uterum feratur, quod minus mobile sua natura videbatur. Comportatum in uterum semen retineri debuit, vnde *inferior superficies aspera facta est*, cui adhæreat semen, & osculum validissime statim à coitu concluditur.

Facta conceptione, fœtus alimento pro nutritione & augmento egebat, vnde magna vasorum copia uterum accedit, & *cotyledones* in uterum pertusi sunt, quibus cum placentæ carnea vasa coherent. Vbi iam conceptus augendi tempus adest, nullum in utero obstaculum est, quo non possit in magnam molem excrescere, cum ex *membrana* constet, quæ in immensum dilatari potest. Iam cum fœtus ad maturitatem pervenerit, exitum sibi quærens, non difficile inuenit vias aptissimas admodum, latas, & am-

& amplas, cum & ceruix ex membrana constructa sit, quæ mirifice dilatari potest. Ipsum autem *pudendum* ne sua angustia obstare posset, cum vndique cute densa, & non valde dilatabili sit circumcirca in extremitatibus & labiis obuallata, fecit *multo grandius, quam est ceruicis*, qui penem admittit. amplitudo, quam per fissuram claudi voluit labiis, ne frigidus aer ad vterum posset penetrare. Ipsi quin etiam vteri fundo, *fibras* dedit omnis generis, vt in partu, vel menstruis fluxionibus expelleret fætum, vel sanguinem: in conceptione seminis, vel retentione se constringeret. Reliquos vsus & Galenus, ac cæteri diligentissime persequuti sunt, & facillime à quouis possunt indagari, cum sapientissima Natura non ita obscura hæc nostro intellectui esse voluerit, si quis animum saltem velit aduertere.

CAPUT XXII.

Exponit differentias, quæ in partibus genitalibus grauida, & eius quæ vtero non gerit, observantur.

CUM partes generationi famulantes, in iis, quæ vtero gerunt, non nihil immutentur, cuius cognitio non tantum mirifice animum delectat eorum, qui Naturæ opera sollicite inquirunt: sed & ad Medicinam felicius faciendam plurimum adfert auxilii; visum est nunc ea subiicere, quæ in plurium grauidarum dissectionibus sæpe à nobis sunt animaduersa.

Ac in *pudendis* quidem, nihil vnquam reperi discriminis, eo tempore, quo gerunt adhuc: *Pudenda* cæterum vbi vel tempus pariendi instet, aut abortus eueniat pluries notauimus, pudendi labia à sanguine ad illas partes confluyente, non nihil tumefacta fuisse. Interdum superuenit inflammatio, ex qua mater cum fætu non leue periculum tulere. Accidunt hi tumores, Venis & Arteriis hypogastricis compressis, dum vterus sua mole ad inferiora ruit, vnde sanguinis, aliorumque, quibus abundant humorum, ad contermina loca affluxio excitatur.

Cervix quoque insigniter abbreviatur, vt haud difficile sit vteri os digito attingere, præsertim si pedibus grauidæ insistant. Vtero enim in omnem dimensionem aucto, non nihil de longitudine ceruicis demitur; premente etiam ob molem, ceruix aliquantulum subsidere cogitur. Non inepte igitur à quibusdam dubitatum mihi videtur, sitne proficius nocuusve coitus, qui vltimis mensibus exercetur, cum prompte ob breuitatem ceruicis, ad interiora vsque vteri, penis penetret, præsertim aperto osculo, dum voluptuoso tangitur impulsu, vnde discrimen est, ne rumpantur membranæ. Contra famina plurimum cōmendant coitum, partumque (si frequentior sit extremis mensibus) faciliter asserunt, dilatari os ceruicis, & lubricari semine, quod ipsæ præ omnibus vnguentis & oleis emollientibus aut laxantibus velint adhibitum. Ego tamen, cum experientia probet esse proficiuum, vt admittam: ita nihil temere agendum esse censeam, si mulier staturæ parvæ sit, primum gerat fætum, dolores lumborum aliquoties passa fuerit, aut antea sine manifesta causa facile abortierit.

Os vteri. Vteri os interius grauidis hiat, tantoque magis, quanto sunt partui viciniore, quid quid etiam alii crepent ex Hippocrate, cum ipsi (vt demonstrauimus) nec recte Hip-

pocratem intelligant, neq; experientiam, quæ Veterum scriptorum, in primis autem diuini Hippocratis fidelissimus est interpres, consulant. Ego vero non tantum centies id tetigi, sed & obstetrices inuestigare docui, vt cognoscerent, reuera grauidæ essent mulieres, an molam tantum gererent, cum facile digito id explorare liceat. Docui quoq; easdem, cum tempore partus maxime hiet, inuestigare, fatusne versus terram capite sit conuolutus, an proprium adhuc situm teneat, ex quod colligant iam iam instare partum, aut longius adhuc abesse. Vidi enim in hac re grauissimos fuisse sapius commissos errores, quod cum primum obstetrices os vteri hiare percepissent, grauidas sellæ imposuerint, & ad conatus parturientium adegerint. Quæ res quantum afferat incómodi, quibus peritior ex se prompte nouerit, cum vteri osculum refrigeretur, maximeq; si hyems sit, vnde fætus, tenellus adhuc, ab aere non mediocriter læditur. Vteri autem osculum hoc cum hiet in grauidis, obturatur crassa & lenta materia, quam quadam ego semper statui esse seminale. Seruit hæc mucosa substantia, primo vt aerem externum ne ingrediatur in vterum impediatur, cum & substantia sua, flatus generando, & frigore plurimum nocere possit: deinde, vt visciditate partus tempore, vteri sinum & pudendum lubricet.

Vterus.

Cæterum ipse *uterus*, dum gerunt, plurimum variat. Nam *magnitudinem* quod spectat, in immensum semper crescit: neutiquam tamen æqualis est, sed ratione sexus & numeri ipsorum fætuum, maior, vel minor obseruatur. Fæmineus enim, maiorem reddit ac masculus; & gemelli, aut tergemini, quam fætus singularis. *Figura* quoq; non amplius cucurbitulæ medicæ, sed vesicæ potius, flatibus, aut vrina distentæ, assimilatur: *situs* autem in medio est vt plurimum, nisi viscus aliquod auctum ex morbo, in alterutrum latus cõpellat. Vltimis tamen mensibus antea sic deuoluitur, vt ipsum peritonæum attingat, omento & intestinis cedentibus versus posteriora. Primis enim versus superiora adigit, & simul ventriculum, ac eam coli intestini partem, quæ ventriculo subiaceret premit, vnde vomitus accidunt, & naturales facultates languent. *Substantia* autem, & *tunica vteri*, statim ac concepit mulier, crassior fit, ac mollior, vt falsum sit, quod à nonnullis proditum est, quo magis distenditur, tanto fieri tenuiorem, cum postremis mensibus duorum pænè digitorum crassitiem, maxime circa superiorem fundi partem, cui placenta carnea adnæctitur, adæquet. Cõstat enim vteri substantia ex pluribus neruaceis membranis, inter quas obliquo ductu procedunt Venæ & Arteriæ, exiguis ramulis sanguine repletis, sic, vt substantia intumescat à repletis eius spatiosis sanguine, quæ rursus corrugatur à partu breui spatio, vt sedecim dierum intervallo, ad naturalem fere magnitudine redeat.

Vasapreparantia.

Vasapreparantia sunt multo maiora, quàm in non grauidis, cum per ea nutriatur infans. Minores tamen sunt Arteriæ, quàm Venæ, quæ nonnunquam ad minimi digiti crassitiem eleuantur.

Testes.

Testes, & Vasa deferentia vna cum cæcis, quod sciam, non mutantur.

Ligamentum.

Ligamenta autem vteri inferiora, sextuplo crassiora videntur, quàm in non grauidis, ob sanguinem. Sinus horum ligamentorum implentur, nõ secus ac alterius vteri substantiæ, cum qua habent similitudinem, cum caua sint, sinuosa, membranosa, & mollia.



ADRIANI SPIGELII

BRUXELLENSIS,

DE HUMANI CORPORIS FABRICA,

Liber Nonus.

Qui mediū ventris historiam complectitur.

CAPVT PRIMVM

De quatuor communibus mediū ventris integumentis.



VE M A D M O D V M imus venter iis partibus ab immenso nostri MEDIVS
VENTER. corporis Architecto destinatus est, quarum beneficio non tantum calorem indefinenter effluentem : sed etiam seipsum in noua sobole Homo quam diutissime saluum integrumque præstaret: sic medium, de quo nunc dicturum sumus, iis dedicauit partibus, quæ idem calidum fouere, per corpus digerere, ac, si quando calor superet, circumfusi aeris frigiditate attemperare queat. Venter hic inter supremum imumque *situs* est, ab illo Situs. ceruice, ab hoc diaphragmate separatus; *anterior* osse pectoris, & cartilaginibus; *ad latus*, costis; *posterior* autem, vertebris, scapulisque circumseptus. Voluit enim prudens Natura, vt medium obtineret locum, quo calidum illud omnia permeans, vitæque perfundens, per vniuersum corpus æqualiter distribueretur. *Figuram* nactus Figura. est oualem, ante retroque non nihil depressam, cuius substantia, neque ossea tota facta est, neque carnea: sed partim osse constar, partim carne, vt & motu esset præditus, nec tamen mollitie in se concideret.

Cæterum cum plures coerceat partes, eas omnes opportune meo iudicio, similiter Partes. vt superius imi ventris, in duos diuidemus ordines, continentium scilicet, contenta-

V u 3

rumque.

Continē- rumque. Voco *continentes*, quæcunque exterius sunt, & reliquas includunt, hasque ite-
tes. rum communes, vel proprias facio, cum nonnullæ cæteris quoque Ventribus, quædam
Commu- huic tantum conueniant. *Communium* sunt quatuor, cuticula, cutis, pinguedo, mem-
nes. brana carnosæ, eadem qua recensuimus serie inuicem incumbentes. At *proprium* plu-
Propria. res numerantur, primumque mammæ vtriusque sexus, quæ anteriorem sedem in pe-
 ctore occupant, deinde muscoli, quorum bene magnus est numerus, partim ante re-
 troque, partim inter ipsas costas sitorum. Hinc membrana duplex, quarum altera to-
 tum ventrem succingit, vt pleura: altera bifariam dirimit, vt mediastinum: post hæc
 ossa, quæ vel antè iacent, vt sternum, siue pectoris os, & duæ Clauiculæ, vtrique
 vna, in elatiore sede; vel ad latera, vt duodecim costæ; vel posterius, quemadmodum
 scapulæ & vertebræ. Tandem sunt cartilagines, quæ septem illas costas, quas veras vo-
 cari diximus, sternò adnectunt, & reliquas quinque spurias, siue iungunt inter se, siue
 efformant. Cæterùm *contentarum partium* duæ sunt duntaxat, Cor scilicet, & Pulmo; & ad
 Cor quidem capsula pertinet, Pericardium dicta, quæ humorem quendam serosum conti-
 net: ad Pulmones autem, aspera arteria. De harum quibusdam antea diximus, puta de mus-
 culis, libro quarto: de ossibus, secundo: tertio, de cartilaginibus. De communibus quo-
 que integumentis abunde quædam exsecuti sumus superiori libro: quamobrem cum
 nolimus fastidiose hic ruminare eadem, non nisi quo pacto ratione ventrium differant,
 leuiter attingemus.

Cuticula Cuticula ergo & cutis ab infimi ventris cuticula cuteq; in eo differunt, quod sub alis,
Cutis. & in quibusdam etiam paulò supra cordis scrobiculum, cui ventriculi superius orificium
 subiacet, pilosa est: dorsi autem cutis, durior multò ac densior, vnde & pilis vacat, sensum
 tamen habet acutissimum, tum ob nervos, qui eo frequentes appellant ex posterioribus
 nervorum dorsalis spinæ furculis: tum ob musculos thoracem mouentes subiectos, qui
 tendinosi, adeoq; admodum sensibiles sunt.

Pinguedo Pinguedo hic multo minore copia, quam in abdomine cernitur, quod nec opus fuerit
 ita defendere calorem, vt in imo Ventre viscerum, & plurimum impeditenti attulisset
 Thoracis continuo motui. Ipsa autem pinguedo cum alias alba sit, in thorace flauior
 nonnihil apparere solet.

Carnosa Cæterùm *carnosa membrana* nihil peculiare obtinet, nisi quod circa colli anteriorem
membra- regionem, carnosior esse videatur, & muscoli naturam assumere, vbi quadratus ille mus-
na. culus efformatur, qui detrahit buccas, & labia, à Galeno *πλάτυσμα μῦωδες* vocatus.

C A P V T II.

De mammis vtriusque sexus.

MAM- **M**AMMILLARVM externas partes, earumque appellationes libro primo copio-
MÆ. se tradidimus, vt operæ pretium non videatur eas denuo hic repetere. Nunc quæ
 substantiam, figuram, magnitudinem, aliaque partibus organicis necessaria, concer-
 nunt, breuiter exsequemur, dum prius monuerimus, Mammæ vtriq; sexui communes
 quidem, at sequiori tamen in primis conuenire, propriasque velut esse, cum in masculis
 similitudinis potius quamdam rationem, ac ipsam rem videantur exprimere. Et hoc illud
 est, cur

est, cur à Latinis nomine diminutiuo in *Viris*, adeoque *mammilla* vocentur: in *mulieribus* autem, *mamma*. His enim propter alendum nuper natum sætum concessæ sunt, illis vsum fere nullum, aut certe minimi admodum momenti præstant. Id tamen obseruatum est à nobis sæpius, si quibus *viris* paulò maiores contingere, eosdem frigidiores sua natura fuisse, & adeo depili pectore, vt propterea mihi persuaferim, consilio certo id à summo Conditore obtigisse, qui hoc, quasi tegumento, calorem cordis exiguum fouere ac conseruare voluit.

Insident autem *Viris* similiter ac *Mulieribus* pectorali humerum adducenti musculo, numeroque duæ sunt; at non attolluntur, cum glandulis careant: nec lac generant, cum sætum non alant. Quod si quid lacti simile interdum in ipsis visum est, vt testem habemus Arist. i. hist. anim. 12. id humor fuit albus, & prorsus ad alendum inutilis. Constant ergo tantum ex cute, membrana carnosâ, papillis in centro, & pinguedine, quæ, quoties prominent, totam quasi magnitudinem ipsis largitur. At *feminarum*, non ex his tantum conficiuntur, sed & ex vasis, & imprimis glandulis, pluribus ac candidis, thoracis musculis adhærentibus, quibus omnibus in medio vna superiecta est maiuscula, in ipso quasi cæterarum centro, & sub ipsa papilla consistens. His innumera vasa intertexta sunt, omnis generis, venæ inquam, arteriæ, & nerui, quæ circa, alia quædam consistunt, veluti canales quidam, candida, & ab inferiore parte toto ambitu enata, quæ in mammillarum centro, semper angustiora facta, coeunt, in quibus lac confectum in glandulis, ad vsum afferuatur. Vocamus hæc vasa *candidos lactis tubulos*, vel, si magis hæc appellatio alicui arrideat, *lactiferas venas*. Venæ autem ipsæ duplices sunt, externæ, & internæ: illæ, à ^a ramo axillari proficiunt, & ^b Thoracicæ superiores vocantur, quæ cutem mammas obtegenem, sub quâ excurrunt, nutriunt: hæ, à ^c subclauis, vt diximus libro quinto, & ^d Mammariæ vocantur, quæ recta ad latera sterni, siue ossis pectoris vtrinque vna descendunt, & vbi ad mucronatam cartilagineam peruenerint, thoracem egrediuntur, deorsumque per rectorum musculorum internam faciem procedunt, donec fere ad vmbilici regionem appulerunt, vbi, pluribus ^e anastomosibus, cum ^f epigastricis venis, ibidem obuiam factis, vniuntur coeuntque. Oriuntur autem ^g Epigastricæ venæ ab ^h externo ramo Iliaco, rectæque per eosdem musculos ascendunt, & quia ab eodem ramo nascuntur, à quo ⁱ hypogastricæ venæ, quæ ad ceruicem vteri fundumque feruntur, fit, vt in iis, quæ recenter enixæ sunt, in magnam attollantur molem, & sæpe minimi digiti crassitiem adæquent. Arteriæ similiter ^l *mammariæ* sunt, à ramis ^m subclauis eodem pacto enatæ & distributæ, quibus eadem quoque ratione ⁿ Epigastricæ arteriæ ascendentes circa vmbilicum ^o osculis suis coniunguntur. Cæterùm, vbi venæ arteriæque hæc mammariæ in itinere versus inferiora ad interuallum quartæ quintæque costæ peruenerint, per medium spatium intercartilagineum, propagines quasdam emittunt, quæ per intercostales musculos penetrantes, in *viris* quidem in musculos pectoris incumbentes: at in *feminis*, & in hos, & similiter in mammarum glandulas infinitis surculis distribuuntur, diuersosque veluti plexus efformant. Nervos quoque habent, ortos à ^p quarto intercostali neruo ex thoracis medulla egresso, qui circa medium costæ, musculum intercostalem perforans, in quatuor ramos diuisus, postea in musculum pectoralem, & per cutim disseminatur, crassiore ramo ^q papillam adeunte. Vasis his & glandulis, pingue-

Mammillæ viro-
rum.

Mammæ
femina-
rum.

Cavales
lactiferi.
Vasa.
Venæ.

Arteria.

Nervi.

Pinguedo
do co-

a, 3.3.F.

b, 5.

c, E.E.

d, g.

e, 10.

f, 9.

g, 9.

h, Z.

i, 8.

l, 6. 2. d.

m, D.

n, 1.

o, n.

p, 7.3.Y.2

q, 7.

do copiosa intertexta est vbiuis, vt æqualitatem quandam mammis aspergat, vnde quibus aut vi morbi ablata est, aut vitio ætatis incrementis, flaccidæ mammæ turpiter dependent. Ipsa autem glandulosa substantia, interna parte membranæ carnosæ superiecta est, cuius beneficio musculo pectorali humerum adducenti adnectitur, extra vero à cute nonnihil crassiore tegitur.

Papillæ. In medio ipsarum ⁊ mammarum foris tanquam in centro ⁊ *papilla* consistit, cor- r. i. r. s.
pusteres, substantia constans fungosa & rara, aliquam multis foraminulis priore par- f. †
te pertusa, quæ contactu, affluente spiritu, non secus ac penis virilis, subito attollitur, mox iterum, eo disperso, flaccida subsidet. Exquisitissimo autem sensu prædita est, cuteque obducta tenuiore, sed nonnihil rugosa, magis que aspera, quam in aliis mammarum partibus. Cæterum, ipsæ mammæ in humano genere *situm suum* in pectore, siue anteriore thoracis parte obtinent, cum cætera animantia rationis expertia, vel in ventre, aut inter femora recondita habeant. *Numero* quoque duæ tantum sunt, & vtrique vna, figura subrotunda, dimidiam sphaeram conficiunt, in quorum centro, velut axis quædam papilla non indecore prominet. *Magnitudo* autem nec ætati cuius, nec omni conditioni æqualis est. *Puellis* enim, *antequam Veneris vsui aptæ sunt*, præter papillas fere nihil apparet: *vbi pubescunt*, leuiter attolluntur; *cum vero menses primum erumpunt*, ad duos fere transuersos digitos excrescunt. Rursus *Virginibus iam viro aptis*, in eam eleuatur magnitudinem, vt manu opportune contegant: *mulieribus* autem, *dum vtero gerunt*, vna cum vtero & fætu augmentur. *Quæ obesa sunt*, iis quoque ob pinguedinem in maiorem molem, quam naturæ leges ferunt, eleuantur.

Vfus. *Vfus mammarum* maxime necessarius est, cum infanti, postquam ex vtero in lucem prodiit, commodum alimentum præpararet suppeditetque. Perquam enim à Naturæ admirabili in aliis providentia alienum erat, si quem tot mensibus in vtero per vmbilicales venas materno sanguine, adeoque alimento cōcocto minime difficili nutriisset, editum protinus ad solidos duxisset cibos, quos neque confecisset vnquam, & tam graui mutatione de repente facta, grauius offensus fuisset. Quare haud dissimile ab illo præparauit, & ex eadem materia; sed multò, quia per os, ad ventriculum, gustatus sensu donatam partem, deducendum erat, dulcius iucundiusque. Tale lac est, quod ex sanguine ab vtero refluento in mammis generatur, & omnes optimi alimenti conditiones obtinet, cum & palato ardeat, facile à ventriculo coquatur, & quam citissime, ac optime nutriat.

Videamus autem quanta solertia ipsa clementissima Parens vsa sit, & quam opportunam fabricam mammis ad hoc munus exsequendum largita fuerit. Primo, ex glandulosa substantia extruxit, qua nihil ad coctionem omnibus numeris absolutam magis idoneum est: nec tamen vnā tantum glandulam esse voluit, sed plures, vt tanto perfectius in pluribus conficeretur. His intertexuit *vasa*, Venas & Arterias, quæ canales sunt materiam aduehentes, & quidem non quamuis, sed sanguinem; nec vndecunque, sed ab Vtero, vt eodem prorsus nutrireretur alimento, quo antea, cum adhuc obscuris alui carceribus includeretur. Sanguis hic non tantum venosus est, sed & arteriosus, quo nobilissimum sit ipsum alimentum, & infanti à matre vita quasi infunderetur, spiritusque. Sanguis autem hic ad mammas non solum sua sponte affluit, & quidem eo statim tempore, quo fætus iam planè absolutus est: sed multo copiosior postea, tum trahente suctu infante, tum

re, tum pellente vtero inutilem illam copiam, affluente adhuc semper aliquid, etiam factu edito, ob consuetudinem. Postquam ergo venas omnes impleuerit, à glandulis, per quas magno numero, pluribusq; plexibus sparsæ sunt, conficitur: confectus postea transfertur ad canales lactiferos, in quibus ad vsum, tanquam in penuario quodam, asseruatur. Cæterum hi tubuli ad ipsum mammarum centrum desinunt, & in papillam, ex qua lac infans exsugit.

Vt ergo mammae ad gignendum aptæ natæ sunt, ita PAPILLÆ maxime idoneæ, ex quibus infans eliciat. Primum enim in medio consistunt ipsius mammae, quo terminantur venæ lactiferae, vt ex his subito exsugatur. Corpus autem est teres, & nonnihil eminens, vt quod manibus infans apprehendere premereq; haud posset, labiis comprehenderet, Substantia fungosa, vt subito cum opus est erigatur, & sic canales, per quos lac promptius exeat, diducantur: rursus, vbi opus non sit, subsideat, iterumq; concidant illi, ne, præsertim turgentibus aliquando mammis lactis copia, inutiliter aliquid de tam nobili alimento effluat. Hoc nomine etiam aliquam multis foraminulis pertusa est, quæ facile cum nutrices lac exprimunt, licebit cuius aspicere. Cute autem tegitur rugosa, vt labia apprehendat melius; at ne hæc lædantur vicissim quia tenera sunt, tenuior est multo, quam aliis in locis: Exquisitissimum autem sensum papillæ obtinent, & tractatæ labiis delectationem suauiore[m] fæminis afferunt, vt inuitent nutrices ad porrigendas sæpius infantibus, ne, si dolore afficerentur, detrectarent; aut, si carerent omni prorsus voluptate, inuitæ, & rarius sugendas darent. Occupant autem pectus in homine, vt dum infans lætat, fæmina aspectu charæ sobolis, iucunditate quadam gaudioque incredibili perfunderetur, cum benigna Parens sic fere omnia instituerit, vt quæcunque tota hæc rerum vniuersitas complectitur, in humanæ miseriæ solatium concedant. Adde & hoc, quod fortasse non postremum est, vt cum Homo animalium sapientissimum futurum esset, & propterea admodum careret omni rationis usu, vnde intellectum nostrum summus Philosophorum ratio tabulæ comparauit, cui nihil inscriptum sit, inscribi autem omnia possent: hæc ratione cum osculis sermonem, cum sermone vero rationem mater factui infunderet. Sunt quoque binæ, ne vna, aut minor, quàm requirebat necessitas, foret: aut nimis magna existeret, sicq; plurimum incommodaret. Cum autem duæ sint, vtriq; lateri vnā affixit, vt æquilibras corporis diligenter seruarietur. Formæ subrotundæ, tum vt plus contineant, tum vt ornent decentius, & minus periculis obnoxie reddantur, cum eo loco alias, præsertim prominentes collocatæ sint, qui sæpius tunditur alliditurque. Cætera quæ de mammis & papilla dici possint, tum de circulo papillæ circumiecto, ea omnia superius, libro primo, nec perfunctorie complexi sumus.

C A P V T III.

De Pleura, siue costas succingente membrana.

TRIPLICEM membranam in medio ventre reperire est: vnā, quæ costas inuestit, & pleura dicitur; alterā, quæ interstinguit thoracem, mediastinum vocata; tertiam, quæ cor includit, & pericardium appellatur. De his ordine nunc verba facturi sumus, sumpto initio à pleura, à qua & reliquæ originem ducunt. Dicitur Pleura, quæ

Appellatio.

vox Græca est, *πλεῖρα*, ὑπὸ τῶν πλεύρων, à costis, quibus subtenditur, vnde & ὑμὴν ἐπὶ ζω-
 κῶς ab vsu, quasi dicas, *succingens membrana* nonnullis vocatur. Latine si Græcam appella-
 tionem velis exprimere, non inepte *costalem tunicam* dixeris. Est enim *membrana*, cum vni-
 uersam Thoracis cauitatem, tum imprimis costas obcingens, ex quo substantia ipsius
 subito patet, quæ aliarum membranarum instar, dura est, alba, tenuis, denique peritonæi
 substantiæ admodum similis, nisi quod robore & crassitiæ nonnihil præstet. Est & *ubique*
duplex, ex quibus illa pars crassior est, quæ thoracis cauitatem respicit: tenuior verò, co-
 stis alligatur. Inter vtramque *Vasa omnis generis* excurrunt, ex quibus *Venæ* sunt duode-
 cim vtrinque, quæ partim ab ^a intercostali ramo elatiore deriuantur, vt duæ superiores, ^{a, 5. 3. e.}
 partim à ^b vena sine pari, vt decem inferiores. Totidem quoque sunt *Arteria*, quarum ^{b, c. c.}
superiores quatuor, ab ^c intercostali superiore, costarum radicibus attenuata, nascuntur: ^{c, 6. 2. b.}
inferiores octo, à posteriore sede trunci descendenti arteriæ magnæ. ^{d, u. u. u.}
Nervi similiter ^{e, 7. 2. o. t.}
^{10. 11. & c.}
^{vsque ad}
^{19.}
^{f, 2. 7. 18.}
^{F.}
 duodecim sunt, & quidem anteriores rami, qui à spinali medulla, dum per thoracis
 vertebrae fertur, prodeunt, cum posteriores in dorso incumbentes musculos digerantur.
 Vasa hæc ^f sub costis ea sede, qua peculiaris ipforum gratia sinus excelsus est, æ-
 quali inter se spatio distinctæ distribuuntur: Venæ tamen, & Arteriæ, per totam costam
 non excurrunt, sed cum ossea parte terminantur: ne tamen intercostalia spatia vasis de-
 stituantur, eo à mammariis furculi, secundum longitudinem seriatim enati, digeruntur.
 Quia autem plurima hæc vasa sunt, propterea & frequens admodum membranæ huius
 inflammatio nascitur, quæ à Medicis Pleuritidis nomen ab affecta parte accepit. Ne-
 que tamen inter pleuram tantum, & musculos intercostales, quos vna cum costis pleuræ
 succingit, si quando inflammatio hæc in abscessum versa fuerit, pus ipsum coaceruatur:
 sed pluries fere inter duplicaturam huius membranæ, per quam vasa incedunt, & quæ
 stabiliuntur.

Figura. Figuram ergo Thoracis quoque habet, hoc est, variam; *superius*, angustam nonnihil; *in-*
ferius latam; latiore adhuc à *lateralibus*; *foris* gibbam; *intus* cauam. *Superficiem* autem *inuerio-*
rem læuem, ne pulmonibus asperitate incommodet: *exteriorem* asperam, vt validius allige-
 tur. Illa etiam aquoso humore semper illita est, qui nascitur ex vaporibus eleuatis à san-
 guine, & postea condensatis respectiua huius membranæ frigiditate. Prodeunt tamen
 ab ipsa neruæ quædam fibræ, quibus pulmo pleuræ alligatur, quæ si nimis stricte sint,
 cum pulmo libere moueri non possit. Dispnam perpetuam, eamque incurabilem in-
 fert. Magnitudo quoque, thoracis internæ magnitudini responderet, quemadmodum peri-
 tonæum canitati imi ventris. *Foramina* quoque sunt complura. *Superne* quidem, vt transi-
 tum largiatur venæ cauæ & arteriæ magnæ, tum gulæ, asperæ arteriæ, ac neruis sexti pa-
 ris: *inferius*, qua diaphragma tegit, terna, adeoque totidem, ac ipsum diaphragma habet,
 eodemq; modo posita; vnum pro vena caua; alterum, pro gula; tertium, pro magna arte-
 ria. Cæterum ipsius *exortum* à meningibus cerebri spinalem medullam inuestientibus,
 quam plurimi dissectionum procures repetunt: hæ enim cum neruis in thorace deductæ,
 & latefcentes, in pleuram degenerare videntur.

Vfus. Vfus autem ipsius similis est vsui peritonæi, vt scilicet tegat, alliget, tum totum mediū
 ventrem, tum viscera, & vasa. Huic vsui quomodo Natura solertissima satisfecerit, &
 quam opportunam substantiam, figuram, magnitudinemq; concesserit, promptum erit
 cuius

cuius per se videre, cum nihil facilius sit, quam in laudes Naturæ excurrere, ut ille aiebat de Hercule, cum iis immensa hæc rerum machina tota plena & perfusa sit.

CAPUT IV.

De Mediastino, siue membranæ cavitatem thoracis intersepientibus.

ALTERA membrana, quæ in medio ventre reperitur, à dicta pronascitur. Cum enim primum pleura à nervis circa dorsi vertebra exorta est, ad sternum per latera contendit, indeque iterum ab hoc versus spinam per medium longitudinis thoracis ad principium redit. Ut ergo pleura medium ventrem totum intus succingebat: sic hæc secunda interstinguit, & in dextram sinistramque partem, siue cavitatem, dirimit. Hinc nomen accepit, ut à Græcis *ὑπὸν Ἀξφρῆσιον*, membrana intersepiciens: à Latinis autem, *Mediastinum*, quasi quod per medium ster, appellatur. Reuera tamen membrana vna non est: sed duæ potius; nec quemadmodum pleura, ob duplicationem: sed quia distinctæ duæ sunt, adeoque vnæ dextra, altera sinistra. Sunt autem secundum longitudinem Vertebrae dorsi contiguæ: at circa sternum, pro ipsius latitudine, à se inuicem distantes. Quod si, ut sæpe accidit, circa hanc partem inflammatio oboriatur, eadem, quæ in pleuritide, contingunt symptomata, & febris ac dolores acuti nascuntur, & pungentes ægrum, non tamen in latere, ut in vera pleuritide: sed in parte pectoris anteriore, qua sternum est. Hæc materia si suppuretur forte, perforatione facta in sternum, vel spatio cartilagineo, facili negotio euacuatur. Sed & hoc loco iis, qui Chirurgiæ nauant, notandum est, fieri posse, ut vulnus in hac parte transuersum factum, propter hanc cavitatem videatur profundissimum, imponatque Medicis, quod sæpe vidi, credentibus, penetrare ad pulmonem, cum tamen in hanc duntaxat pertingat cavitatem. Quare caute hic agendum, accurateque videndum est, ne præcipiti prognostico, sese artemque suam quisque prostituat. *Substantia* ergo Mediastini membranæ est: sed pleura tenuior, molliorque, cuius *superficies exterior*, qua pulmones spectat, lævis, multoque inter dum adipe circa vasa perfusa: *interior*, aspera, propter fibras, quibus membranæ iunguntur. *Magnitudo* autem ipsius tanta est, ut à iugulo vsque ad diaphragma, & à vertebra ad osthoracis pertingat. *Venas* habet, & *arterias* exiles, à mammariis, & à vena sine pari. Præterea venam aliam, quam Mediastinam supra ideo vocauimus, quod in hanc membranam tota absumatur. Oritur hæc à subclauii rami inferiore sede (interdum etiam ex ipso trunco ascendente, antequam ad iugulum diuidatur,) ac modo vena vna est crassa satis, quæ secundum vtriusque membranæ longitudinem cum nervo ad Diaphragma abeunte, supra pericardium descendit, per mediastinum dispersa; modo propagines duæ, quæ per mediastinum deferuntur. *Nervi* quoque sunt Stomachici dicti, qui in duplicatura hac mediastini feruntur. *Vsus* ipsius est, ut non modo dextram thoracis cavitatem à sinistra diuidat: sed & ut pericardium, in quo cor continetur, sursum suspensum detineat, ne, vel ad spinam concidat, dum supini iacemus; vel antè procumbat, dum versus terram flectimur; aut ad alterutrum latus prouoluatur, dum dormientes ipsis innitimur. Præterea vasis quibusdam rurum iter

Nominis ratio.

Nota.

Substantia. Superficies. Magnitudo.

Vsus.

1.

2.

3.

præparat, prohibetque, cum pulmones repleti multo aere, totam cauitatein replent, ne pars pulmonis dextra ad sinistram pertingat, & premat, quod Natura hoc intersepimento facile cauit, quod non osseum, nec cartilagineum factum est, sed membraneum, vt aliquo pacto cederet, nec duritie pulmones offenderet, si quando ultra consuetudinem pulmones extenderentur.

CAPVT V.

De Pericardio, & humore in ipso contento.

Synonyma.

TERTIA membrana est, quæ περιкарδιον dicitur, quod περι τὴν καρδίαν posita sit, hoc est, circa cor, vnde & interdum περικαρδιον & χιτών à Græcis nominatur. Hippocrates vocat κελὸν, siue *vaginam*: at Aristoteles ὑμένα πικελωδὴν, καὶ παχὺν, *membranam pinguem & crassam*. Latini vt plurimum Græcam appellationem retinent, vocantes *pericardium*: alii quam optime *cordis inuolucrum*, *capsulam*, aut *indumentum* indignant. Membrana enim est ampla, vniuersum cor inuoluens, à Mediastino producta: vel potius, (si primam inde originem repetas, à qua & ipsum Mediastinum nascitur,) à pleura, cui parte anteriore & posteriore necitur: at inferius, diaphragmatis circulo nerueo tam validè, vt citra dilacerationem separari haudquaquam possit. Magis autem ad sinistrum latus spectat, quàm ad dextrum; & ad priorem partem, quàm posteriorem. *Substantiam* habet satis crassam, quæ commode distendi & dilatari potest, ex quo fit, vt ægri in cordis palpitatione vix sentiant dolorem, nisi fortè tam valida sit, vt valide cor ad costas impingat. *Figuram* habet pyramidalem, cum superius latius sit, inferius angustius, sicque cordis, quod complectitur in se, figuram affabre exprimit. Distantia etiam, quæ inter cor & pericardium, æqualis est, adeoque ipsum pericardium maius, vt in suo motu naturali commode distenderetur, nec tamen in pericardium allideret. Tantum ergo interuallum inter cor, & hoc ipsum intercedit, quantum requirebat commoda cordis dilatatio. Est autem continua omni sui parte, excepta basi, in qua quinque foramina, ob vasa cordis obtinet: duo quidem, propter venæ Cauæ, partim introitum, partim egressum: alia vero tria, ob venæ arteriosæ, & arteriæ venosæ, tum Aortæ exitum.

Humor in pericardio contentus. *Differentia huius humoris. A copia.*

In hac membrana continetur aqua, quam Galenus 5. locor. affector. 2. vrinæ similem statuit, nec tantum in mortuis reperitur, sed & in viuientibus, quanquam in illis semper copiosior sit, & præsertim si diutius à morte aperiantur. Differt hæc aqua, & copia, & colore. *Copia quidem*, pro ratione ætatis, temperamenti, sexus, & morborum. Pueris enim, vberior est, quàm iuuenibus, & iis qui temperamenti sunt valde humidi, quàm qui sicco præditi: sæminis quoque, ac maribus, copiosior colligitur, & qui serolo admodum sanguine abundant. Hinc est, quod obseruamus, eos qui ex obstructionibus viscerum, lienis, iecoris, & mesenterii laborant, adeoque copiam aquosi humoris in venis coaceruant, quod propter has ipsas obstructions chyli tantum tenuior aquosiorque pars per mesaraicas venas ascendere queat, si quando nimio animi affectu, & potissimum mærore afficiantur, Cordis palpitatione corripitur, quod in his ad cor illico effundatur, sicque copiosum humorem hunc generet. *Quoad colorem*, in sanis, limpi-

A colore.

limpidissima est, in hydropicis, urinæ turbatæ similis; in quibusdam aliis, loturæ carni-um similem vidimus.

Vfus pericardii est, primò, vt Cor in loco naturali contineat, quoties vel supini, vel pro- Vfus.
niiacemus, aut ad alterutrum latus volumur, in qua re quam proficuum quoque sit 1.
mediastinum, capite præcedente ostendimus. Colligit deinde, & asseruat in se hanc a-
quam, siue serosum humorem, qui multis nominibus vtilissimus est. Cor enim nimio 2.
motu æstuans, refrigerat: exsiccatur, humectat & madefacit: asperum, lubricat; nudum,
contra externas iniurias munit, & quasi loricat. Hinc est quod videmus, eos, qui-
bus absumpta est, in hæticis febres, actabes incidere, quod cor habitualemente calorem
hac destitutum prompte suscipiat, & susceptum seruet. Sed & digna memoratu vi-
detur historia, quam refert Realdus Columbus, de discipulo quodam suo Romæ mor-
tuo, cui pericardium prorsus defuisse inuentum est. Subinde is dum vivebat, in syn-
copen incidit, & subinde mortuo similis videbatur, ex qua & extremum tandem
diem clausit. Cæterum, de ipsius generatione diuersæ admodum sunt authorum sen-
rentiæ. Quidam conatum à primordiis vitæ primoque natali statuunt, non secus ac
aerem implantatum in auribus: sed quia tamen experientia comprobatur, alio
atque alio tempore plus aquæ contineri, aut minus, generari ipsam plures postea sta-
tuerunt. In viuus enim animantibus sectio docuit, modicum contineri humoris: at in
iis, qui à cordis palpitatione, vel mortui sunt, vel sæpe viuus infestati fuere, copiosorem
inuentum esse, quam naturalis quantitas requirebat. Non defuerunt autem, qui ex po-
tu generari crediderunt, transsudante ex Oesophago, dum descendit, quæ opinio risu
potius, quàm refutatione digna mihi videtur. Eorum ergò sententia, aut verissima,
aut certe à vero non longe aliena videtur, qui arbitrantur, aquam hanc, ex vaporibus
generari, eleuatis ex sanguine & sero, qui in venis arteriisque cordis continetur, &
postea respectiua pericardii frigiditate condensatis. Sic videmus in iis etiam, qui in-
culpatissima fruuntur sanitate, peritonæi internam superficiem semper madere, pleu-
ramque perpetuo humidam, non aliunde certe, quam ab istis vaporibus condensatis,
cum solers Opifex præpedire sic conatus sit, quo minus membranæ, quod prompte alias
fieret, exsiccarentur.

CAPVT VI.

De Corde, eiusque partibus externis.

COR, Latinis à Græco vocabulo καρδιά dicitur: καρδιά autem, vel quasi καρτία, ab Etymo-
 Imperio, (vt voluit Chrysippus) 2. de placit. Hippocratis, 5. quod habet in alias par- logia.
 tes; vel certe, quasi καρτία, per literatum transpositionem, καρτέα καρδία, quod vi-
 brare significat, ac si perpetuo motu vibretur. Græci veteres, & præcipue Poetæ, ex-
 cellentiæ gratia σπλάγχνον, siue viscus appellarunt, vnde Medea μεγαλόσπλαγχνον δι-
 cta, cordata, ac animosa: hinc elegantissimum verbum σπλάγχνιζεσθαι, quo Græci sum-
 mum cordolium denotant, quasi dicas, imo corde dolore impersentire. Situs.
 Situm est cor in medio ventre, antè sternum, & in fæminis quoq; mammis; ad latera, costis; posterius, scapu-
 la & vertebriis munitum. Huius ^a Basis secundum omnem locorum differentiam exacte

medium locum obtinet: at ^b *mucro* sinistrorsum nonnihil, & antrorsum, infra *læuam* pa- ^{b, I.I.}
pillam exporrigitur, cuius & motum in sinistro latere percipimus; vnde nonnulli ana-
tomix imperiti, totum cor in sinistro latere iacere crediderunt. In quadrupedibus con-
tra, non basis tantum, sed & mucro mediam sedem tenet. *Figuram* habet pyramidalem,
quo fit, vt nuci pinex à priscis dissectionum proceribus fuerit assimilatum: sed hæc figu-
ra quadrupedum potius, quam hominis cordi conuenit, quod illorum cor ex basi ampla
& rotunda, sensim in mucronem acuminatum terminetur: at huius latius sit, & nonnihil
depressum. Quamuis crediderim, & cor in viuo homine rotundius esse, quam post mor-
tem apparet, & rotunditatem illam amittere tantum, concidente ob mollitiem, & ven-
triculorum magnitudinem, ipsius carne. ^c *Externa cordis superficies* à basi vsque ad mucro- ^{c, F. G.}
nis summum læuis est, & æqualis, præterquam in locis, vbi adipe perfunditur, aut ^d vasa ^{d, a. z.}
discurrunt: interior, maxime inæqualis. Quoad magnitudinem, ratione corporis maius ho-
mini, quàm cæterorum animalium vlli contigit, & in longitudine quidem, sex trans-
uersos digitos æquat: in latitudine vero & altitudine, quatuor. Totum autem *carneum*
est, crassum, rubrum, ac densum: in mucrone tamen, quàm basi nonnihil spissius, fibris-
que multis intertextum, quo nomine Hippocrates non veritus est, libro, quem de Cor-
de inscripsit, musculum vocare. Plurimum tamen inter vtrumque discriminis occurrit,
vt haud sciam, qua ratione defendi possit, si carnis colorem, densitatem, fibrarum
diuersitatem, ipsamque actionem respicias. *Color* enim in musculorum carne multo ru-
bicundior est, ipsaque caro mollior, quàm in corde. *Fibræ* autem simplices, cum recta
cunctæ à principio ad finem excurrant: at Cor ex omni fibrarum genere contextitur: nec
loco inter se differunt, quemadmodum videmus in intestinis, aliisq; quibusdam parti-
bus, in quibus transuersæ fibræ exteriorem partem obtinent, rectæ & obliquæ inter-
nam, aut contra: sed inuicem omnes implicitæ sunt ac confusæ. Iam si actionem spectes,
musculorum actio contractio est ad suum principium, dependens à voluntatis nostræ
imperio, adeoque delassatur ac fatigatur, si nimia sit: cordis contra substantia motum
habet à naturæ instinctu insitum ac innatum, qui neque sisti à voluntate nostra, neque
concitari potest, & (res dictu mirabilis) indefinenter multorum annorum spatio sine
vlla fatigatione aut noxa cietur. *Connectitur* ope pericardii, superius mediastino, inferius
diaphragmati; per vasa autem aliis partibus: cætera liberum est vbique, vt libero motu
perpetuo agitur.

PARTES
CORDIS.
I.
Diffimi-
lares.
2.
Simila-
res.
Adeps.

Cæterum vt partes omnes inspiciamus, diuidi cor potest in partes dissimilares, & sim-
plices. *Dissimilariarum* duæ sunt, vna superior, altera inferior: illa, ^c *Basis* dicitur, & *Caput cor-* ^{e, 2. I. H.}
^d *dis*, estque lata & orbicularis, ex qua quatuor illa vasa, de quibus postea dicturi sumus, o- ^{H.}
riginem suam deducunt: hæc, ^f *Mucro* & *Apex* vocatur, estque acuminata. *Similarium* aliæ ^{f, I. I.}
sunt externæ, aliæ internæ. *Externæ*, Adeps, Membrana integens, Vasa omnis generis, &
Auriculæ. *Internæ*, Ventriculi, & Valuulæ.

Incipiamus ab ^g *adipe*, quam circa cor inueniri negauit Philosophus, in historia ani- ^{g, b. b.}
malium: quæ tamen in homine copiosior, quàm brutis, maxime ad basin, vbi vasorum
est egressus, inuenitur. Quin imo cor nonnunquam adeo adipe inuoluitur, vt minus
peritis anatomicis imposuerit, cor abfuisse: præsertim cum & ego ex dissectionibus
obseruarem, animalia sanguinea, quo pinguiora sunt, eo minus cor habere. Et hoc
esse

esse reor, quod legimus in historiis, immolante C. Cæsare in tauri opimi extis cor abfuisse. Quis enim credat bouem excordem vixisse vnquam, cum animalium sanguineorum principium cor sit, à quo omnia dependent? Et mihi certe ipsi superioribus annis obligit, vt dum in theatro publico struthiocamelum diffecarem, cor tanta adipis quantitate oblitum inuenirem, vt facile multis præsentibus fidem fecerit, cor huic aui defuisse. *Membrana*, qua obuoluitur, tenuis est, à subiecta carne, cui validissime adnascitur, inseparabilis. *Vasa* habet omnis generis, per suam substantiam dispersa, venas, arterias, & neruos. ^{b, a.} *Vena*, à caua trunco ascendente oritur, paulo antequam in dextrum ventriculum implantatur, & *Coronaria* dicitur, quod coronam antiquorum regum imitetur. Cingit enim vndique basin, multosque ramos per exteriorem cordis superficiem, in totam eius substantiam ad mucronem vsque dispergit, qui per sinistram partem frequentiores, maioresque rariores; & exiliores ad dextram digeruntur. Huic ad exortum, ne sanguis ad cauam refluat, *Valvula* apposita est, lunam dimidiatam referens. *Arteriam* modo vnam, modo duas, ab Aorta deriuatas, vbi ad sinistrum cordis ventriculum enascitur, statim in exortu, antequam pericardio excidat. Vocantur hæc arteriæ similiter *Coronaria*, quod eodem cum vena modo basin cingant, & per longitudinem cordis, potissimum in sinistro latere, furculo transfundant. *Neruos*, à sexta cerebri coniugatione exiles habet, in basin iuxta venam arteriosam disseminatos. Hos Piccolomineus vim ac facultatem motoriam præter sensum cordi suppeditare censuit, adeoque si derepente obstruantur lædanturve, mortem improuisam inferre. Ego tamen hæc falsâ esse experientia didici, cum plurimum animalium corda exempta è corpore, abscisso penitus neruo aliquamdiu commota fuisse, obseruari.

*Membrana
Vasa.*

^{z, 9.1.K.} Sunt tandem in basi cordis vtrinq̃ue duæ partes, veluti appendices, quas ⁱ *auriculas* ^{Auricu-} Veteres vocarunt: non tantum, vt quidam voluerunt, à forma, quam habent cum auribus canum communem: sed & à connexionione, cum cordi vtrinq̃ue, vt capiti aures adnexæ, eodemque modo ab ipso debeant. *Duæ* ergo sunt, vna dextra, altera sinistra, ad orificia eorum vasorum quæ cordi materiam inuehunt, hoc est, ad Venæ cauæ, & Arteriæ venalis. *Figuram* habent pyramidalem, sed vertice non nihil acuto præditam: *superficie* autem sunt inæquali, tam foris, quam intus, oppletæ tamen, & extensæ sanguine, foris æquales apparent. *Substantia* etiam vtraque constat nervosa, ex triplici fibrarum genere conflata, & tenui, vt cutis crassitiem haud multum superet. *Differunt* autem inter se, *primò* situ, quod dextra venæ cauæ ostiolo præiaceat, cum qua veluti commune corpus efficit; sinistra, arteriæ venali. Deinde magnitudine, quod dextra sinistra altero tanto sit amplior: *tertiò*, duritie, quia sinistra durior, pauloque carnosior, & crassior. *Quartò* tandem, figura, læua acuminatiore, magisque in latus exorrecta. Hæ motu perpetuo & indefinente iuxta cum corde mouentur: sed contrario. Dum enim cor dilatur, ipsæ contrahuntur, & materias effundunt: dum constringitur ipsum, dilatantur, & sese expandunt. Motum hunc doctissimus Hippocrates quoque obseruauit, qui libro de corde, tota sua natura cor agitari scribit; at aures priuatim tum intumescere, tum flaccescere.

CAPVT VII.

*De Cordis partibus internis, Ventriculis inquam,
& Valvulis.*

*Cordis
Ventriculi.
Numerus.
An tres
sint ven-
triculi
cordis
humani.*

CONTINET Cor omnium animalium cauitates, quas Hippocrates γαστήρ, id est, ventres: Galenus & Aristoteles κοιλίας, Iulius Pollux κόλπος, siue sinus appellat. Latini, *Ventriculos cordis*. De horum numero magna lis est inter dissectionum Professores, cum Galenus, cæterique Medici, duos tantum agnoscant: at Peripatetici, secuti Aristotelem, tres velint esse. Hic enim 3. historiarum animalium 3. tres inueniri ventriculos in maximis animalibus, duos in mediocribus: at vnum tantum in minimis, tradidit. Quin & 1. historiarum animalium 17. ordinem quoque & situm cuiusque explicans, maximum quidem, in dextro latere; minimum, in sinistro: at medium magnitudine, inter sinistrum & dextrum locatum scribit. Et ne quid desit tandem, 3. de part. animalium 4. laudat quoque hoc Naturæ institutum: & satius esse iudicat, tres fuisse constitutos ventriculos, quam duos, vt vnus quidem, commune sit vtriusque principium, medium enim & impar principium est. Hunc ternarium cum Aristoteles mediocribus animalibus assignarit, non defuerunt quamplurimi, qui in homine tres sinus conati sunt ostendere, quos cum ego minime vnquam obseruare potuerim, nec verò Aristotelem ita temere erroris acculandum censeam: crediderim equidem inter maxima animalia, elephantos, rhinocerotem, & balenas retulisse; hominem autem, equum, & bouem, inter mediocria, quæ duos tantum habent. Nullibi enim de hominis corde, quod sciam, loquens, ternos ventriculos statuit: at clarissimus locus est, 4. de generatione animalium vltimo, vbi hominem, respectu elephantis, ἐλάττωα vocat, & paruum: quo eodem sane loco, eandem illam diuisionem animalium, qua in maiora, mediocria, & minima dirimuntur, insinuat. Duo ergo sunt in humano corde ventriculi, vnus dexter: alter sinister.

*Differen-
tia ven-
triculorū
A magni-
tudine.
A san-
guine.
A forma.*

Differunt hi ventriculi, primo *magnitudine* inter se, cum dexter sinistro multo sit maior, vt qui à basi ad mucronem vsque pertingat, vnde & ab Aristotele, 1. historiarum animal. 17. κοιλίη μεγάλη, maior, ille dicitur; hic, ἐλάττω, minor. Deinde, *sanguine*, cum dexter crassiores paulo contineat, &, vt melius exprimam, venosum, quæ causa est, vt Galenus κοιλίαν φλεβώδη, καὶ αἱματώδη, ventriculum venosum, & sanguineum appellat. Sinister contra spirituosum obtinet, omninoque talem, qualis per arterias in vniuersum, corpus digeritur. *Forma* quoque differunt, cum si per transuersum cor disseces, dextrum quidem figuram crescentis lunæ semicircularem exprimere inuenias: laeuum, orbicularem. Septum enim, quod vtrumque ventriculum interiacet, qua dextrum sinum respicit, gibbum est: qua laeuum, cauitatem habet. Ex quo fit, vt figura dextri, à basi cordis, vsque ad cauitatis finem semicircularis seruetur: sinistri vero cauitas orbicularis, paulatim, instar coni, à latiori basi in angustum tendens. Quartò, *sinister ventriculus* in cordis medio exacte exsculptus esse videtur, si portionem illam, quæ dextrum constituit, auferas: dexter autem quodammodo à latere tantum appositus. Quintò, carne sinister triplò quàm dexter crassiore constat, multoq; solidiore, ac compactiore.

*A situ.
A crassi-
tie.*

Diuiduntur autem ventriculi hi, ne sanguis vterque confundatur, pariete dextro sinistri ventriculi, quem *septum cordis* Anatomici vocarunt. Hoc propterea à dextris gibbum, à læua concauum est, & cum sinistro sinistri ventriculi pariete æqualis crassitiei.

Septum cordis.

7, 9. fig. 12.

b, A. A. A.

A.

c, D. D. D.

D.

^a Apertis ventriculis, à basi ad mucronem sectione secundum longitudinem ducta, ^b interna superficies inæqualis admodum cernitur, multisq; velur ^c cauernulis referta, quæ carni eius imprimuntur, cum in parietibus reliquis, tum in septo. Hos Galenus in septo pervias putat, sed obliquo tortuosoq; ductu, non recto, vt sanguis à dextro ventriculo in sinistrum sensim feratur, non cum impetu irruat. Ego cum doctissimo Vesalio sum, qui censuit, nullatenus penetrare. Caterum ex ventriculis sinister inæqualior est, & foueis pluribus ac insignioribus refertus, quod etiam notauit magnus Hippocrates, libro de corde, qui ambo, inquit, sinus, interiore parte asperi sunt, veluti erosi aliquantulum: sed sinister magis, quam dexter. Obseruare præterealicer, carneas quasdam fibras in vtroq; ventriculo, teretes, & graciles, à ventriculorum mucrone prodeuntes, quæ in membranas fibras desinunt, infernæ parti valvularum, de quibus jam dicemus, insertas. Hæ in dextro, quinq; , vel sex quandoq; : in sinistro tantum binæ, at crassiores ac solidiores occurrunt, quibus si quis nomen velit imponere, *Carunculas teretes cordis*, vel *papillares*, non male, credo, vocabit.

Interna facies ventriculorū.

Caruncula cordis.

d, 9. 1. L.

Porro hi duo ventriculi circa basin cordis in quatuor vasa desinunt, quorum duo sunt Venæ, totidemq; Arteriæ. *Vena*, in dextrum ventriculum: *Arteria*, in sinistrum terminantur, aut prodeunt. *Venarum prima*, ^d *Caua* dicitur, Aristoteli *magna*, quia omnium venarum maxima est, quæ Galeno reliquisque Medicis à Iecore originem trahere videtur. Huius orificium aortæ orificio triplo maius, in totum dextrum ventriculum expanditur, exceptum primo à dextra auricula. *Altera Vena*, *Arterialis* vocatur, *vena* quidem (vt superius libro quinto complexi sumus) quod sanguinem crassiusculum pro nutritione pulmonibus deferat, cum sanguis in dextro cordis sinu contentus fibrosior sit: *arteria* autem, quia corpus arteriæ obtineat, hoc est, ex duriore membrana, & duplici, vt arteriæ sunt, confecta. Hæc vena caua longe minor, in duos diuisa truncos, ad pulmones tendit, dexterque in dextram: at sinister, in læuam partem, in ramos innumeros iterum dispersi, disseminantur. *Arteriarum*, quæ ex sinistro ventriculo prodeunt, *prima* dicitur ^e *magna*, Aristoteli *ἀόρτη*. Hæc ex basis ipsius centro crassa membrana enascitur, & in duos diuisa truncos, vnum sursum, alterum deorsum mittit, vnde illum truncum ascendentem, hunc descendentem vocauimus. ^f *Arteria venosa* altera est, *arteriæ* nomen ab officio obtinens, quia sanguinem scilicet spirituosum & vitalem pulmoni transportat: sed *vena*, ob tunicam simplicem, venarum tunicæ similem. Hæc similiter bifariam diuisa, statim ab egressu è corde, alterum ramum in dextrum, alterum in sinistrum lobum digerit.

Vasa quatuor circa basin cordis.

1.

2.

Arteria.

1.

2.

e, N.

f R.

Ad horum vasorum orificia vndecim membranæ reperiuntur, quas Hippocrates, libro de corde, pelliculas cordis appellat: Galenus, 6. de vsu part. 14. membranas generali voce. Anatomici Recentiores *Valvulas* & *Ostiola*, ab vsu. Videntur enim instar valvarum, aut portæ aperiri, aut claudi, vt materia affluens, aut assumatur, aut intercipiatur. Sunt autem duplicis generis: *aliæ* enim ex ampla basi in obtusum mucronem

VALVULÆ.

Differencia.

Trisulca. cronem desinunt, atque vbi clauduntur, telorum triangularium eminentiis similes sunt, vnde *trisulcæ*, aut *tricuspides* vocantur: *aliæ* iis similes, quæ in reliquis venis, præsertim artuum, cernuntur, semilunæ, aut Græcorum C similes, vnde *semilunares*, vel *signiformes* appellantur. Illæ intro spectant, quod vasis intromittentibus appositæ sint, vt cito admittant materiam, sed non emittant: hæ, extra, & vasis educentibus appositæ. Trisulcarum ergo tres, Venæ cauæ orificio: & duæ, Arteriæ venosæ appositæ: signiformium autem tres iuxta arteriæ magnæ, quam venæ arteriosæ. Valvulæ hæ, sed imprimis trisulcæ, plurimis fibris, & quasi filamentis, iisque fortibus, ad septum cordis, maxime versus mucronem carunculis teretibus adnascuntur. Has omnes qui videre velit, ventriculos transuersim incidat prope basin, cum omnes in situ egregie tunc sese monstrent.

C A P V T VIII.

De actione, & usu Cordis, partiumque ipsius.

*Actio
Cordis,
Pulsus.*

*Partes
pulsus.
Dilatatio.
Contractio.
Quies intermedia.*

QUÆNAM propria cordis sit actio, & quæ soli competat, nemini meo iudicio obscurum esse potest, cui vnquam vivæ alicuius animalis dissectioni interesse licuit. Vidit enim haud dubio cor indefinente quodam perpetuoque motu, modo latius ampliusque factum, modo rursus angustius, strictiusque. Morus hic à Galeno, 6. de placit. Hippocr. & ab Aristotele, libro de respiratione, σπυγμός, vel σπύζις dicitur, & τὸ σπύζειν, quod pulsare, vel salire significat. Latini *Pulsus* appellant, constatque hic motus duabus partibus, quarum altera *σφαιρική* dicitur, *dilatatio*: altera, *συπλην*, & *contractio*. Est autē *dilatatio cordis*, mucronis ipsius ad basin attractio, qua amplius ipsum fit, & siquidem longitudo comprimitur, sphericum: *contractio* autem eiusdem mucronis à basi discessus, à quo cor angustius redditur. Inter vtramq; hanc actionem necessario *quies* quædam quasi media intercedit, cum nulla res sit, quæ contrariis motibus citra hanc agitari possit, quod, vti summus philosophorum demonstravit 8. Physicor. text. 62. 63. duobus simul oppositis motibus res illa ageretur. Est igitur duplex, aut *interna*, quæ intercedit contractionem & dilatationem: aut *externa*, quæ inter dilatationē & constrictionem interiicitur. Perficiuntur hi motus, & gemina quies, beneficio fibrarum, quas diximus omnis generis cordi tributas esse. Cum ergo rectæ contrahuntur relaxatis transuersis, cor dilatur, cui, quod de longitudine decedit, in latitudinem additur: vbi contrahuntur transuersæ, relaxatis rectis, constringitur, & quod demitur de latitudine, in longitudinem accedit. Quod si obliquæ contrahantur, in se coactum cor manet, & inter mediam illam quietem inter dilatationem & constrictionem perficit. Cæterum cum duos esse cordis vetriculos dixerimus, dextrum scilicet & sinistrum, & hunc altero multo nobiliorem, merito ambigere videmur, vterq; an vero hic tantum moveatur: & si vterq; an æqualiter, an huius motus illius motum sequatur. Huic dubitationi sic satisfaciendum esse censeo, vtrumque pulsare, sed magis sinistrum quam dextrum, quod viva dissectio edocet: vtrumque autem per se, quia in vtroq; principium huius motus est, etsi in sinistro præstare videatur. Ipse tamen hic motus voluntarius non est, & qui ex nostro dependeat arbitrio, quemadmodum musculorum contractio, quam

quam & sistere cum volumus, & concitare possumus: sed naturalis prorsus est, qui absque voluntate, & nobis nihil tale cogitantibus, perficitur. Est ergo internum quoddam, & naturale principium unde pendet: quale autem sit, grauius Philosophi Medicique inter se certant. *Aristoteles* enim Peripateticorum princeps, libro de respiratione, statuit, pulsus à feruore sanguinis fieri, dum in spiritum conuertitur, adeoque dilatari cum bullæ eleuantur; rursus contrahi, dum subsidunt. Quæ sententia vtcunque, primum audita, vero impense similis videatur, experientia tamen Anatomica falsissima depræhenditur, cum sæpe aduerterim, cor quorundam animalium extractum & discissum, omni quoque sanguine exhausto, adhuc fortes validosque pulsus edidisse. Magis ergo mihi arridet *Galenî sententia*, statuentis, à peculiari facultate cordi insita, profluente à forma eiusdem, proficisci: quam ipsam, à beneficio, quod vniuersis nostri corporis partibus confert, vitalem; à munere autem, pulificam appellauit.

Vs vs pulsus commode geminus statuitur: vnus, qui cordi conuenit, quatenus pars est principalis, toti humanæ fabricæ inseruiens; alius, qui cordi inseruit, quatenus priuatam actionem habet. Communis ergo & generalis vsus est, vt sanguis spirituosus per vniuersum corpus indefinenter motu diffundatur, ac pellatur. Pellitur autem sanguis per *constrictionem*, dum cor angustius redditur, contractis fibris transuersis, non secus exigit ea, quæ suis finibus continentur, ac nos manu farcimine pressa, quicquid intus est, supra infraque pellimus. At enim cum sanguis hic digeri per corpus non posset, nisi prius in corde generaretur, nec generari, nisi prius materia suppedigaretur; præter contractionem, & dilatatio maxime erat necessaria, cuius ope, dum cor latius fit, & cavitatem ampliorem nanciscitur, vi vacui validissime venosum sanguinem è cavæ trunco ad se trahit. Ipsa autem quies ad motum cordis per se non pertinet, nec quidquam efficit: sed tanquam id, quod contrarium motum consequitur, accedit, & id teste Galeno, l. de cognitione puls. 10. Cæterum, sanguis hic ex corde duplicis vsus gratia pelli debuit; primo, ne, cum ad putredinem perquam aptus sit, sui temperamenti culpa, quod calidum humidumque est, quiete prompte admodum putresceret: deinde, ad partes alendas minime secederet, quæ causa est, vt supra quoque diximus, cur Natura venis vbique arterias adiunxerit, nec à latere, sed inferius posuerit, vt scilicet motu, Venarum sanguinem indefinenter propellerent: tandem maxime necessarius, vt vitam singulis partibus largiretur. Cum enim Vita nihil aliud sit, quam calidi in corpore permanentia, & calidum hoc ipsum, aut insitum sit, aut influens: vtrumque sane necessarium esse, facile patebit, si cogitauerimus, omnes animæ, sed imprimis naturalis, & vegetativæ actiones, caloris beneficio obiri. Cum autem ea animalia præ aliis calore abundare æquum sit, quæ aeris frigidi iniuriis exposita erant, unde supra diuisionem in sanguinea, & exsanguia attulimus: Homo, omnium animalium calidissimum, maximeque sanguineum est, cum non, vt cætera bruta, in latibulis alicubi latitans, sed quocumque tempore aptum ad aeris quascumque iniurias esse debebat, vt contemplationi rerum diuinarum singulis momentis & vbique locorum, ubi ea se diffusa vndiquaque offerunt, incumberet. Influyente igitur calore erat opus, ne, si per æctum corpus vnus fuisset dispersus, facile à frigore victus exspirasset. Quod sane sic

Cur infuso calore opus fuerit.

Proprius.

impeditum quam sapientissime fuit, dum frigore extrinsecus accedente, influens re-percutitur, intusque efferuescens magis, cum opus est, opportune externis partibus inde suggeritur. Similiter calidis temporibus, quid facilius erat, quam exsolui & dissipari: at ita interioribus adherens, omnes caloris ambientis ac dissipantis vires eludit, dummodo (quia semper quod ad externas partes digeritur, in auras abit dissipatum,) suo tempore alimentis restituatur. Similiter infuso erat opus quam maxime, ut facile influens, ob affinitatem susciperetur. Cum ergo fonte quodam caloris necessario indigeret Natura, Cor extruxit, in quo calor sic abundat, ut qui in corde existimatur minimus esse, in aliis partibus maximus sit: imo talis, ut si viuentem adhuc hominem in sinistrum ventriculum demittatur digitus, feruens calor percipiatur, quod testatur sunt historiae eorum, qui à carnifice viui sunt dissecti. *Proprius usus ac priuatus est*, ut sibi ipsi seruiat, respiratione scilicet pulmonum mediante, quæ similiter inspiratione & expiratione constat. *Inspiratio* cordi necessaria est, ut aer attrahatur frigidus, qui sanguinem in corde feruentem & calorem attemperet: *expirationis*, ut fuligines genitæ expellantur. *In dilatatione* ergo aer aduenit; *in contractione*, fuligines pelluntur. Non tamen aer sua substantia ingreditur, ut postea monstrabimus: sed refrigeratur tantum sanguis ab aere, qui in arteria venosa est, & sic vicissim infusus in cor, eum qui in sinistro ventriculo continetur.

Cur mucro cordis in sinistro latere sit.

Refutantur alii.

Sed age, videamus quomodo fabrica cordis, actionibus his & vñibus satisfaciatur. Primum ergo *situm est* in medio ventre, ut ad vtrumque reliquorum, supremum, inquam, & imum, tum ipsos quoque artus, æqualiter sanguinem & cum hoc, spiritus diffunderet. Et quo fit, ut & *ipsa basis ex ætate medium* in hoc ipso teneat *secundum omnem locorum differentiam*, sed imprimis iuxta superiorem, & imam. nam à dextra & sinistra, à priori & posteriore parte, propterea potius remota æqualiter videbitur, quo commodius sese dilatare possit, nec vllibi allidat, quod accideret prompte, si ad alterutram declinaret. *Mucro autem non nihil ad latus vergit in homine*, quia thoracem parte inferna depressum habet, & breuem: at brutis, ad diaphragma, quod pectus acutum obtineant, & longius. Absque hoc ergo foret, vtriusque motus, cordis inquam, & diaphragmatis, se mutuo impediissent, quod Natura solers euitare cupiens, mucronem in latus non nihil reposuit; *nec tamen in dextrum, sed lævum collocavit*, ob venam la-uam, quæ in thoracem per septi transversi dextram partem ascendit. Sunt ergo nuxæ, quas quidem afferunt, factum hoc esse propterea, ut sinistram partem calefaceret, quæ alias frigidior est dextra. Quid enim quæso commodi à situ cordis quævis pars consequetur, cum cor transmissione sanguinis, spirituumque, non posito, vel connexionem calorem largiatur? *Figura oblonga est, sed superius latiuscula, adeoque pyramidalis; oblonga* quidem, quia hac ratione attracto mucrone ad basim, quam commodissime in sphaeram globatur, & sic in dilatatione plurimum sanguinis trahit: rursus discedente mucrone ab eadem, quam opportune stringitur. *Superius autem lata est non nihil*, & ampla, ut quatuor vasis, partim ingredientibus, partim è corde emergentibus sedem præparet. *Maius autem cor est homini, quam aliis animalibus*, quia homo omnium animalium maxime sanguineum est. Ut ergo hepar quoque maximum obtinuit, à quo confectus sanguis in venis portæ ad cor transmittitur: ita & iam cor ipsum merito ma-ximum

ximum habet, quod copiam illius sanguinis suscipiat. *Substantia dura est, ac densa, ut spiritus, qui calorem influentem constituunt, ne dissipentur, conseruet: quemadmodum arteriæ eadem de causa venis crassiores spissioresque sunt factæ. Cæterum, cum fons sit caloris, ac veluti cisterna quædam sanguinis, quem attenuat: merito cauum esse debuit. Sufficiebat autem huic muneri vna cavititas, vnde vnum tantum ventriculum habere videmus pisces, aliaque multa animalia: sed quia Homo pulmonibus præditus est, atque respirat, dextrum sinistro summus Naturæ opifex adiecit. Et hoc est, quod diximus, sinistram scilicet sinum Cor totum constituere, adeoque & in eius medio exacte exsculptum; dextrum, tantum appendicem quandam esse. Voluit enim summus Parens, ut Pulmo peculiari nutriretur sanguine; non venoso quod nimis esset crassus: neque arterioso, quia nimis tenuis: sed medio inter vtrumque; adeoque tali, qui in dextro ventriculo non nihil attenuatus foret. Decebat namque pulmones esse leuissimos, & propterea ex tenui & rara carne constare, vnde etiam sanguine, diuerso à sanguine, quo aliæ partes nutriuntur, ali conueniebat. Hoc quam verum sit, non melius licebit intelligere, quam si experientiam me imitatus consulas. In fœtu enim, dum adhuc vtero conclusus coercetur, crasso & venoso sanguine nutritur, quemadmodum sequenti capite dicemus, vnde duplo grauior est, & quæuis particula pulmonum aquæ iniecta, protinus submergitur, cum pulmo hominis adulti vel totus in summo natet. Dexter ergo ventriculus ea ratione conditus est, ut pulmonibus opportunum conficiat alimentum, vnde quæ pulmonibus carent, eadem & hoc destituuntur. Sinister autem, ut sit cisterna caloris sanguinisque, ex qua vniuerso corpori suppeditetur. Ex his iam causas licebit reddere differentiarum vtriusque. Dexter enim sinistro maior est, quia plurimum sanguinis à pulmonibus digeritur: tum, quia sanguis admodum tenuis necessarius est, qui alit, & sic facile dissipatur: tum, quia pulmones ipsi in perpetuo sunt motu, & valde quoque à vicino corde incalescunt; calor autem digerit, dissipatque. Continet quoque crassiorem sanguinem, quam sinister, quia ille nutrire debet; hic vero, in spiritus conuerti, qui tenuissimi cum sint, materiam subtilem requirunt. Sinister, in medio quasi corde exsculptus est, quia est cavitatis primaria: at dexter, appendix tantum, vnde lateri adhæret. Tandem ille, & triplo fere crassior, quia spirituosus sanguis facile dissiparetur, nisi optime munitus foret, quod in dextro non est verendum, qui crassiorem continet. Hæ ergo cum ita se habeant, merito quatuor vasa circa cor conspiciuntur; duo, circa dextrum sinum, & duo sinistram, ut in vtroque sint & inferentia, educentiaque. Vena quidem caua, ut materiam pro spirituosio sanguine suggereret: Arteria autem magna, ut eundem per totum corpus distribueret. Rursus, Vena arteriosa, ut pulmonibus sanguinem: Arteria venosa, calorem & vitam suppeditaret. Vena autem caua, & arteriosa iunctæ sunt in dextro, ut prius in hoc pro pulmonibus sanguis elaboraretur: arteria vero magna, & venosa, ut ex eodem optime præparatus, per illam omnes partes, at per hanc, ad pulmones dispesceretur. Sed & alia causa est, quia dum vena arteriosa nutrimentum pulmonibus suggerit, partem aliquam arteriæ venosæ per anastomoses, quibus inuicem iunguntur, infundit: sicque ex dextro ventriculo ad sinistram sanguis, materia spirituum, in dilatatione transportatur. Falsum enim est, per septum quidquam exsudare, cum illa foramina peruia non sint: ineptum autem, quod laudant*

*Pulmo
nutritur
peculiari
sanguine.*

*An per
septum
sanguis
distribuitur.*

Naturæ quoque in hac re prouidentiam, quæ perseptum voluit traducere, vt sensim instillaret, non vi, aut impetu irrueret, quod fieret, si per arteriam venosam, vtpotè vas magnum ac insigne accederet, vnde calor suffocaretur: quasi vero Vena caua non multo maior sit, per quam in dextrum sinum sanguis effunditur. Quod si quis quærat, quo nomine foramina ea facta sint, promptum mihi erit respondere, propter nutritionē esse condita, cum venæ per cordis intimos recessus haud dispergantur, nutritio tamen necessaria sit, vnde consuluit cordi Natura foraminibus his interim, quæ venarū ductibus respondent. Id verum esse facile licebit colligere, cum videamus, non in sepro tantum hæc comparere, sed in vniuerso corde, id quod mihi quidem magni argumenti loco est, alio, quam dicunt ipsi, sine creata esse. Est tandem & alius vsus, cum circa bronchia asperæ arteriæ vasa hæc consistant, vnde ipsis refrigeratis ab externo aëre attracto, necessario & ipsa frigus concipiunt, ipseque sanguis in ijs contentus, qui postea infusus in sinistrum ventriculum, reliquum attemperat. Nec enim verum est, substantiam ipsius aëris cor accedere, cuius substantia cor non indigeat, & nec via vlla sit, per quam ingrediatur: vt taceam, maximam Naturæ imprudentiam, quæ cætera tam provide, tantoque consilio omnia perfecit, si Cor vitæ fontem externi aëris iniurijs tam temere obiecisset, à quo tam sedulo omnes reliquas, vel minimi quoque momenti partes, defendit. Taceam quoque, refrigerari satis ebullientem sanguinem, vbi frigidus arteriæ venalis affunditur, cum videamus à leui halitu ebullientem in magno ahenò ad ignem aquam componi, dum carnes nostras coquimus. Vterque ergo ventriculus duo vasa continet; vnum, quod infert; alterum, quod exportat: infert, dum cor dilatur; exportat, dum constringitur. Cæterum, quia futurum erat, vt illatum modo, subito reflueret, nisi impediretur: Natura sane ingeniosissimum quid commenta est, dum vasorum orificijs *membranulas* quasdam præfixit, quæ alternatim aperiuntur, & clauduntur. *In dilatatione quidem aperiuntur omnes, siue extenduntur, adeoque trisulcæ* veluti fissuras efficiunt inter se, per quas materia intromittitur: *signiformes* vero, extrema suorum vasorum claudunt, & sanguinem egressum remeare prohibent. *In contractione contra, omnes clauduntur, & laxantur*, sicque *trisulcæ* spatia illa, & fissuras claudunt, ne quid regrediatur: *signiformes* vero, flaccescunt, vt sanguis libere efferatur. Omnes namque eam conformationem adeptæ sunt, vt simul tensæ, totum orificium exactè tegant, & occludant. Vt autem quam optime tendantur, & vim sanguinis irruentis sustineant fortius, plurimum *fibræ illæ à carunculis teretibus enatæ* iuuant, quæ contrahuntur, & valvulas resupinant. Tres autem tantum sunt creatæ, quia, vt Galenus præclare philosophatur, pauciores adeoque maiores, neque tam exactè clausissent, neque tam celeriter: plures, adeoque minores, multo quidem citius, & exactius, at imbecilliores fuissent. *Dua tamen tantum arteria venosæ principio affixæ sunt*, vt non tantum per ipsam ingrederetur cor sanguis ille, qui per venam arteriosam à dextro ventriculo suppeditatur: sed & semper aliquid vicissim ex sinistro ventriculo ad pulmones transmittatur, spatio aliquo relicto, quod vitam, vt reliquæ arteriæ, ipsis offerret. Cæterum eleganter dubitari hoc loco potest, quæ causa sit, quam propter Omnipotens illud Numen in dextro quidem ventriculo, venæ, arteriosam substantiam, crassamque membranam: at in sinistro, arteriæ,

veno-

Valuula.

Elegans
dubitatio.

venosam, & simplicem, tenuemque sit largitum. Nec enim temere, sed summo id fecisse videtur consilio, partim vt fœtui, partim vt adulto homini inferuaret. Et *venæ* quidem *arteriosa crassities*, fœtui id vtilitatis defert, ne sanguis spirituosior, qui ab arteria magna, in venam arteriosam refunditur, quemadmodum nunc dicturi sumus, nimium dissipetur: *adulto* autem, & excluso ab vtero, vt, quia tenuiorem sanguinem, in dextro scilicet ventriculo elaboratum, quam venæ aliæ ferat, cuius pars vna pulmonibus; altera, arteriæ venosæ offertur, ne in itinere longiore interim pereat, profundaturque. Contra *arteriæ venosæ tunica simplex* est, vt fœtui venæ loco esset, & sanguis crassus per eam posset excidere, cum crassum sanguinem, & venosum, à caua accipiat, antequam dextrum cordis ventriculum ingreditur: *adulto* autem, vt, quia plurimo sanguine pulmo indiget, copiose is excideret, qui tamen non nimium, vt in vena arteriosa dissipari potest, quin aliqua portio ad cor perueniat, cum breuior jam multo ad cor sit via. At enim, *duobus vasis, quæ materiam important*, *Auriculæ appositæ* sunt, ne sanguis, quem maiori conatu cor allicit, quam expellit, maxima vi in dilatatione irrueret, & sic vel cor totum periculosè impleteret, ne distendi amplius, aut contrahi in se posset, vt videmus interdum vesicam vrina nimis plenam: vel, vasa ipsa rumpantur. Primo ergo in auriculis colliguntur materiæ, vnde dum dilatatur cor, ipsæ constriunguntur, & sic modeste infundunt sanguinem. Merito autem *duæ sunt*, quia duo quoque vasa, quæ intro ferunt. *Substantia constant nervosa*, vt possint dilatari magis minuscve, ne attractionis impetu rumpantur. *Dextra autem maior est sinistra*, quia & caua arteria venosa maior est, ampliorque. *Vasa tandem omnis generis habet*: Venas, vt nutriatur: Arterias, vt viuat: Nervos, vt sentiat. Et Vena quidem, oritur à caua trunco, antequam in ventriculum dehiscat, vt cor sanguine nutriatur crassiore, quia crassam habet, & densam substantiam. *Valuula huic appositæ*, ne in contractione cordis, sanguis regrediatur. *Adipis vsus est*, vt humectet cor: at, ne facile lique scat à calore eiusdem, non pinguedo, sed vera adeps est.

Auriculæ.

CAPVT IX.

De vniione vasorum cordis in fœtu, quæ in nato perit, vbi modus simul aperitur, quo non ipsa solum perditur, sed & vasa umbilicalia in editis cavitatem suam amittunt.

IN vasis, quæ circa cordis basin sunt, discrimen quoddam occurrit, cum aliter se in fœtu, quamdiu vtero concluditur, aliter in homine jam nato, habeant. Bina enim vtrobiq; inuicem junguntur, vnum ex vasis dextris; alterum, ex sinistri ventriculi: & quidē vasa inferentia simul, & simul educentia. Illa, per anastomosin; hæc, per canalem proprium: vtraque, priusquam cordis basin attingant. ^a Vena ergo caua cum ^b arteria venosa paulo quam in dextrum ventriculum hiet, eo scilicet loco, quo vena coronalis pronascitur, per ^c foramen satis insigne nequitur, cui ^d membrana quædam tenuis, ac pellucida, ex parte arteriæ venosæ præfecta est, sola radice superius firmata. Contra, ^e Ar-

*Vniō vā-
sōrū cor-
dis in fœ-
tu.*

^a, 9. fi. 13. B
^b, G.
^c, E.
^d, I.
^e, 6. fi. 14.
D.

teriar

teria magna cum vena arteriosa, per & canalem, siue tubulum venosum nectitur, quia ^{f. e.} h truncus descendente Aortæ, ea sede oritur, qua nervus recurrens sinistri lateris reflexus ^{g. G} estitur, sicque oblique venam arterialem accedit, cui circa bifurcationem ^{h. D.} inferitur. ^{i. G.} Vnio hæc in homine in lucem edito confestim aboletur, & *membrana* quidem ipsa primo statim triduo adnascitur, sicque foramen occluditur: *tubulus* autem, post paucos dies, non secus, ac Vasa umbilicalia, primum cavitatem amittit, & in ligamentum abit, mox prorsus, aliquam multis tamen annis, fereque tribus, aut quatuor interiectis, evanescit.

Vfus.

Vniones hæc vasorum, pulmonum gratia conditæ sunt, quos in sætu, & crasso sanguine venoso nutriri, nec arterioso destitui conveniebat. *Crasso nutriri*, ut, cum nondum cordi respirandi præstarent officium, ad quod leuitas ipsorum requirebatur, aspera arteria, tenera adhuc & flexibilis, ab eorum pondere comprimeretur, ne vacuum in ea esset, quod aërem traheret, qui in utero concedi non poterat. Hinc & in sætu pulmones grauiores esse cernimus, & aquæ iniectiones, quantulacunque portione, non secus, ac parenchyma cordis jecorisve, subito mergi, cum adultorum animalium pulmones contra, vel toti, innatent. *Arterioso non destitui*, ne priuarentur vita, qua carerent necessario, quod sanguis vitalis per umbilicales arterias attractus, & hinc in truncum Aortæ delatus, cor haudquaquam subire posset, nec adeo ad pulmones deduci, ob valvulas, quæ circa orificium arteriæ magnæ, qua sede in cor hiat, sitæ, foris spectant. Vasa ergo hæc sapiens Natura sic adaptare debuit, ut neuter sanguis ad cor appelleret: non venosus, ne in dextro ventriculo, ut in editis, attenuaretur: nec arteriosus, ne non ad pulmones deueniret. Ille ergo per venam umbilicalem attractus ad hepar, indeque per radices portæ refusus in cauam, cuius beneficio ad cor deferretur, statim, antequam id attingat, in arteriam venosam effusus, pulmonibus subministratur. Hic contra, attractus per arterias umbilicales, ubi prope orificium arteriæ magnæ constiterit, cum cor ingredi nequeat, per tubulum ad venam arteriosam, indeque ad pulmones deferretur. Ex quo patet, cur in sinistro Ventriculo *Arteria vena substantiam nata sit*, nimirum, ut sanguinem venosum distribuatur, qui crassior cum sit, ut excidat, tenuiorem membranam requirit: contra, in dextro. *Vena vero arteriæ*, ne, cum deferat spirituosum sanguinem, si simplex esset tunica, subito digereretur. *Iungitur autem Vena caua cum arteria venosa foramine*, quia sibi conterminæ sunt: *Arteria vero magna cum Vena arteriosa tubulo, siue canali*, quia longius à se distant. At enim, ne ex arteria venali, refundi quidquam posset, *membrana* foramen clauditur: rursus &, ne regurgitaret ex vena arteriali sanguis, *canalis obliquitate* prospectum est.

Modus
quo unio
hæc deper-
ditur ex
sententia
Hieronymi
Theobaldi.

Cæterum, qua ratione post editum sætum, tum anastomosin hæc obliteretur, tum etiam vas ipsum pereat, nemo, quod sciam, hætenus aperuit. Hanc tamen princeps inuestigauit, & ad nos perscripsit Excellentissimus Vir, Hieronymus Theobaldus, Medicus Venetus, quæ, cum non minus elegans sit, ut ipse Medicorum est elegantissimus, quam ingeniosa, & Anatomico homine digna, sic dignissimam merito statuiamus, quæ non priuatim tantum, sed & publice legatur, ut fidæ nostræ amicitiae pluribus confirmatæ officiis; ob commune dissectionum studium, in quo Vir egregius egregia plurima inuenit, grata memoria hic, & ubique præstetur. Eadem autem opera, ob

ta, ob argumenti vicinitatem, eiusdem quoque, de vasorum vmbilicalium, & vrachi, in funiculos permutatione, sententiam proponemus. In prima ergo respiratione, quæ subito partum excipit, duo euenire, inquit, quibus fœtus, adhuc vtero inclusus, minime assuetus fuit, pulmonum nempe ab aëre impletio, & inanitio reciproca : deinde, Diaphragmatis ad interna viscera depressio. Ab illa, hæc vasorum circa cor vnio: ab hac, vmbilicalium structura perit. Repletis enim ab aëre pulmonibus, Vasa duo, Vena scilicet arterialis, & Arteria venalis, quod arteria aspera jam extendatur, quæ antea in fœtu, ob pondus pulmonum, compressa subsidebat, cum bronchia ramosq; eius circumstent, (vt dicetur sequenti capite,) stringuntur, vnde sanguis vtriusq; ad cordis sinus pellitur. At enim cum Venæ arteriosæ valvulæ ingressum eius prohibeant: Arteriæ autem venosæ admittant (quod illæ foris, hæc intro spectent,) fit, vt sanguis huius, ad cor, perpetuo motu, trudatur. Cum autem Vena caua & ipsa, more suo, sanguinem ad arteriam venosam impellat, membranula à sanguine compressa valide, exactèque clausa, (quæ ratio est, cur in superiore parte adhæreat, in inferiore libera sit) omnè ingressum præpedit, ex quo fit, vt sanguis hic postea, qua data via, ad dextrum cordis ventriculum secedat. Quia vero in constrictione cordis sanguis expellitur, euenit rursus, vt per Venam arteriosam detrudatur, à qua digestus deinceps continuo ad Arteriam venosam, dum sanguis in hæc nunquam cessat irruere, perpetuoq; etiam à cordis dilatatione ex ea attrahatur in sinistrum sinum, ipsa membranula, fatigata assidue ad suas oras affluxu, tandem coalescit, sicq; anastomosis hæc aboletur, ac perit. Affluente ergo, hac, vt dixi, ratione, sanguine, & petente sinistrum cordis Ventriculum in dilatatione, vbi cor constringitur, per arteriam magnam iterum effunditur, vnde cum deorsum à corde sanguis jam tendat arteriosus, nec, vt ante (cum à matre suggereretur) sursum quidquam trahatur, in tubulum nullus effunditur. Sed nec ex Vena arteriosa quidquam in hunc secedit, cum, vt diximus, Natura id obliquitate ipsius prohibuerit, vnde fit, vt alimento omni tubulus hic destituatur, sicq; primum in ligamentum coalescat, mox omni prorsus, vt & vita, carens, computrescat, & ex putredine in auras abeat. Eadem compressio vasa vmbilicalia in aliam substantiam transmutat: & Venam quidem, in ligamentum, quod lecur suspendit: Arterias vero, & Vrachum, in funiculos. Cum enim ad Venam vmbilicalem à matre sanguis amplius haud digeratur: à musculis autem abdominis, tum visceribus quoq; ob diaphragmatis descensum compressis, & ipsa prematur, nec ab hepate alimentum nanciscitur, sicq; necessario cavitatem amissa in ligamentum abit. Non tamen, vt obliquus vasorum cordis ductus, euanesceat, qua eius substantiam à vicinis venis nutriri voluit Natura & incrassari, vt in ligamentum abiret, cum tantam compressionem, quæ vita priuare queat, haudquaquam patiatur. Arteriæ quoque vmbilicales similiter comprimuntur, impleta vesica vrinaria, arque in latitudinem distensa, cum antea in fœtu in longitudinem porrigeretur, & eadem arteriæ, dum animal accrescit, in funiculos abeunt, quia elongantur, & cum non vna vbique augeantur, manent breuiores. Vrachus quoque ob eandem distensionem, quam facillimè comprimitur, cuius orificium breuissimo temporis spatio sic perit, vt ne guttula vrinæ perfluat.

Arteria-
rum vmbilicalium
in ligamentum
conuersio.

Arteri-
arum vmbilicalium
in ligamentum
conuersio.
Vrachii
permutatio.

CAPVT X.

De Pulmonibus, & eorum aspera Arteria.

Etymologia.
Synonyma.
Partes.

PULMO, quod alterum viscus est eorum, quæ in medio ventre continentur, Græcis πνεύμων dicitur, & πνεῖν, à respirando, q̄ ipsius officium est. Auicenna cordis culcitram vocauit, quia cor ei tanquam puluino incumbit. Vulgus cordis flabellum & ventilabrum appellat. Diuiditur in duas^a partes, quarū altera dextrū, altera sinistrum thoracis latus occupat, in quorum medio cor situm, vnde apud Veteres pluries propterea plurali numero pulmones, & apud Græcos quoq; πνεύμονας vocari legimus. Sic Plautus in Curculio, Pulmones distrahuntur, cruciatur cor. Ab hoc Pulmonarij nomen acceperunt, qui pulmonum inflammatione laborant, Græcis πνευματικοὶ dicti. Horum vtraq; pars è regione quartæ thoracis vertebræ, linea per transversum nonnihil obliq; ducta, in duas alias subdividitur, superiorem scilicet, & inferiorem: interdum in tres, quas lobos fibrasve pulmonum appellant, & membraneis nexibus ita sibi adhærent, vt sectio hæc interdū vix compareat. Quod si duo duntaxat sint, superior lobe inferiore breuior est. Figurā habent vngulæ bubulæ, cum extrinsecus, qua parte thoracis cavitatē respiciunt, gibbi sint: intrinsecus, caui. Hippocrates tamen, libro de corporum dissectione, testudini animali, nec ineptè, comparauit. Magnitudo tanta est, vt in viuentibus, cum inspirant, vniuersam medijs ventris cavitatē repleant: at dum expirant, flaccidi concidunt: non ita tamen opere magno, vt in mortuis, cum semper aliquid aëris spiritusq; in se retineant in viuus, nec omnis vna regrediatur. Connectuntur superius ope asperæ arteriæ, collo, & dorso: antè, sternum: posterius, vertebris, idq; ope mediastini: infra, septo, quibusdam nexibus (notatu dignissimum) à membrana, qua tegitur pleura, qui si breuiores sint, jam diximus, dispnæam incurabilem insequi. Substantia ipsa est παρέρχυμα, & caro, (si adulti hominis sit) rosei coloris, mollis, spongiosa, admodumque levis, vnde in aquam proiecta supernatat. Contra fatus pulmo, rubicundior est, durior, & grauior, statimq; submergitur, ob sanguinem venosum, quo nutritur in vtero, deductum à caua ad arteriā venosam per anastomosin, vt monstrauiimus. Παρέρχυμα hoc membrana cingitur, à cōmuni vasorum pulmonem ingredientium tunica enata, quæ tenuis, mollis, & vehementer porosa est, vt mirum nulli videatur, si ex thoracis cavitare materiam per hanc in asperam arteriam rapi, exspuiq; postea videat. Vasa autem accepit omnis generis: Venas quidem, à vena arteriali, ex dextro cordis ventriculo prodeunte: Arterias vero, ab arteria venosa, è sinistro. Illa, nutrimentum; hæc, vitam affert; sed vtraq; in duos statim, ac primum pulmonem attigere, ramos diuiduntur, mox iterum in plures, donec tandem penitus in capillares furculos, propè externam superficiem, dissoluantur. De his, supra sub finem libri sexti egimus, cum Venarum Arteriarumq; historiæ colophonem imponeremus. Nervi quoq; exiguum à sexta coniugatione neruorum cerebri habet, qui tamen ad membranam duntaxat accedit, à quo & obrusus ille sensus, quem nactus est, ipsi nascitur.

Est & aliud vas, nulli alteri visceri, aut parti totius corporis, præter pulmones, commune, quod olim ab antiquissimis anatomia proceribus, ἀπμεία dicebatur, ab officio, & 3.

b, 9. fig. 1.
A. E. E.
& 9. fig. 2.
officio, & 3.

Linea dissecans.

Lobi.
pulmonū.

Figura.

Magnitudo.

Cōnexio.

Substantia.

Membrana.

Vasa.

officio, *ἡ δὲ πὺν δὲ ἐκ τῆς*, quod aërem in respiratione attrahat, cum reliquas arterias Aspera hodie sic vocatas, Venarum nomine complecterentur. At enim posteriores cum Galieno vocabulum *τεταχῆα* addiderunt, vocantes *asperam* hanc arteriam, ab inæquali sua substantia, ut à Venis pulsantibus distinguerent, quæ nunc Arteriæ simplici voce nuncupantur. Est autem *aspera arteria* ^c fistula oblonga, ex ^d cartilaginibus rotundis, ^e membranisque; inuicem connexis, efformata, semper patula, quæ ex humiliore faucium sede incipiens, gulæq; incumbens, in pulmones multiplici ramorum serie dispergitur. Diuiditur in duas partes, quarum ^f altera elatissima est, & *caput asperæ arteriæ* dicitur, Græcis *ἀσπυγξ*, *ἡ δὲ πὺν ἀσπυγξ*, quod gutture latius diducto vociferari significat. Nonnullis etiam improprie *φάρυγξ* vocatur, quemadmodum Aristoteles, secundo historiæ animalium 12. sæpe confundit, cum propria acceptione fauces denotet, siue partem ante laryngem sitam. 8. Altera pars, & inferior, *βρόγχος* vocatur, *ἡ δὲ βρόγχος*, quod Veteres potum ad pulmones per hanc ferri crederent. Latini *fistulam*, Barbari *cannam pulmonis* appellant. Lactantius, *spiritalē fistulam*.

Situs est LARYNX in collo, & quidem in ipsius medio, cum vnicus sit, figuram Larynx. penè terebrem referens, nisi quod antè acutè nonnihil extuberet; posterius autem, depressus subsidat. At enim cum organica pars sit, ex pluribus similaribus exstruitur, cartilaginibus inquam, musculis, membranis, vasis, & glandulis, de quibus ferè omnibus jam ante egimus, ut necessarium non sit, plura de larynge hoc loco verba facere. Nam *cartilaginum historiam* tertius liber complexus est: *musculorum*, quartus, in quibus & obiter, cum occasio sic tulerit, *de glottide*, ac *laryngis rimula* locuti sumus. Quod *vasa* *Vasa*. spectat, quæ sola reliqua fecimus. *Venas* à vena jugulari externa habet, & quidem ramo interiore, qui os subit. *Arterias*, similiter à carotidis maiore ramo, & profundo, fauces accedente. *Nervos* autem, à sexta cerebri coniugatione, *Recurrentes* dictos de quibus supra libro septimo pluribus egimus. *Glandularum* autem duo sunt paria, quæ laryngi *Glândula*. adiacent. Primum par Anatomici *Tonsillas*, Chirurgi *amygdalas*, Græci *παριδμια* & *ἀντιδιδες* appellant, quæ ad elatiorem ipsius sedem, & latera gargareonis, circa linguæ radicem, in ore collocantur vtrinque, cuius communi quoque membrana integuntur, ut cerebri humiditatem suscipiant, & in saliuam conuertant. *Alia dua*, ^{2.} ad laryngis humilem sedem sitæ sunt, thyroïdi, seu scutiformi cartilagini incumbentes. Hæ cum in fæminis plerisque omnibus ob temperamenti sui humiditatem ferè tumeant, sit, ut collum teres & æquale his reddant. At in maribus, præsertim, qui sicciores sunt, cum flaccescant, laryngis anteriorem extuberantiam monstrant, quam vulgus credulum, *Adamipomum* appellat, fabulans, protoplastæ nostro, cum exteritus omnipotentis Dei voce peccati sui pænitentia tangeretur, de pomo illo fatali nonnihil in faucibus adhæsisse.

FISTULA contra, partim ex membranibus, partim cartilaginibus constat. *Membrana* *Membrana*. enim duplex est, *vna exterior*, à pleura enata, eaq; tenuis, cartilaginum vinculis pertinacissimè connata; *altera interna*, à tunica palatum succingente profecta, densiore ac solidiore substantia constans, humore quodam vinctuoso perfusa, fibrisque rectis prædita. Donata hæc sensu est exquisitissimo, ut minimum quodque in arteriam asperam illabens, protinus persentiat, tussiq; eiiciat, ne obstructa alias fistula in præsentissimum vitæ discrimen

tæ discrimen animal coniceretur. Est autem *tussis* vehementissima quædam efflatio, quæ animalibus naturalibusq; instrumentis concurrentibus accidit, in qua plurimus aer celerrime ac concitatissime erumpit, vt id ex aspera arteria eiiciatur, quod ipsius interiorem tunicam lacessit. *Cartilagine* vero, inter vtramque hanc membranam consistunt, quarum quamplurimæ sunt, annuli figuram, non tamen integri, referentes, cum quarta parte, & quidem posteriore sui sede, deficient; quam tamen ipsam supplet membrana dura, quæ ibi succingitur, quantumuis rotunditatem illam circuli in planam superficiem extendat. Vocantur hæ cartilagine à figura sua *σπμοειδής*, Latinis, *signiformes*, cum C Græcorum, similiter rotundum quidem sit, at circulum tamen integrum haudquaquam absoluat. Fistula ergo hæc, cum statim sub cricoide, siue annulari laryngis cartilagine, initium ducat, recta descendit, angustior semper facta, & posteriore sui sede membrana quadam œsophago adhærens, donec sub iugulo prope quartæ thoracis vertebræ corpus, in duos diuidatur ramos, dextrum & sinistrum, quorum vterque suilateris pulmonem ingreditur. Ingressi autem, subito in duos alios subdividuntur, & hi rursus in alios, donec tandè in minimos surculos, ad externam vsque superficiem pulmonum dispersos, facessant. Vocantur hi rami, qui per ipsam substantiam excurrunt, pulmonis *σπίριχια*, quæ vox apud Latinos postea Medicos retenta fuit. Cæterum vt annulares cartilaginei trunci, quo fistula magis deorsum fertur, eo minores angustioresque fiunt; ita rami cum primum pulmones ingressi sunt, non amplius ex signiformibus annulis constant; sed ex integris, minoribus tamen, varias exprimentibus formas, rhombos, inquam, quadrata, & triangula, quæ propria membrana coherent, vt quibus in locis arteriæ venalis, & venæ arterialis propaginibus iunguntur, membranei sint, cæteris vero in locis, cartilaginei. Locantur enim inter vtriusque huius vasis propagines, ita vt asperæ arteriæ rami in medio sint, anteriore sede arteria, posteriore vena. Interdum tamen varius obseruatur situs, & asperæ arteriæ rami cæteris vasis incumbunt, aut subiacent,

ACTIO.
Respiratio.

Causa re-
spiratio-
nis.

ACTIO *pulmonum est respiratio*, cum nullum animal sit pulmonis experts, quod respiret. Est autem *Respiratio*, *tractio emissioque aeris per asperam arteriam, vt fons & principium caloris refrigeretur*. Primaria ergo pars in pulmone asperæ arteriæ fistula est, Veteribus cisterna aeris propterea nuncupata: ipsa autem respiratio duabus conficitur partibus, inspiratione, & expiratione. Inspiramus aerem, dum dilatur pulmo, & cum ipso arteria: expiramus, dum concidit rursus, & aerem pellit. Dilatatio hæc, & contractio pulmonum, vnde fiat, in dubium à multis reuocatum est: ego tamen ab eorum semper fui partibus, qui non per se, sed motu thoracis has fieri credidere, cum satis ex viua sectione nobis pateat, dilatato diaphragmate protinus thoracem, & cū hoc pulmones, extendi. Sequitur enim fugam vacui pulmo, qua nihil in natura est ad trahendum fortius: at, ne præsentī vitæ periculo, in thoracis vulnere hæsitaret Homo, propterea fibris quoq; Natura benignissima pleuræ quasi alligauit, vt nihilominus, quamquam remissius, si forte thorax læsus sit, trahatur. Ex his intelligitur, motum pulmonū esse, interdū naturalem tantum, interdū ex naturali animaliq; compositū, quemadmodū thoracis motus, à quo pendet, duplex est, vt supra lib. 4. c. 8. ostendimus. *Naturalis* est simpliciter, cū libera est respiratio, & à solo diaphragmate thorax mouetur: cōposita est, cum

cum violenta, & thoracis muscoli intercostales concurrūt. Reliquos enim, quos ceteri Anatomici addunt, ad respirationem nihil facere, satis laudato loco probatum fuit. Neque est, quod quis obiiciat diaphragmatis motum naturalem dici non posse, quod ipsum musculus sit, cum sciamus sic vocari non tantum ipsum, qui sit fibris, sed & qui musculis, si naturali modo fiat, hoc est, præter nostræ voluntatis arbitrium. Comprimatur ergo pulmo compresso thorace, eodemque distento dilatatur, & non secus ac fabrorum folles, ne inane spatium maneat, aere impletur. Inprimis tamen aspera arteria, cuius cartilaginee à se mutuo nonnihil recedunt: membranæ autem, quæ illas iungunt, in latitudinem expanduntur.

V s v s *respirationis* est, tueri, attracto aere, calidum, quod in suo fonte est, hoc est, in corde. Cum autem calidum pluribus modis seruari possit, *primum* pabulo & materia, in quam agit; *deinde*, ventilatione à frigido: *tandem*, excrementorum fumosorum euacuatione, non secus ac videmus externum nostrum ignem tribus his modis apud nos conseruari (absque his enim si foret, in locum naturalem, qui supra est, protinus auolaret) *pabulo* quidem, per alimentum, cibum potumq; seruatur; *fuliginosorum excrementorum euacuatione*, per arterias, ad quas deferuntur, & per poros exhalant reliquæ; *ventilatione à frigido*, per aerem externum conseruatur. Non enim credendum est, aeris substantia, transformata in spiritus vitales, tanquam pabulo, calidum nostrum refici, cum videamus inspirato plurimo aere, si cohibeatur, suffocari tamen animal: quod certe propterea fit, quia aeris substantiæ suscipiendæ gratia respiratio non sit instituta. Quin videmus plura quoque esse sanguinea animalia, vt pisces, quæ vitali spiritu prædita, aerem ramen non attrahunt. Accedit, quod à Naturæ prouidentia admodum foret alienum, si, cum reliquas partes omnes ab aere tam sollerter & studiose defenderit, ipsum caloris fontem cor, tam remere eidem obiecisset. Sic enim protinus omnia ab aere lædi cernimus, vt quamprimum aliqua pars interior ipsi exposita sit, actiones omnes naturales, quæ ipsi famulantur, læsæ deprehendantur. Attrahit ergo aerem externum pulmo, vt qualitate sua frigida fruatur, quod nobis satis manifestum sit in calidioribus locis, vbi violenter respiramus, quod cor, quantumuis pulmones plurimum hauriant aeris, nihil adiumenti percipiat, cum non refrigeretur. Quia tamen nulla in re vnquam prodiga Natura est, sed vt Oeconomus sollers studiose omnia in usum reuocare contendit, ne quid pereat, quod quocunque modo animali poterat esse adiumenti, vt inspirationem aeris ad vitæ tutelam traduxit, ita expiratione ad melioris vitæ usum abusa est. Adhibet enim ad vocem, qua affectuum suorum promit reconditas vires, alterique significat. Ac vt *fistula* quidem asperæ arteriæ præcipuum erat instrumentum refectionis calidi innati, quod in corde est: ita *caput* eiusdem primum organum vocis.

Sed iam videamus, quomodo his actionibus satisfaciatur Pulmo. Primum *in thorace situs est*, vt & orilarynge esset vicinus, à quo haurit aerem, & reddit: & deinde cordi suo corpore, cui in inspiratione seruit: tum linguæ, quæ vocem postea in articulatam sermonem discriminat. *Diuisus autem in duas partes*; vt in medio cor tegeretur, & vt à se diductæ hæ partes violentius aerem attraherent. *Linea autem subdividuntur*, ob flexuram thoracis, cui sic sequaces redduntur. *Figura* peculiaris nulla est, sed talis, quæ

loco accommodata erat, vnde *foris gibba, intus concava*, quod dorsum cauum erat, cor conuexum. *Substantia constat spongiosa ac molli*, vt essent quam leuissimi, vnde dum fœtus adhuc vteri ergastulo concluditur, nec respirationis munere indiget, duriores sunt ac crassiores. Cæterum vt nutriatur & viuatur, non nihilque sentiat, *omnis generis vasa accipit, & venam quidem, non à porta vena*, quia hæc nutrit tantum eas partes, quæ sanguine admodum crasso indigebant, vt viscera nutritioni dicata: *neque à cava*, quia & ille crassior erat, quam leuitas substantiæ pulmonum admittebat: *sed à dextro cordis ventriculo*, in quo sanguis fit, medius inter arteriosum & venosum, adeoque nec nimis tenuis, nec crassus, sicque sanguine nutritur, quali non alia pars corporis, quemadmodum & ipsum quoque parenchyma ab aliis variat. *Arteriam autem à sinistro ventriculo*. Est & alia causa maximi momenti, quamobrem à corde hæc vasa immediate deducta sint, nempe vt ex dextro ventriculo ad sinistrum feratur sanguis, è vena arteriali in arteriam venosam effusus, sicque spirituosus ac nobilis ille sanguis, qui per arterias deducitur, generetur. In ipso autem itinere, ne qua occasio benefaciendi animali Naturæ temere præterlabatur, refrigerat hunc, vt effusus in sinistru sinum, calidum, quod in corde efferuescit, temperetur: non secus ac nos ad ignem nostrum externum sæpe vno oculi ictu ebullientem cohibemus aquam, pauca frigida affusa. Atque hæc est illa refrigeratio calidi, cuius gratia respiratio instituta est, pulmoneſque, & totus thorax fabricatus. Attractus enim per arteriam asperam frigidus aer, bronchia primum refrigerat, hæc, quia medium tenent locum, vtrimq; adiacentia vasa, vnde & sanguis protinus vicinitate frigidum concipit: effusus autem ad cor, necessario efferuescentem calorem cohibet. Hæc causa est, cur vbi iunguntur inuicem, membranea sint bronchia, vt scilicet frigus promptius penetret. *Arteria autem aspera non tota ex cartilagine constat*, quia dilatari haud potuisset: *neque ex membrana*, quia facile concidisset: vt ergo neutrum deficeret, cartilaginibus membranas intertexuit, non secus ac costas musculis intercostalibus in structura thoracis. *Larynx autem ex rima constat*, vt sonum ederet aer, per angustum spatium traiciens; cæterum hunc vt variis modis, & pro suo quisque libitu formaret, cartilagineſ circumiecit. quibus præfecit musculos, qui pro nostro arbitrio, modo claudunt, aut aperiunt; modo dilatant, aut constringunt, sicque amplum angustumve reddunt. At enim ne exsiccentur nimium hæc instrumenta, cum vox à sicco corpore ingrata fiat, (quemadmodum fistulæ arte paratæ id edocent) glandulas adiecit, à quibus perpetuo moderate irrigaretur.

FINIS LIBRI NONI.

ADRIA-

Quomodo
calidum
cordis re-
frigere-
tur.



ADRIANI SPIGELII

BRUXELLENSIS,


DE HUMANI CORPORIS FABRICA,

Liber Decimus.

Qui supremi ventris historiam continet.

CAPVT PRIMVM

De capillis, & quatuor communibus summi ventris integumentis.



EX tribus Ventribus supremus restat, quem CAPVT vocamus, Cerebri, & facultatis animalis, adeoque sensus motusq; domicilium. Hunc in summo corporis loco magnus nostri corporis Architectus collocatum voluit, quod sensuum organa contineat, quorum pleraque in sublimiore sede felicius suum munus exsequuntur. Oculi enim in alto siti, tanquam ex specula quadam, quæ distant, intuentur & prospiciunt: Aures, vocem in sublime euolantem hauriunt: nec minus odores, quorum vis ignea summa quævis petit à Naribus opportunius in alto positis excipiuntur. Sed enim cum hic locus minus tutus sit, cui vndiq; scilicet variorum discriminum vis plura intentat mala, & *substantiam* ei dedit, quæ resistere quibuslibet iniuriis commode valeret: & *figuram*, quæ declinare haud difficulter posset. Non enim carneum fecit, ut imum ventrem: neq; carnes iunxit ossibus, ut in medio: sed totum ex vno, quamquam non continuo, osse extruxit, cui formam adaptauit sphaeræ in modum rotundam, nonnihil tamen ad latera, potissimum priore parte compressam.

De hoc ut verba nunc faciamus, primum singulas ipsius partes enumerabimus: deinde singulorum succinctam historiam persequemur. Ceterum omitemus, quæ exte-
riores sunt, cum earum appellationes jam superius abunde complexi sumus: de iis tan-
tum

CAPVT.

Situ.

Substan-
tia.

Ordinis
ratio.

- tum agemus, quæ internarum rationem obseruant, suntq; , vt in reliquis duobus ven-
 tribus, vel *continentes*, vel *contenta*. *Continentes* vocantur, quarum complexu aliæ coërcē-
 tur, suntq; decem, partim communes, vt capilli, & quatuor integumenta cōmunia di-
 cta: partim propriæ, vt pericranium, muscoli, & ossa caluariæ, quæ externæ sunt: duæ
 membranæ, Meninges dictæ, Cerebrum ambientes, quæ omnes in caluariæ interna se-
 de continentur. *Contenta* primum duæ sunt, Cerebrum & Cerebellum, quibustamen
 non inepte Spinalis medullæ principium, quod adhuc caluariæ terminis continetur,
 adiunxeris. Plures deinde aliæ, quæ quinque sensuum sunt instrumenta, quanquam ta-
 ctus sensorium non in capite solum coërceatur: sed per vniuersum corpus diffusum, la-
 tissimè pateat. Ex his quarundam historia, jam ante enarrata est, & quatuor quidem
 communium libro septimo, vt hic nihil super sit aliud, quam discrimen, quod occurrit
 ratione aliorum vntium: propriarum, puta musculorum, & cranij, partim in quarto,
 partim in secundo libro abunde satis enodata.
- CAPILLI.** CAPILLI primum in conspectum se offerunt, ^a totam posteriorem capitis partē, ^{a, 1.2.}
 quæ capillata propterea dicitur, contegentes. Horum *substantia* densa est, solida, ac
 dura, secundum longitudinem fissilis; at in latitudine flexibilis. Habent hi pili *tres par-*
tes, summam vnam, quæ interdum finditur: *mediam alteram*, quæ flecti potest; *tertiam* tan-
 dem, imam, alba quadam & mucosa substantia obsitam, quam *pilorum radicem* appel-
 lant, & cuius beneficio cuti pilus inhæret. *Situs* omnibus communis est, in postica ca-
 pitis parte: at ductus tamen diuersus, cum ^b syncipitis capilli, versus frontem; ^c occipi- ^{b, 2.}
 tis, ad dorsum; ^d qui circa tempora sunt, versus aures vertantur; quorum ductuū cen- ^{c, c.}
 trum, idemq; causa, in summa mediaq; caluariæ sede locus ille est, qui Aristoteli *κορυφή*, ^{d, b.b.}
~~καὶ τὸ κούρειν~~, quasi *κρυφή*, quod crinibus densioribus, ac reliquæ capitis partes, regi vi-
 deatur. Latinis autem proprietatem rei apta voce exprimentibus, ^e *Vertex*, q; circa eum ^{e, d.}
 capilli vertantur, vocatur. Hic ergo communis terminus est quatuor caluariæ partiū,
 syncipitis inquam, quæ se vsque ad frontem versus priora extendit: occipitis, quæ ad
 dorsum inclinatur; & temporum, quæ latera respiciunt. *Figuram* habent, non, vti creditur
 vulgo, teretem: sed, quod nuper inuenti instrumenti optici beneficio, quod res, quan-
 tumuis minutissimas, euidenti magnitudine oculis offert, obseruare licuit, quadrang-
 ulam, in morem stipitum caulium ve quarundam plantarum. In nonnullis recti sunt,
 in alijs intorquentur, & crispi fiunt. Cæterum in humano corpore *longissimi* sunt in
 corpore, qui nascuntur, non quidem, vt alijs placuisse video, ex fuliginosis cerebri ex-
 crementis: sed ex sanguine potius, attracto per radicem pili in reliquum truncum. Pro-
 bari hoc ex ijs potest, quæ analogia quadam pilis correspondent in alijs animalibus,
 qualia sunt, in aquatilibus quidem genere (quam quæ per radices suas alimentum at-
 trahunt: in volatilibus autem penne, in quibus, si quam extrahas junioribus, manifestè
 sanguinem aduertas, qui pennas componat, idemq; alat. Eodem ergo modo & in pi-
 losis animantibus, ex sanguine, à pilorum radice attracto, & in propriam substantiam
 elaborato, pilos generari, mihi omnino persuasum habeo, quod vna eademq; in ana-
 logis vbiq; ratio à sapientissimo rerum Opifice accuratè obseruata fuerit. Quæ causa
 certe est, vt consumpto cerebro, quemadmodum Hippocrates 6. epidemior. loquitur,
 caluities sequatur, exhausta sanguinis debita copia, eius scilicet, à quo pili proueniūt
 & quo

& quo cerebrum partesq; circumstantes nutriuntur. Quod si calidum sit moderate, vt ferax esse solet humorum hæc temperies, sanguinem suppeditabit, vnde læta ipsorum seges luxuriabit: contra, si frigidum sit, & materia deficiet, & egressus quoq; intercipietur. Iam si siccum sit, quis dubitet raros futuros, & quam subito defluuiio perituros? contra, si humidum sit, denfos, frequentes, & in extremum vsq; senium perduratos.

Differunt tamen capilli in homine, penes ætatem, sexum, regionem, temperamentum, *Differen-
tia.* & habitum corporis. Ac quoad magnitudinem, breuissimi rarissimique sunt infantibus, *A magni-
tudine.* prolixi mulieribus, breuiore viris. Breues sunt Æthiopibus, longiores Scythis, alijsq; Septentrionem colentibus populis. Qui humidiores sunt cerebro, longiores produ- *A figura.* cunt: qui sicciores, breuiore. Quoad figuram, pueris nuper natis molliore, ac simplici- *A colore.* res sunt, rectique fæminis, & qui frigidas humidasque plagas incolunt, vt Europæi, aut temperamentum simile sunt indepti, rectos alunt: calidi contra, vel in calidis re- *A copio.* gionibus degentes, crispas, quemadmodum Æthiopes. Quoad colorem, humoris præ- dominantis color in capillis vbique cernitur, cum qualem humorem caro attraxerit, talem colorem pilus induat, ex Hippocrate, lib. de natur. puer. Pueri albos capillos ple- runque, aut modice flauos habent; iuuenibus ad nigredinem vergunt: senibus & decrepitis, cani fiunt. Viri, & qui calidam siccamque regionem inhabitant, aut tempera- mentum huiusmodi natura obtinere, nigris capillis teguntur. Nonnullis sunt pau- *A copio.* ciores, vt infantibus: alijs pauci, vt senibus, quibus decidunt, quod malum Caluities vocatur, oriturq; in syncipite potius, quam alibi. Caluescunt autem celerius, quibus pili molles sunt, parui, tenues, & qui calida cerebri temperie laborant, cum à bilis acrimonia pilorum radices his prompte erodantur.

Vltus capillorum *primarius* est, vt cutem: *secundarius*, vt cerebrum defendant ab in- *V s v s.* iurijs, vel foris, vel intus subeuntibus. *Foris* quidem *incidunt*, aër, pluuia, grandines: at *intrinsecus* vapores ex inferioribus partibus exhalantes, negotium facessunt. *Aer* plu- ribus nocere potest modis: *frigiditate*, cutis poros constipando, vnde vaporum egres- sus inhibetur: *caliditate*, vnde spiritus dissipantur, cerebrumque velut excoquitur: *hu- miditate*, partes internas laxando: *siccitate*, omnia adstringendo, & innatam humidi- tatem absumendo. His omnibus capilli caput contegendo quam aptissime subue- niunt. *Pluuia* madefaciunt, *grandines* concutunt: illas capillorum densitas; has, ductus ar- cet. Densitas enim pluuias non admittit facile: at ductus, quod incidit grandinis statim deducit. Similiter autem & internorum vim hebetant. Vaporibus enim ab infernis partibus eleuatis, & summa capitis petentibus, exitum largiuntur, viamque liberam atque apertam concedunt.

A, 10. l. l. *DE* *a* CVTICVLA & *b* CVTE, nihil est noui, quod afferam, differens à reliqua, *CVTICV-* nisi quod illa tenuior sit in capite: hæc crassior. Non tamen per se, sed capillorum il- *LA.* lam constipantium gratia, quæ tenuitas his defluentibus in caluitie vel tactu perci- pitur. Eadem de causa & durior est alia cute, vt Fallopius monet, & frigidior, inde- que & siccis gaudet medicamentis, & calidioribus, ne calor eius exsoluatur. Aristote- les Philosophorum coryphæus, 3. histor. cap. 11. sensu cutim per se carere inquit, maxi- meque in capite id contingere. Rationem mox subiicit, quod inter cutim & os, mini- me omnium caro sit interposita. Sed falsus videtur fuisse, cum liquido pateat, sensu re-

vera esse præditam, at obruso. Nec causa eius rei hæc est, quod substrata carne careat, ut censuit Philosophus: (nam & tibiæ priori parti cutis excarnis obducitur, nihilominus acuto sensu donata est,) sed quia tum pauci nervi ad eam pertingunt: tum quia partim ex sensibili, partim sensu destituta substantia constat. Sensum enim habet cutis: at carent eo, pilorum radices. *Venas* quoque obtinuit, & *Arterias*, illæ, à iugulari externa; hæ, ab arteriæ carotidis exteriore ramo propagantur.

Vasa.

PINGVEDO.

^c PINGVEDO circa occipitium observatur copiosior, in obesis; pauca, aut nulla ^e, F.F.F. etiam in macilentis. In fronte quoque pauca est, est tamen quædam, & præcipue in iis, qui obesi sunt: imo omnibus quibus glabra obtrigit, nec rugis intricata, ut adolescentibus, pinguedo cuti subest, cum rugæ ob carnosam membranam fiant, quando pinguedine nulla interiecta, immediate cuti subternitur, unde & macilentis frequentiores sunt, maiorefque.

MEMBRANA CARNO-
SA.

^d MEMBRANA CARNOsa circa frontem, nisi in obesis, vicinissime adhæret, ^d, D.D.D. crassiorque est, & ^e musculos illos constituit, qui vulgo fronti, à nobis autem superci- ^e, E.E.E. liistribuantur.

CAPVT II.

De Pericranio.

Etymologia.

Substantia

Numerus

Crassities.
Sensus.

Cōnexio.

^a S V B a membrana carnosâ subito, ac nullo intercedente corpore, alia quædam ^b a, 10. 1. 1. membrana inuenitur, quam Græci à situ *περικρανιον*, subintellige *κρανα*, & communiter quoque *περικρανιον* in neutro genere appellant, *σφατὸν* *περικρανιον* *πινεα*, quod circa cranium, siue calvariam tendatur. Membrana est tenuis, & alba, capitis ossa inuestiens, non tamen omnia, sed frontis tantum, duo syncipitis, & occipitij. *Frontis* quidem *os*, ad oculorum usque orbitas: *syncipitis*, ad squamiformes conglutinationes: *occipitij*, ad primâ usque; vertebam. Temporū enim ossa nuda sunt, ^c cum ad ea appellens, musculos ^c, M.M.M. eam sedem occupantes, (sunt autem attollens inferiorem maxillam) ascendat, & externa obtegit, non tamen ad insertionem pertingat: sed circa iugalis ossis regionē terminatur. Hanc nonnulli duplicem faciunt, aliam dicentes esse, quæ membranæ carnosæ, aliam quæ cranio nequitur: illam vero ^d pericranium dici, hanc ^e periostrium. Attendi enim omnibus ossibus membranâ foris, quæ ab externis protegat, & tueatur. Mihi tamen *simplex tantum* semper visa est, et si in ipsâ dissectione geminam mentiatur naturâ, id ipsi cum cæteris omnibus membranis, quæ quantulamcunq; crassitiem nactæ sunt, commune obtinuisse. *Crassior* autem hæc est pluribus aliis, quæ in nostro corpore reperiuntur: sic tamen, ut circa futuras seipsam quoque crassitie vincat. *Sensum* habet acutissimum, ob primi secundique nervorum cervicis coniugia, quæ per o cipitium sparguntur: tum ^f propaginem tertij paris cerebri, quæ foramina ossium frontis egrediens, ^f, n. 1. 2. 3. ad cutem eidem oblatam proficiscitur. Huius gratia prudenter Chirurgi admonent, pericranium pungendum haudquaquâ esse: & in vulneribus capitis studiose, dum terebris cranium perforamus, præcauendum, ne alicubi lædatur, sed si à subiecto osse remouendum sit, incisione cuspide acuti, vnguibusque separetur. *Conneditur* enim cum crassa cerebri membrana fibris quibusdâ nerveis ad cranij interiora se penetrantibus,
valideque

a, 10. 1. 1.
D.D.D.
b, G.

c, M.M.M.

d, Ostenditur ex horum opinione litera G. & a.
e, H. & b.

valideq; sic hanc membranam, & cum hac cerebrum suspendentes, ne in inordinatis corporis motibus, nunc huc, nunc illuc propulsum, alicubi cum præsentis vitæ discrimine allidatur. Quamvis autem non ignorem aliis dissectionum Professoribus quasi omnibus contra fuisse visum, atq; ego statuo, cum credant emergere potius ex intimioribus calvariæ adytis, à crassa meninge, quæ pericranio originē communicat: quo minus tamen cum ipsis faciam, diligentior pericranij in recenter natis infantibus inspectio mihi persualit. Docuit enim me & hanc & istud circa ossium syncipitis commissuram anteriore sede committi quidem inter se valide: at ætate paulo post crescente, discedere inuicem, nec nisi nexibus fibrosis coniungi. Quidquid tamen sit, siue oriri à crassa membrana statuamus, siue neci tantum, aduersione dignissimum est, maximum utriusque inter se consensum esse, & vel leuem quæcunque huius inflammationunculam, cerebro protinus communem fieri. Et hæc causa quoque vna est ex præcipuis, cur vulnera & confusiones musculorum temporalium lethales habeantur. Nam ut relinquam iam Venarum & Arteriarum (sat insignium) copiam, à quibus sanguinis enorme impendet profluvium: ut tendinem validum, ac si quis alius, egregie validum, ac robustum: acutus pericranij hunc inuestientis sensum exacerbatu dolore, quam insigni vi ex vicinis partibus ad inflammationem sanguinem allicit, unde pericranium consequutione quadam conterminarum partium facta, tandem eandem duræ membranæ, & quod hac integritur, cerebro impertit.

Consensus inter pericranium & duram membranam.

CAPUT III.

De duabus cerebrum obcingentibus membranis.

EX continentibus capitis partibus duæ adhuc supersunt, quarum historia enarranda, membranæ inquam, in ipsa cranij cavitae interiore sitæ. Vocantur hæc à Galeno *μῶνιες*, velut propria quadam appellatione, nullique alteri membranæ communi: Hippocrates tamen libro de carnibus sic late accepit, ut & venis, & ventriculo, tum intestinis, aliisque partibus voluerit tributam esse. A barbaris, qui Arabum scholas sequuntur, *Matres* vocantur, vel quia ab his reliquæ corporis membranæ ortum suum deriuant, quæ sententia multis visa est: vel, quia materna quadam cura cerebri incolu-
Synonymia.
Substantia.
Figura.
Magnitudo.
Numerus.
Appellatio.
 mitati prospiciant, quod continent, integrumq; præstant. Sunt enim ut aliæ membranæ, ex fibris cuiusvis generis, tū propria substantia contextæ: *figura* ac *magnitudine* Cerebro, quod ambiunt ac circumamplectuntur respondentes. Cum autem duæ sint *numero*, exterior cranio subiecta, nonnihil maior est; interior, & cerebro contermina, minor angustiorque. Distat illa & à cranio, & suo coniuge: ab utroque quantum requirit interuallum distensio contractiove sinuum, quos vehit, arteriarum ritu pulsantium. Illud in capitis vulneribus, in quibus internæ partes detectæ sunt, comparebit: hoc, Galeni documento facili opera conspicies, pertusa exteriori membrana levi foramine & insufflato calamo fistulave aere. Utriusque historiam nunc subnectemus, vbi prius monuerimus, à substantia sua utramque nomen sortitam, & exteriorem quidem à Galeno passim *σκληρὴν* & *παχύν*, duram, crassamque: ab Hippocrate *παχυτέραν*, vocabulo relationem quandam ad comparem exprimente dictam: internam *λεπλήν*, siue tenuem. *Barbari* duram *piam*que matrem appellant.

**Crassa mem-
brana.** ^a CRASSA ergo membrana crassiorem habet ac duriorē substantiam, non tantum si cum sua coniuge conferas: sed & reliquis vniuersi corporis membranis, quæ causâ fortasse est, cur ab hac principium cæterarum pleriq; omnes Anatomici petierint. Im-
Situs. mediate ^b *cranio substrata est*, cui validissime cum omnibus in locis, tum præsertim cir-
Cõnexio. ca futuras cohæret, per quas, vt dixi, ^c fibras quasdam ad exteriores cranii sedes edu-
cit, vt validissime alligetur. Sed & circa basin eiusdem vbiuis, imprimis vbi processus
acutos^d exigit os cuneiforme: tũ foraminibus cranium ipsum pertusum est, quorũ or-
bibus firma cõnexionē iungitur, si discedas à duobus tantũ ossis cuneiformis sinibus,
circa quos glândula pituitaria sita est. ^e Nec tuitur & tenui mēbranæ, & huius interuen-
**Superfi-
cies.** tu cerebro, beneficio vasorum, quæ huic, & illi largitur. ^e *Superficies externa, vel supe-
rior*, quæ cranium respicit, ^f inæqualis est, & asperitate quadam donata, ob fibras, qui-
bus se conterminis partibus adstringit: *interna, vel inferior*, æqualis, splendida, & humi-
**Forami-
na.** dior. *Foraminibus* pertusa est plurimis, sparsim seminatis, ad vasorum: sed in medio ma-
iusculo, ad infundibuli transitum: maximum omnium obtinuit, qua sede spinalis me-
dulla dorſi vertebrarum seriem ingreditur: quemadmodum & cribri instar perforata
cernitur, vbi os spongiosum obtendit. Membrana hæc duobus in locis reflexa se redup-
Processus. licat, sicque *processus duos* exigit, quorum alter in elatiore capitis parte, alter in po-
steriore considerat: ille, superior; hic, posticus non immerito nominatur. Subiicitur ^g *su-
perior*, quæ quasi deducit, ^h sinui tertio, de quo paulo post dicemus, sed cum per mediũ
cerebri ad anteriora excurrat, bifariam id ipsum in ⁱ dextram ^l sinistramq; partē secat.
Redditur autem in itinere angustior, & quo longius à principio suo profectus est, in ^m
apicem tenuiorem definit, qui tandem in ⁿ processum superiore ossis spongiosi, quæ
Cristam Galli vulgo vocari supra monuimus, alligatur. Hic quia apte satis falcē me-
soria exprimit, à Dissectoribus *Falx* vocatur. *Posterior* ergo sedes, quæ portioni duræ
membranæ cerebellum obuelanti contigua est, *falcis basi*: at prior, quæ Cristæ adnascitur,
mucroni respondet. *Superna & convexa pars, dorsum*; inferna, & caua, *aciem* mentitur. A po-
steriore autem sede in priora latus, sensim falcis in morem stringitur, & angustatur.
**Hemi-
crania
causa.** ^o *Posterior* breuior, at crassior, ^p cerebellum potissimum à ^q cerebro diuidit. Ad supe-
riorem processum nonnulli referunt, quod hemicrania nonnunquam caput tentet,
cohibita scilicet vi dolorificæ causæ ab hoc intersepimento, quo minus vtrumque la-
tus occupet. At falluntur hi grauiter, cum hemicranie non internas subeant capitis
partes: sed foris, temporales musculos obſideant, humeribus biliosis irruentibus.
**Sinus cras-
sæ mem-
branæ.** In his duobus processibus quatuor quasi tubuli, siue canales deducuntur, non vt
reliqua cerebri, aliarumque partium vasa adamussim rotunda, sed latiora nonnihil,
**Primus
& secun-
dus.** quos *Sinus* appellant. ^r Primi duo, siue dexter & sinister, à situ lateris in quo consistunt,
sic appellati, ad latus foraminis primi ossis occipiti, oriuntur, & per posteriora ascen-
dentes oblique, ad se versi, circa cerebelli apicem ^t coeunt, atque angulum efficiunt,
quæ nonnulli reſectionũ studiosi Herophili ^{λινδον}, siue *Torcular* fuisse arbitrantur. ^u In
hos sub principium inseruntur Venæ iugularis internæ maior, & Arteriæ carotidis mi-
nor ramus, per ^v secundũ ac terciũ occipiti foramina, primo accumbentia, cranii am-
plitudinem subeuntes. Circa finē autē duos alios ex concursu suo educunt, quorũ ^x al-
Tertius. ter sursum vadit, y alter deorsum labitur. Ille tertius dicitur, hic quartus. ^z *Tertius* lon-
gissimus

a, 10.1.

2. B. B. B.

b, A. A.

c, g. g. g.

& H. H.

d, 10.2.1.

D. D.

e, 10.1.2.

B. B.

f, g. g.

g, 10.2.2.

& G. G.

vide &

6.1. T. T.

in qua

rotus cõ-

spiciuus

est.

h, L. L.

i, E. E.

l, E. F.

m, L.

n, 10.7.

1 D.

o, 10.6.

1. K. K.

p, 1.1.

q, B. B.

r, 10.6.1.

Q & P.

itemque

10.11.1.

M. O.

s, 10.6.1.

t, 10.11.1.

L.

u, 2.5.1. Z.

Z.

x, 10.6.1.

R. R. R.

y, Q. Q.

z, R. R. R.

a, T. T. T gissimus omnium, totam ^asuperiorem sedem elatioris huius membranæ processus per-
b, 10. 2. 1. repat, & cum eadem circa cristam finit. ^bAb hoc sinu plures deinde propagines varia-
D. D. D. tim sparguntur, *partim sursum*, ad cranij medullium, quod ipsius laminis intercluditur,
 tum pericranium membranam contententes: *partim deorsum*, ad processum superiore
 elabentes: *partim versus latera*, tum in crassâ membranæ, tum tenuis sedes propagatæ.
Quartus autem *sinus* è diuerso breuissimus, inter cerebrum & cerebellum ad nates glan- **Quartus.**
 dulamque pinealem recta fertur, in itinere furculos spargens, *à superiore quidem parte, v-* **Surculus.**
num, qui ad callosi corporis sedem sublimiorem vadit; *ab inferiore alium*, qui ad ventri-
 culos secedit: ipse autem *truncus*, iuxta testes varie diuisus, glandulam pinealem petit, &
 bifariam scissus, ventriculos anteriores subintrat, vtrique rorum dispensans. **Truncus.**

c, 10. 1. 2. Sunt & alia vasa, partim ^cà iugulari vena interna, eiusque ramo anteriore minore- **Vasa.**
C. D. E. que, per crassâ membranæ latera propagata, cuius vestigia in syncipitis ossibus impres-
 sa egregie conspici, supra iam dictum est, quo nomine & diligenter in cranii perfora-
 tione Chirurgis aduertendum est, ne hic terebram nimis immergant, sed caute vena-
 rum sedes euitare discant. Est & ab arteriâ carotidis maiore ramo soboles: tum exiles
 quædam per anteriorem sedem distributæ.

d, 10. 2. 1. ^d **T E N V I S** *membrana*, *κεφάληνιγξ*, ^e crassâ nullo intercedente corpore subiecta, **Tenuis**
E. E. E. immediate cerebrum contingit tegitque, tenuior illa, vt appellatio ipsa fert, mollior, **membra-**
e, A. A. A. & sensus exquisitioris. ^f Infinitas autem vasorum propagines à ^g crassâ deriuatas in se **na.**
f, D. D. D. suscipit, iterumque cerebrum dispensat: quæ vt tutius progrediantur, & citra ruptionis
g, C. C. C. periculum substantiam cerebri peruadant, vsquequaq; variis anfractibus hoc nomi-
 ne cerebro incisis se insinuat, & ad intimiores partes transmittit. Ex quo clarum **An cere-**
 est, grauius nonnullos hallucinari, qui Cerebrum inflammatione posse corripitur, **brum in-**
 gant, quod & Galenus olim agnouit, scripsitque, & experientia ipsa sæpenumero eui- **flamme-**
 denter ostendit. Ad aphorismum enim quinquagesimum vltimæ sectionis, in quo **tur.**
 Hippocrates, eos quibus cerebrum syderatum est, tridui interuallo obire docet, gra-
 uem potius inflammationem, quam natiui caloris extinctionem (quam alias Sphace-
 lus significat) intelligendam esse testatur. Rationem addit, quod ab hoc nulla salutis
 spes super sit, quam Hippocrates tamē promittit si hoc superauerint. *ὁκόσσι αὐτὸ σφακελιδῆ
 ὁ ἐγκέφαλος, ἐν περὶ τῶν ἡμερῶν ἀπώλει. ἢν δὲ ταύτας διαφύξουσιν, ὕγιες γίνονται.* Iam & nos ipsi
 per foramina cranii, quæ terebris fiunt in capitis vulneribus, cerebrum cum dura
 membrana ita sublatum esse, vt extra caluariam promineret, sæpe vidimus: sedata mox
 inflammatione in suum locum rediisse. Quin & in apertis cadaueribus abscessus in ip-
 sa Cerebri substantia repertos, multorum grauissimorum authorum testimonio
 comprobatur.

CAP V T I V.

Cerebri, quatenus id in Veteri sectione se offert, historiam nectit.

CONTINENTES supremi ventris partes vidimus, reliquum nunc est, vt & con-
 tentas inspiciamus. Continetur in cranio *Cerebrum*, Græcis *ἐγκέφαλος* dictum, à **Cerebrū.**
 situ suo, *ὅτι ἐν τῇ κεφαλῇ ἵσταται*, quod in capite locatum. Veteribus Philosophis, quibus **Etymolo-**
 gis.

medulla esse credebatur, cum adiectione *μενός ἐγκεφαλίτις*, *medulla capite contenta*, ad differentiam *τῆ ραχίτιδος*, eius quæ dorso comprehenditur, & spinalis medulla hodieque nuncupatur. Reuera autem Cerebri substantia à medullari ossium plurimis in rebus distat, & id multis paralangis, siue temperamentum intuearis, siue vsum consideres. Calida enim hæc est, & ossium humectationi dicata: illa frigida, sensui motuique destinata. *Substantiam* ergo habet sui generis peculiarem ac propriam, & nulli alteri parti, nisi spinali medullæ, quæ quasi oblongatum cerebrum est, communem. Hanc etsi haud accuratè definire nobis liceat, quod mens nostra ad formarum inspectionem hebescat: nonnullis tamen accidentibus circumscribere conueniet, si dicamus crassam esse, viscidam, glutinosam, albam, ac mollem. *Magnitudo* autem tanta, vt homo in respectu sui corporis ex omnibus animalibus maximam cerebri copiam sit nactus, teste Aristotele i. histor. anim. & mares plus, quam fæminæ, in qua re tamen haud subscribo. Id vero notandum est, quod tradit se obseruasse Fallopius in profundis capitis vulneribus, in plenilunio turgere cerebrum, subsidere decrecente Luna. Ex quo facile rationem licebit multorum petere, sed imprimis cur in lunæ obitu grauiora eueniant incommoda, ex ictu capitis, quod tunc temporis ob interuallum cranio duræque membranæ interiectum promptius venæ quæuis abrumpantur. Quin &, cur nouilunij tempore epilepsie periodo quadam moueantur. Humores enim acres denegata humiditatis permixtione ac redinem concipiunt, cerebrumq; mox laceßunt, sed imprimis si melancholia peccet adusta, aut atrabilis humor. *Figura* cranij formam æmulatur, adeoque rotundum est: sed circa basin aliquantulum depressum. *Superficiem* autem habet inæqualem, & hoc duabus de causis. *Primo*, ob^a anfractus & spiras, intestinorum circumuolutionibus similes: *deinde* ob tubercula, quæ per basin sparguntur, ex quibus quatuor priorem sedem circa frontem occupant, duo vtrinque ad latera sita sunt in media basi, quinque circa occiput.

Lib. de-
vulnerib.

a, 10. 2. 2.
CCC.

Diuisio.

Diuiditur^b Cerebrum in tres partes, in^c Cerebrum propriè sic dictum,^d Cerebellum, & ^e principium spinalis medullæ. Varia enim Cerebri acceptio est, & modo, vt jam sumpsimus, totum id insinuat, quod cranij amplitudine comprehenditur, quomodo & Cerebri vulnera dicuntur, quæ quocunq; loco inflicta sunt huic substantiæ: modo anteriorem, & maiorem eius partem, vt sumpsit Aristoteles, i. histor. anim. cum bipartitum esse inquit omnibus animalibus, eiusq; postremæ parti adiunctum id, quod Cerebellum vocatur. Differt autem à Cerebello substantia, colore, magnitudine, figura, & cavitatibus. *Substantia*, quia mollus est: *colore*, quia candidus: *magnitudine*, quia triplo amplius: *figura*, quia rotundum: *cavitatibus*, quia his plenum.

b, vide 10.
9. 2.
c, BBB.
d, D. D.
e, EEE.

Discrimē
Cerebri,
& Cerebelli.

Duplex
Cerebri
secandi
ratio.

Antiqua.
Nova.

Cæterum antequam harum historiam enodandam suscipiamus, merito monendū est, duplicem esse sectionis Cerebri rationem: *vnam* à Galeno traditam, & à pluribus quoq; Recentiorum obseruatam, puta Vesalio, Falloppio, alijsq;: aliam nouiter opera Constantini Varolij inuentam, qui & ipse plures mox assecras indeptus. Inter vtramq; illud est discriminis, quod *antiqua* à superiore sede sectionis seriem auspicatur: *nova*, liberato cerebro ab ossibus omnibus, à basi initium ducat. Hanc, & illam, cum tenere plurimum intersit, quod sine antiqua Veterum Medicinæ Scriptorum, sed imprimis Galeni

Galenilectio, necessario obscura fiat: citra nouam autem Veritas vix vnquam pateat: de vtrauis sermonem instituemus, à Veteri initium petentes.

f. 10. 2. 2. f Cerebrum ergo ab ^g elatiore crassæ membranæ, siue falciformi processu bifariam, *Diuisio cerebri.*
 g. GG in ^h dextram ⁱ sinistramque partem diuiditur, quæ foris ^l spiris anfractibusq; in æqua- *Cerebri substantia duplex.*
 h. EE les, intestinorum sibi implicatorum situm haud ineptè exprimunt. Secta hæc substan-
 i. EF tia cultello, duplicem ostendit naturam, *aliam*, quæ continet, & colore subcinericia est;
 l. CCC *aliam*, quæ continetur, & alba. Illam, *corticem* vulgo; hanc, *medullam* vocitant: illa, mol-
 m, vide 10 lior est; hæc, dura. ^m Sublato autem mox processu qui sic medias sedes dirimit, ⁿ com-
 3. 1. III. pressisq; leuiter ad latera his partibus, in fundo diuisionis, ^o candida quædam sub-
 n. FFFF stantia emergit, quam *Corpus callosum*, *τοιοῦτον δὲ σῶμα* appellant, quæ medulla cerebri est,
 o. GG. & vtramque partem committens.
 10. 4. 2.

AA. extra P Abtruncatis autem his duabus partibus, & intacto corpore, Cavitates duæ occur-
 ritum lo- runt, quas ^q *Ventriculos cerebri*, *κοιλίας ἑξ ἡμεράδων* Galenus appellat, in vtroque latere vnus,
 catum. qui vulgo *Anteriores*, ab alijs *superiores* dicuntur à situ, relato ad quartum, qui his à tergo
 p. hæc o- est; vel tertium, qui substat. Nam si studiose rem tecum reputes, ad omnes locorum
 stendit 10 differentias mediam occupare sedem in cerebri corpore obseruabis. Rectius ergo
 3. 2. dextrum sinistramque dixeris, qui ^r septo quodam distinguuntur, quod supernè callo-
 q. GG. so corpori, infernè fornici vnitur. Laxa est substantia, & rugosa: at explanata, claræque
 HH. luci, vel ardenti candelæ exposita, vitri in morem transparet, vnde & nomen inuenit,
 r, vide 10. vt *septum lucidum*, vel *speculum* dicatur. Cæterum ipsi ventriculi cum insigni sint ampli-
 4. 2. E. tudine conspicui, priore posterioreve parte latescunt magis, & obtusa rotunditate se
 circulant, in medio contra, stringunt & angustantur. Versus inferiora quoq; decli-
 uitate quadam ad se versis, ad tertium ventriculū properant. Succinguntur autem in-
 terna parte *membrana* quadam tenuissima, quæ malè à pluribus negata, ab infundibulo
 huc ascendente originē deriuat, sensuq; pollet exquisito. Inter hos ventriculos & for-
 nicem, ^s *plexus quidam*, ex infinitis minimorum vasulorum complicationibus ope tenuis
 f. DD me- membranæ suffulcientis, contexti, reperiuntur. Vasa hæc primo quidem ex ijs sunt,
 lius vero, vtpote ex
 panfas re- fert 10. 5.
 1. C. D. tur anastomosibus cuncti cum ramulis Vertebralis arteriæ. Vocantur hi *plexus* (duo
 enim sunt, vtrinq; vnus) *χοροειδῆ πλέγματα*, *Choroides*, vel *Chorioformes*, assimilati *χορῷ* *Plexus Choroi- des.*
 r. C. C. C. membranæ fætum inuoluenti in vtero. ^t *Fornix* autem, *καμάριον* dictus, à forma, qua te-
 studinis instar tertio ventriculo incumbit, sub calloso corpore, cum quo substantiam
 haber similem, situs est Amplius hic, & latus est, qua posteriorem duorum ventriculo-
 rum sedem respicit, at mox, paulatim angustatus, in apicem tenuem definit, vt sic trian-
 gulum Iosceles, siue æquicrurum, sed longioribus base cruribus, referat. Superna sede
 se attollit, & conuexitate protuberat: inferna cauius, sinuatur.

u. huic di- eata est 10
 5. 2. FF. ^u *Tertius ventriculus* sequitur, quem si rectè intuearis, profecto à dictorum natura im-
 x. E. pendio alienum esse fateberis: imo hercle concursum potius eorum, quæ peculiarem
 r, vide 10. sinum dixeris. Vbi enim coëunt postica sedes, cum paulo profundius, quam priore de-
 3. 11. G. H. scendant, vallem quasi exstruunt. In hoc duo sunt meatus, ^x vnus anterior, insignis, ma-
 & K. ximeque conspicuus, qui in cerebri substantia exsculptus ^y recta deorsum versus in-
 fundi-

Corpus callosum.

Ventriculi anteriores.

Membrana ventriculos succingens.

Plexus Choroides. Fornix.

Tertius ventriculus. Duo ipsius meatus Anterior.

Posterior. fundibulum fertur: ^z alter, in posteriora porrectus, sic angustus, vt Vesalius interdum ^z, 10.5.2.
reperiri negitet, sub ^a testibus & ^b natibus cerebri in quartum Ventriculum delabatur. ^{G. vide &}
Circa hunc rima quoq; est, quam Columbus Vuluæ muliebri assimilat. ^{10.8.11.D}

Infundibulum. Ex priore ergo ad infundibulum via patet. Est autem ^c *Infundibulum*, quæ & *Peluis* ^{a, II.}
quibuldam, cavitates quædam sub tertio Ventriculo, ex membrana cerebri tenuiore ^{b, H. H.}
composita, quæ sensim angustior reddita, infundibulum, quo vimur ad transfunden- ^{c, vide 10.}
da liquida in vasa strictioris orificij, æmulatur. Desinit autem in ^d glandulam quan- ^{10. N. sed}
dam, eadem tenui membrana obuelatam, quæ Galeno innominata mansit: cæterum ^{imprimis}
nostris *Pituitaria* dicitur, quod pituitam credatur excipere, destillantem à cerebri ven- ^{10.8.11.K.}
triculis. Sita est autem in ^e sinu ossis cuneiformis quadrato, qui in sellæ medio exscul- ^{d. O.}
ptus est, à quo quatuor alij excurrunt, partim versus ^f priora, ad secundum foramen ^{e, 2.5.1.I.}
iusdem ossis in oculi sedis radice positum; partim ad ^g posteriora, ad inæquale & aspe- ^{f, K.K.}
rum foramen, quod eiusdem ossis quintum est. ^h Circa glandulam à lateribus dicti si- ^{g, L.L.}
nus plexus quidam membranofus consistit, infinitis arteriarum surculis retis instar ^{h, expres-}
complicatarum exstructus, qui omnes originem habent ⁱ à maiore carotidis arteriæ ^{sus hic est}
ramo, qui per foramen proprium in osse temporum insculptum cranij amplitudinem ^{10. 10. li-}
ingreditur. Vocatur hic plexus *Rete admirabile* Recentioribus: Galeno, *δίκτυοειδὲς πλέ-* ^{tera L.L.}
γμα, hoc est, *plexus retiformis*. Figuram eius non rectius animo committes, ac si piscato- ^{i, K.K.}
rum retia quamplurima extensa, & inter se confusa mente conceperis. Quanquam au-
tem à doctissimo Vesalio negatum sit, esse quale à Galeno descriptum reperimus, quem
nec hominis cerebrum, sed bouis: nec exactè vidisse, sed delusum visu proficitur: o-
mnino tamen id statuendum est, in hominum quoq; cerebris plexum hunc reperiri,
quantumvis non negemus in vitulorum bouumque capitibus multo maiorem, adeo-
que & euidentiore.

¹ Circa secundum ac posterius foramen, qua in quartum itur, corpora quædam occurrunt, ^{l, 10.5.1.}
non admodum insignis magnitudinis, quæ inter primas meretur partes illud, quod ab ^{G.}
Anatomici proceribus *κωνάριον* vocatur, siue ^m *Glandula pinealis*, ducta appellatione à ^{m, K.}
substantiæ, tum figuræ ratione. *Substantia* enim glandulæ est, non nihil duriusculæ, &
figura nuci pineæ, aut turbinatæ similis, cuius apex sursum spectat, basis deorsum. *Sita*
ergo est hæc glandula in principio canalis illius, qui posteriorem ventriculum cum
tertio coniungit, & prout cæteræ glandulæ omnes venarum diuarcationibus tribu-
tæ sunt, sic hæc sinum quartum ad duos priores ventriculos contendentem sustinet ac
suffulcit. Glandulæ pineali ex vtraq; tertij ventriculi parte contiguæ sunt particulæ
quatuor, rotundæ, ac eminentes, ex quibus priores, ⁿ Testes, *διδύμοι*: posteriores, *Nates* ^{n, II.}
& *Clunes*, Græcis similiter *κλυνῆς*, appellantur. Sunt autem portiones cerebri tenues & ^{o, H. H.}
globosæ, imaginem eorum, à quibus nomen acceperunt, repræsentantes, quæ *meatum*
ducunt ex tertio ventriculo in quartum patentem.

Quartus ventriculus. P *Quartus* autem hic *Ventriculus* inter Cerebelli inferiorem partem, & spinalem me- ^{p, 10.B.}
dullæ superiorem situs est, omnium ventriculorum cerebri minimus, qui, ad teretem ^{3.C.}
figuram compositus, sensim in acumen se stringit, vnde & ab Herophilo
scriptorio calamo comparatus fuisse æsti-
matur.

CAPVT V.

Cerebelli, eiusque partium iuxta Veterum dissectionem, enarratio.

CEREBELLVM altera ac posterior Cerebri pars est, à Græcis *παρεγκεφαλῆς* dictum, CEREBEL-
lum.
a, 10. 6. fig.
1. 11. & fig.
2. FF. itē
10. 9. I.
D. D.
 Quod Cerebro velut appendix cohæreat. ^a *Situm* enim est à posteriore ipsius sede in occipitio, cui duarum membranarum interuentu, quibus inuoluitur, cohæret. Ety molo-
gia.
Situs.
Substan-
tia. *Dif-*
 fert autem à Cerebro pluribus in rebus, idq; haud leuiter, substantia, inquam, magni-
 tudine, forma, cavitatibus, & colore. *Substantia* enim eius, quæ spinali medullæ circa
 basin originem confert, durior multo est: & *magnitudo* vix tertiam partem conficiens:
 forma autem latiore, quam rotunda; tum *sinibus* nullis intus excauata, *colore* flauum, &
b. vide 10.
8. fig. I. &
3. it. 10. II.
2. AA. aa.
c, CC.
d, D. vide
& 10. 8. 13.
 cinereum. ^b *Constituitur* autem ex quatuor partibus, quarum ^c duæ laterales sunt, dextra, &
 sinistra: ^d duæ mediæ, anterior & posterior. Illæ, rotundæ sunt sphaerarum in morem:
 hæ, teretes, & (si simul contempleris), velut in orbem aguntur. Illas, *Globos cerebelli* haud
 incommode vocaueris: has, Veteres *Vermiformes processus*, *σκοληκοειδείς ὑπερφύσεις*, dixerunt. Magni-
tudo.
Forma.
Color.
Partes.
Globi.
Processus.
 Sunt autem apud eosdem celeberrimi, ex quibus alter anteriorem quarti ventriculi
 sedem, alter posteriorem apice suo respicit. Figuram enim habent vermium, qui cario-
 sa ligna depascuntur, multipliciter orbiculati, ex altera parte latiores, altera strictiores.
 Stricta ergo *sinum* respiciunt, qui inferiorem sedem cauat, & *cisterna* à nonnullis dici-
 tur, estque elatior sedes quarti ventriculi, cum reliquam sedem tenuis membrana
 obuelet. Sinus.

CAPVT VI.

Spinalis medulla, secundum Veterum placita, descriptio.

TERTIA pars Cerebri, eius inquam substantiæ mollis, & albæ, quæ toto cranij com-
 plexu coercetur, *Spinalis* est *Medulla*, improprie sic hodieq; dicta ob erroneam Ve-
 terum opinionem, quibus à medulla ossali nulla propemodum in re distare credebatur.
 Græcis ergo *μυελὸς ῥαχίτης*: sed & *νοτιαῖα* dicitur, siue *dorsalis*. Vtcunq; vocetur, eius
 appellatio ambiguitatis haud est expers, sed sepe, vt apud Galenum & plerosque omnes
 Antiquos Anatomicos, illam substantiam denotat, quæ cranio, veluti processus quidam
 cerebri oblongus, per occipitij foramen primum & amplissimum egrediens, in totam
 vertebrarum dorsii seriem ad ossis vsq; coccygis sedem, cum itinere semper decrescens,
 labitur. *Interdum*, vt ab ijs vsurpatur, qui, falsitate priscae sectionis deprehensa & abolita,
 nouam substituerunt, pro ea tota sumitur, cuius ^a pars adhuc cranij terminis contenta,
 ab Antiquis ignorata fuit. Medulla ergo spinalis commode situs ratione bifariam di-
 uiditur, si aliam quidem Cranio, aliam spina vertebrisq; comprehensam dixeris. Quæ
a, hanc o-
stendite e-
legantè,
fig. 2. tab.
9. lib. 10.
 tamen vera eius origo sit, & quantulacunq; illa portio, quam Cranium regit, sequens
 enarrabit Caput: nunc enim sic eius historiam persequi animus est, vt Antiquis illis
 Refectoribus perfecta erat.

Ortus.

Cæterum spinalis medulla ex Galeni sententia 8. vñ. part. 10. ex quarto cerebri ventriculo, tanquam principio suo digreditur, cum cerebri non minus, quam cerebelli sit quædam productio; at vbi jam ad amplū occipitii foramen peruenit, recto tramite per spinam fertur. *Substantiam* ergo & Cerebri nata est, non tamen vt illa duplicem, sed medullarem tantum: nec ita mollem, sed duriusculam, vt adeo alba sit, & compacta, quamquam nec sibi ipsi vbique similis, cum progrediendo semper indurescat. Est & gemina, diuisa velut longa sectione in medio, vsque ad lumborum vertebra, quam bipartitionem coctio tibi oculis subiiciet facile, cum citra dilacerationē diueller. Sed & animo si velis hanc concipies, dū aduertas causam, quæ alterutrius lateris paraly sin impingit. Cingitur hæc *membrana* duplici, non secus ac Cerebrum vnde oritur. *Vna*, quæ immediate tangit, à tenui meninge protensa, & sese inter vtramque partem innuans, sola seorsim inuoluit. Per hanc vasa excurrunt, quæ vel nutritioni ipsius, vel vitæ prospiciunt. *Altera*, quæ hanc obtendit, & à crassa membrana proficiscitur. His duabus inuolucrum circumiicitur ex Galeni sententia, enarum à ligamento vertebrarum corpora iungente. Cæterum id obseruandum est, priores duas, quæ à cerebri meningibus descendunt, nullo inter se, quemadmodū vbi adhuc in caluaria sunt, intervallo distinguunt, sed sese contingere. *Figura* teres est, sub principium amplior, sensimque in apicem, vbi nonnihil processit, attenuatur. Tota autem continua cum sit, circa finem tamen in plures *funiculos*, ac quasi filamenta quædam, caudæ equinæ speciem referentia, dissoluitur. Educit autem similiter ac Cerebrum (quanquam hercle, vt dicturi sumus, ipsa potius sola ipsius portio superior) *nervos*, qui cum innumeri sint, ab Anatomicis tamen in numerum foraminum vertebrarum communium, per quæ ex spina egrediuntur, sunt digesti, vt adeo tot sint coniugationes, quot vertebrarum foramina. Quo autem pacto hi nerui egrediantur, & egressi distribuuntur in singulas partes, abunde satis in superioribus videmur esse complexi.

Membrana.

Figura.
Funiculi.

Nervi.

Lib. 7. c.
3.

CAPVT VII.

Cerebri eam dissecandi rationem, quam Recentiores inuenerunt, primum proponit, mox partium eius beneficio inuentarum, aut aliter comparentium, historiam nectit.

Nona sectionis
utilitas.

Differentia.

Sic ergo Cerebrum se, eiusque partes, si Galeni Veterumque præceptis insistent sectionem aggressus fueris, habent: at si Recentiorum quorundam inuentis placide acquiescens, ab inferiori sede aspiceris, & plures primo partes, quam enumerauimus, & elegantius nonnullas, ac aliter se oculis obiectantes, tam figura, quam magnitudine, situ, atque origine haud dubio deprehendes. *Plures dico partes*, cum præter Vermiformes Cerebelli processus, & Pontem (sic ab inuentore Varolio vocatum,) intueri detur: elegantius, Infundibulum, & glandulam pituitariam, tum rete admirabile. *Aliter se habentes, in figura* quidem, tertium & quartum ventriculum: *in magnitudine* autem, duos primos & anteriores dictos sinus: tum *in situ* nates, & testes, nuncupata corpuscula: tandemque *origine* spinalem medullam, duo prima neruorum cerebri paria, tum quintum, & octa-

& octavum olfactui famulans. In his ergo discriminis vtriusq; sectionis cardo vertitur, quæ omnia fusiore nunc stylo persequemur, sectionis seriem, vna cum partium, quæ se aliter ac in vulgari habent, natura describendo.

Ad hanc ergo administrationem Caput quam recentissime abtruncatum eligatur, cui, si desit forte, Vitulinum, aut Ovinum, substitues, cum præter magnitudinem illorum corpusculorum, quæ testes natesse dici commemorauimus, nullum se monstret discrimen ab humano. Quin si meum non detrectes consilium, etiam atque etiam in his te prius exercitatus humani capitis sectionē aggredieris, quod in his pleraq; evidentiore quadam magnitudine sensibus egregie se ingerant. Vtrumvis autem habeas, ossa primū solertissime separabis, id diligenter animaduertens, ne qua parte subiectā crassam membranā violes, cum qua nervos opticos, iisque appensos oculos in suis sedibus relinquere te velim. Cæterum vt id in expedito tibi sit, quanquam hercle citra laborem & difficultatem nequaquā transigi potest, primum omnium communibus illis tegumentis, vna eum musculis cranio instratis, tum maxilla inferiore, ablatis, orbiculatam caluariæ sectionem institues, serra, qua Chirurghi nostri in absciendendis gangræna tabidis membris, vtuntur, transuersim in ipso nasi ossium medio iniecta. Deduces autem mox per conterminū oculorum ambitum, supra ossis iugalis sedem, mediumq; ossium temporalium; ad occipitij inferiorem regionem, rursusq; repetens per alterū latus principij tui terminū, sic circumcirca serram promouebis. Interim temporis studio se, ne qua altius forte immergatur caueas, neu membrana substrata ossi læsa, operi tuo ignominiosam noxam impingas. Hac sectione rotunda expedita aliam auspicaberis in basi cranij transuersim per mammillarium processuum apices. Inde iniecto cultelli manubrio, quanta poteris summa diligētia conaberis ossis hanc partem (quæ occipitij ossis pars est posterior) liberatam à reliquo, à supposita membrana leuare. Hoc enim ablato iam liquido tibi postica cerebri pars, ipsumq; adeo Cerebellum patebit. Reliqua autem ossa haud magno ingenio studioque deinceps separabis, dummodo laboris moræque non nihil fueris patiens. Egregiam hic operam præstabit serra partim, partim & forfex excisoria, quibus nonnunquam & cultellum acutum addas, vbi os tenuerit occurret, qualia circa oculi orbitam se offerunt. Denudato sic ab inferiore sede cerebro, quid promptius erit, quam & ab elatiore à cranio seiungere, cum iniecto cultello, & sursum deorsumque acto facili prorsus negotio à se disparentur?

Cerebro hac ratione cum suis membranis è caluaria exempto *dura*^a primum *membrana substantia* consideranda erit, tum sinus inspiciendi, in quibus ad memoriam reuocanda omnia, quæ de his paulo ante sunt tradita. Mox inuerso cerebro, basi; sursum spectante,^b crassam membranam decussatim intersecabis, ad latera portionibus repositis. Circa tamen nervos quicquid eius est omne relinques, ne forte hi disrumpantur, eorumque postea ortus te subterfugiat. Eodem modo *tenuem* quoque auferes, cuius ope anterior spinalis medullæ pars cerebro, posterior cerebello connectitur. At enim hic plures tibi illico patebunt partes, ipsumque adeo ^c *Cerebrum* inferiore sui facie conspicuum, tum ^d *Cerebellum* cum vermiformibus processibus, ac ipsa ^e *Spinalis medulla*. Præter hæc priore sede ^f *processus* cerebri duo, quos *mammillares* vocant, tum ^g *oculi*, à quibus museulos cunctos remouebis, vt à ^h solo optico nervo dependeant liberi. In-

Caput
quale re-
quiratur.

Præpara-
tio capitis
ad sectio-
nem.

Sectionis
initium
unde faci-
endum.
Dura
membrana.
Sinus
quatuor.
Tertia
membrana.
Partes
Cerebri
ablatis
membra-
nis con-
spiciunt.

^a, vide 10.
^g, i. vbi
cerebrū
mēbrana
dura in-
uolutū,
inferna
sede, cō-
spicuum
est.
^b, 10. 9. 2.
AAAA.
^c, BBB.
^d, DD.
^e, EEE.
^f, ff.
^g, YY.
^h, R.

ter hos progreditur ¹ *oſtauum par nervorum*, quod odorum receptioni dicatum eſt. Inde ^{i, Q. Q.}
¹ *Arteria carotidis ramus maior* vtrinq; & *rete admirabile* ſpectabis, in quorū medio ^{l, G. G.} *m glandula pituitaria* cum ^{m, l.} *infundibulo* ſuo eſt ſita. Hinc ^{n, P.} *o ſecundum neruorum par* contemplaberis,
 & ^{o, K. K. I.} *P Vertebralem arteriam*, quæ per tranſuerſos vertebrarum ceruicis proceſſus aſcen-
 dens, ſub ^{p, Z. Z.} *ſpinali medulla* cum coniuge ^{q, E. E. E.} *v nita*, ad anteriora capitis ^{r, c.} *excurrit*, ac ^{s, d.} *ite-*
 rum bifariam diſiſa, ^{t, e. e.} *rete admirabile* cum carotide arteria eſt format. His ſic obiter lu-
 ſtratis accuratius mox omnia rimanda ſunt.

Spinalis medulla verus or- tus. Primum ergo inueſtigāduſ verus ſpinalis medullæ ortus, qui ſeſe haud difficulter in
 conſpectum proferet, reflexa eadem verſus anteriora. Non enim in occipite, vt alias
 creditur, ſed anteriore magis cerebri parte exoritur, eſſicta ex quatuor veluti radici-
 bus, quarū *anteriores dua* maiores ſunt, & ea ſede ex cerebro enaſcuntur, quæ circa Ven-
 triculorum fere medium conſiſtit; *dua poſteriores* minores, ex cerebelli inferiore parte
 enatæ. Progredientibus autem verſus poſteriora illis, hæ occurrentes iunguntur,
 ſicque ſpinalem medullam producunt, ex qua vt vno, ſic vero principio omnes, quot-
 quot ſunt corporis nerui, emergunt. Circa truncos poſteriores, *proceſſus* occurrer non-
 nullus, qui in veteri ſeſtione prorfus ſe nequaquam prodiſ, à Varolio *Pons Cerebelli* di-
 ctus. Hic per tranſuerſum in anteriora & inferiora fertur, ſicque ſpinalem medullam
 amplexatur, vt ſcripſimus ſuperius primum par gulam conſtringentium, Oeſophagi
 principium amplecti.

Nervorum Cerebri diſtorum verus or- tus. His indagatis, exacte neruorum, quos vulgus ad Cerebrum refert, originē inueſti-
 gare expedit. *Primum* enim par, non vt iniquiunt Priſci, ex cerebri baſis anteriore ſede
 oritur; ſed ex radicum anteriorum ſpinalis medullæ ſuperiore parte, qua ventriculo-
 rum cauitatem reſpiciunt. Similiter *ſecundum* ex eodē fere loco, quod in ſuo exortu ſic
 vnitur, vt angulum communem efficiat. *Quintum* ex ponte Cerebelli prodiſ, qui cum
 Veteres fugerit, & huius paris verum exordium latuiſſe eos neceſſum eſt. *Oſtauum* ſi-
 militer ad extrema cerebri latera, ea ſede, quæ ſupra auditus foramina eſt. *Cætera* vel ex
 Veſalii quoque, & Columbi mente à ſpinali medulla egrediuntur. Quis autem o-
 mnium progreſſus ſit, quæque diſtributio, ſupra libro ſeptimo compræhendimus.

Quartus ventri- culus quid ſit. Neruorum principiis dimiſſis, Cerebellum auferendum eſt, vt *quartus ventriculus*
 pateat, qui inter ipſius baſin, & ſuperiorem ac poſticam partem ſpinalis medullæ, ex
 eorum concurſu enatus, reconditur, cum reuera non ſit aliud, quam cauitas quædam
 teres, ex duobus ſinibus ſemicircularibus eſt formatus. Superiorem ergo eius portio-
 nem Cerebellum; inferiorem, Spinalis medulla conſert: ac, ſi rem æqua metiaris æſti-
 matione, ventriculi nomine prorfus indignus eſt, cum in ipſa cerebri cerebellive ſub-
 ſtantia non ſit ſitus, neque primaria intentione à Natura exſculptus, ſed ex corporum
 diſpoſitione neceſſario talis emergat.

Nates. Teſtes. Remoto deinde Spinalis medullæ principio, ablatis autem penitus neruis opticis
 vna cum demonſtratis, corpufcula illa quatuor, *Nates, Teſtes, & Pinealis glandula*, non ta-
 men, vt vulgo, in ipſo Cerebri corpore, ſed extra tibi apparebunt, ſacilique agnoſces
Pinealis glandula. industria, principia eſſe ſpinalis medullæ, vt in vſu inueſtigando ſudorem haud mo-
Foramen poſterius tertii ven- triculi. veas. *Teſtes* enim portiones ſunt radicum medullæ à Cerebro enaſcentis: *nates* autem
 earum, quæ à Cerebello deriuantur. *Foramen* deinde poſterius tertii ventriculi, per
 quod

quod ad quantum viam esse tradiderunt, non aliud est, quam interuallum, quod ex concursu quatuor horum corporum sphaericorum, ob figuræ necessitatem, sequitur, & formatur.

Tandem *Ventriculorum* cerebri inspectio restabit, qui ut pateant, longa tibi & profunda sectio in basi vtrinque facienda erit, labraque sectionis ad latera coniicienda, aut distrahenda. Sic manifesto comperies, quoad numerum duos tantum esse Ventriculos: *ratione magnitudinis*, ampliores, quam vulgo creditur: *at figura*, cerebri formam sequi. Quin si aduertas maiori industria, vnicum esse affirmabis, distinctum septo lucido. In his considerabis plexus retiformes, qui ex membrana, vasis varie inter se complicatis, tum (quod diligenter notandum ex obseruatione Varolii) innumeris glandulis componuntur.

His visis inuertendum cerebrum est, & eius superior pars diducenda, quæ falcis interuentu, (est hic processus superior duræ membranæ) bifariam scinditur. Circa medium vtriusque callosum corpus interiacet, quod vtramque necit.

Ventriculi anteriores.

Septum lucidum. Plexus retiformis.

Dextra & sinistra cerebri pars. Callosum corpus.

C A P V T VIII.

De Actione & vsu Cerebri.

CVM omnis, quæ de rerum naturalium, actione vsue instituitur disquisitionis principium, vera sit ac perfecta ipsarum prævia inspectio, quod animus noster in causarum inuestigatione, iis insistat & vtatur notionibus, quas sensus, mentis satellites, obtulerunt: neminem esse statuo, quin tacita protinus vi quadam intelligat, maiores nostros, vtcunque summos, & in Philosophia exercitatissimos Viros, grauitè in Cerebri vsu hallucinatos esse, quod, vti monstrauimus, plerasque omnes ipsius partes, vel imperfecte, vel false admodum, ob ignotam veram dissecandi rationem cognouerint. Quamobrem & dum ad hanc nos disputationem componimus, ab eorū vestigiis merito discedendum erit, & Recentiorū potius sequenda inuenta, quorū ingenio, vt primū vera dissecandi Cerebrū ratio in lucē eruta est, ita & occasio data fuit, accuratius subtiliusq; plurima inuestigandi. Vtcunq; autem necdum omnia sic clara reddita sunt, vt omnes superasse tenebras videantur: credendū tamen, fore aliquando, qui in hanc rem, velut omniū præclarissimā, animum diligentius intendētes, quæ nunc mentē nostrā fugiūt, clara ac manifestiora reddant. Interim dicamus, quæ in hac difficillima refectionum parte nostro sumus assequuti studio. exordiū ab ipsa Actione desumentes.

Veteres merito circa Cerebri actionem hallucinatos esse.

Graues hic mox disceptationes inter Medicos, Peripateticosque Philosophos se offerunt. Hi enim cordis refrigerandi gratia conditum, ex duce suo Aristotele, 2. de partibus animal. c. 7. probare conantur: illi, spirituum animalium generandorum nomine factum, non instrenue profitentur. Ego, etsi haud ignorem, quam longe inter se distent summi hi Viri, si primum eorum opiniones recitari audias: non tamen sic sententiis, quam verbis à se mutuo mihi dissentire videntur. In eorum ergo concedo placitum, quibus creditur, *Galenum* rem ipsam duntaxat: *Aristotelem* vero etiam modum indicasse. Ille enim, spiritus animales ex vitalibus in cerebro elaborari statuit: hic, modum simul exprimit, quo generatio illa perficitur. Dum enim beneficio arteriarum caroti-

Actio Cerebri.

dum, tum jugularium venarum, spiritus & sanguis, in duræ cerebri membranæ sinus effunduntur, temperamento cerebri, quod, quam cordis, frigidius est, temperantur, aptique animalibus functionibus, (sensu hæc motuque absoluuntur) fiunt. Manifeste id tibi licebit notare, ubi vel vino, vel internis causis cerebrum incaluerit, in quo subito, nec mens sibi constat, errantque sensus, ac motus labascunt. Nec tamen, quod quibusdam visum est, secundum substantiam quædam hic vitalium spirituum fit mutatio, quæ totam horum naturam euerrat: sed temperamenti solius alteratio quædam perficitur. Quanquam certè credam, quoad substantiam attenuationem quoque aliquam accedere, cum nudos magis, liberosque ab omni concreta materia, atque vitales spiritus, qui sanguini adhærent, vsu experiamur. Cæterum ipse Aristoteles, utcumque à multis hic acerbè reprehendatur, qui obscuritatem eius exprobrant, prudentissimè tamen, meo iudicio, egisse videtur, ut qui modum cum re breuiter sic explicare contendit. Nec tamen ita obscuritatem ipse suis verbis, vel ambiguitate vocum, vel impropria quadam dicendi ratione affert, quam relinquit ijs, quibus legendi Aristotelem, & intelligendi ratio non satis est perspecta. Nam cum loquendi formulas, quas ipse habet, tum à nostris hominibus, tum imprimis Galeno diuersas, acerbè nimis subito eludunt, næ faciunt, omnia ut intelligendo, nihil ut intelligant. Quam enim clarus sit, ac quam præclaram sententiam de Cerebri actione protulerit, apertè satis ex laudato loco colligitur, 2. part. an. 7. in quo clarissimè edocet, Animæ nostræ officia muniaque omnia caloris beneficio obiri, adeoque & motum ac nutritionem calore absolui. Calorem autem hunc, cum in corde stabuletur, ut in fonte, propterea & calidissimum ibi esse: sed cum in alijs alijsque tum partibus, tum actionibus, mediocritas quædam requiratur, momentum, quo hanc assequitur, contrarium postulare.

Necessario ergo pars aliqua (talis est Cerebrum) condenda erat, quæ calorem cordis feruentem, id est, vitales spiritus, temperaret, cuius ope reliquæ actiones, ut motus ac sensus, absoluerentur. Ergo cum Cordis refrigerandi gratia Cerebrum conditum scribit, multa simul non minore elegantia, quam breuitate explicat, vsu primo, deinde modum, ac tertio materiam. *Vsu* quidem, quia Cordis gratia factum: *Modum*, quia refrigerat: *Materiam*, siue subiectum, Calorem. Sed videamus, quam aptè etiam Galeno assentiatur. Calorem, inquit, cordis refrigerari: at calor hic ubique animæ instrumentum ab eodem vocatur, & hoc ipsum Spiritus alibi dicuntur esse: qui ergo clarius Vitales Galeni spiritus indicasset, cum calorem cordis vocat? Sed & qui melius? cum sic causam illius refrigerationis simul includat, quod scilicet tam feruentem calorem actiones omnes haudquaquam perferant. Galenus tamen strictius hunc vsu persequitur, dum sensus motusque, gratia fieri id contendit: explicat enim quæ sint actiones illæ, quæ refrigerio cerebri indigent. Ex his concluditur, partibus omnibus sensu motuque præditis, facultatem hanc, spirituum animalium in Cerebro genitorum ope offerri, haud secus, ac Vita ipsa eorum subsidio, qui in corde residentes, Vitales à Medicis propterea appellantur. Cæterum, ut hi ipsi sua ipsorum substantiâ Arterias peruadunt, omnesque, ad quas transmittuntur, adeunt partes, sic & (superius id probatum est) animales spiritus neruorum penitissimas partes, cum vitalibus sint tenuiores, fulminis instar peruadunt, ac temporis momento penetrant. In viuo namque corpore, partes quæ-

Lib. 7.
ca. 1.

nus

Aristoteles
defensio.

Spiritus
animalis
in substantiâ
neruos
adit.

uis apertæ sunt, ac raræ, ob calorem à corde indefinenter suggestum peruadentem omnia atq; attenuantem, quæ postea ob frigiditatem concidunt mox in morte, ac stringuntur. Cerebrum ergo canalibus quoq; eget, Neruis, non aliter atq; Cor Arterijs, quibus idcirco abscissis, aut interceptis, omnium animalium functionum pernicies subsequitur.

Vfus cerebri.

Intueamur nunc structuram Cerebri, ac videamus vt his actionibus satisfaciat. Primum *in cranio situm est*, vt quam vicinissimum esset sensuum instrumentis, à quibus sensibiles species offerendæ erant, cum Cerebro dignoscendi discernendique eas facultas sit tributa. At enim cum sensuum organa supremum requirant locum, isque à cranio occupetur, quemadmodum id sub principium huius libri adstruximus, merito & Cerebro hic assignandus erat. *Figura ergo & ipsa cranij est*, quod peculiarem per se nullam requirat actionis suæ gratia, quanquam, vt audiemus postea, rotunda quam plurimum iuuat, accomodetque. Est autem *homini inter cetera animalia maximum*, quia maxime sanguineus est, adeoque & maxime calidum cor habet, & refrigeratione maiore indiget. *Substantia vero ipsa sui generis est, ac peculiaris*, quod, cum præcipuum generationis spirituum organum ipsa cerebri sit substantia, & vero hæc ab omnibus alijs diuersa, hanc nulli communem esse decuerit. *Crassa autem est*, ne flueret: ne tamen vicissim nimis dura, non reciperet specierum impressionem, *glutinosa ac viscida*. *Alba* autem, quia sanguinis expers: & hoc, vt frigidior esset alijs omnibus corporis partibus, quo calore suo moderato, vitalium spirituum calorem remitteret, vt videmus à calore mediocri plumbi eliquati æstum temperari. *Duplex autem hæc substantia merito est, partim mollior*, vt ea, quæ Cerebro sic dicto strictius, *partim duriuscula*, vt quæ Cerebello competat. Molliores enim neruos & humidiores, vt rectè Varolius atque ingeniosè asserit, Opticos, siue Visui dicatos necesse erat, quod Visio mediante humido absolueretur: duriores, adeoque siccis magis, Acusticos, siue Auditui inferuientes, quod, quæ sonum apprehendunt organa aliquam ariditatem expostulent. Hinc adeò & illi ex *Cerebro*: at hi è contra ex *Cerebello* originem suam ducunt. Quia tamen haudquaquam conueniebat, diuersa omnimodo neruis, qui omnes vni communi functioni deferuiunt, principia constituere, ab utroque alia quædam substantia enascitur, quæ quia per Spinam se penetrat, *Spinalis medulla* cognominatur, tametsi bene magna ipsius portio caluariæ amplitudine adhuc coërceatur. Hæc omnium totius corporis neruorum vnum ac commune principium est, quanquam ex gemino corpore, ac geminam, vti diximus, originem capiat.

Cæterum, cum hæc substantia sic mollis ac tenera, infinitis opportuna fuisset periculis, nisi firmata aliquo corpore, imperium omnè declinaret, *Membranis* eam solers Natura inuoluit, quas ipsas postea, cū nec sic satis tuta in saltibus, alijsq; corporis violētis motibus foret, cranio quaquaversum alligauit, & quidē præsertim, vti firmitus id esset, traiecit quibusdam fibris per futurarum compagines. Harum membranarum *duæ sunt*, vt altera quidem, dura scilicet, contineret, nec rumperetur, vnde crassior facta est: altera immediatè tegeter, ne cerebrum pars mollis ac tenera diffunderet, ne tamen alicubi offenderet, hinc mollis, tenuis, læuisque exstructa fuit. Sed & illa sinibus dicata, crassitiem exposebat: hæc ductus tantum exiliores per cerebrum spargit, per quod vti tu-

tius feratur, comes ipsa, varios *anfractus* in superiore ipsius superficie exsculpit, quibus sese vbiuis insinuat. In sinus autem sanguis arteriosus venosusq; effunditur, qui mox confusus, & Cerebro alimentum, & spiritibus animalibus generandis, materiam sup-
 peditat. Quicquid enim crassi ac fibrosi in eo est, in nutrimentum cedit: at vitales spi-
 ritus, exhalantes in Cerebri substantiam, attenuatiq; mox ac refrigerati fuerint, in a-
 nimales faceffunt, nervisq; postea transmittuntur. *Sinus* hi *quatuor sunt*, ex quibus *primi*
duo obliq; ascendunt, cum à lateribus vtrinq; ipsos exstruentia vasa ascendant, quæ in
 communi sede coeunt: *reliqui* excurrunt, partim versus superiora, vt *tertius*; partim ad
 inferiora, quemadmodum *quartus*. Cum autem quæqua versum propagines multipli-
 ces disseminent, quam commodissime sane omnibus cerebri partibus prospectu fuit.
 Duo enim priores cerebri quidem posteriorem tantum, at totam cerebelli substantiã
 nutriunt, spiritibusq; perfundunt; tertius vero, superiorem; sed quartus, mediam ac
 inferiorem sedem. Alij rami Venarum, Arteriarumq;, qui cranium subeunt, nec nu-
 triunt cerebrum, nec vitam largiuntur, quemadmodum neq; horum quæ diximus
 propago vlla extra cerebrum ad alias partes defertur. Ad crassam enim membranã
 à minore jugulari vena, tum Carotidis maiore ramo vasa accedunt.

Sinus.

Excre-
menta ce-
reabri.Ventricu-
los duos.

Cæterum, vt in quavis nostri corporis coctione excrementa quædã separari neces-
 se est, quæ tanquam inutilia primum colliguntur, mox derruduntur: sic eadem ratione
 in tertia cõcoctione cerebri, imprimis quia frigidior pars est, vel potius minus, ac aliæ,
 caloris particeps, coaceruari plurima, necessitate quadam colligitur. Sunt hæc crassa,
 viscidaq;, (Mucû vulgus Medicorum appellat,) quæ vt coaceruentur alicubi sapiens
 Natura *Ventriculos duos* (reuera .n. duo tantum sunt) efformauit, è quibus postea per an-
 teriorem tertij dicti ventriculi meatum, tum per peluim sensim ad glandulam pituita-
 riam transmittit, à qua ad inferiores inde partes stillando deducitur. Ac si *moderatè qui-*
dem recrementa hæc *congerantur*, oculis affluunt, pro musculis: tum nervis, pro eorun-
 dem principijs, ne in motibus partium quasi perpetuis, exsiccentur, irrigandis. his .n.
 munijs, etsi abusu quodam adhibeantur, maxime tamen necessaria videbantur. Iam si
abundent, vel errore externo, aut debilitate cerebri, ad spongiosi ossis sedẽ nonnunquã
 (frequentissime id adeo hyberno tempore frigoris gratia evenit) affluunt, vbi obstru-
 ctiones foraminulorum inferentia, Grauedinem excitant. At enim cum promptum
 foret, vt vel sua natura, quæ viscida est, vel mora diuturniore in cerebro, tenacior ma-
 teria hæc reddita ventriculorũ parietibus, tum inferioribus cerebri sedibus adhære-
 ret, sicque irremediabiles concitaret obstructions, prouida in cunctis Parens, plexus
 Choroides ex arterioliis infinitis efformauit, quarum tum motu, tum calore ac spiritu
 attenuata sensim deturbantur. Quia etiam excrementa haud vnquam in suum con-
 cedunt locum, sed vel expultricis facultatis vi, qua truantur, vel, attractricis, vt
 trahantur, indigent, *Glandulis* iidem hi plexus pleni sunt, quarum substantia, vel ma-
 gni illius Hippocratis testimonio, quocunque corporis loco inueniatur, serosorum
 humorum expurgationi dicata est. Sunt autem arteriæ hæc glandulæq;, membranulæ
 tenuis, densæ tamen, ope connexæ, vt à disruptionis periculo, cui tenuitatis suæ gratia
 obiectæ erant, vendicarentur. Quemadmodum autem à viscositate discrimen erat,
 ne obstructio oboriretur: sic vbi acredinem recrementa hæc suscipiunt, epilepsiæ,
 velli-

vellicato neruorum principio, quod circa spinalem medullam est, periculū imminet.

Reliquarum partium, quæ in Cerebro sunt, vsus, ex dictis facile colliguntur, vt demonstratione proluxiore haud egeant, dum veram modo disseccandi rationem & noris probe, ac studiose sequaris. *Testes*. n. & *Nates*, portiones tantum esse radicū medullæ, à cerebro, tū cerebello enascentis, ipsa inspectio docebit: *foramen* autē *posterius tertij ventriculi*, non aliud, quam meatum ex horum globosorū corporū concursu enatum, ipse conijcies. Vbi. n. cumq; quatuor sphaeræ seles contingunt, in medio interuallum quoddam spatiumq; interijci nulli nec dubium est, nec obscurum. *Glandula Pinealis* his adstans, glandula est diuarcationem sinus quarti sustinens, ac versus anteriora deducēs. Ipse autem *quartus Ventriculus*, & extra ipsam Cerebri substantiam consistit, (vnde nugæ sunt spiritus eum suscipere) & nihil est aliud, quam cavitās, ex sinu Cerebelli, & medullæ spinalis enatus. Ille, ob concursum processuum vermiformium fit; hic, ob vnionem duorum truncorum. Ex necessitate ergo fabricæ horum corporum, non finis aliquis gratia, qui quidem Cerebri actioni inferuiat, conditus videtur.

CAPVT IX.

De oculo interno, siue visus instrumento.

IN capite Cerebrū, si late hoc vocabulo vtaris, tum sensuum instrumenta contineri, ab initio huius libri diximus. Cum ergo quantū præsens institutum requirebat abunde satis de illo verba fecerimus, reliquū videtur, vt de his quoq; sermonē exordiamur. Sed. n. cum sensuum alij quidem interni dicantur, alij externi, illos Cerebro, tantū instrumento proprio vtī, apud omnes pænē pro confesso habetur, modū tamen ipsum nemo fortasse adhuc est, qui aperuerit, cum ferē sic euenire videamus, nostra vtī anima infinitarum rerum cognitionis sit capax, & in diuinarum quoq; scientiā penetrēt, seipsam tamen, immersa his corporis vinculis, intelligere ne utiquam possit. Externorū vero sensuū domicilia quinq; sunt, q̄ totidem reperiuntur obiecta, quæ sensibus obuersantur: non tamen omnia in cranio collocata sunt, sed quatuor tantū, diffuso per totū corpus quinto, quod Tactui debetur. Exordiemur ab *Oculo*, qui visui dicatus est, cum & subtilissimo obiecto gaudeat, & hanc mortalium vitam beatā ex omnibus quā maxime reddat, quo sine voluptas nulla, nulla iucunditas est, cū immensam hanc rerū pulchritudinem eum necesse sit fugere, qui visu destitutus perpetuis tenebris vrgetur.

Dicitur autem *Oculus*, ὁφθαλμός Græcis, quasi ὠπός ὕλας, sedes ac domiciliū visus, & vel externus est, de quo libro primo actum fuit, vel internus. *Externus* dicitur, qui citra dissectionem conspicuus est, ad quem referuntur supercilia, palpebræ, tarsi, cilia, tum glandulæ, & foramen lacrymale: *interior*, contra, qui dissectionis beneficio innotescit. Conficitur hic ex musculis, adipe, vasis, tunicis, & humoribus. De *musculis* a libro quarto dictum est: de *adipe* pauca monenda sunt, si dicamus, copiosum satis oculis apponi, interiectum inter musculos & vasa, qui seruit ad eosdem irrigandos, ne in motu, qui perpetuus quasi & continuus est, exsiccentur. *Vasa* omnis sunt generis *Vena*, à jugularibus ortæ: *Arteria*, à Carotidibus: *Neruorum* duplex genus, b vnum sensum primario impertiens: c alterum, motum: illud primum par, & Opticum: hoc, secundum,

cundum, & Motorium vocatur: ceterum vtriusq; historia libro septimo enarrata est. Restat ergo vt hic de solis tunicis humoribusq; agamus.

Tunica.

De *Tunicarum* numero magna lis est inter Anatomiarum procures, quam ipsam vt declinemus, inspectioni potius, quam authoritati insistamus, sed & hac diuisione euitabimus. *Alias* enim dicimus tunicas, quæ ipsum oculi globum efformant, pro humorum receptione: *alias*, quæ adnascuntur oculo, vt alligent vicinis partibus: nonnullas demum, quæ humores ipsos immediate cingunt, ne inter se confundantur. *Primi ordinis sunt*, quæ propriè oculorum tunica vocantur. *secundi*, quæ impropiè: *tertij*, quæ humorum membranæ appellari quam commodissimè queant. *Primi ordinis*, ab optico neruo efformantur, qui^d cum triplici constet substantia, (conflatur. n. ex duabus cerebri membranis, dura tenuiq; cum ipsa eiusdem molli natura) à se (in nullo id alio totius corporis neruo videre est) mutuo separata, mox expansa, & se conglobante, tres quoq; sunt numero, ^e *vna*, crassa, à dura; ^f *altera*, tenuior, à tenui; & ^g *ultima*, mollis, à cerebri ipsissima substantia producta. *Prima*, ^h Dura dicitur: *secunda*, ⁱ Vnea; *tertia*, Retina, vel Retiformis. ¹ *Secundi ordinis*, duæ sunt: *altera* enim à pericranio constituitur, & ^m Adnata vocatur; *altera*, à tendinibus musculorum oculorum duræ tunicae implantatis, & Innominata appellatur, quasi incognita Veteribus nomen indepta haud fuerit, cum tamen expressam ipsius mentionem Galenus, 10. de vsu part. 2. fecerit, vbi, ad circulum, inquit, sextam quadam tunica extrinsecus propè accedit, in duram tunicam inserta, in quam musculorum oculos mouentium eneuationes (id est, tendines) finiunt. Prior ergo ex his, orbitæ; posterior, musculus, oculum alligat. Humorum cum tres sint, (vt postea dicitur,) Aqueus quidem nullam habet membranam, quæ ipsum coërceat: at Crystallinus, & Vitreus membrana cinguntur, quas opportunè Crystallinam, Vitreamque dicemus. ⁿ *Dura ergo tunica*, Græcis σκληρώδης dicta, omnium oculi membranarum substantia durissima, crassissimaque est, situ extrema, colore cinereo. Hanc nonnulli Arabes secuti in duas diuidunt, posteriorem inquam, & priorem; illi totius nomen tribuunt, hanc à substantiæ similitudine *Corneam* appellant. Pellucida enim est instar laminæ corneæ bouinæ, eundem etiam colorem refert: magnitudine tamen alteri vsque adeo cedit, vt non vltèrius se extendat, quam crystallini humoris est ambitus. Rotunda ergo quoque, velut ipse est, perque eam iridem, & pupillam apertis oculis extrinsecus, tanquam duas hæc partes cooperientem intuemur. Gibbæ sedem anteriorem habet, at posticam concauam, densa, dura, æqualis ac tensa. ^o *Vnea*, ab optico neruo vsque ad iridis ambitum, siue Coronam, sese expandit, ac totam eam oculi partem, quam dura vsque ad corneam, cingit. Atra est in vtraque sua facie, sic tamen, vt in exteriori color hic facile à digitis detergatur, at in interiori inseparabilis sit. In bobus interior cærulea est, externa perpetuo nigricat. Hanc Herophilus folliculo vuae nigræ, ex qua succus, cum gigartidis expressus est, haud ineptè assimilauit, ^p *αγοειδὴν* vocans. Cum enim colore conueniant, foris quoque vt folliculus hic, læuis est, intus asperiuscula, ante perforata, vnde & alijs *περιμμένη* appellatur. Foramen hoc *Pupilla*, Græcis *κορη*, & quia nigrum esse solet, *Nigrum oculi* quibusdam dicitur, ea sede exsculptum, quæ centrum corneæ ambit. Est autem in homine, rotundum: in boue, ouale: in fele, fissura instar oblongum, cui dilatatio ac constrictio, pro ratione lucis vehementioris aut debilis ingressu vel recessu, com-

d, 10. 12. 1.

e, a. a.

f, bb.

g, c c

h, BB

i, DC

l, F.

m, G.

n, 10. 12.

fig. quidē

2. facie ex

teriore.

at 3. inter-

iore de-

lineatur.

o, 10. 12.

fig. 4 ac

extero-

re: sed 5.

interna

sede con-

spicua.

Dura.

Cornea.

Vnea.

Pupilla.

su, competit. Cæterum membranam hanc similiter vt duram in duas nonnulli, auctoritatem sequentes Arabum, diuisere, quarum priori totius nomen tradidere, *Vueam* vocantes: posteriorem *χοροειδῆ*, *Chorioformem*, dixere, quod Chorij in modum plurimis venulis arteriolisq; interna sui sede sit perfusa. At enim cum nullibi discrimen reperire sit, ne præter necessitatem immensam rerum nostri corporis copiam augeamus, vnicam constituere satius est, quam *Vueam* appellare cum Herophilo, quod commodissime nomen hoc inuentum fuisse videatur, fas erit. *Retina*, vel *Retiformis*, *ἀμφιβληστροειδής*, quod figuram exprimat retis rotundi, quod in aquam orbiculariter projicitur, & *ἀμφιβληστρον* vocatur, *ἀμφὶ τὸ ἀμφιβάλλειν*, quod circumijcere significat: Latini euericulum dicunt. Hæc à nerui optici medio & extremo, mucosa, rubescens nonnihil, ad crystallinum vsq; humorem, cuius ambitu complectitur, sese extendit. *Adnata*, *ἐπιπεφυκός*, *Adnata*, à pericranio originem suam ducit, quod vbi palpebram succinxerit, reflectitur, & totum illum album oculi bulbum, quem citra dissectionem in viuis intuemur, vsq; ad corneam circumferentiam contegit. *Innominata* autem à tendinibus musculorum ocularum mouentium producit, qui sub adnata tunica progredientes, in eandem propè irritidem locum terminantur. *Crystallina*, quam & *Araneam*, & *ἀραχνόειδῆ* Græci vocant, à tenuitate, qua aranearum telas æmularur, æqualis est, densa, læuis, eiusdem & figuræ, ac magnitudinis, cuius est crystallinus humor, quem succingit, non tamen paris vbiq; crassitie. Anterior enim pars, quæ aqueum humorem respicit, sic tenuis est, vt multis occasionem præbuerit dubitandi essetne crystallinus humor membrana, inuolutus: posterior, crassiuscula videtur. *Vitreæ*, *ὕαλοειδής*, humoris vitrei tunica, tenuissima, alba, ac læuis, quæ facile se prodat, cum ea incisa, quem continet, humor effundatur. *Humorum interni oculi tres sunt*, 1. *Aqueus*, 2. *Crystallinus*, 3. *Vitreus*, à rebus illis, quibus quam simillimi sunt, suum nomen indepti, & eodem, quo recensuimus ordine, in oculo siti. *Aqueus* enim, aquæ instar fluidus, nullaq; interceptus tunica, angustijs illis, quæ inter corneam, *vææ* q; foramen & crystallinum sunt, anteriore maxime sede intercluditur, quantitate quoq; reliquis admodum cedens, Hunc sequitur *Crystallinus*, *κρυσταλλοειδής*, aranea contentus membrana, concretæ glaciei purissimæ æmulus, lenticularis potius, quam exactè sphaericæ figuræ, quæ causâ est cur à Ruffo Ephesio *Lenticularis oculi pars* fuerit vocatus. *Vitreus*, siue *ὕαλοειδής*, quod vitrum liquefactum, colore, consistentia, ac splendore exprimat, copiosissimus, à tergo crystallini, quo quintuplo maior, situs, totumq; ferè oculi bulbum adimplens.

A C T I O *Oculi* nulli non manifesta est, nimirum *Visio*: at *vsus* partium ipsius præcipui non rectius queunt explicari, quam Visionis ratione sedulo percepta. Ad hanc tria requiruntur, instrumentum, obiectum, & quod vtrumque intercedit, medium. *Instrumentum* est *Oculus*; *Obiectum*, *res* visibilis; *Medium*, aër illustratus, & à re visibili, maximeque eius colore, affectus. Aërem enim affici ab obiecto visibili, immutariq; pluribus experimentis nullo negotio probari potest. Candida namq; induti veste, si æstiuo tempore ac sereno sub vironte consideant arbore, viridi colore à folijs, veluti tingi videbuntur. Hæc aëris mutatio non quatenus aër est eidem accidit, (non enim illustratus nihil huiusmodi patitur) sed quatenus diaphanus est ac perspicuus, & verbi gratia, à solis radijs illustratus. *Lux* namq; corporis colorem attingens, coloratur; sensus au-

tem formam citra materiam suscipit. Ob hanc ergo causam duabus ex partibus inter-
nus oculus exstruitur, ex diaphanis inquam, & opacis. Diaphanæ sunt, ex tunicis qui-
dem, Cornea, Aranea, ac Vitrea, omnesque humores: cæteræ membranæ, opacæ. Dia-
phanæ ergo partes anticam oculi sedē occupant, vt ab affecto aere & ipsæ afficiantur,
ab illuminato & ipsæ illuminentur: opacæ cōtra, in posteriore, & à lateribus sitæ sunt,
vt lumē melius clariusq; per diaphana corpora penetret & splendescat. Sic in profun-
do putei fundo, si obscurissimus sit, meridianis horis stellæ comparebunt. Cæterū cum
in omni organo pars vna sit, cui potissimū actio refertur accepta, quæ & primaria pro-
pterea dicitur, in oculo quidem plerorumq; fere omnium Anatomicorum consensu
humor Crystallinus illa perhibetur. Ego vero in visione duas præcipue partes constituen-
das arbitror, vnam, quæ lumen immutatū sentit, alterum, quæ recipit: illa, (ni fallor)
retina est tunica; hæc, vitreus humor. Hic enim, quam crystallinus, optico neruo mul-
to est vicinior, vltimamq; propterea & maximam suscipit refractionem. Merito ergo
Cornea gibba exterius est, vt in oculum magna corpora aliæq; res visibiles, etiam ex obli-
quo inciderent: *interius conuexa*, vt humori aqueo, (sub ea enim totus continetur,) con-
ueniens spatium tribueretur. Eundem vt retineret, neve aut difflueret, aut exhalaret,
densa facta est; & ne perumperetur, aut facile erosa damnum acciperet, tum à fumo
acribusq; foris incidentibus, tum à lacrymis excidentibus, *dura est exstructa*. *Equalis ac*
tensa, ne species visibiles corrugatæ offerrentur: Diaphana vero, vt lux ad humores, qui
lucis in oculo refractiones efficiunt, transiret. Prima enim in aqueo fit cum cornea; se-
cunda, in crystallino; tertia in vitreo. Fit namque visio per refractionem: refractione di-
uersa corpora postulat, diuersaq; magnitudinis, ac splendoris. Rursus inter opacas par-
tes tunica *Dura* facta est, ad oculum in sua rotunditate conseruandum. *Vvea*, nigra in-
terius & exterius, vt aqueus crystallinusq; humores obscurarentur impenius, sicque
lux oculum subiens splenderet magis, ac colligeretur. absque hoc enim foret, ad pro-
fundum locum non penetraret. *Foramen uveæ datum*, vt res visibiles admitteret: *Crystal-*
lina ac Vitrea, vt suos humores terminent, ne diffluent.

CAPVT X.

De Aure interna, siue organo Auditus.

AVRIS. **A**VDITVS organum, *Auris* dicitur, à vocibus hauriendis, quod eius est officium.

Externæ. Hæc duplex est, vna externa, altera interna, eadem sane ratione, atque Oculum ge-
minum diximus. **EXTERNÆ**, Græcis diminutiue ὤτιον dicitur, quos Latini recte
imitati *Auriculam* vocant: Interna, totius nomine gaudet, ac verum præcipuumque au-
ditus est organum. Appellationes illius, partesque ^a libro primo persequuti sumus, hic
figuram tradamus, quæ pæne ovalis, si latitudinis circumferentiam spectes: sin altitu-
dinis, exterius, vbi occipitum respicit, magna ex parte gibba; interius, tribus cauitati-
bus sinuata. *Prima*, intima est, ^b auditorium meatum constituens, & ad tympani vsque ^{b, 1. 1. 3. h.}
membranam penetrans: *Secunda*, quæ hanc immediate ambit, latiuscula, ac ^c Concha ^{c, c.}
dicitur: *Tertia*, sub oris auriculæ reflexa, totam fere ipsam circumit, & innominata re-
manfit. *Componitur* ^d *superior auriculæ pars*, ex cartilagine, cute tenui, & membrana, ^{d, a.}
Partes si- *milares.* *carnosa*, per quarum externam superficiem, quæ caput spectat, exiguæ venæ atque ar-
teriolæ

a, cap. 1.

b, 1. 1. 3. h.

c, c.

d, a.

e. b.

teriolæ à venis iugularibus, tum carotidibus arteriis ortæ, excurrunt. ^c *Inferior pars* (Lobus dicta) ex molli spongiosaque carne constat, cute obiecta, citra membranam carnosam. Ipse autem *auditorius meatus*, partim cartilagineus est, vt foris, partim osseus, vt sede interna. Cæterum *Vsum Auriculæ* egregie nobis clarum reddunt, quibus vel frigoris iniuria periit, vel gladio abscissa est, cum articulum sonum nequaquam apprehendunt, sed fluentis instar aquæ murmur duntaxat percipere sibi videantur. Percussus enim aer, neque præparatus, neque collectus prius à cavitatibus auriculæ, in meatum auditorium compellitur. Ipsa autem auricula cartilaginea est, vt commodè omnibus externis resisteret, nec tamen in se mollitie concideret, quo pacto & aliæ partes extremae è cartilagine, (vt superius libro tertio diximus) exstructæ fuerunt.

Auditorius meatus.

Interna.

Cavernæ Prima.

Secunda.

Tertia.

Membræ

Officula.

Musculus

Actio.

f. cap. 1.

g. 2. 6. 8. S. S.

h. cap. 9.

i. cap. 5.

l. cap. 2.

m. 10. 12.

9. G.

n. 10. 22.

10. A.

9. B.

p. 10. 12.

11. A.

2. B.

r. 10. 12.

8. A.

f. 10. 12.

9. C.

f. G.

u. D. E. E.

INTERNA auris in osse temporum consistit, sed ea eius parte, quam s. os petrosi appellamus. Habet hæc cavernas tres, membranas, officula tria, musculos duos, & nervum. De *officulis*,^h libro secundo actum est; de *musculis*,ⁱ quarto: de *nervo*,^l septimo: Cavernæ ergo, & membranæ hic explicandæ erunt.

Cavernarum^m prima, *Tympanum* à nonnullis Recentioribus vocatur, quia tympano bellico instrumeto cum sua membrana impendio quam similis est. Hæc omnium maxima, ossis petrosi principio insculpta ea sede est, quæ mammillaris processus radicem, & sinum, qui maxillæ inferioris capitulum suscipit, intercedit. Continet autem in se tum aerem illum, quem implantatum Philosophi appellant, tum duo foramina, n. vnum maiusculum, per quod in secundam cavernam itur: o alterum minus, quod in tertiam tendit. p. *Secunda*, *Labyrinthus* dicitur, & in ossis petrosi radice insculpta, rotunda est, in innumeros & anfractuosis meatus, magna ex parte posterius ad mammillaris processus interiora tendentes, desinit. q. *Tertia*, quam *Cochleam* appellant, omnium minima est, cochlearumque gyros perquam affabre exprimit, in anteriore sede processus petrosi sub primæ cavitatis tuberculo sita.

Membranarum complures sunt, pellucidæ, ac aranearum telarum instar tenues, quæ priores duas cavernas, nonnullosque in labyrintho meatus inuestiunt. r. Vna est præ cæteris maxime nobilis, à Barbaris *myrinx*, à Recentioribus quibusdam *Tympani membrana* vocata. Hæc rotunda est, cæteris crassior, s. annulo illi osseo, qui t. tympano, siue primæ cavernæ circumiicitur, quæqua versum adnata, adeoq; & veluti septum quoddam eam ipsam ab auditorio meatu separans. Post hanc in eadem caverna u. tria officula continentur, à figura Malleus, Incus, stapesque dicta; musculusque exiguus, quem supra Internum auris internæ vocauimus.

Auditus, siue actio auris, vt Recentiores asserunt Anatomici, accidit, cum sonus, qui solidorum corporum velociter percussorum qualitas sensibilis est, vicino aeri, tanquam proprio subiecto, impressa, ad aurem internam, & eius præcipue membranam tympanum obcingentem, per continuatum aerem defertur. Ingreditur enim hic

aer commotus primam cauernulam, in qua implantatum illum aerem mouet,

quo commoto reliquus, qui in aliis continetur cauernis,

agitur, & ad nervum tandem pertingit, à

quo percipitur.

CAPVT XI.

De naso interno, sive olfactus instrumento.

NASVS. **I**NSTRVMENTVM Olfactus nonnulli, vulgi sententiam sequuti, nasum esse arbitrantur. Galenus, modo anteriores cerebri ventriculos, modo processus mammillares autumat, quia tamen hæ partes concurrere ad olfaciendum videntur, dicamus Olfactus instrumentum ex duplici constare parte, externa nempe, & interna. *Externa,* Nasus vulgo dicitur, & tribus *ex ossibus* constat, de quibus ^a libro secundo actum est: *ex* ^a, cap. 12. *ossibus cartilaginibus quinq;* quarum historiam in ^b tertio persequuti sumus: tum *cute membrana-* ^b, cap. 2. *que carnosæ,* quarum tractatio sub generali continetur, quæ ^c libro octauo exhibuimus. ^c, cap. 1. Illius membranæ enarratio omiſſa adhuc est, quæ interius nasi foramina investit, & acutissimum habet sensum, tenuis, & rubicundi coloris. Hæc, quo cerebro vicinior fit, maximeque circa elatiorem nasi regionem sensum acquirit exquisitiorem. mox vero, cristosum os succingit, ac foraminulis totidem, quo ipsum, pertunditur, per quæ mucosus humor grauedine pressio capite, exstillat, vacuaturque.

INTER-**N**US. **O**S **C**RI-**B**ROSUM. **P**ROCESSVS **C**EREBRI **M**AMMILLARES. Cæterum *interna partes instrumenti olfactus*, siue nasi interni, *os sunt cribrosum*, crassa & ex sanguine membrana obcrustatum ea sede, qua cerebrum respicit, tum *processus mammillares*. Ex cerebri enim anterioribus partibus ^d duo veluti tubercula vaccarum mammis similia prominent, quæ ideo *mammillares* (ab aliquibus, *papillares*) *cerebri processus* vocantur. His subiacer ^e anterior pars (incumbens adeo ossi cristoso,) octauo paris nervorum cerebri, per quos ad cerebrum deferri, apprehendi autem primum odores per processus mammillares credimus, cum os cribrosum ad odoratum primario non concurrat, sed tantum odoribus viam concedat. ^d, eleganter expressio. 10. Q. Q. ^e, F. F.

CAPVT XII.

De gustus, tactusque instrumentis.

GVSTVS tactusque instrumenta hic iungimus, quod Gustus vel Aristotele teste, cui omnes subscribunt, quædam tactus sit species. De neutro tamen multa dicenda sunt, quod omnium quoque confessione, Gustus instrumentum sit Lingua, cuius historia in ^a libro quarto recensuimus, quanquā primaria pars unica illa sit, qua obcingitur. Nerui deinde, quas partim à quarta, partim septima coniugatione eorum, qui à spinali medulla, dum in cranio adhuc est, oriuntur, accipit, superius quoque libro septimo sunt explicati. De Tactus organo à diuerso lites mouent Dissectionum Professores innumeras, quia tamē certum est, immediatum aliquod constituendum esse, quod competat partibus tam diuersis tactu præditis, Cuti, Membranæ, Neruo, Tendini, Carni, non melius possumus, quam si dicamus, Carnem esse, non illam intelligentes, quæ vulgo sic vocatur, sed quicquid fibris nerveis constipatur, ac molle est. Sic facile infinitis nos subtrahemus disputationibus, quas Philosophi Medicique instituant, modumque inueniemus, qui sententiam vtrorumque necet.

GRATIAS TIBI DOMINE IESV.

RERVM



RERVM ET VERBORVM IN DECEM DE HVMANICOR- PORIS FABRICA LIBRIS ME- MORABILIVM

I N D E X.

<p>A.</p> <p>Abdomen. 10. improprie pro imo ventre sumitur. <i>ibid.</i></p> <p>Abdominis compressio. 142. quo fine instituta. <i>ibid.</i></p> <p>Abdominis muscoli qui dicantur esse. 138. nihil ad respirationem faciunt. 130.</p> <p>Abdominis oblique descendentes muscoli. 139. eorum vera origo. 132. <i>vsus.</i> 143</p> <p>Abdominis oblique ascendentes muscoli. 140. eorum <i>vsus.</i> 143</p> <p>Abdominis recti muscoli. 140. eorum actio, & <i>vsus.</i> 144</p> <p>Abdominis transversi muscoli. 141. eorum actio & <i>vsus.</i> 147</p> <p>Abdominis pyramidales muscoli. 141. eorum actio & <i>vsus.</i> 147</p> <p>Acetabulum. 34</p> <p>Adeps. vide Pinguedo.</p> <p>ἄδην & στερον quid sit. 268</p> <p>Aer non generat spiritus vitales. 365</p> <p>Aethiopes cur nigri. 264. cur capillos habeant breves. 271</p> <p>Ἀρρώμιοι. 62</p> <p>Amgdalae quae Chirurgis dicantur. 363</p> <p>Anastomoses venae portae & cauae in iecore. 189. quem usum praestent. <i>ibid.</i> & seq.</p> <p>Anastomosis venae mammariae & epigastricae sub</p>	<p>rectis abdominis musculis. 343</p> <p>Ancoriformis processus. 62</p> <p>And. Laurentii de implantatione vasorum deferentium in vterum sententia notatur. 336.</p> <p>eiusdem de peritonaei crassitie opinio falsa. 276</p> <p>Animalia bruta in dorso pilosiora. contra ac Homo, & quae eius rei causa. 270. pilosiora sunt ratione regionis in qua degunt, & cur. 271</p> <p>Animalia hyeme cur pinguescant magis, quam aestate. 273. quae venas habent, habent & arterias, & cur. 221. quaedam sanguinea, alia vero exsanguia, & quam obrem. 213</p> <p>ἀντίades. 363</p> <p>ἀπὲρ τοῦ κυάμων quid denotarit apud Pythagoricos. 320</p> <p>Apophysis. vide Processus.</p> <p>Apoplectici cur diaphragmatis motum, resolutione totius corporis facta, liberum tamen aliquamdiu habeant. 251</p> <p>Aristotelis opinio circa usum Cerebri laudatur. 382. à multis male, non intellectus, reprehenditur. 382</p> <p>ἀρμεία unde dicatur. 219</p> <p>Arteriae etymologia. ib. homonymia. ib. synonymia. <i>ibid.</i></p> <p>220. definitio. <i>ibid.</i></p> <p>Arteria aspera. vide Pulmonum aspera arteria.</p> <p>Arteriae actio & vsus. 221</p> <p>Arteriarum differentiae. 222. à magnitudine. ib. progres-</p>
--	---

progressu. ib. situ. ib. connexione.	ibid.	Aures, & earundem partium appellationes.	8
Arteriarum fibræ in interiore tunica transuersæ, in	ib.	Aurium motus. 122. musculi.	ibid.
exteriore rectæ & obliquæ. 220. & cur.	ib.	Auris interna. 389. eius cavitates, ibid. meatus. ibid.	ibid.
Arteria duplici membrana constant.	ibid.	membrana.	ibid.
Arteriarum membrana sensu carent.	221	Author non discedit à Galeni sententia, nisi victu so-	
Arteriarum sanguis tenuis.	ibid.	colorum inspectione.	325
Arteriarum pulsus à corde influit.	ibid.	αὐχὴν ἐσοῦ.	33
Arteriæ corporis extima, vt vena, non accedunt.	222	αἰθῆρος vena.	198
Arteriæ etiam in ossa penetrant.	ibid.		
Arteriarum spiritus non contaminantur, etsi recipiant humores excrementitios.	232	B asilica vena, vide Vena basilica.	
Arteria magna ortus ex corde. 223. diuisio in truncum ascendentem & descendentem. ib. quas partes vterq; truncus alat.	ibid.	Biceps musculus.	154
Arteriæ magna truncus ascendens. ibid. descendens.	227	Βρῆχια.	364
Arteriæ mesentericæ. 234. trahunt chylum ex Galeni sententia. ib. & 231. purgant quoq; humores excrementitios.	232	Βρῆχος.	363
Arteriæ carotides.	225	Buccarum motus. 118. musculi.	ibid.
Arteria axillaris.	ibid.		
Arteria venalis. 236. non ducit aerem à pulmonibus ad cor.	237	C æci nonnulli à vulnere fronti influcto, alij à subito oborta dysenteria visum receperunt.	244
Arteriæ præparantes viri. 319. ex trunco enascuntur.	ibid.	Cacitæ repetitina quibusdam à sternutamento nimio oborta.	243
Arteria splenica. 229. eius vsus multiplex, & notatu dignissimus.	230	Calcaneus. 83. eius latera.	ib.
Arteria secunda dextræ cordis ventriculi cur vena corpus nacta.	359	Calidum cur duplex à Natura factum, influens scilicet & innatum. 355. cur in corde, seu fonte, influens stabulari voluerit.	356
Αρθρὸν. 35. ambiguitas.	ibid.	Calidum influens in corde vt refrigeretur.	366
Αρθρῶδία.	37	Calidum quot modis conseruetur.	365
Articulus. 34. ambiguitas.	ibid.	Calidi nimis cur non pinguescant.	272
Artus. 13. proportio. 26. dextræ partis maiores. ib. à quibus causis proportio variatur. ib. sunt æquales in corpore.	ibid.	Calor cur in spiritu recumbat.	222
Aspera arteria. vide Pulmonum aspera arteria.		Calor vnus idemq; est, qui in Ventriculo chylum, in Hepate sanguinem, in Mammis lac generat.	325
Atrabilarij humores per quas vias expurgentur. 232		Caluaria. vide Cranium.	
Auditus oscicula 48. eorum numerus. ib. substantia.		Caput. vide Supremus venter.	
ibid. magnitudo. ibid. historia. ibid. instrumentum.	389	Caput ossis. vide Ossis caput.	
Auditorius meatus.	ibid.	Capitis, eiusdemq; partium externarum appellationes. 3. pili. 368. cuticula. 369. pinguedo. 370. membrana carnosæ.	ibid.
		Capitis figura. 21. magnitudo.	ibid.
		Capitis motus. 126. musculi.	ibid.
		Capilli. 368. eorum substantia. ibid. partes. ibid. situs. ib. magnitudo. ib. materia. ib. figura. non teres, sed quadrangula. ibid. differentia penes ætatem,	

- ratem, sexum, regionem, temperamentum, &
 habitum corporis. 369. vsus. *ibid.*
 Caput longum, breue, latum, acuminatum, ro-
 tundum, 21
 Cardinalis Cibonis obitus. 310
 Carnium quatuor genera, & qua. 108
 Carnis in musculis vsus. 109
 Caro fibrosa quo modo praecipua musculi pars di-
 catur esse. 108
 Caro maxime necessaria musculi pars, *ib.* non ta-
 men in omnibus musculi partibus eam reperire
 est. *ibid.*
 Caro immediatum tactus instrumentum, & quo-
 modo. 269
 Carotides arteria. 225. ligata somnum inducunt,
 quod demonstrauit Columbus Pifis, teste Val-
 uerda. *ibid.*
 Carpus. 77. eius figura. *ib.* connexio. *ib.* motus. 156.
 musculi. *ibid.*
 Cartilago quid. 88. eius vsus. 89. differentia. *ibid.*
 quaedam nulli parti connexa, quaedam iun-
 ctæ. 90
 Cartilagine palpebrarum. 91. nasi. *ib.* auriculae.
 92. laryngis. *ib.* aspera arteria. 93. thoracis. *ib.*
 infimi ventris. 94
 Cartilago ensiformis. 93
 Cartilago thyroidea. 92. cricoides. 93. arytenoi-
 des. *ibid.*
 Caruncula myrtiformes pudendi muliebris. 13.
 330. earum situs, & numerus. *ib.* vsus 337
 Cavitas Hippocratis inter ventriculorum & septum
 transuersum conclusa quæ sit. 291
 Cephalica vena. vide Vena Cephalica.
 Cerebrum 373. eius etymologia. *ibid.* substantia.
 374. magnitudo. *ib.* figura. *ib.* superficies. *ib.*
 Cerebri diuisio. *ibid.* & 375
 Cerebri & cerebelli discrimen. 374
 Cerebri substantia duplex, cineritia, & alba. *ib.*
 Cerebri membrana. 371. earum synonymia. *ibid.*
 substantia. *ib.* figura. *ib.* magnitudo. *ib.* nume-
 rus. *ibid.*
 Cerebri membrana crassa. 372. eius situs *ib.* con-
 nexio. *ib.* superficies vtragq; *ib.* foramina. *ib.* pro-
 cessus duo. *ib.* sinus quatuor. *ibid.*
 Cerebri membrana tenuis. 373
 Cerebrum an inflammetur. *ibid.*
 Cerebri processus mammillares. 250. 390
 Cerebrum secandi duplex ratio, antiqua, & no-
 ua. 375
 Cerebri corpus callosum. *ibid.*
 Cerebri ventriculi quot sint ex opinione Veterum.
ibid.
 Cerebri duo ventriculi anteriores. *ibid.*
 Cerebri ventriculus tertius. *ib.* eius foramina. *ib.*
 Cerebri ventriculus quartus. 376. quid sit reuera.
 Cerebri septum lucidum. 375 (381
 Cerebri ventriculos succingens membrana. *ibid.*
 Cerebri infundibulum. 376
 Cerebri glandula pituitaria. *ibid.*
 Cerebri rete admirabile. *ibid.*
 Cerebri testes. *ibid.*
 Cerebri nates. *ib.* quid sint reuera. 380
 Cerebri actio & vsus. 381
 Cerebri vsus non bene nouerunt Veteres, & cur. *ib.*
 Cerebri vsus vnde petendi. *ibid.*
 Cerebrum cordis refrigerandi gratia conditum,
 Aristoteles statuit, & quam bene. *ibid.*
 Cerebrum spirituum animalium generandorum
 gratia factum Galenus censuit. *ibid.*
 Cerebrum cur in cranio situm. 383
 Cerebrum cur homini maximum. *ibid.*
 Cerebri substantia sui generis est. *ibid.*
 Cerebri membrana cur facta. *ibid.*
 Cerebellum. 377. eius etymologia. *ib.* situs. *ib.* sub-
 stantia. *ib.* magnitudo. *ib.* figura. *ib.* color. *ibid.*
 partes. *ib.* globi. *ib.* processus vermiformes. *ib.* fi-
 nns. *ibid.*
 Cerebelli pons. 380
 Cerebrum secandi noua ratio. 378. quæ inter
 ipsam & antiquam sit differentia. *ib.* ad eam
 quale caput requiratur. *ibid.*
 Cerebri ventriculi reuera duo tantum. 384. quis
 eorum verus vsus. *ibid.*
 Ceruix appendicis. 33

cervix. <i>ib.</i> eius motus. 128.	masculi. <i>ib.</i> pulmonum	cor non est musculus.	350
gratia condita.	64	Cor quoad basin exquisite mediū thoracis obtinet.	
Chordapsus.	281	356. at non ratione mucronis, & cur.	<i>ib.</i>
χειρα.	34	cordis adeps.	350
Chylus quid.	290	cordis membrana.	351
Chylificatio absoluitur ope caloris ventriculi, con-		cordis vasa.	<i>ibid.</i>
terminarumque partium.	<i>ib.</i>	cordis auricula. <i>ibid.</i> earum numerus. 352. vt disse-	
cibo concocto cur plus vrina, quam nondum abso-		rant inter se. <i>ib.</i> vsus.	359
luta chylificatione reddamus.	230	cordis ventriculi. 352. eorum numerus, an tres sint,	
claves olim ad similitudinem Latinorum longius-		vel duo. <i>ib.</i> differentia. <i>ibid.</i> facies interior. 353.	
culi facte.	59	vsus.	355
clauicula in homine vnde dicta. <i>ibid.</i> earum figura.		cordis septum. 353. an sanguinem transmittat ex	
<i>ib.</i> numerus. <i>ibid.</i> connexio. <i>ibid.</i> substantia. <i>ib.</i>		dextro ventriculo in sinistrum.	358
vsus.	<i>ib.</i>	cordis caruncula.	353
clauicula si frangantur iuxta sternum cur hume-		cordis vasa quatuor. ex basi eius erumpentia.	<i>ib.</i>
rus subito cum scapula decidat.	138	cordis valvula. <i>ib.</i> earum differentia. <i>ib.</i> vsus.	358
clitoris. 329. eius substantia. <i>ib.</i> erigitur scemini, vt		cordis expers animal. an viuere queat.	351
viris penis. <i>ib.</i> ligamenta. <i>ib.</i> crura. <i>ib.</i> glans. <i>ib.</i>		cordis facultas motrix an à cerebro per neruos in-	
glandem tegens cutis. <i>ib.</i> musculi.	<i>ib.</i>	fluat, vt censuit Piccolhomineus.	<i>ib.</i>
clitoris saepe in magnitudinem eam intumescit, vt		cordis actio est pulsus. 354. vide Pulsus.	
minus peritis Anatomia mulieres in viros dege-		cordis scrobiculus.	60
nera affectantur.	<i>ib.</i>	cor maius homini est, ac brutis, & quare.	356
clysteres totum corpus purgare, si ex medicamentis		cordis figura pyramidalis, & quamobrem.	<i>ib.</i>
purgantibus componantur.	232	cordi pulsus innatus, arteriis influens.	221
clysteres in agris quibusdam ad ventriculum ascen-		cordis vasorum vnio in foetu qualis. 359. quomodo	
dere posse.	296	pereat ex opinione Hieronymi Theobaldi.	360
coitus an vltimis gestationis mensibus proficius,		corporis humani figura. 17. quam sit variabilis. 18.	
necne.	339	quantum referat ipsam scire.	<i>ib.</i>
colum, & ipsius partium appellationes.	8	corporis humani magnitudo. 17. quantum disse-	
colli figura. 22. longitudo, latitudo, ambitus.	<i>ib.</i>	rat secundum aetatem, <i>ibidem.</i> sexum, regiones,	
collum tenue, & crassum.	<i>ib.</i>	& morbos. 19. an sit minor hodie, quam fuit o-	
collum appendicis.	32	lim.	20
colon intestinum, vide Intestinum colon.		corporis transpiratio diligenter omnibus addiscen-	
convivere quid Hippocrati significet.	335	da.	292
consensus vteri cum mamma vnde fiat. 141. 199.		corpus varicosum.	319
qualis sit.	207	costa thoracis. 69. earum numerus. <i>ib.</i> diuisio. <i>ibid.</i>	
consensus inter pericranium, & duram membra-		substantia, <i>ib.</i> cartilagine. <i>ib.</i> connexio. <i>ibid.</i> fi-	
nam.	371	gura. 70. magnitudo. <i>ib.</i> vsus.	<i>ib.</i>
contractio musculorum.	103	cotyledones vteri. 334. eorum vsus.	338
cor. 349. eius etymologia. <i>ibid.</i> situs. <i>ib.</i> figura. 350.		cranii vsus. 42. substantia. <i>ib.</i> crassities. 43. figura.	
superficies. <i>ibid.</i> magnitudo. <i>ib.</i> substantia. <i>ibid.</i>		<i>ib.</i> superficies. <i>ib.</i> lamina.	<i>ibid.</i>
connexio.	<i>ibid.</i>	crista galli quodnam os dicatur.	50
		crista	

Crista, pro alis vulva sumitur.	329		
Cubiforme os.	84	D.	
Cubiti motus. 154. musculi.	ibid.		
Cucullares musculi.	150	Δεφτὸς.	319
Cuneiformia ossa. 84. eorum numerus. ib. maius.	ib.	Deslorare virginem phraſis vnde nata.	331
ib. minus. ib. medium.	ib.	Dens magnus Hippocratis.	65
Cunnius, vox obscana.	328	Dentes, & eorum appellationes.	7.55
Cuticula. 261. eius substantia, ibidem. sensus expers	ib.	Dentium substantia.	ibid.
ibidem. causa materialis, & efficiens, ib. conne-	ib.	Dentium figura. ib. non omnibus similes.	ib.
xio. ib. vsus.	ib.	Dentium cavitas. ib. non vbiq; est, sed iuxta radi-	
Cutis. ib. quomodo nervea dici queat. 262. aliis cras-		cem tantum. ib. membrana succingitur. ib. dif-	
sior, aliis tenuior, idque pro ratione sexus, etatis,		fert ratione etatis, & dentium.	56
regionis, &c. ib. varii coloris est, similiter penes		Dentium vasa.	ib.
etatem, regionem, sexum, temperamentum,		Dentium alveoli. 55. dentibus numero & figura re-	
263. diuersi est temperamenti. 265. sensu omnis		spondent. ib. pereunt cum dentibus.	ib.
pradita.	ib.	Dentium articulatio. ib. est triplex.	ibid.
cutis superficies.	ib.	Dentium superficies.	56
cutis foramina, partim conspicua, partim inconspi-		Dentium magnitudo.	ib.
cua.	ib.	Dentium numerus. ib. cur differens apud authores.	
cutis tota in homine immobilis.	266	ib. magnus laudatur à Physognomis.	ib.
cutis connexionem cum subiectis partibus non vbi-		Dentium vsus.	57
vis aequalem habet.	ib.	Dentes primas qualitates, non itere secundas sen-	
cutis ratione pilorum differens.	ib.	tiunt. 56. & cur.	ib.
cutis paucas habet arterias.	ib.	Dentes incisores. ib. vsus.	ib.
cutis actio, & vsus.	ib. & seq.	Dentes canini. ib. figura eorum. ib. munus.	57
cutis ab interna parte non exacte sentit, nec		Dentes oculares qui dicantur, & quare sic vocentur.	
inter calidum frigidumque distinguit.		ibidem.	
269		Dentes molares. ibid. numerus eorum. ibid. figura.	
Cutis an sit tactus organum. ibidem. in homine cur		ibidem.	
pilis interpellata, nec vti in aliis animalibus		Dentes sapientia.	ibid.
continua.	270	δέρμα.	261
cutis raritas quomodo ventris constipationem in-		Diaphragmatis historia. 133. in omnibus est duplex.	
ducatur.	268	ib. eius productiones.	ib.
cutis temperamentum medium in omnibus quali-		Diaphragmatis motus duplex. 129. quomodo na-	
tatum excessibus, & cur.	267	turalis dici queat.	ibid.
cutis sua temperie debilis, & cur.	ibid.	Diarthrosis ossium. 36. quotuplex.	ibid.
cutis capitis crassa. 369. sensu reuera pradita, sed		Digitum manuum. 14. pedis.	17
obtusum.	ib.	Digitum manuum motus.	158
cutis capitis cum crassissima sit, qui tenuis-		Digitum manuum ossa.	78
sima cuticula tegatur. 262. at sub calce densa		Digitum pedis ossa.	85
cuticula vestiatur.	263	διχτοειδὲς πλέγμα.	376
Cystica gemella.	191	διπλὸν.	43

<i>Dispnea perpetua ab artibus, quibus pleura pulmo</i>	<i>Falx dura cerebri membrana.</i>	371
<i>alligatur, fibris, interdum nascitur.</i>	<i>Faucium musculi.</i>	124
<i>δωδεκάδακτυλον ἔντερον.</i>	<i>Febris quartana gigantes interdum facit.</i>	20
<i>Dolores circa os sacrum & pubem post partum</i>	<i>Femur, eiusq; partium appellationes.</i>	16.
<i>difficilem vnde.</i>	<i>Femoris motus. 162. musculi,</i>	ibid.
<i>Dormientibus quo in latere decumbendum.</i>	<i>Fibra sanguinis.</i>	179
<i>Dorsum. 9. eius longitudo.</i>	<i>Fibula. 81. eius appendices. ib. linea tres.</i>	82
<i>Duodenum intestinum. vide Intestinum duodenum.</i>	<i>Figura alicuius partis externa & media quid sit.</i>	

E.

<i>ἐκτετατοί qui dicantur.</i>	20
<i>ἐλυστροειδής membrana,</i>	319
<i>Emendatio loci 1. histor. anim. 16. Aristotelis.</i>	288
<i>Enarthrosis.</i>	36
<i>ἔντεα.</i>	292
<i>ἐπιδερμὶς.</i>	261
<i>Epiglottis.</i>	93
<i>Epilepsia praeludium quomodo in palpebris, facieq;</i>	
<i>quibusdam se offerat.</i>	245
<i>Epiphysis.</i>	32
<i>ἐπιπλοον.</i>	282
<i>ἐπιπλοοκοτίτης αἱ.</i>	283 (obrem. 244)
<i>Errhina in oculorum affectibus fugienda, & quam-</i>	
<i>Error medicorum notatur, qui agris de frigiditate</i>	
<i>conquerentibus frigidos humores causam sta-</i>	
<i>tuunt.</i>	270
<i>Explicatio loci Aristotelis, qui est 1. hist. anim. 16.</i>	
<i>288. Alterius, qui habetur 3. histor. anim. 11.</i>	
<i>269. itemque alius, 2. depart. anim. 6. 39. &</i>	
<i>tandem 1. generat. anim. 2.</i>	323
<i>Explicatio loci Hippocratis 6. epid. sect. 6. 268. Al-</i>	
<i>terius ex Coacis pranotion. 228. item lib. de na-</i>	
<i>tur. mulier.</i>	330
<i>Explicatio aliquot aphorismorum Hippocratis diffi-</i>	
<i>cilium. Primo, 24. sect. quinta, 223. Deinde, 32.</i>	
<i>sectionis eiusdem, 234. Tercio, 54. sect. ultima.</i>	
<i>291. Quarto, 51. sectio. quinta, 335. Quinto, 15.</i>	
<i>sect. sexta, 194. Sexto, 55. sect. 7.</i>	285
<i>Exspiratio quid sit. 364. eius usus.</i>	365

F.

<i>Facies, & eius partes.</i>	3
<i>Facultas animalis.</i>	240

G.

<i>Gastrocnemius musculus.</i>	167
<i>Γαστήρ quandoq; pro vtero sumitur.</i>	331
<i>Generacioni dicata partes Viri cur duplices.</i>	323
<i>Genitales partes Viriles. 12. muliebres. ib. & seq.</i>	
<i>Genitalia grauidarum in quibus à non grauida-</i>	
<i>rum partibus, & quomodo differant.</i>	339
<i>Germani Italici cur pilosiores.</i>	271
<i>Gibber.</i>	76
<i>γύγλον &.</i>	37
<i>Glandula vasorum diuarcationi dicata.</i>	180
<i>Glandulae seminales. 320. earum substantia. 321.</i>	
<i>magnitudo.</i>	ibid.
<i>Glandularum seminalium tunica interior poris</i>	
<i>peruiam numeris. 320. quomodo hi pori depre-</i>	
<i>hendantur.</i>	321
	Glan-

- Glandula pituitaria cerebri. 376
 Glans pinealis. ibid.
 Glandulis Natura ad serositates absumendas per totum corpus vsa est. 326
 γλῶν. 34
 Glutei musculi. 163
 γμφοσις. 37. articulatio propria dentium. 55
 Grauedo vnde oriatur. 50
 Grauida cur de alui duritie conquerantur. 281
 Gula. 288. eius synonymia. ib. etymologia. ib. origo, & progressus. ib. membrana tres. ibid. vasa. ibid. glandula. 289. vsus. ib. actio. ibid.
 Gustus instrumenta. 390
- H.**
- H**æmorrhoides cæcæ vel apertæ. 192. diuturna non claudendæ. 194. non inferunt necessario hydropem, vel tabem sanata, sed vtrplurimum tantum. 195. non fiunt tantum à sæculo lento sanguine, sed & à bile & pituita. ib. nonnunquam insaniam inducunt. ib. interdum dysenteriam. 196
 Hæmorrhoidales venæ. 192. vide & Venæ hæmorrhoidales.
 Hæmorrhoidales arteria. 231
 ἁμυνία. 37. exquisita raro datur. ib.
 Hepar. 302. eius etymologia. ib. situs. ib. connexio. ib. figura. ib. protuberantia. ib. lobus. ib. sinus. ib. fissura. ib. magnitudo. ib. numerus. ib. substantia. ib. vasa. ibid.
 Hepatis duoligamenta. ibid.
 Hepatis porta. ib.
 Hepar excarne quid sit. 190. quomodo faciendum. ibid.
 Hepatis situs naturalis. 279. non naturalis. ibid. præternaturalis. ib.
 Hepar aliquando in lævo hypochondrio situm. ib.
 Hepar cur in mortuis sub spuris cartilaginibus reconditum inueniatur. ib.
 Hepar, quibus magnum, iis magnus quoque ventriculus. 302
- Hepatis magnitudo pro ratione ætatis differens. ib. magnitudo præternaturalis. 279
 Hepar plures vena porta ramos, quam caua obtinet. 303. iidem per anastomoses iunguntur. ib. & cur. 304
 Hepatis actio. ib. vsus. ib.
 Hepatis parenchyma quem vsus præstet. ib.
 Hepar cur homini maximum. ib.
 Hepatis substantia eür parenchyma. ib.
 Hepatis sanguificatio in quo differat à sanguificatione lienis. 312
 Hepar non sanguificat in suo parenchymate. 304
 Hepatis lobus per quem aqua hydropicorum in omentum interdum irrupit. 287
 in Hepatis inflammatione cur agri in læuo latere nequeant decumbere. 280
 Hernia quomodo fiat. 277. qui herniæ magis sint obnoxij. ib. cur stantibus magis, quam decumbentibus herniæ fiant. 281
 Hieron. Theobaldi de perditione vñionis vasorum cordis, quæ in fœtu comparet, sententia elegantissima. 360. eiusdem de permutatione vasorum vmbilicalium in ligamenta opinio. 361
 Homo cur caput parte posteriore pilosum habeat. 270
 Homines nostri an breuioris stature sint, ac priusci. 20
 Humeri motus. 152. musculi. ib.
 Humor oleaginosus vesicularum seminalium. 320. in coitu copiose effunditur, & qua de causa. 327
 Humor osium. 38. aliquando deficit. ib. aliquando abundat. ib.
 Hydropicorum aqua, per quas vias in omentum irrumpat. 285. & seq.
 Hymen membrana. 13. 330. reuera datur. ibidem. cur interdum non reperiatur. 331. in maturis virginibus, quam iunioribus crassior. 330. raro imperforata. 331. forma florem refert. ibid.
 Hystericus affectus quomodo generetur. 333

I

Icterus non nascitur meatu cystico vesicae biliaris obstructo, sed aut utroque, aut certe communē. 309

Jecur. vide Hepar.

Ileum. vide Intestinum ileum.

Iliac.

II

Incus auditus osiculū. 48. eius caput. ib. cavitās, ib. crura. ibid.

Infimus venter, & ipsius partes externa. 10. magnitudo, & à quibus causis ea variatur. 24

Infimi ventris viscerum situs. II. 278

Infimi ventris partium diuisio. 260

Infundibulum cerebri. 376

Inspirationis pulmonum vsus. 365

Intercostales musculi. 134. quot sint. ibid.

Interscapulium. 62

Intestina. 292. eorum synonyma. ib. situs. ibid. connexio. ib. initium. ibid. magnitudo. ibid. substantia ibid. vene. ibid. arteria. 293. nervi. ibidem substantia mucosa. ib. numerus. ibid. varia differentia. 294

Intestinorum longitudo. 293

Intestina foris pinguedinem adnatam habent, quod contra medicos quosdam notandum. ibid.

Intestinorum varia diuisiones. 294

Intestina tenuia, & crassa quae dicantur. ibid.

Intestinorum actio. 297. vsus. ibid.

Intestinorum obscurus motus quis sit. 298. quomodo demonstrari queat. ibid.

Intestinum duodenum. 294. eius ortus. ib. progressus. situs naturalis. ibid.

Intestinum jejunum. 281. eius principium. ibidem. vasa. ibid. longitudo. ibidem. plicae. ibid. situs naturalis. 281. praeternaturalis. ibid. à ventriculo cibis repleto comprimitur. ibid.

Intestinum ileum. 294. eius initium. ibid. etymologia. ibid. plicae. 295. substantia. ibid.

Intestinum caecum. 281. eius figura ibid. magnitudo

ib. in sano semper inane. ibid. aliquando inuentum verme plenum. ibid. situs praeternaturalis. ibid. in quodam suspensio cum ileo & colo herniam fecit. ibid.

Intestinum colon. 295. eius ortus. ibid. connexio. ibid. longitudo. ibid. figura. ibid. cellula. ibid. ligamentum. ibid. appendicula. 296. vasa. ibid.

Intestini coli valvula. ib. interdum laeditur, ut adeo feces ascendere queant, ut & clysteres. ibid.

Intestini coli situs naturalis. 281. in quodam suspensio fecit herniam. ibid.

Intestinum colon in quibusdam longius, in aliis brevius. ibi. mutat situm ventriculo pleno. 282. ambulantibus & sedentibus magis descendit, quam decumbentibus ibid. gravidis utero aucto ascendit. ibid. à lateralibus partibus situm nequaquam mutat. ibid.

Intestinum rectum. 296. magnitudo eius. 297. & vasa. ibid.

Intestina crassa cur tenuibus magis sint obnoxia viceribus. 281

Itali Germanis cur minus pilosi. 271

ἰντες.

34

K

Καρχία quid olim dicebatur. 60

κεφαλή τῶ ὀσφ. 33

κίον quis morbus apud Hippocratem. 330

κόρυς & osium. 33

κοτυλεδόνες. 334

κρεμασῆρες musculi. 148

L

Labia. 7. eorum motus. 119. musculi. ibid.

Lacertus. 101

λάρυξ quid proprie significet. 363

Larynx. 363. eius situs. ibid. vasa. ib. glandula. ibid.

cur ex rima constet. 366

Barynxis motus. 124. musculi. ibid.

Latera. 9. eorum longitudo. 23

ληγόν

Herophili.	372	li.	ibid.
Lien. 309. eius situs. ibid. numerus. ibid. connexio. ibid. magnitudo. ibid. figura. ibid. superficies. 310. substantia. ib. membrana. ibid. color. ibi. vasa. ib. actio.	311	Lingua cur in ardentibus febribus nigrescat causa vera.	224
Lienis situs naturalis. 280. non naturalis. ibid. praternaturalis.	ibid.	Lumbi.	11
Lienis magnitudo praternaturalis viginti tres libras pendens.	ibid. & 309	Lumborum motus. 147. musculi.	ibid.
Lienis futura.	309	M	
Lienis caput & cauda, quid Hippocrati.	ibid.	Macrocephali.	21
Lien acciuius & decluius quid eisdem.	ibid.	Malleolus internus. 83. externus.	ibid.
Lienis vasorum anastomosis diligenter notanda. 313		Malleoli male Tali à medicis dicuntur.	16.
Lien non dolet.	ibid.	Malleus auditus ossiculum. 48. eius capitulum. 49. processus. 48. inuentor.	ibid.
Lien ut attrahat crassum chylum.	312	Mamma.	9
Lien aliquando in dextro hypochondrio situs.	280	Mammarum magnitudo. 23. quomodo variet. ib. in nutrice considerata.	24.
Lien in sanis cur tactu non deprehendatur.	309	Mamma puellis infantibus non apparent: pubescentibus erumpunt: mensibus aptis, attolluntur: gravidis, intumescunt.	344
Lienis via per quas expurgatur ad ventriculum. 310 alia ad nares. 311. ad vrinas. ibidem. ad podicem ibidem.		Mammilla virorum. 343. ex quibus consistit. ibid.	
Lienosis cur diuretica ab Hippocrate prescribantur.	ibid.	Mamma foeminarum. ib. ex quibus partibus consistit. ibid. earum canales lactiferi. ibid. venae. ibidem. arteriae. ibid. nervi. ib. magnitudo. ibid. vsus.	344
Lienis vsus ab Aristotele optime propostus.	311	Mammosa foemina libidinosiores.	208
Lien sanguinem purissimum generat.	311	Mammillares cerebri processus.	249
Lien non potest esse receptaculum humoris excrementitii. ibidem. multo minus melancholici.	ibid.	Manus, & eius partes.	13
Ligamentum quid. 94. eius vsus. ib. differentia. 95		Manus lineae. 14. monticuli.	ibid.
Ligamenta carent sensu.	94	Manus, siue carpi motus. 156. musculi.	ibid.
Ligamentorum alia lata, alia teretia. 95. alia membranea, alia cartilaginea.	ibid.	Masticatoria in oculorum affectibus adhibenda, non errhina.	244
Ligamenta capitis. 96. thoracis. ibid. imi ventris. 97. artuum.	ibid.	Maxilla inferior. 7. superior.	6
Ligamenta annularia manus. 98. pedis.	99	Maxilla inferioris os. 53. homini breuissimum. ibid. & rotundum. 54. ex vnicò osse constat adultis. ib. mobile. ib. durum, crassum.	ibid.
Ligamentum transversale carpi.	158	Maxilla inferioris motus. 120. musculi. ib. figura. 54. processus duo. ib. foramina duo. ib. asperitates tres. ib. cavitates.	55
Ligamentum ossium.	37	Maxilla superioris ossa. 51. connexio. 52. futura.	ib.
Linea candida. 139. semilunaris.	ibid.	Mediastinum, vide membrana Mediastinum dicta.	
Linea vite in manu, vite longitudinem monstrat.	14	Medius venter. 341. eius cuticula. 342. cutis ib. pinguedo. ib. membrana carnosae.	ibid.
Lingua frenum. 96. motus. 122. musculi.			Medu-

Medullam non esse osium alimentum probatur.		Motus animalis, musculi beneficio peragi-	
39. quem vsus præstet.	ibid.	tur.	103
Melancholia hypochondriacæ sedes.	230	Motus tonicus.	ibid.
Membrana carnea. 274. cur carnea dicatur ef-		Motus voluntarius quis dicatur.	241
se, cum reuera sit neruea. ib. in multis anima-		Mulieri sanguinem vomenti erumpentibus mensi-	
libus musculi munere fungitur. ib. in quibusdā		bus cur solutio fiat.	234
locis in homine carnea quoq; est. 275. in recens		Musculus vnde dictus. 101 an Aristoteles cognoue-	
natis rubra. ib. sensu exquisito prædita. ib. hor-		rit. ib. Hippocrati cognitus. ib. apud Aristotelem	
rores vellicata excitat. ib. eius vsus. ib. non ita		caro dictus.	ibid.
bene à pinguedine distinguitur.	ibid.	Musculi definitio secundum Galenum. 102. secun-	
Membrana Mediastina dicta. 347. eius etymolo-		dum Authorem.	104
gia. ib. substantia. ib. superficies. ib. magnitudo.		Musculus motus animalis instrumentum.	102
ib. vsus.	ibid.	Musculus pars dissimilis. ib. quomodo pars simi-	
Membrana pleura. 345. eius appellationes. 346.		laris interdum dicatur.	ibid.
substantia. ib. vasa. ib. figura. ib. superficies. ib.		Musculi propria actio que.	103
magnitudo. ib. foramina. ib. exortus. ib. vsus. ib.		Musculorum motus quatuor sunt.	ibid.
Membrana ὄσχος. 319. δρῆς. ibid. ἐλυθροειδής.		Musculorum figura media & extrema.	ibid.
ibid. ἐλικοειδής.	320	Musculi quidam semper in media sunt figura. ib.	
Membrana cerebri ventriculos succingens.	375.	Musculorum constructio.	104
Membrana viscerum in vi ventris vnde nascan-		Musculorum partes dissimiles quæ ib. vulgo ma-	
tur. 277. non ubiq; æqualis crassitie, sed cras-		le definiuntur. ib. probatur. ib. quomodo defi-	
siores, quorum viscerum arteria plures sunt. ib.		nienda, ex sententia authoris.	105
Menses per quas venas effluant, ex observatione		Musculorum finis male ἀποτέλεισις, aut τέλεισις,	
Authoris.	207. 335	sive tendo dicitur.	ibid.
Menses pudenda laxant.	207	Musculorum partes similes. ib. quadam ex his	
Mentula magna, itemq; parua, cur improbe-		communes, quadam propria. ib. & seq.	
tur.	25	Musculos excarnandi modus.	106
Mentula muliebri.	329	Musculorum differentia ex tribus classibus petita,	
Μεσαράιον.	299	primo, ex ijs quæ totum musculi corpus respi-	
Μεσεντέριον.	ibid.	ciunt. 110. secundo, quæ dissimiles partes con-	
Mesenterium. ib. à Gaza Lactes vertitur. ib. diui-		cernunt. 111. tertio, quæ similes.	113
sio. ib. figura. ib. magnitudo. ibid. substantia. ib.		Musculorum varia forma.	110
vasa. ib. glandula. 300. connexio. ib. exortus. ib.		Musculorum qui maximus. ibid. minimus 111.	
adeps. ib. vsus.	ibid.	crassissimus.	ibid.
Μεσώκωλον.	299	Musculorum numerus valde controuersus.	ibid.
Metacarpus. 77. figura. ib. substantia. ib. magni-		Musculorum caput quot differentias habeat ratio-	
tudo.	ibid.	ne substantia. ib. figura. ib. magnitudinis. 112.	
Metatarsus. 85. eius ossa. ib. & eorum magnitudo.		numeri. ib. situs.	ibid.
ibid.		Musculorum venter quot differentias habeat, ra-	
Μεταχένιον.	62	tione substantia. ib. figura. ib. magnitudinis. ib.	
Mons Veneris.	329	numeri.	ibid.
Motus duplex, naturalis, & animalis.	102	Musculorum finis quot differentias complectatur,	
		ratione	

ratione substantia. ib. figura. ib. magnitudinis.	116	Musculi oculorum.	116
ib. numeri. ib. situs.	ibid.	Musculi ossis hyoidis.	123
Musculorum tendo quot discrimina faciat ratione		Musculus palmaris.	157
figura. 113. magnitudinis. ib. numeri.	ibi.	Musculi palpebrarum.	115
Musculorum alij nervos habent, alij nervis destitu-		Musculi pedis.	167
untur. 105. & 113		Musculi pedis digitos flectentes. 169. extendentes.	
Musculorum doctrina quantas difficultates habeat,		170. ad latera trahentes.	ibid.
& quomodo tollenda.	113	Musculi penis. 149. vsus.	ibid.
Musculorum divisio.	ibid.	Musculus plantaris.	168
Musculorum nomina & appellationes vnde peten-		Musculi radij.	155
da.	114	Musculi scapulae.	150
Musculorum numerus immensus. ib. & incertus. ib.		Musculi thoracis qui vocentur. 129. quot sint reue-	
quomodo tamen facile addiscendus. ib. & verus		ra.	133
numerus inveniendus.	ibid.	Musculi tibiae.	165
Musculi abdominis. 138. Obliq. descendentes. 139.		Musculus trochlearis.	117
Ascendentes. 140. Recti ib. duo habent principia		Musculus vesicae.	148
ex opinione authoris, 143. Transversi. 141.		μύρτον quid Veteribus in pudendo muliebri di-	
Pyramidales. ibid. non reperiuntur in omnibus.		ctum.	329
142. & quando non reperiuntur. ib. quem vsum			
habeant.	ibid.		
Musculorum abdominis vsus duplex.	ibid.	N	
Musculus ani. 149. est duplex.	ibid.	Nasus, & eius partium appellationes.	4
Musculi auricularum. 121. aurium.	ibid.	Nasi motus quot. 118. musculi.	ibid.
Musculi buccarum.	118	Nasus internus.	390
Musculi capitis.	126	Nates.	11
Musculi carpi.	156	Natura muliebris.	328
Musculi cervicis.	128	Nauiculare os. 83. eius pars connexa, & conca-	
Musculi cubiti.	154	ua.	84
Musculi faucium.	124	Nervus 238. eius homonymia. 239. propria signifi-	
Musculi femoris.	162	catio. ib. definitio. ibid. substantia.	ibid.
Musculi frontis qui sint. 115. rectius superciliarum		Nervorum vsus.	241
musculi dicendi. ibid. ijs laeis palpebra deci-		Nervorum alii molles, alii duri.	ibid.
dunt.	244	Nervi omnes teretes.	ibid.
Musculi humeri.	152	Nervorum exortus diuersus.	242
Musculi intercostales. 134. quot sint. ib. cur quidam		Nervorum primi, secundi, quinti, atq. octavi paris	
plures ac Author ponant.	ibid.	verus ortus.	380
Musculi labiorum.	119	Nervorum doctrina utilitas.	238
Musculi lumborum.	135	Nervi quasi omnibus musculis insunt.	109
Musculi manus digitos flectentes. 158. extendentes.		Nervus in musculo aut principium, aut medium,	
160. obliq. trahentes.	161	nunquam in finem inseritur.	ibid.
Musculi maxilla inferioris.	120	Nervi in musculum insertio qualis.	ibid.
Musculi nasi.	117. & seq.	Nervi in musculum distributio qualis.	ibid.
		Nervi ex innumeris funiculis contexti.	239
		Nervi non sunt distincti in sensorios motorios-	
		Eee	que.

que.	240	Oculus semiapertis dormire in acutis morbis cur le-	
Nervorum olfactoriorum verus ortus.	390	thale.	245
Nervorum aliqui tantum sensum ferunt, alii sen-		Oculus quo pacto extra orbitam possit procidere.	
sum & motum.	240	ibidem.	
Nervorum paria triginta octo. 242. ex quibus octo		οιοφραγος.	288
cerebri dicta. 243. septem medulla cervicalis.		Olfactus instrumenta.	390
249. duodecim dorsalis. 252. quinque lumbo-		Omentum. 282. eius substantia. 283. magnitudo. ib.	
rum. 254. sex ofis sacri.	255	figura. ib. connexio. ib. membrana, siue ala dua.	
Nervorum cerebri historia. 243. verus ortus.		ib. origo. ib. vasa. ib. vsus.	ib.
380.		Omentum homini saepe pubis ossa attingit. i-	
Nervi brachiorum. 255. crurum.	258	bidem.	
Nervi optici reuera perforati.	243	Omenti situs naturalis. 282. dum stamus, curri-	
Nervi recurrentes. 247. iis praeclis vox perit, &	ib.	mus, equitamus, descendit. ibid. quandoque supe-	
quamobrem.	ib.	rior membrana locum mutat, quandoque infe-	
veūp & quid significet.	239	rior. ibidem. obesit descendit ob pondus. ibidem.	
Neutra ofium articulationis. 37. quotuplex ea sit.		obesum vteros comprimit, ut steriles fiant. ibid.	
ibidem.		intestinis flatibus repletis inuoluitur. ib. in hernia	
Nutritio an fiat humoribus excrementitiis.	215	descendit.	ibid.
		Omentum ex Galeni sententia connectitur Ventri-	
		culo, lien, & colo. 283. imo vero & hepati. 287.	
		& quomodo.	ibid.
		Omentum quibus abscissum est, iis frustratur cibi	
		concoctio.	283
		Omentum concoctionem iuuat.	ibid.
		Omenti, ex Hippocratis sententia vsus improba-	
		tur.	ibid.
		Omentum cur homini, quam brutis maius.	284
		ὀππες.	34
		ὀρε & membrana.	319
		Os. 28. unde dicatur. ib. quid sit.	ib.
		Ofium cognitio quam utilis, & necessaria sit.	27
		Ofium doctrina fundamentum Anatomiae.	ib.
		Os pars simplex, & quomodo.	28
		Os quot vsus praestet.	29
		Ofium differentia. ib. à temperamento. ib. à figura.	
		ibid. à meatibus. 30. à superficie. ib. à magnitu-	
		dine. ib. à numero 31. à situ. ib. à sensu. ib. à tem-	
		pore generationis.	ib.
		Ossa virorum duriora foeminarum ofibus.	29
		Ossa puerorum mollia.	ibid.
		Ossa non omnia aequè dura.	ib.
		Ossa cur plura, non vnum, à natura factum.	31
		Ofium	

O.

Obesi cur difficilius respirent decumbentes. 279.
cur infecundi. 272

Observatio de subcauo oculi. 6. de mentula lon-
ga. 25. de pudendo muliebri. ibidem. de pedi-
bus longis. 26. de humore articulari. 38. de vn-
guibus. 87

Oculus, & eius partes. 5. 6. 385

Oculus internus. 385

Oculorum motus. 116

Oculorum muscoli. ibid.

Oculorum adeps. 385

Oculorum vasa. ib.

Oculorum tunica. 386. earum numerus, apud Au-
thores incertus. ibid. qui tamen facile cognosca-
tur. ibid.

Oculorum tunica Dura. ibid. Cornea. ibid. Adnata.
387. Innominata. ib. Crystallina. ibid. Aranea.
ibid. Vitrea. ibid.

Oculorum humores. ib. tres sunt, ib. Aqueus. ib. Cry-
stallinus. ib. Vitreus. ibid.

Oculi actio, & vsus. ibid.

- Osium sine aliquod principium, quale venarum.*
 40. & quodnam id sit. *ibid.*
Ossa ex duabus constant partibus ex præcipua, & aânata. 32
Osium compositio. 35. *quotuplex.* *ibid.* *κατὰ σὺνθεσιν.* *ib.* *κατὰ ἀφ' ἑαυτῶν.* 36
Osium nutrimentum quod. 38
Osium appendix. 32. *processus.* 33. *sinus.* *ib.* *capita.* *ibid.* *cervices.* *ibid.*
Osium appendicum vsus. 32
Osium omnium numerus. 41. *osium capitis numerus.* *ibid.* *thoracis.* *ib.* *imi ventris.* *ib.* *artuum.* *ib.*
Osicula tria auditui inferuentia. 48. *quis inuentor eorum.* *ibid.*
Os coccygis. 68. *ex pluribus osiculis componitur.* *ibid.* *eius substantia.* *ib.* *connexio.* 69. *in mulieribus extrorsum nonnihil vergit.* *ibid.*
Os coxendicis. 71. *eius acetabulum.* *ibid.* *sinus.* *ibid.* *appendix.* 72. *duo tubercula.* *ibid.*
Os cribriforme. 50. *vide & Os spongiosum.*
Os cubiti, vel Vlna. 75. *quid commune cum radio habeat.* *ibid.* *quid proprii habeat.* 76. *eius sinus sigmoides.* *ibid.* *processus sinus eius.* *ibid.* *processus styloformis.* *ibid.*
Os cuneiforme. 49. *connexio.* *ibidem.* *substantia.* *ibidem.* *processus.* *ibidem.* *sinus.* *ibidem.* *foramina.* 50
Os femoris. 79. *eius substantia.* *ib.* *figura.* *ibid.* *connexio.* *ib.* *appendices dua.* *ibid.* *processus duo.* *ibid.* *foramina.* 80
Os frontis. 45. *eius figura.* *ibid.* *connexio.* *ibid.* *substantia.* *ibid.* *cauerna.* *ibid.* *foramina.* 46. *processus.* *ibid.*
Os humeri. 73. *eius appendix superior.* 74. *capitulum superius.* *ib.* *appendix inferior.* *ibid.* *trochlea.* *ibid.* *sinus duo.* *ibidem.* *tubercula duo.* *ibidem.* *foramina.* 75
Os hyoides. 58. *vnde dictum.* *ibidem.* *eius synonymia.* *ibid.* *est os multiplex.* *ibidem.* *quot osibus constet.* *ibidem.* *basis osis hyoidis.* *ibid.* *cornua osis hyoidis.* *ibid.* *processus osis hyoidis.* *ibidem.* *connexio.* *ib.* *vsus.* *ibid.*
Os is hyoidis motus. 123. *musculi.* *ib.*
Os ilium. 71. *eius spina.* *ibid.* *costa.* *ib.* *dorsum.* *ib.* *connexio.* *ib.*
Os innominatum. 70. *vnde dictum.* *ibid.* *ex quibus osibus componatur.* *ibid.* *differentia in vitroque sexu.* 72
Os iugale. 51. *eius partes.* *ibidem.* *situs.* *ibidem.* *vsus.* *ibidem.*
Ossa maxilla superioris sex. 52
Os occipitis. 46. *eius figura.* *ibidem.* *numerus.* *ibid.* *substantia.* *ibidem.* *superficies.* *ibidem.* *foramina quinque.* 47
Os pectoris. 59. *ex quibus osibus constet.* 60. *substantia eius.* *ib.* *figura.* *ib.* *vsus.* *ib.*
Ossa pubis. 72. *foramen eorum.* *ib.* *an dehiscant in partu.* *ibid.* *an moveantur.* 132. 145. *qualiter moveantur.* *ibid.*
Os sacrum. 67. *vnde dictum.* *ibidem.* *non est vnum.* *ibid.* *foramina.* 68. *processus.* *ibid.* *an dehiscat in partu.* 72
Ossa scapularum. 61. *figura eorum.* *ibid.* *tria latera.* *ibid.* *anguli tres.* *ibid.* *connexio.* *ibid.* *substantia.* *ibid.* *processus tres.* *ibid.* *cervix.* *ibidem.* *spina.* 62. *vsus.* *ibid.*
Osicula sesamoidea manuum. 78. *situs eorum.* *ib.* *figura.* *ibid.* *numerus.* *ibidem.* *connexio.* *ibidem.* *vsus.* *ibid.*
Osicula sesamoidea pedum. 85
Os spongiosum. 50. *eius partes quatuor.* *ibid.* *& partium vsus.* *ibid.* *præternaturam expurgat cerebri excrementa.* 51
Ossa syncipitis. 46. *eorum numerus.* *ibid.* *connexio.* *ib.* *superficies.* *ibid.*
Ossa temporum. 47. *eorum figura.* *ibidem.* *connexio.* *ibidem.* *substantia.* *ibidem.* *sinus duo.* *ibid.* *foramina quinque.* *ibidem.* *processus quatuor.* *ibidem.*
Os tibia. 80. *appendices dua.* *ibidem.* *sinus.* 81. *tuberculum.* *ibidem.* *capitulum laterale.* *ibidem.* *tuberculum anterius.* *ibidem.* *tres lineæ.* *ibid.* *tria latera.* *ibid.*
Ostiola venarum. 180

P.

P almaris musculus.	157	Penis differt magnitudine pro ratione familiarum, frequentia coitus, &c.	321
Palpebra. 5. earum motus.	115.	Penis non fit minor, vt vulgus putat, si umbilicus brevius abscindatur.	ib.
ibid.		Pericardium. 348. eius synonymia. ib. substantia. ib. figura. ib. vsus.	349
Palpebra. cur prolabatur: supercilii musculo la- so.	244	Pericardii humor. 348. ipsius differentia ratione copia & coloris. ib. eius generandi ratio.	ibid.
Pancreas. 301. eius substantia. ibid. figura. ib. situs.		Pericranium. 370. eius connexio & consensus cum dura membrana.	ib.
ib. membrana. ib. vsus multiplex.	ib.	Perineum.	16.
Papilla. 9. 344. earum magnitudo. 24. sensus ex- quisitus. 344. vsus.	345	Peritonæum.	275
Paralyfis imperfecta quomodo interdum colicos dolores sequatur.	233	Peritonæum. ib. vnde dicatur. ib. eius figura. ibid. superficies. ib. substantia. ib. connexio.	276. ori- go. ib. foramina. ib. vsus.
Paraſtate. 319. eorum ortus. ib. situs. ib. insertio.		Peritonæum non ubique eadem tenuitate pradi- tum.	277 276
ib. substantia. ib. membrana.	ib.	Peritonæum non aequalem in omnibus, quæ succin- git visceribus, crassitiem habet.	ib.
Paraſtate semen elaborant. 324. & quidem vi propria.	ibid.	Peritonæi processus, & quæ vasa vehant.	277
πεπερηχια.	108	Peritonæum largitur membranas omnibus imi ventris membranis.	276. circa Vesicam & V- terum duplicatum.
πεπερηχια.	363	Pes, & eius partium appellationes. 15. magnitudo in proportionato corpore.	26
Partes diuersæ qui diuersas res generent.	325	Pessaria virginibus danda non sunt.	331
Partes imi ventris quæ sint quas vena porta, quas- ve cava nutrit.	276	περυζ quandoque pro Larynge sumitur.	363
Parella. 80. eius vsus. ib. substantia. ib. connexio.		περζος.	21
ibidem.		Pilorum materia quæ sit.	270
Pectus. 9. eius longitudo.	22	Pilos nutriri.	212
Pedis motus. 167. musculi.	ibid.	πικαλ.	271
Pelvis, quæ cavitatis apud Anatomicos dicatur.	72	Pinguedo.	ibid.
Penis, & eius partium appellationes. 12. homony- mia. 321. situs. ibid. figura. ibid. magnitu- do. ibidem. partes externæ & internæ. ibidem.	327	Pinguedinis materia sanguis. 272. nō tamen qui- vis, sed maxime elaboratus. ibid. & qui oleosus.	ibid.
actio.	322	ibidem.	ibid.
Penis musculi.	322	Pinguedinis efficiens.	ibid.
Penis vasa.	ib.	Pinguedinis generatio qualis. ibid. quas conditio- nes requirat.	274
Penis glans. 323. eius sensus acris. ib. substantia. ib.	ib.	Pinguedinis vsus duplex.	ibid.
foramen.	ib.	Pinguedinis temperamentum.	273
Penis frenum.	ibid.	Pinguedinis & sani differentia.	271
Penis septum pellucidum.	322	Pinguedinis differentia in copia ratione sexus, et a- tis, tem-	
Penis duo nervosa corpora.	321		
Penis canalis. 322. eius exortus. ib. foramina. ib.	ibid.		
substantia. ib. musculi.	ibid.		
Penis fibræ pectiniformes.	ibid.		

<i>tis, temperamenti, regionis, vitæ generis, temporis anni, & morborum.</i>	273	<i>tur, & cur.</i>	339
<i>Pinguedo circa membranas maxime concrefcit, & cur.</i>	272	<i>Pudenda menfium tempore valide laxantur.</i>	207
<i>Pinguedo an fentiat.</i>	273	<i>Pueri cur nequeant loqui.</i>	29
<i>Pinguedo mufculis quibusdam adnafcitur.</i>	108	<i>Pueri cur pingues non fint.</i>	272
<i>Pinguedo iis eft, quæ vtrinque dentata.</i>	271	<i>Pulmo. 362. etymologia eius. ibid. fynonymia. ibid.</i>	
<i>Pinguedo cum fæuo à Medicis quandoq; confunditur. ib. & feq. imo & à Galeno ipfo.</i>	272	<i>partes. ib. linea diuidens. ib. lobi. ib. figura. ibid.</i>	
<i>Pinguedo capitis.</i>	370	<i>magnitudo. ibidem. connexio. ibid. fubftantia. ibidem. membrana. ibidem. vafa omnis generis. ib. actio.</i>	364
<i>Pituita quomodo expurgetur.</i>	49	<i>Pulmonarii qui dicantur.</i>	362
<i>Pituita collecta in cavitatē quæ inter ventriculū & diaphragma eft quomodo dolores concitet.</i>	292	<i>Pulmo fætus rubicundior, durior, ac grauior, quam adulti, ftatimque fubmergitur, ifto natante.</i>	ibid.
<i>Plantaris mufculus.</i>	168	<i>Pulmonum afpera arteria. 363. eius partes. ib.</i>	
<i>Pleura, vide Membrana pleura.</i>		<i>Pulmonum fiftila. ib. eius membrana duplex. ib.</i>	
<i>Pleuritis.</i>	345	<i>cartilagine. 364. truncus. ib. diuifio. ib.</i>	
<i>Plexus pampiniformis.</i>	319	<i>Pulmonum bronchia.</i>	ib.
<i>Plexus choroides cerebri.</i>	375	<i>Pulmo fanguine ab aliarum partium fanguine diuerfo nutritur.</i>	357
<i>πλέυρα.</i>	346	<i>Pulmo cur non venofo fanguine nutriri debuerit. ib. neque arteriofo.</i>	ib.
<i>πένυμων, & πένυμονες.</i>	362	<i>Pulmo inflammatus quomodo resolutionem inferat.</i>	228
<i>Pori cutis.</i>	265	<i>Pulfus quid. 221. cordi innatus. ib. cordis arteriarumque fit fimul.</i>	ib.
<i>Pollicis flexores. 159. extenfores. 160. ad latera abductores.</i>	161	<i>Pulfus cordis actio.</i>	354
<i>Portæ Hepatis.</i>	302	<i>Pulfus ex dilatatione, conftictione, & intermedia quiete conftat.</i>	ib.
<i>πύλη.</i>	323	<i>Pulfus efficiens caufa.</i>	ib.
<i>Præputium.</i>	ibid.	<i>Purgationes corporum per clyfteres, optimeq; adeo institui poffe.</i>	232
<i>Principium partium triplex.</i>	182	<i>Pygmai an dentur.</i>	20
<i>Processus offium. 33. quotuplex.</i>	ib.		
<i>Processus aliformis.</i>	49		
<i>Processus mammillares cerebri.</i>	249		
<i>Proftata.</i>	320		
<i>Ψάα mufculi.</i>	163		
<i>Πάρεσθες qui dicti.</i>	61		
<i>Pubes.</i>	11		
<i>Pudendum virile. 12. eius proportio.</i>	25		
<i>Pudendum muliebre. 13. eius magnitudo. 25. periculose medicamenti adstringitur.</i>	ib.		
<i>Pudendi muliebris rima magna. 329. labia. ib. ala, feu nymphea. ib. clitoris. ib. caruncule myrtiformes. 330. duo caca foramina. 331. vfus. 337.</i>			
<i>Pudendum muliebre in grauidis fæpe inflamma-</i>			

<i>Renum fascia.</i>	313	<i>Sanguinis ratione animalia duplicia.</i>	212
<i>Renēs succenturiati.</i>	ibid.	<i>Sanguis alimentum omnium partium.</i>	ibid.
<i>Renum caruncula papillares.</i>	315	<i>Sanguis ad prudentiam confert.</i>	214
<i>Renum glandulae. 14. earum figura. ib. substantia.</i>	ibid.	<i>Sanguis offitum alimentum.</i>	38
<i>ibid. vasa. ibid. vsus.</i>	ibid.	<i>Sanguis an possit in venis putrescere.</i>	218
<i>Renum actio.</i>	316	<i>Sanguis cur ex corde pellendus.</i>	359
<i>Renum vsus.</i>	ibid.	<i>Sanguinis venosi color. 179. fibra. ibid. crassities. ib.</i>	ibid.
<i>Renēs ad se ferum trahunt.</i>	ibid.	<i>vsus.</i>	ibid.
<i>Renum calculi vbi generentur.</i>	205	<i>Sanguis menstruus. vide Menses.</i>	
<i>Ren sinister cur dextro magis calculo obnoxius. ibid.</i>	ibid.	<i>Sanguificationis historia.</i>	305
<i>Respiratio. 364. eius causa. ibidem. partes, ibidem.</i>	365	<i>Sanguificationem nec in corde, nec in jecore fieri ut</i>	184
<i>vsus.</i>	130	<i>queat probari.</i>	
<i>Respiratio duplex, libera & coacta.</i>	329	<i>Sanguificatio hepatis. Vide Hepatis sanguificatio.</i>	
<i>Rima magna vulua muliebris.</i>	ibid.	<i>Scapula 61. vide & Os scapularum.</i>	ibid.
<i>Rotatores femoris. 79. externus. ibidem. internus.</i>	80	<i>Scapularum motus. 150. musculi.</i>	34
<i>ibid.</i>		<i>Skeleton.</i>	198
<i>Rotula.</i>		<i> Sectio thoracis vbi facienda.</i>	323
		<i>Semen virile corporis nostri materia non est.</i>	
		<i>Seminis materia sanguis. 324. non tamen quivis, sed</i>	
		<i>perfectissimus. ibid. cur non ex vena porta ducatur. ibid. cur arteriosus.</i>	ibid.
		<i>Semen virile non abit in auras, ut quidam putant</i>	
		<i>statuisse Aristotelem. 323. sed calidum influens, ac</i>	ibid.
		<i>innatum constituit.</i>	
		<i>Semen virile quomodo dicatur $\sigma\gamma\lambda\acute{o}\epsilon\delta\varsigma$ & $\pi\alpha\upsilon\epsilon\mu\alpha$</i>	ibid.
		<i>$\pi\acute{o}\upsilon\delta\varsigma$ apud Aristotelem.</i>	
		<i>Semen virile non asseruatur in testibus, sed prosta-</i>	324
		<i>tis.</i>	
		<i>Semen per quas vias, & quomodo in vrethram coi-</i>	320
		<i>tus tempore deducatur.</i>	
		<i>Semen acedine persusum, & cur.</i>	324
		<i>Senes an minores sint seipsi juvenibus</i>	19
		<i>Serrati maioris musculi vsus ex opinione Autho-</i>	132. 151
		<i>ris.</i>	
		<i>Serrati postici quem vsu habeant ex Authoris</i>	ibid.
		<i>sententia.</i>	
		<i>Sesamoidea osicula. 78. vide & Osicula sesa-</i>	
		<i>moidea.</i>	33
		<i>Sinus osium, & eorum differentia.</i>	372
		<i>Sinus dura cerebri membrana.</i>	11. 278
		<i>Situs viscerum imi ventris.</i>	
		<i>$\sigma\kappa\epsilon\lambda\epsilon\tau\eta\nu$.</i>	34
			$\sigma\omega\phi\phi\sigma$

S

S Acrolumbi musculi, & eorum vsus ex sententia
authoris.

Sacrum.

Saluatella. vide Vena saluatella.

Sanguis, & sanguen.

Sanguinis synonymia nulla. 211. homonymia. ibid.

Sanguinis definitio.

Sanguinis receptacula.

Sanguinis materia.

Sanguinis efficiens causa.

Sanguinis causa finalis.

Sanguinis fibrae.

Sanguis aspectu quidem homogeneus, at reuera heterogeneus.

Sanguinis partes quot, & quae sint. ibid. quas causas habeant.

Sanguinis differentiae quae sint.

Sanguis taurinus an sit venenum.

Sanguis venae portae crassior ac seculentior: ibid. & cur.

Sanguis vasorum partium extremarum rubicundior, quam aliarum.

Sanguis cur rubicundior per cucurbitulas, quam vene sectionem educatur.

σπρουνήσπες ὀδόντες.	57	Sutura senilis abolentur 43. & quæ prius ex ossis.	
σπλωοειδές ὄσσω. 49. vide Os cuneiforme.	318	ibidem.	
Sphincter musculus. 148. eius vsus.	63	Sutura virgæ sexui, & quidem numero pari sunt.	ibid.
Spina dors.		communis.	ibid.
Spinalis medulla. 249. eius etymologia. 377. homonymia. ibid. origo. 378. membrana. ibid. forma.		Sutura quatuorplex.	ibid.
ibidem. nervi.	380	Sutura solis capitis ossibus competunt.	ibid.
Spinalis medulla verus ortus.		Sutura coronalis. 44. sagittalis. ibidem. lambdiformis.	ibidem.
Spiritus ex sanguinis ἀσπρῶς sunt. 221. & seq.		Suturarum quæ dicantur vera. ibidem. quæ mendosa.	ibidem.
Spiritus vitales qui dicantur. 222. non generantur ex aere. ibid. refrigerantur, & cur, in cerebro. 381.	382	Suturarum verarum historia.	ibid.
attenuantur in cerebro.		Suturarum mendosarum numerus.	ibid.
Spiritus animales quomodo generentur. 381. ex qua materia.	ibid	Suturarum communium historia.	ibid.
Spiritus animales nervos in substantia peruadere probatur.	240	συμμενῶς quid significet Hippocrati.	335
Spiritus animalis quomodo in oculo videat, in aure audiat.	325	Symphysis ossium. 35. quatuorplex.	36
Spiritus proprii ad seminis virilis generationem non requiruntur.	ibid	συνάρθρωσις. 36. quatuorplex.	ibid.
Splen. vide Lien.		συνδίστασις.	ibid.
Spleniatum mentum quid.	309	συνέκρωσις.	35
Splenica arteria. vide Arteria splenica.		συνένωσις.	36
Splenica vena. vide Vena splenica.		συνύμενσις. ib. ab Authore inuenta.	ibid.
σπρωγοειδές ὄσσω.	50	συνχόνδρωσις.	ibid.
Stapes auditus osciculū. 49. eius capitulum. ibid.		συσσάρκωσις.	ibid.
basis. ibid. situs.	271		
τίσας.			
Sternum. vide Os pectoris.			
Sternutatio nimia quomodo quibusdam repentinam eacitatem attulerit.	243		
Stillicidium pro ventriculo cur satius sedentibus, quam decumbentibus fiat.	280		
Stomachus pro ventriculo apud Latinos sumitur.	288		
Subclauij musculi vsus ex Authoris opinione.	132. 137		
Supercilia sinuum ossium.	34		
Suppositoria ex helleboro albo quomodo sæpe grauia symptomata inferant.	232		
Sutura quid. 37. 43. eius ambiguitas. 37. vsus triplex.	42		

T

Tactus immediatum instrumentum caro, & quomodo.	269
Talus 82. eius sex latera.	83
Talus improprie de malleolis dicitur.	16
Tarsus. 82. eius ossa. 84. motus. 167. musculi.	ibid.
Tendo musculi quid sit.	106
Tendo pars similis.	ibid.
Tendo pars simplex, & sui generis.	ibid.
Tendo per totum musculi corpus, & quidem secundum longitudinem diffunditur.	ibid.
Tendo diuisus carne stipatur.	ibid.
Tendo contractioni maxime opportunus.	ibid.
Tendinis substantia.	107
Tendinis temperies.	ibid.
Tendinis temperiem consequentia.	ibid.
Tendo tantum secundum musculi longitudinem ducitur.	ibid.
Tendo non tantum in fine, sed & principio musculi reperitur.	ibid.
Tendo	

Tendo est primaria musculi pars. <i>ibid.</i> probatur id quatuor rationibus. <i>ibid.</i>	363
Tendo illa pars est per quam fit musculi contra- ctio. <i>ibid.</i>	372
Tendo modo vnitus est, modo diuisus. 107. & cur. <i>ibid.</i>	33
Testes vnde dicantur Latinis. <i>ibid.</i>	292
Testes viriles. 319. eorum substantia. <i>ibid.</i> partes. <i>ib.</i> magnitudo. <i>ib.</i> figura. <i>ibid.</i> musculi. <i>ibid.</i> tunica quatuor. <i>ibid.</i>	57
Testes viriles nunquam in se semen continent. 325	330
Testes viriles non generant semen, nec in se, neq; in alio per irradiationem. <i>ibid.</i> quibus argumentis id probari possit. <i>ibid.</i>	79
Testes viriles non habent in se spiritus proprios, tan- quam in fonte suo. <i>ibid.</i>	336
Testes viriles non egent peculiari spiritu ad seminis generationem. <i>ibid.</i>	364
Testibus virilibus ablatis, aut latis, cur generandi vis pereat, cum testes semen non generent. 326	33
Testium virilium verus vsus ex authoris senten- tia. <i>ibid.</i>	V
Testes viriles quomodo ad seminis generationem se- cundario conferant. <i>ibid.</i>	Valuula venarum. 180
Testes viriles serosum humorem continent. <i>ibid.</i>	Vasorum natura. 178
Testis sinister cur dextro maior. <i>ibid.</i>	Vasa caca muliebria. 336
Testes muliebres. 335. differentia eorum cum testibus virilibus, in situ, substantia, figura, tunicarum numero, magnitudine. <i>ibid.</i> & seq.	Vasa deferentia viri. 320. eorum substantia. <i>ibid.</i> or- tus. <i>ib.</i> progressus. <i>ibid.</i>
Thorax, & eius partium appellationes. 9	Vasa deferentia muliebria. 336. non implantantur in vteri ceruicem, vt censuit Andr. Laurentius. <i>ibid.</i>
Thoracis ambiguitas. <i>ibid.</i> etymologia. <i>ibidem.</i> diui- sio. <i>ibid.</i>	Vasa emulgentia. 314
Thoracis figura. 22. magnitudo. <i>ibid.</i>	Vasa preparantia virilia. 318
Thoracis motus. 129	Vasa preparantia muliebria. 336. in quo conue- niant cum virilibus, & differant, <i>ib.</i> qualia in gravidis sint. 340
Thorax cur ex carne & ossibus constet. 69	Vena. 177. eius ambiguitas. <i>ibid.</i>
Thorax imprudenter stringitur infantibus. 23	Venarum diuisio. 178. definitio. <i>ibid.</i>
Thoracem dilatantes constringentesq; musculi quid sint, & qui. 132. Extendentes quot ex opinione a- liorum. 134. ex authoris sententia vnus tantum 135. Fleccentes. 137	Venarum & arteriarum discrimina. <i>ibid.</i>
Tibia, & eius partium appellationes. 16	Vena est vas. <i>ibid.</i>
Tibia motus. 165. musculi. <i>ibid.</i>	Venarum sanguis in quibus ab arteriarum sanguine differat. 179
	Venarum substantia simplex. <i>ibid.</i> non tamen vbi- que. <i>ibid.</i>
	Venarum fibra. <i>ibid.</i> quot earum genera. <i>ibid.</i>
	Vena sensu carent. <i>ibid.</i>
	Venarum figura. <i>ibid.</i>
	Venarum magnitudo. <i>ib.</i> quotuplex. <i>ibid.</i>
	Venarum numerus. 180
	Venarum situs. <i>ibid.</i>
	Venarum valuula. <i>ib.</i> quis earum inuentor primus. <i>ibid.</i>
	Venarum actio. 181
	Vena-

<i>Venarum differentia.</i> ib. à substantia. ib. à magnitudine. ib. à figura. ibi. à sede. ib. à connexionione. 182 ab usu. ib.		<i>Vena encephalica.</i>	200
<i>Venarum connexio varia.</i>	ib.	<i>Vena frontis.</i> 201. magna cum utilitate in infania aperitur.	ibid.
<i>Vena comites ubiq³ arterias habent.</i>	ib.	<i>Vena hemorrhoidalis interna.</i> 192. externa.	206
<i>Vene olim nervi dicti.</i>	239	<i>Vena hypogastrica.</i>	ib.
<i>Venarum principium nullum ex Hippocratis sententia.</i> 182 quomodo probari id possit.	ib.	<i>Vena iugulares.</i>	202
<i>Venarum principium male ab Aristotele cor positum.</i> 184. male item Iecur à Galeno.	186	<i>Vena lumbares.</i>	206
<i>Vena sunt que in hepate sanguificant, non parenchyma.</i> 184. quomodo id probetur.	ib.	<i>Vena mediana.</i>	202
<i>Venarum cur due tantum sint facta.</i>	188	<i>Vena poplitea.</i> 209. celebris apud Medicos, & cur. ib. difficulter secari potest, & cur. ib. fonticulo infra facto euacuatur.	ib.
<i>Venarum electio in brachio dum secanda sunt, non ita religiose observanda, & cur.</i>	204	<i>Vena porta qua dicatur.</i> 188. & vnde. ib. quomodo apud Priscos vocetur. ib. est crassior caua. ib. est minor caua. 189. quas partes alat.	190
<i>Vena cutanea que dicantur.</i>	266	<i>Vena porta diuisio in radices, truncos, & ramos.</i>	ibid. & seq.
<i>Vena secunda dextri cordis ventriculi cur arteria substantiam habeat.</i>	357	<i>Vena porta radices.</i>	ibid.
<i>Vena micans.</i>	220	<i>Vena porta truncus.</i>	191
<i>Vene adiposa.</i>	204	<i>Vena porta rami duo insignes.</i>	ib.
<i>Vena azygos, siue sine pari.</i> 315. eius ramus ad emulgentem sinistram abiens.	ib.	<i>Vena porta vsus.</i>	193
<i>Vena arterialis historia.</i> 236. eius vsus.	237	<i>Vena porta cum caua in hepate anastomoses.</i> 189. & seq.	
<i>Vena basilica.</i> 203. in dextro brachio Hepatica dicitur, in sinistro Splenica. ib. in duos ramos diuiditur.	ibid.	<i>Vena porta & caua differentia.</i>	189
<i>Vena Caua, qua dicatur.</i>	188	<i>Vena preparantes viri.</i> 318. dextra. ib. sinistra.	ib.
<i>Vene caue descriptio sic tradenda est, ac si ex hepate oriantur, idq³ propter authores.</i>	196	<i>Vena saluatella.</i> 203. in affectibus melancholicis admodum commendatur, & qui possit prodesse ostenditur.	ibid.
<i>Vena Caua ratione Hepatis, duos veluti truncos constituit.</i>	197	<i>Vena saphena.</i>	208
<i>Vena Caua truncus ascendens.</i> ibid. truncus descendens.	204	<i>Vena spermatica.</i>	205
<i>Vena Cephalica.</i> 202. à Vesalio Humeraria dicitur. ibid. cur sic dicatur.	ibid.	<i>Vena splenica.</i> 191. quos ramos spargat.	ib.
<i>Vena Cephalica semper sine: at Basilica cum impetu secta sanguinem fundit, & quare.</i>	221	<i>Vena umbilicalis.</i>	210
<i>Vena Cephalica manus.</i> 203. magna cum utilitate in capitis dentiumq ³ affectibus aperitur.	ib.	<i>Venter quid.</i> 2. eius ambiguitas.	ib.
<i>Vena deferens Viri sinistra cur ex emulgente oriatur.</i>	206	<i>Venter medius calori influenti dicatur.</i>	341
<i>Vena emulgentes.</i>	204	<i>Ventris medius situs.</i> 341. figura. ib. partes duplices, continentes, & contenta.	342
		<i>Venter supremus.</i> 367. eius situs. ib. substantia. ib. partes.	ibid.
		<i>Ventriculus.</i> 289 eius figura. ib. situs. ib. annexio. ib. magnitudo. ibid. substantia. ib. orificia. 290. vasa. ibid. actio.	ib.
		<i>Ventriculi orificium superius, Græcis κορυδα, dicitur.</i>	ibid.

- Ventriculi situs naturalis.* 280. *nonnaturalis.* *ibid.*
praternaturalis. 281
Ventriculus ex vulnere Diaphragmatis in Thorace
ascendit. *ibid.*
Vermes in venis interdum generari. 218
Vertebrae. 63. *earum vsus.* *ib.* *numerus.* *ib.* *commu-*
nia quae habent. *ibid.*
Vertebrarum corpus. *ibid.*
Vertebrarum processus triplices. *ibid.*
Vertebrarum foramen proprium & commune. 64
Vertebrarum connexio. *ibid.*
Vertebrae Cervicis. *ib.* *interdum septem, nonnun-*
quam & octo sunt. *ib.* *quae communia inter se*
habeant. *ibid.*
Vertebrarum cervicis prima quid proprii habeat.
ibid.
Vertebrarum cervicis secunda quid proprii habeat.
65
Vertebrarum cervicis quatuor secunda subiacentes
quid proprii habeant. *ibid.*
Vertebrarum cervicis septima quid proprii habeat.
ibid.
Vertebrae thoracis. *ib.* *quid commune inter se habe-*
ant. *ib.* *quid proprii praeter aliis vertebri.* 66
Vertebrae lumborum. 67. *quid commune inter se*
habeant. *ibid.*
Vertex. 368
Vesicae. 288
Vesicula biliaria. 306. *eius connexio.* *ib.* *magnitu-*
do. *ib.* *figura.* *ib.* *substantia.* *ib.* *mucosa substan-*
tia qua intus oblitur. 307. *vasa.* *ibid.*
Vesicula biliaria partes dissimilares fundus, & cer-
vix. *ib.* *meatus biliarii.* *ibid.* *communis canalis.* *ib.*
vsus. *ibid.*
Vesicula seminales. 320. *earum humor oleagineus.*
ib. *vsus.* 326. *cur plures sint facta, nec vna sola.*
327. *cur anfractuosa.* *ibid.*
Vesica urinaria. 316. *eius synonymia.* *ib.* *situs.* *ib.*
& 282. *connexio.* 316. *figura.* 317. *partes disti-*
milares. *ib.* *substantia.* *ib.* *membrana.* *ib.* *forami-*
na tria. *ib.* *musculi.* *ib.* & 148. *vasa.* 317.
Vesica urinaria fundus. *ibid.* *cervix.* *ib.* *corpus.* *ib.*
Vesicae foramen in pudendo muliebri. 330
Via, per quam colici dolores in paralyfin, & epile-
psiam degenerant. 233. *in arthritidem, & con-*
tra commutantur. 232
Via per quam thoracis empyema & aqua euacua-
tur, ex Falloppii primii sententia, deinde & A4-
thoris. 315. *vide & 198. & 227*
Via per quas Lien repurgatur. 316
Via, per quam humores pravi ad intestina detur-
bantur ex Liene. 230
Via per quam hydropicorum aqua expurgantur ad
intestina. *ibid.*
Via, per quam potus per vniuersum corpus subito
penetrat. *ibid.*
Via, per quam pravi humores ex liene vomitu rei-
ciuntur. *ibid.*
Via, per quam atra bilis purgatur. 232
Victus tenuis cur purgamentis assumptis praescriben-
dus. 230
Virginibus cur sanguis in coitu effluat. 331
Vir peccatus dorso pilosus habet, ut ventrem ab umbi-
lico ad vsque perinaum. 270
Viscerum imi ventris situs. 11. 278
Viscerum imi ventris diuisio. *ibid.*
Viscerum obstructions quae faciant in animi affecti-
bus cordis palpitaciones. 348
Viscerum paruitas signum bonarum carniū la-
nionibus. 309
Visus instrumentum. 387. *obiectum.* *ib.* *Mediu.* *ib.*
Vita quid sit. 355
Vlceracrafforum intestinorum cur vlcerebus tenuio-
rum frequentiora. 230. 282
Vlna. *vide Os cubiti.* 11
Umbilicus. 10. *centrum imi ventris, imo totius cor-*
poris. 11
Umbilicalis vena & arteria, quomodo post editum
fœtum in ligamenta abeant, ex opinione Hiero-
nymi Theobaldi. 361
Unctio supra umbilicalem regionem facta qui pur-
get. 232
Unguium, & eorum partium appellationes. 15
Ungues non sunt cartilaginei. 86. *nec ossa.* *ibid.* *sed*
partes

partes sui generis. <i>ib.</i> nutriuntur.	212	Vteri os inuerfum, induratum, exulceratū, cicatrice obductum, aut nimis humidum cur sterilitatem inducat.	<i>ibid.</i>
Ungues habent vasa omnis generis. 86. sunt pradi- ti sensu.	<i>ib.</i>		
Vnguuium vsus.	87	Vteri os in grauidis coniuict, nō exacte clauditur, vt alij censent, & quomodo id deprehenda- tur.	335-339
Vreteres. 314. eorum substantia. <i>ib.</i> ortus. <i>ibid.</i> pro- cessus. <i>ib.</i> membrana. <i>ib.</i> insertio. <i>ibid.</i> magnitu- do.	<i>ib.</i>	Vteri fūdus. 332. eius synonymia. <i>ib.</i> situs. 333. ma- gnitudo. <i>ib.</i> figura naturalis. <i>ib.</i> nō naturalis dū gestat. <i>ib.</i> connexio. <i>ib.</i> ligamenta quatuor. <i>ibid.</i>	
Vreterum tubuli.	315	Vteri in grauidis magnitudo. 340. substantia. <i>ib.</i> figura. <i>ib.</i> situs.	<i>ibid.</i>
Vreterum peluis.	<i>ibid.</i>	Vteri ligamenta superiora. 333. vteri ligamenta inferiora. 334. in muliere, quæ ex coitu nimio mortua dicebatur plena semine reperta. <i>ibid.</i>	
Vrethra. 322. vide & Penis canalis.		qualia in grauidis sint.	340
Vrethra per medium prostaticarum in exortu in- cedit.	320	Vteri os internum mensium tempore hiat. 207.	<i>ibid.</i>
Vrethra seminis ac vrina communis via.	<i>ib.</i>	vnde sciatur.	
Vterus. 331. eius partes tres, Ceruix, Osculum, & Fundus.	332	Vteri os internum grauidis hiat, tantoq; magis, quanto sunt partui viciniore. 340. vt id scia- tur. <i>ib.</i> occluditur tamen crassa viscidaq; ma- teria.	<i>ibid.</i>
Vteri substantia.	334	Vtero ad medium coxæ procidente cur conuulsio- nes fiant. 353. item cum menses supprimuntur, & dolor fiat in imo ventre, & in laterum mol- litudine.	<i>ib.</i>
Vteri membrana.	<i>ibid.</i>	Vteri consensus per arterias venasq; potius, quam neruos in hysterico fit affectu.	335
Vteri cotyledones, siue acetabula.	<i>ibid.</i>	Vulua & eius partes.	13
Vteri cornua.	<i>ibid.</i>	Vulua. vide Pudendum muliebre.	
Vteri cavitates.	<i>ibid.</i>		
Vteri futura.	<i>ibid.</i>		
Vteri vasa, vena, arteria, & nerui.	335		
Vteri situs naturalis.	282		
Vteri ascensus. 333. descensus. <i>ib.</i> inclinatio. <i>ib.</i> an vere locum mutet.	<i>ibid.</i>		
Vteri ceruix. 331. eius situs. 332. substantia. <i>ib.</i> ru- ge interiores. <i>ib.</i> connexio. <i>ib.</i> contorta est, vbi non recipit penem virilem. <i>ib.</i> vsus. 337. in gra- uidis insigniter abbreviatur.	339		
Vteri ceruicis osculum externum. 331. internum.			
332. vtriusque vsus.	337		
Vteri os internum. 332. eius situs. <i>ibid.</i> figura. <i>ibid.</i> coniuientia perpetua. <i>ibid.</i> apertio in coitu & partu.	<i>ibid.</i>		

Z.

Ziphac.
Zirbus.

175
183

1054



I
Spigellus

